

MANVALE  
MEDICORVM,

SEU

ΣΥΝΑΞΙΣ

APHORISMORVM  
*Hippocratis, Prænotionum, Coactarum,  
& Predictionum, secundum propriam  
morborum omnium nomenclaturam,  
Alphabetico digesta ordine.*

Labore & industria D. HONORATI  
BICAISII D. M. in celeberrima  
Aquensi Gallo-Prouinciæ Vni-  
uersit. Regia publici Pro-  
fess. primarij.



GENEVÆ,

Sumptibus Petri Chouët.

M. DC. LX.





# LECTORI

Beneuolo, S.

**S**PARSA passim Di-  
ui Hippocratis pla-  
cita (Lector claris-  
sime) ea qua potui  
industria redegī, ut tanti viri  
doctrina, fervor aliquis accref-  
ceret. Scimus enim radiare in  
cælo Solem, à quo abstractus  
magnam sui luminis partem a-  
mitteret: scimus sydera in firma-

A 2.



mento micantia, quæ si ab hoc  
extraherentur, fulgere desine-  
rent, sic varia principis nostri  
monita non elucerent, seu (ut  
verius dicam) incognita iacerent,  
nisi locum illis designassem. Ha-  
bes igitur in hoc precioso libello  
non confusè tanquam in lapidi-  
cinis, sed ordinatè ut in annu-  
lo aureo divites gemmas coacer-  
vatas, illum lege, illum fove,  
illum ama, si cupias magnus es-  
se medicus. Reclusit in scrinio  
lapillis ornato Homeri poemata  
Alexander, vellem ego ut in pe-  
toris tui abdita, vel (ut rectius  
loquar) in memoria tue pene-  
tralia

tralia hunc includeres libellum.  
Hac præcipua de causa publi-  
cum feci ut fluxilem memoriam  
invarcm; meum feceram nisi  
quibus nihil unquam justè dene-  
go substraxissent amici. Quod  
si à te mea non probetur industria,  
sat erit, ut cum Poeta dicam,

Hæc si displicui fuerint  
solatia nobis,  
Hæc fuerint nobis præ-  
mia si placui.

Interim vale, dum alio pro-  
perat calamus, ut quæ in primo  
promisit opere exaret.

Ne prætereas moneo in ma-



serie alicujus questu, analogas  
inquirere literas seu consimilis  
naturæ titulos quales esse possunt,  
In sania, Delirium, Phreni-  
tis, &c.



MA

A

R



# MANVALE MEDICORVM,

SEU

ΣΥΝΑΞΙΣ

APHORISMORVM  
Hippocratis, Prænotionum, Coaca-  
rum, & Prædictionum, secundum  
propriam morborum omnium nomen-  
claturam, Alphabetico digesta ordine.

ABORSVS.



I mulieri geminos ferenti mam-  
mæ subito extenuentur abortus  
sequitur, aph. 37. sec. 5.

Mulieri geminos ferenti si alte-  
ra mamma extenuetur, alterum abortu edit,  
siquidem dextera mamma extenuata est ma-  
rem, si verò sinistra, foeminam abortione  
excludit, aphor. 38. sec. 5.

A 4



Quæ præter naturam tenues utrum gerunt, abortiunt donec habitiores evaserint aphor. 44. sec. 5.

Quæ verò mediocriter corpulentæ abortum faciunt secundo mense aut tertio sine occasione manifesta, iis cotyledones lentoris sunt plenæ, nec præ pondere fœtum continere possunt, sed abruptis decidit. aph. 46. sec. 5.

Quæ ex partu & abortu copioso celeriter iam impetu feruntur, si subsistant molestiam exhibent, huiusmodi mulieribus rigor inimicus est, & alvi perturbatio, præcipue si præcordiorum dolore vexentur, 56. sec. 2. l. 2. co.

Ex abortione ubi alba de repente percurrunt, si rigor aliquis corripiat & ad femur impetus vnde prægnans fiat, tremor molestus subit, 54. sec. 2. l. 2. co.

Quæ fœtum sunt perdituræ, iis mammae extenuantur, contra verò duræ si fiant, dolor aut mammas, aut coxas, aut oculos, aut genua fatigabit, nec abortiunt, aph. 53. sec. 5. Vide partum.

### ABSCESSVS.

In febribus abscessus qui primis iudicationibus non solvuntur, longitudo morbi significant. aph. 51. sec. 4.

Considerandum in quibus speramus abscessus circa aures futuros, num ex capite doleant, an superiorum partium tenues sudores oboriantur,

oboriantur, aut novus insuper rigor, ac deinde num alvus affatim prorumpat, aut aliquo sapore detineantur. Videndum quoque num vrina diluta cum sublimibus quibusdam innatantibus albidis & quæ varia exalbescunt, & graveolent, abscessus ad aures exeant, ac fortè quidem quibus huiusmodi vrinae adsunt, iis crebra de naribus stillatio contingit, an & his quidem lingua lævis est ac minime aspera, 163. l. 2. sec. 2. co.

Graves atrium abscessus qui citra iudicationem sensim conquiescunt & dissipantur, damno sunt, 170. l. 1. sec. 2.

Vide Anginam, dolorem renum, vide febrium soporem.

### ACVTI.

In morbis acutis non omnino certæ sunt mortis aut salutis prædictiones, aph. 19. sec. 2.

Morbi acuti generantur intra dies quatuordecim, aph. 23. sec. 2.

In præcipiti morbo si partes externæ perfrigerentur, internæ verò vrantur ac sitis vrgeat, malum denunciatur, 115. sec. 2. l. 2. co.

In præcipiti morbo, capitis dolor, & præcordia revulsa, nisi sanguis ex naribus profuatur ad phernicidem deveniunt, 119. sec. 2. l. 2. co.

Vide bilem atram, crifim, faciem.

### ALVVS.

Quibus in iuventute alvus est humecta iis in senectute siccatur, quibus contra siccata



**A**  
astrictaue juvenibus fuit, iis senibus hume-  
sta laxaue sit, aph. 20. sec. 2.

Alvi durities cum dolore, vna cum febribus, horrois sensu insignibus, ac cibi fastidio, laborantibus, paululum humectata alvo, ad suppuracionem non tendit, 640. sec. 2. l. 2. co.

Quibus alvus est humida juventam quidem agunt facilius quam qui eandem siccam habent, sed senectute difficilius defunguntur; ipsis siquidem senescentibus ferè resciscantur, aph. 21. sec. 3.

Vbi alvus intercepta est & arctè conclusa, parvaque & nigra caprarum stercorebus similia, nec nisi coacta emittit, hoc casu sanguis è naribus erumpens periculo est, sent. 47. l. 1. sec. 2. prædict.

Alvus circumtensa ex medici industria siquida dimittens, celeriter intumescens, convulsionis significationem quandam præ se fert, quod & Aspasij filio contigit, in his novus subortus rigor perniciem facit, ex his casibus convulsione tentato ac inflato vbi diutius morbus traxerit, ex ore putrida & virulenta prodeunt, 99. l. 1. sec. 2. præd.

Alvi fluxus, vide excrementa & crism.

Alvi, vide dolorem juguli & præcordiorum.

Alvi durities cum dolore in febribus horrois sensu insignibus ac cibi fastidio laborantibus nisi paululum humectata alvo purgationem faciat, ad suppuracionem tendit,

303. sec. 2. l. 2. co.

Eandem habet sententiam, 140. sec. 2. l. 2. co.

Alvus perturbata saluginosa demittens; vna cum febre non admodum torpore & fopore oppressos consequitur; 641. l. 2. l. 2. c.

Alvi solatio quæ præter rationem accidit, cum voce tremula in his diutius perseverante perturbatione perniciem intentatur, 258. sec. 2. l. 2. co.

Longo alvi profluvio laboranti sponte vomitus superveniens morbum solvit, aph. 13. sec. 6.

Mulieri veterum gerenti si alvus multum fluat, periculum est ne abortiat, aph. 34. sec. 5.

Biliosus alvus perturbata exigua reddens genituræ similia & mucosa, doloremque ad intum ventrem inferentia, vrinæ quoque non facile prodeuntes, ad hydropem tendunt ex huiusmodi casibus, 455. sec. 2. l. 2. co.

### ANXIETAS.

In Anxietate laborantibus cum alvi turbulenta suppressione celeriter velut culicum punctura in cutem erumpunt & ad oculos lachrymosus abscessus procedit, 564. sec. 2. l. 2. co.

In Angore & pervigilio vexatis ad aures abscessus maxime obveniunt, 563. sec. 2. l. 2. co. vid.

### ANGINA.

Quibus ex Angina in pulmonem mali



conversio, ij intra dies septem moriuntur: si  
verò hos effugerint purulenti evadunt, aph.  
10. sec. 5.

Anginæ in quibus neque in collo, neque  
in faucibus quidquam apparet, sed quæ vehe-  
mentem suffocationem ac spirandi difficul-  
tatem adferunt, eodem aut tertio die necant,  
363. sec. 2. l. 2. co.

Quæ verò tumorem ac ruborem in collo  
capiunt, in reliquis quidem eodem modo se  
habent, verum diuturniores sunt, 364. sec. 2.  
l. 2. co.

Præcipue autem malum prerogatur, qui-  
bus non solum fauces, sed cervicem quoque  
& pectus unâ rubor occupat, maximè verò  
potest inde secunda valetudo contingere, si  
rubores ad interna minimè revertantur, quod  
si evanescant neque in exteriores partes con-  
versum sit tuberculum, neque plus facili &  
sine dolore exerceatur, aut neque ista diebus  
judicatoris contingant, perniciem denun-  
tiant. Ac fortasse etiam sappurati fiunt. Se-  
nitatis autem indicium est, ruborem & abs-  
cessus ad externas quàm maximè partes ver-  
gere, 365. sec. 2. l. 2. co.

Quibus Angina ad pulmonem divertit,  
partim quidem intra septem dies pereunt,  
partim verò liberati pus intro colligunt, nisi  
pituitosa sursum educantur, 367. sec. 2. l. 2. co.

In Angina laborantibus, subarida sputa,  
gracilescentibus faucibus malum prænun-  
tiant,

tiant, 369. sec. 2. l. 2. co.

In Angina linguæ tumores absque vlla si-  
gnificatione evanescentes periculum denun-  
tiant. Quum etiam dolores citra evidentem  
causam disparentes perniciem ostentant, 370.  
sec. 2. l. 2. co.

Angina laborantes nisi celeriter costâ ex-  
pungant perniciosè habent, 371. sec. 2. l. 2. co.

In Angina absque vlla significatione, re-  
sudantes in caput dolores cum febre pericu-  
lum indicant, 372. sec. 2. l. 2. co.

In Angina laborantibus absque vlla signi-  
ficatione, delati ad crura dolores cum febre  
perniciosi, 373. sec. 2. l. 2. co.

In Angina laborantibus absque vlla signi-  
ficatione, gracilescentibus faucibus, dolor  
intensus ad pectus aut ad alvum progressus,  
purulentas dejectiones facit, alioqui autem  
tale quid solutionem præ se fert, 375. sec. 2.  
l. 2. co.

In Angina quæcumque conspicuum dolo-  
rem non producit periculi plena sunt, quin  
etiam diuturni sunt, qui ad crura progredun-  
tur dolores ægreque ad pus deducuntur, 376.  
l. 2. l. 2. co.

Angina correpto si tumor appareat in col-  
lo bonum, foras enim morbus existit, aph.  
37. sec. 6.

Ab Angina detento, tumor & rubor in  
pectore superveniens bonum, foras enim  
morbus vergit, aph. 59. sec. 7.



Angina gravissima quidem est & celerimè interimit, quæ neque in faucibus, neque in ceruice quicquam conspicuum facit, plurimum verò dolorem exhibet & difficultatem spirandi, quæ erecta ceruice obitur, inducit hæc enim eodem etiam die & secundo, & tertio, & quarto, strangulat, at quæ in feliquis quidem similiter dolorem exhibet, in faucibus vero tumorem ac rubores excitat, admodum quidem exitialis est, priore tamen longe diuturnior, cum non solum fauces, sed cervicem quoque rubor occupat, ex eaque præcipue evadunt, si cervicem & pectus robur detineat, neque ad interna erysipelas revertatur, quod si neque diebus indicatoriis dispareat erysipelas, neque tuberculum ad exteriorem sedem se verrat, neque pus rufissim rejiciat, facileque ac sine dolore habere videatur, mortem indicat aut ruboris reversionem, at securius est tumorem & ruborem ad externa converti, quod si ad pulmonem se vertat, dementiam excitat, & ex his nonnulli suppurati plerumque evadunt: gurgulio quam & tumor & rubor occupat non sine periculo rescatur aut perunditur, inflammationes enim & sanguinis profluvia ei succedunt. Verum talia ut extenuentur aliis rationibus eo tempore tentanda sunt, ubi verò totum secretum fuerit, & summa gurgulionis pars maior & rotunda, superior autem tenuior extiterit, per id tempus manum admo-

admovere tutum est, ex l. prænot.

### APOPLEXIA.

Apoplexiam fortem nullo profus modo debilem ægrè curaveris, aph. 42. sec. 2.

Strangulati aut suffocati, nondum tamen mortui ad se non redeunt, quorum circa os collecta spuma apparuerit, aph. 43. sec. 2.

Apoplexia autem fit maximè à quadragésimo anno, ad sexagesimum, aph. 57. sec. 6.

### AQVA

Aqua quæ citò calefit, & citò refrigeratur, levissima, aph. 26. sec. 5.

### ATRA BILIS.

Febrium initio si atra bilis sursum aut deorsum prodeat lethale est, 68. s. 2. l. 2. co. vide bilem, dysenteriam.

### AVSTER.

Vide tempus.

### AVTVMNVS.

Vide tempus.

### AQVILO.

Vide tempus.

### AVRIS.

Vide tinnitum, surditatem, tuberculum.

### ÆGROTARE.

Minus periculosè ægotant quorum vel naturæ, vel ætati, vel consuetudini, vel temporis familiaris morbus est, quàm quibus nullo horum affinis cognatusque existit, aph. 34. sec. 2.

### ÆRVGINOSI.



Æruginosi non admodum ventrosi, aph. 71. sec. 5.

## Æ T A S.

Quod ad ætates verò pertinet, verè & prima ætate, pueri & his ætate proximi optimè degunt valentque maximè, ætate verò & autumni ad alium vsque partem senes. Reliquo autumno & hyeme qui mediam ætatem agunt, aph. 18. sec. 3.

Secundùm ætates autem hi sunt morbi, parvis & nuper natis puerulis, oris vlcera, vomitiones, tussis, vigilix, pavores, vimbilici inflammationes, aurium humiditates, aph. 24. sec. 3.

Adventante dentitionis tempore, gingivarum pruritus, febres, convulsiones, alvi profluvia, maximè cum caninos edunt & iis præsertim qui crassissimi sunt, & qui alvo sunt dura, aph. 35. sec. 3.

Ipsis verò grandiusculis tonsillarum inflammationes, vertebræ in occipitio introrsum luxationes, anhelationes, calculi, lumbrici rotundi, ascarides, verrucæ pensiles, laryngitismi, strangurix, strumæ, & alia tubercula, præcipuè verò ante dicta, aph. 26. sec. 3.

Grandioribus autem & ad pubertatem accedentibus, superiorum etiam morborum multi, & febres diuturniores potiùs, & ex naribus sanguinis fluxiones, aph. 27. sec. 3. vide morbum, v.

Quod ad ætates autem attinet, tubercula quidem

Quidem suppurantur, atque eadem strumosa magna ex parte pueros exercent, facileque ex his levantur, at iisdem ubi paululum ætate processerint atque adoleverint, nascuntur quidem minùs ac difficiliùs tolluntur. Viris autem id genus tubercula non admodum fiunt, verum favi formidabiles & cancri abditii desertum, & ex pustulis noctu inquietantibus (quas *brannides* vocant) ulcera serpentina quos herpes nominant, donec annos sexaginta longè superarint. Senibus verò ex huiusmodi tuberculis nullum accidit, at cancri latentes, quique summa corporis infestant, fiunt, & ad mortem comitantur, ex locis difficiliùs sanantur alæ, ac laterum cavitates & femora, in his namque humores resident & recidivæ fiunt, & ex l. 2. præd.

Ætas, æstus, æstivatio, vide tempus, calor.

## BALBI.

Balbi longo alvi proflavio maximè corripiuntur, aph. 32. sec. 6.

## BILIS ATRA.

Morbis quibuslibet incipientibus si atra bilis suprâ exierit periculofum, aph. 22. sec. 4.

Quibus per morbos acutos, aut diuturnos aut vulnera, aut alium modum extenuatis, atra bilis aut velut sanguis niger subierit, postmodum moriuntur, aph. 23. sec. 4. vide atram bilem.

## BILIOSVS.

Vide alvum.



## BIBERE.

Quibus noctu bibendi est aviditas, iis obdormiscere bonum est, aph. 27. sec. 5.

## BVBO.

Ex bubone febres omnes malæ, præter ephemeræ, aph. 55. sec. 4.

## CAPVT ET CEREBRVM.

Quæ caput quodammodo concutiunt, cum intensa oculorum rubedine ac manifesto delirio, perniciem denunciant, neq; tamen hoc ad mortem comitatur, verùm circa aures tumorem excitat, 163. sec. 2. l. 2. co.

Quæ caput concutiunt & aurium sonitus excitant, sanguinem è naribus profundunt aut mulieri menstrua deturbant, idq; præsertim si ad spinam ardor consequatur, fortasse etiam difficultas intestinorum expectanda est, 167. sec. 2. l. 2. co.

Qui capite gravati ad sinciput dolorem sentiunt, per vigilio torquentur, iis sanguinis eruptionem fore spes est; tum vero præcipuè, si aliquis contensionis sensus ad cervicem pertingat, 168. sec. 2. l. 2. co.

Quibus concussum fuerit cerebrum, vel ex plaga doluerit, aut aliquo casu, his illico vox deficit, neque vident, neque audiunt, fereq; intereunt, 194. sec. l. 2. co.

Quibus occasione aliqua cerebrum fuerit vehementer concussum, mutos protinus fieri est necesse, aph. 58. sec. 7.

Quibus divisum est cerebrum, his febrem & bi-

& biliosum vomitum supervenire est necesse, aph. 50. sec. 6.

## CALVI.

Qui calvi fiunt, iis varices magni non fiunt, quibus verò calvis existentibus varices superveniunt, ij rursus capillati fiunt, aph. 34. sec. 6.

## CALCVLVM.

Calculo laborantes eo habitu constituti, ut ne urinariam fistulam calculus illabatur, promptè urinam reddunt, 472. f. 2. l. 2. co.

## CALIDVM.

Calidum frequentiore usu hæc invehit incommoda, carnis effœminationem, nervorum incontinentiam, animi torporem, profusiones sanguinis, animi deliquia, ad quæ quidem mors, aph. 16. sec. 5.

Calidum in quo ulcere pus movet, maximum securitatis præstat indicium, curam emollit, extenuat, dolorem lenit, rigores, convulsiones, tetanos mitigat, capitis gravitatem solvit, ossibus fractis plurimum prodest, maximè si nudata sint, multoq; magis si in capite. His etiam prodest quæ moriuntur aut ulcerantur à frigore. Herpetibus denique exedentibus, sedi, pudendo utero, vesicæ: His omnibus calidum amicum & decretorium, frigidum inimicum & interimens, aph. 12. sec. 5.

## CALOR AVT FRIGVS.

Ex qua parte corporis in est calor aut frigus, ibi morbus, aph. 39. sec. 4.



Quando toto corpore mutationes acci-  
dunt, ut si corpus refrigeretur & vicissim ca-  
lescat, longitudinem morbi significat, aph. 41.  
sec. 5.

Relicti in præcordiis æstus cum febre, in  
qua totius corporis habitus perfrigeratur,  
malo sunt, idque præsertim si cum sudori-  
bus contingat, 7. sec. 2. l. 1. præd.

## CANCER.

Quibus oculi cancri adsunt, non curare  
melius, curari enim citius intereunt, non cu-  
rati verò longius vitam trahunt, aph. 38. sec. 6.

## CARUNCULA.

Vide urinam, dysenteriam, excrementa.

## CERVIX.

Cervix dura cum dolore, & maxillarum  
connexio, ac jugularium venarum palpatio  
vehemens cum tendinum distentione perni-  
cium minatur, 261. sec. 2. l. 1. co.

## CIBVS.

Paulo peior, sed suavior cibus æ potus,  
meliori quidem, at ingrato præferendus, aph.  
37. sec. 2.

Si quis febricitanti cibum præbeat, quem  
sano exhibet, valenti robur, ægrotanti mor-  
bus fit, aph. 55. sec. 7.

Si à morbo cibum adhibens quispiam vi-  
res non recipiat, copioso alimento corpus  
onerari indicat: si verò modicè epulanti  
idem eveniat, vacuatione indigere certum  
est, aph. 81. sec. 2.

Si à

Si à morbo bellè comedenti corpus non  
proqueat malum, aph. 31. sec. 2.

Qui adversa valetudine abundè initio com-  
edunt, nec proficiunt, ij ferè tandem om-  
nes in cibi fastidium incidunt: contra qui ini-  
tio forti inedia usi cibum postea appetere inci-  
piunt, valetudine facilius liberantur, aph.  
31. sec. 2.

Vide dysenteriam, lumborum dolores.

## CIRCUMVITVS.

Vide crifum, satietatem.

## COLLYM.

In febre detento si repente collum intor-  
queatur, ac vix valetudine abundè exi-  
stente tumore mortiferum, aph. 35. sec. 4.

Collum neque converti, neque devorare  
posse plerumque lethale, 278. sec. 2. l. 1. co.

## COLOR FACIEI.

Frequens coloris cum calore mutatio bo-  
no est, 125. f. 2. l. 2. c.

Quibus juvenibus diu coloris fœdatio in  
est, non tamen continenter ad instar regii  
morbi, & viri, & femine capitis dolore  
conficiantur, & lapides ac terram edunt, aut  
profluvium per ora venarum sanguinem so-  
lita effundere patiuntur, hæmorrhoidas Græ-  
ci dicunt, ac colores cum vitore pallidi diu-  
turni, absque vehementi regio morbo, cætera  
quidem eadem facere solent: verùm præcor-  
diorum dolores eo magis vexant quam cæte-  
ras, neque tamen lapides aut terram edunt.



Qui verò diu pallidi faciem habent tumidam, eos certum est aut capitis, aut viscerum dolore laborare, aut sedem internam quodammodo male affectam esse: Magua autem ex parte ubi hæc adfuerint, non unum aliquod malum inesse videtur, sed interdum multa; aut etiam omnia, ex lib. 20. prædicto.

Si color alius ex alio oriatur longitudinem morbi significat, aph. 41. sec. 5.

### COLLIQVATIO.

Hepatico colliquatio cum raucedine malum portendit, idque præcipue si cum quadam tussi contingat, 447. sec. 2. l. 2. co. vide respirationem.

### CONVALESCENTES.

Quibus in morbo conualescentibus pars aliqua laborat, eo abscessus fiunt, aph. 32. sec. 4. vide cibum.

### CONCVSSIO.

Vide cerebrum.

### CONSVETVDO.

Consuetudo longo tempore etiam si deteriora sint, insuetis minus molesta esse solent, quare ad insolita quoque faciendâ mutatio, aph. 50. sec. 2.

Præter consuetudinem aliquid facere, ut verbi gratia aliquid propensius curare, & magno studio eniti prius non consueverim, aut contra, pravam, ut delirio proximam, 47. sec. 2. l. 2. co.

Quotidianis laboribus affecti, etiam si in-

validi

validi sint aut senes, insuetis quamvis robustis & juvenibus, facilius consueta ferunt exercitia, aph. 49. sec. 2.

### CONVVLVSIO.

Convulsio ab helleboro lethalis, aph. 1. sec. 5.

Convulsio à vulnere perniciofa, aph. 2. sec. 5.

A copioso sanguinis fluxu singultus aut convulsio mala, aph. 3. sec. 5.

A purgatione immodica quam hypercathartism vocant convulsio aut singultus malum, aph. 4. l. 5.

Qui tetano corripiuntur intra quatuor dies intereunt, si verò hos superauerint incolumes evadunt, aph. 6. sec. 5.

Convulsio vel à repletionem vel à vacuationem fit, ita vero & singultus, aph. 39. sec. 6.

Quibus in convulsionibus oculi intente splendunt, his mens non constat & diutius morbum trahunt, 351. sec. 2. l. 2. co.

Quæ convulsionis in morem affligunt, cum alto stupore, quem catochum vocant, tubercula ad aures attollunt, 352. sec. 2. l. 2. co.

Convulsionem & nervorum distentionem succedens febris solvit, 354. sec. 2. l. 2. co.

Ex vulnere convulsio lethalis, 355. sec. 2. l. 2. co.

Convulsio febris succedens periculum denunciat, minimam vere pueris, 356. sec. 2. l. 2. co.



Adultiores & qui septimum annum exceperunt, convulsionem in febre non comprehenduntur, alioqui periculum denunciatur, 357. sec. 2. l. 2. co.

Convulsionem solvit febris succedens acuta, quæ prius non aderat, aut si prius adfuit ingravescens, confert & urinæ vitreæ copiosus pertransitus, & alvi fluxio, & somnus, convulsionem autem de repente ortas febris solvit, ac alvi fluxus, 358. sec. 2. l. 2. co.

Loquendi impotentia in convulsionibus multum perseverans, malo est, quæ verò parum durat, aut linguæ syderationem, aut brachij, aut eorum quæ in dextra parte sunt, denunciat, solvitur autem magna urinarum confertim, ac derepente prodeuntium abundantia, 359. sec. 2. l. 2. co.

In nervorum distentionibus, & iis quæ in posteriorem partem sunt, dissolutæ maxillæ mortem afferunt, quin etiam lethale est in posteriorum partium distentione sudare, & corpus dissolvi, ac in eodem malo per nares revomere, aut ubi per initia vox defecta fuit, clamare aut nugari; postridie enim affuturam mortem significat, 361. sec. 2. l. 2. co.

Febres cum posteriorum partium distentione, urinæ genitale semen referentes solvunt, 362. sec. 2. l. 2. co.

Quibus tempora secantur, iis ex adversa sectionis parte convulsio fit, 498. sec. 1. l. 2. co.

Vulneri succedens convulsio malo est, 506. sec. 2. l. 2. co.

Cont.

Convulsionem muliebria, si citra initia appareant, neque febris accesserit, solvunt, 531. sec. 2. l. 2. co.

Turbulentæ & valde confidentes è somno exurrectiones, convulsionem minantur, præsertim vero si cum sudore contingant, 112. l. 1. prædict. sec. 2.

Quæ convulsionis in morem affligunt, cum alto stupore quem catochon vocant, abscessus ad aures excitant, 161. l. 1. præd. sec. 2. ¶ Convulsio cum tremore, corporis jactatione, & implacitate, ac alto stupore quem catochon vocant, parvulorum circa aures obortu abscessuum spè facit, 162. l. 1. præd. sec. 2. ¶ Convulsio in febre suborta eademq; die desinens, bono est, 156. sec. 2. l. 2. co. ¶ Convulsio in febre suborta, febrem primo die, aut postero, aut tertio sinit, quod si horam quaprehendit superet, ac desinat, malo est, 157. sec. 2. l. 2. co.

In uteri strangulatu non autem expertæ convulsionem faciles sunt, 349. sec. 2. l. 2. co.

Cum convulsionibus & sudore febrienti, defluentia sputa minimè mala sunt; his præterea alvi aliquantulum madescunt, ac fortasse aliquid ad articulos abscessurum sperandum est, 350. sec. 2. l. 2. co.

Propter ardorem vehemens convulsio, aut tetanus, malum, aph. 13. sec. 7.

Propter vigiliam convulsio, vel desipientia, malum, aph. 18. sec. 7.

A medicamenti potione convulsio mortifera, aph. 25. sec. 5.

B



Quæ convulsionis in morem affigunt ea  
altum soporem (catochum vocant) inducunt,  
104. sec. 2. l. 2. co.

Spasmo aut tetano febris si accesserit mor-  
bum solvit, aph. 57. sec. 4.

Ex epoto helleboro convulsio exitum af-  
fert, 567. sec. 2. l. 2. co.

Vide calidum, dolorem lumborum, & se-  
bres.

### CONTRARIA CONTRARIIS curari.

Qui à plenitudine fiunt morbi, vacuatione  
curantur, ut qui ab inanitione proficiscun-  
tur, sanantur plenitudine, cæterorumque  
contraria sunt remedia, aph. 22. sec. 2.

Quæ præfrigerata sunt excalefacere oportet;  
præterea, quæ sanguinem profundunt  
aut brevi sunt profusura, aph. 19. sec. 5.

Est tamen ubi in tetano sine ulcere juveni  
bene carnosio ætate media, frigida larga per-  
fusio calorem revocat, calor verò hunc solvit,  
aph. 21. sec. 5.

Quoquo modo corpus moveatur, simul ac  
laborare coepit, quies statim lassitudinem le-  
vat, aph. 48. sec. 2.

### CONCIPERE.

Quæ præter naturam non concipiant, iis  
uteri os ab omento comprimitur, itaque gra-  
vidari donec extententur nequeunt, aph. 46.  
sec. 5.

At mulieres quamquam magis aut minus  
uterum

uterum gestare sint idoneæ hunc in modum  
æstimare licet, in primis quidem in formas  
intuendo, parvæ namq; grandioribus in con-  
ceptum præstant, tenues crassis, candidè ru-  
bris, nigra liventibus. Præstant item quibus  
venæ extant, iis quibus minimè apparêt, quin  
etiam grãdiorinatu exuberans carnis moles,  
malo est, mammarum autem turgidæ & magnæ  
probantur, atque ista quidem visui sunt expo-  
sita. At sciscitari oportet num menstrua singu-  
lis mensibus appareant, & num satis idonea  
copia, & an boni sint coloris, æquali copia  
in singulis temporibus & ratis mensium die-  
bus effluant, quod quidem optimum est; locus  
verò conceptui idoneus, quem sanè uterum  
nominamus, sanus esse, & siccus, & mollis  
debet, at neque contractus, neque prolarus,  
neque ore distorto, aut compresso, aut di-  
ducto, etenim quidquid horum contigerit,  
conceptum fieri impedit. Mulieres igitur  
quæ concipere nequeunt & pallidæ videntur,  
absque febre neque aliqua causa in visceribus  
arctante, iis caput dolet, & menses malè ac  
incertè prodeunt, aut certè pauci, neque ex  
longo intervallo sic affectis apparent, & ute-  
ri purgatione indigent. At quæ tum bene co-  
loratæ sunt, tum bene carnosæ & pingues, &  
venas habent latentes, & doloris expertes  
sunt, hisque menstrua aut nullo modo pro-  
deunt aut pauca & sincera fluunt: in hujus-  
modi naturis difficillimè conceptus procura-



tur, quod si liberè apparentibus menstruis in-  
 culpatò sit corpore mulier, neque concipiat,  
 locus in quo uterus continetur in causa exi-  
 stimandus est, quo minus foetus tollatur, aut  
 etiam contractus est aut diductus; reliqua  
 enim quæ hac contingere solent cum dolore  
 & decoloratione, ac colloquatione sunt: qui-  
 bus verò ulcus in utero ortum est, sive ex  
 parte sive ex tuberculo aut aliqua quapiam  
 causa, iis febres & inguinum tumores obve-  
 niunt, illorumque locorum dolores: quod  
 si parius purgamenta simul quoque restite-  
 rint, tum ea mala omnino sunt immoderata  
 & diuturna accenduntque & præcordiorum  
 dolores, & capitis: at verò ubi ulcus sanatum  
 est, locus ille laxior ac durior necessario ef-  
 ficitur, & minus conceptui idoneus: Quod si  
 ulcus sinistra tantum occupet, mulierque  
 concipiat, aut ubi adhuc ulcus habet, aut po-  
 stea ubi convaluit, eam marem potius coniu-  
 riam spes est. Sed si ulcus dextra teneat, &  
 mulier concipiat, foetus fœmineus magis ex-  
 pectandus est: at si febris comprehendat eam  
 quæ concipere nequit & tussicula detineat,  
 querendum num uterum ulcus aliquod oc-  
 cupet, aut ex his mali quæ scripsimus aliud  
 quidpiam, etenim ubi nil mali eo loco sub-  
 esse constiterit, quod extenuationem aut  
 conceptus impedimentum efficiat, sangui-  
 nis vomitione resus metus impendet, ei verò  
 mulieri menstrua ex necessitate disparuerunt.

Si ve-

Si verò febris sanguinis eruptione tollatur &  
 menses appareant, concipiet: quod si ante  
 sanguinis eruptionem alvus effusa fuerit, pra-  
 vum in modum, periculum est ne mulier an-  
 te sanguinis eruptionem intereat. At quæ-  
 cunque se concepisse existimant, neque con-  
 ceperunt & multis mensibus decipiuntur,  
 quod menstrua non compareant, ac venter  
 turgescere ac moveri videatur, eæ capitis ac  
 cervicis dolore præcordiorumque, consti-  
 ctantur, neque lac in ipsarum mammis in-  
 nascitur, nisi paucum quoddam & aquosum,  
 cum verò ventris tumor dissolutus fuerit, ac  
 mollis evaserit, eæ, nisi quid aliud obliet,  
 concipient, quandoquidem affectio ista ad  
 mutationem utero afferendam valet, adeo  
 ut post hoc tempus concipiant: eæ verò quæ  
 conceperunt doloribus istis non tentantur  
 nisi consueta fuerint. His capitis dolores ac-  
 cedunt, & lac in mammis innascitur. Quæ  
 autem longæ fluxiones exercent de capitis  
 dolore, lumborum & imi ventris interro-  
 gandæ sunt, sciscitari quoque oportet num  
 dentium stuporem sentiant, aut visus hebe-  
 tudinem, aut aurium sonitum: at quæcunque  
 jejuna multis diebus aliquantulum biliosa  
 vomitione rejiciant, si neque uterum gerunt,  
 neque febre detinentur, interrogabis num  
 lumbricos rotundos unâ etiam vomitu re-  
 fundunt, id enim nisi fateantur ipsis ad futu-  
 rum prædices, potissimum autem mulieres

B 3



in vadit hic morbus, deinde etiam virgines, reliquos vero homines minus, ex l. 2. sec. 2. præd.

Si scire velis an mulier concepit, dormitæ aquam mulsam potui dato, & si veneris tormina patiat, concepit, sin minus, non concepit, aph. 1. sec. 5.

### COXENDICVM MORBI.

De coxendicium autem doloribus sic existimandum est. Quibus senioribus, vehementissimi torpores ad sunt & lumbi ac crura frigesunt, nec pudendum erigere valent, alvulque non nisi coacta egerit; & muscosum alvi recrementum plurimum prodit, his maxime diuturnum fore ac prædicendum ex quo morbus cepit, annum ut minimum perseveraturum, juvamentumque non nisi aut vere aut ætate sperandum. At juvenibus quidem non minores dolores afferunt coxendicium morbi, sunt tamen breviores, etenim quadragesimo die liberantur. Quin nec vehementes torpores, neque crurum ac lumborum perfrictiones fiunt. Quos autem morbus iste in lumbis ac cruribus vexat, neque tamen adeo ut decumbere cogantur, animadvertere oportet: num aliquid usquam in coxa concreseat, percotarique num ad inguen dolor perveniat. Etenim si utraque ad fuerint, morbus efficitur diuturnus. Percotandum quoque num femur torpores sentiat, & ad poplitem pertinens. Quo concessio rursus petendum num

per tibiam ferantur ad primam summi pedis partem quæ tarsos dicitur, qui enim istorum bonam partem fatentur, his ipsis erus modò calidum, modò frigidum fieri rectè prædixeris. At quibus sic morbus, relictis partibus quæ ad lumbos sunt, intro vergit, eos bene sperare jubeto, quibus vero coxendicem & lumbos occupat & supra vergit, iis fore gravem prædicito. Quibus autem ad articulos dolores oriuntur & tumores, desinuntque sine podagra, iis & magna viscera adesse comperies, & in urina quod subsidet album, ac si cui tempora attollentur, ea sæpe dolere fatebitur, & sibi nocturnos sudores contingere. Quod si neque tale quidquam in urina subsidet, neque sudores contingunt, metus est ne articuli claudicent, aut in his abscessus fiat, quem melicerida vocat, iis autem morbus iste contingit, quibus pueris aut juvenibus, ex naribus sanguinis fluor consuetus desit. Ex quibus percotari oportet num in juventute sanguinis fluxus contigerit, & num pungentes pruriginis ipsis in pectore aut dorso insint, aut eadem contingant, quibus vehementes alvi dolores absque perturbatione ad sunt, aut quibus per ora venarum quæ sunt in ano sanguis effunditur. Hinc namque istorum morborum origo petenda est. Quod si viris hujusmodi fœdus color appareat, num etiam capitis dolor ad sit percotandi sunt, quod fatebuntur. Ex quibus qui venteris...



tra parte dolores sentiunt, iis vehementes dolores fiunt, idque vel maxime si in præcordiis ad hepar dolor restiterit, quibus malis confestim levat strepitus qui in ventre fit, at ubi dolor conquievit, urina crassa & pallida redditur, atque hoc morbi genus neutiquam lethale est, sed valde diuturnum, at ubi jam moribus inveteraverit homines oculorum caligine vexat; perecontrari igitur oportet dum sanguis in juventute fluxerit aut oculorum caligatio contigerit aut urina pallida vacuata fuerit, aut intus excitari spiritus & supervenientes juvamentum attulerint, ista namque omnia fatebuntur ii, l. 2. sec. præd.

#### CRASSI.

Qui natura sunt valde crassi, breviora vita fruuntur quam qui graciles, aph. 44. sec. 2.

#### CREPITVS.

Vide status.

#### CHISIS.

Quibus crisis fit, nox quæ accessiones præcedit gravis, quæ subsequitur levior ferè solet existere, aph. 13. sec. 2.

Index septimi 4. sequentis septimanæ 8. initium, spectandus quoque est undecimus, siquidem is secundæ septimanæ quartus est. Rursumque decimus septimus spectandus, is enim à quarto decimo, 4. est & ab undecimo 7. aph. 24. sec. 2.

In præcipitibus morbis judicatio in quibus expectanda est, 145. sec. 2.

Morbi

Morbi vero præcipites & acuti, effluente ex naribus sanguine, judicatione absoluntur, idque die judicatorio, ac sudore copioso exorto, urinaque purulenta ac vitrea affatim reddita, in qua quod subsidet, laudabile fit aut abscessu effata digno, & alvo mucosa & sanguinea deiciente ac de repente prorumpente, vomitionibusque non pravis sub judicationem contingentibus, 150. sec. 2. l. 2. co.

Quibus ex naribus fluxiones quæ 7. 9. aut 14. die contingunt, ut plurimum à febribus vindicant. Eodem verò modo & biliosus alvi fluxus, & qualis in intestinorum difficultate fieri assolet, ac genuum & coxendicum dolore, urinaque sub judicationem concocta, at verò in muliere mensium profluvium, 152. sec. 2. l. 2. co.

Non, si quid in morbis acutis fiat præter rationem levius, sidere oportet, nec turbari, si quid temerè gravius acciderit. Istiusmodi enim multa sunt incerta, nec durare diu, aut persistere solent, aph. 37. sec. 2.

Vide febres.

Febrium judicationes iisdem numeratur diebus quibus & evadunt & moriuntur homines, nam & mitissimæ febres & quæ securissimis fulciuntur signis die 4. aut ante desinunt, maxime verò malignæ & quæ cum gravissimis signis fiunt, 4. vel potius interficiunt. Primus itaque earum insultus ad hunc modum desinit. Secundus ad 7. deducitur

B 5



5. ad undecimum 4. ad 14. 5. ad decimum septimum. 6. ad vigesimum. Sic igitur circuitus ex acutissimis morbis per 4. facta accessione ad vigesimum terminantur. Neque verò horum quicquam integris diebus exactè numerari potest, cum neque annus etiam neque menses integris mensibus numerari soleant, post hæc autem eadem ratione, juxta eandem adjectionem, primus circuitus est, quatuor & triginta dierum, 2. 40. 3. 60. at inter horum initia perquam difficile est dignoscere quinam longo temporis spatio judicari debeant, quod simillima sint eorum principia. Verùm à primo die advertere animum oportet, & pro singulorum quaternariorum additione considerationem adhibere, nec latebit quonam se vertat morbus. Quaternarum quoque conditio eundem servat ordinem: qui vero intra brevissimum spatium judicationem sunt subicuri, facilius dignoscuntur, cum maxime inter se ab initio dissideant, qui cum ex morbo superfuturi sunt, facile spirant, dolore vacant, noctu dormiunt, aliaque securissima signa habent. At perituri difficultate spirandi vexantur, delirant, vigilant, ceteraque pessima signa habent. His igitur sic se habentibus, de morbis ad indicationem tendentibus, tum ex tempore, tum ex utraque adjectione conjectura facienda est ad eandem quoque rationem & mulieribus indicationes ex parte contingunt. Capitis dolores

lores vehementer ac continenter cum febre, aliquo quidem ex signis accedente, admodum exitiale. Quod si sine signis hujusmodi, dolor 20. diem superat, & febris detineat, sanguinis è naribus eruptionem aut alium quendam abscessum ad inferiores sedes suspectari oportet. Verùm quo ad dolor recens fuerit, eodem modo sanguinis è naribus eruptionem aut suppurationem expectare convenit cum aliàs, tum si dolor circa tempora & frontem affuerit, at sanguinis eruptio magis expectanda venit in his qui nondum quintum & trigessimum annum attigerunt, senioribus vero suppuratio, ex l. præu. f. 2.

Quæ perniciem minantur, ea si absque vlla significatione alleviant, mortis periculum denunciant, s. l. præd.

Quæ cum malignis signis allevamentum afferunt, & quæ cum bonis non remittunt molesta sunt & difficilia, 48. sec. 2. l. 2. co.

### CRV DITAS.

Vide Vrinam.

### CVBITVS.

Vide dolores cubiti.

### CVTIS.

Cutis corporis squalida, & plus æquo sicca, malè affectæ alvi index est. In his prærubræ caruncula ex alvo prodeunt, 617. sec. 2. l. 2. co.

DEMENTIA, SEV DESIPIENTIA & delirium.



Dementia in quibus ægri sunt tremuli aut aliquid investigantium more sensim contrahant, aut palpant, phrenitum prænunciant, quin & ad furam dolores, in his mentem emoveat, 56. sec. 2. l. 2. co.

Propter plagam in capite acceptam, stupor aut desipientia malum, aph. 22. sec. 7.

Deliratio quæ cum illi sit tutior, quæ vero studio adhibito periculosa, aph. 57. sec. 6.

Vehementes insanix cum vocis defectio-  
ne perniciem intendant, 254. sec. 1. l. 2. co.

Qui statim perturbantur sine ratione, per-  
vigilio torquentur, nigra & compacta ex al-  
vo demittunt, interdum sanguinem è nar-  
ibus profundunt, 110. sec. 2. l. 2. co.

Quæ sensum sunt mentis feroces emotio-  
nes, in ferinas evadunt, & convulsiones por-  
tendant, 155. sec. 2. l. 2. co. Eadem sententia  
habetur, 85. sec. 2. l. 3. co.

Desipientia cum difficultate spirandi è su-  
dore lethalis est, quin etiam cum difficultate  
spirandi & singultu mortem adfert, 89. sec.  
2. l. 2. co.

Desipientia cum sopore, convulsiones mi-  
nantur, 84. sec. 2. l. 2. co.

In febribus vehementes emotiones cum  
taciturnitate, in eo cui vocis defectus non  
est, perniciem minantur, 70. sec. 2. l. 2. c.  
quæ brevi tempore durant feroces mentis  
alienationes, mæta sunt & in ferinas eva-  
dunt, 246. sect. 2. l. 2. co.

À sangui-

À sanguinis profusio desipientia aut et-  
iam convulsio malum, aph. 2. sec. 7. vide in-  
saniam. Decubitum, vide jacere.

### DESTILLATIO.

Destillationes & gravedines coctionem  
in valde senibus non admittunt, aph. 40.  
sect. 2.

Destillationes in ventrem superiorem ad  
suppurationem perveniunt intra dies vigin-  
ti, aph. 38. sect. 7.

Dejectiones, vide excrementa.

### DENTES.

Dentium collisio aut stridor præter con-  
suetudinem à teneris contractam insaniam  
ac mortem denunciant: quod si jam deliran-  
ti istud accidat, prorsus exitiale est, quin &  
dentes resiccari perniciem denotat, 235. sec. 2.  
l. 2. co.

Dentis syderatio abscessum ad gingivas  
enatum solvit, 236. sec. 2. l. 2. co.

Ad dentis syderationem vehemens acce-  
dens febris cum delirio, mortem minatur:  
quod si surventur ægri, ulcera pus colligent,  
& ossa abscedent, 237. sec. 2. l. 2. co.

Dentium stridor quibus per sanitatem mi-  
nimè est consuetus periculum denunciat: suf-  
focatio in his valde prava, 48. sec. 2. l. 1.  
præd.

In febribus dentibus stridere quibus à pue-  
ro minimè est consuetum in saniam & mor-  
tem significat ex l. prænot. Vide febres.



**D**  
**DEGLVTIRE.**

Potum ægè deglutienti cum spiritu tussiculoso eructatio quodammodo reuulsa, intro convoluta, ventris dolorem denunciat: vitiosa etiam sunt prærubræ dejectiones, æruginosæ 4 die apparentes, ac huiusmodi sanguinis profuvia soporem inducunt; in his casibus ex convulsione moriuntur, nigris ante prodeuntibus, 632. sec. 2. l. 2. co.

Vide collum.

**DYSENTERIA, SEV DIFFICULTAS** intestinorum & diarrhœa.

Si dysenteria laboranti veluti caruncula deiciantur, mortiferum, aph. 26. sec. 4.

In longis intestinorum difficultatibus cibi fastidium malum & cum febre pejus, aph. 3. sec. 6.

Intestinorum difficultate laborantibus, vomitio biliosa circa initia, malo est, 463. sec. 2. l. 2. co.

In gravi intestinorum difficultate quibus humor ad pus pervenit, quod summum infidet, exalbidum erit, & copiosum 464. sect. 2. l. 2. co.

Intestinorum difficultate laborantibus, aliquantulum rubræ, limosæ, & copiosæ dejectiones, in flammeo colore & prærubro perfusus solutæ insaniam suspectam faciunt, 465. sect. 2. l. 2. co.

Lienosis difficultas intestinorum non longa vitilis, longa verò mala, vbi enim desinit si aquæ

si aquæ inter cutem, aut intestinorum lævitates oriuntur, mortem afferunt, 466. sect. 2. l. 2. co.

A diarrhœa dysenteria, aph. 75. sect. 7.

Dysenteria supervenit lienteria, aph. 76. sect. 7.

A sincera deiectione dysenteria, aph. 23. sect. 7.

Dysenteria si ab atra bile incipiat, exitiosa. aph. 24. sect. 4.

Quibus per diarrhœas spumosa sunt alvi excrementa, iis à capite fit defluxio, aphorism. 20. sect. 7.

**DISURIA.**

Stranguriam & disuriam thoracis venæ sectio solvit, aph. 58. sect. 7.

**DOLOR.**

Qui ab aliqua corporis parte dolentes, dolorem non sentiunt, iis mens ægrotat. aph. 6. sect. 2.

Ex duobus doloribus non eundem locum occupantibus, qui vehementior est, alterius sensum obscurat, aph. 46. sect. 2.

Dolores qui sine febre invadunt ne interficiunt quidem at plurimum diurni sunt, multasque mutationes ac recursum habent, atque horum generum primum quidem in capitis doloribus spectantur, quorum quidam leves sunt, quidam etiam longè graviores virorum verò ea sic ineunda est ratio, quibus autem visus caligat & rubor quidam in ipsis



oculis fit, cum quadam frontis pruriginē, eos iuvat sanguis sua sponte aut ex necessitate profluens, atque hic modus simplex est. At quibus dolores capitis & frontis contingunt, tum ex ingentibus ventis, tum ex frigore post vehementem æstum nos gravedines potissimum quidem omnino liberant. Iuvant quoque & mucosæ pituitæ in naribus ortæ, præcipuè quidem sponte fluentes, si minus vi expressæ, gravedines verò in totum fiunt adeo ut tussis consequantur & sternutamenta ubi succedunt, neque dolores sedant, iis tubercula & coloris parvitates ex necessitate aderunt: quos verò dolores sine causa & diurni & totum caput occupantes jam gracile, & viribus exhaustos affligunt, in his attendendum morbum priore multo esse graviolem, quod si in cervicem & dorsum relicto capite dolor descendit, rursusque in caput recurrit, adhuc gravior existimandus est ac omnium maximè terret si à capite ad cervicem & dorsum pervenit, eos verò iuvati spes est si abscessus aliquis eruperit, aut pus tussis rejectum fuerit, aut sanguinem per ora venarum fundere sint soliti, aut pustula toto corpore pullularint, ex usu etiam est caput porriginē tentari, ex sec. 2. l. 2. prædict.

#### DOLOR CAPITIS.

Ex parte capitis posteriore laboranti re-  
cta in frontem excurrentes vena incisa prodest,  
aph. 68. sec. 5.

Capite.

Capite dolenti & vehementer laboranti,  
pus vel aqua vel sanguis per nares, aut os,  
aut aures effluens morbum solvit, aph. 10.  
sec. 6.

Qui capitis doloribus & aurium tinnitibus citra febrem tenebrosa vertigine & vocis tarditate, manuumque stupore tentantur, in his aut syderationem aut morbum comitialem aut etiam oblivionem sperare convenit, 161. sec. 2. l. 2. co.

Ex capite dolentes, & alto stupore, quem catochum dicunt, detenti, ac delirantes cum alvi interceptione, ferociente intuitu floridi, in scapulis rigescunt ac posteriorum partium distentione tentantur, 162. sec. 2. l. 2. coac.

Quæ caput quodammodo concutiunt, cum intensa oculorum rubebine, ac manifesto delirio, perniciem denunciant, neque tamen hoc ad mortem comitatur, verum circa aures tumores excitat, 163. sec. 2. l. 2. co.

Dolor capitis cum sedis ac pudendorum dolore torporem ac impotentiam adfert, vocemque exolvit; neque ista molestiam exhibent, verum ex his somnolenti, ac singultuosi nono mense evadunt, & voce libera reddita in integrum restituntur, 164. sec. 2. l. 2. co.

Qui capitis dolore vexantur ac alto stupore quem catochum vocant, cum dolore detinentur oculos habent prærubros, in his



sanguinis profluvium sperandum est, 166. sec. 2. l. 2. co.

Qui capite gravati, ad sinciput dolores sentiunt pervigilio torquentur, iis sanguinis eruptionem fore spes est, cum verò præferim si aliquis tensionis sensus in cervice apparet, 135. sec. 2. l. 2. co.

In gravibus & acutis capitis doloribus, cum torpore & gravitatis sensu, proclives sunt convulsiones, 171. sec. 2. l. 2. co.

Ex capitis dolore liberat pus è naribus effluens, aut spura crassa, & inodora, liberat quoque & Ulceram eruptio, interdum verò & somnus, & alvi fluxus, 172. sec. 2. l. 2. co.

Moderatus capitis dolor cum exhausta siti aut sudore febrem non solvunt, gingivarum abscessus, aut citra aures tubercula denunciat, nisi alvus erumpat, 173. sec. 2. l. 2. co.

Capitis dolor cum sopore & gravitatis sensu quodammodo convulsionem accersit, 174. sec. 2. l. 2. co.

Qui capitis dolore, siti, levi pervigilio detinentur, obscure loquuntur, ad motum impotentes, humescente alvo, laetudine vexantur, in his fortasse insania metuenda est, 175. sec. 2. l. 2. co.

Qui capite dolent cum levi aliqua surditate, manuum tremore, cervicis dolore, nigricantes reddentes urinas & densas, ij si nigra vomitione refuderint, perniciosè habere sciendi sunt. 176. sec. 2. l. 2. co.

Quibus ex posteriore parte ossibus fractis, capitis dolor inest vehemens, & crassa è naribus fluxio, malo est, si dolore autem ad oculum suborto, vigore corripiantur, qui etiam ossium ad tempora effractura, convulsiones accersere solent, 118. sect. 2. l. 2. co.

In vterum gestantibus capitis dolores qui cum sopore, à gravitate & convulsione fiunt, vt plurimum malo sunt, 527. sect. 2. l. 2. co.

In vterum gerentibus capitis dolores cum sopore & gravitate malo sunt, fortesque huiusmodi naturæ vna etiam convulsionibus sint obnoxia, 534. sect. 2. l. 2. co.

Quibus absque febre & coloris feciditate frequens adest verticis ac temporum dolor, si planè nullus alius fuerit faciei abscessus, aut vocis gravitas, aut dentium dolor, iis sanguis è naribus profluit, etsi alioqui sani videntur, iis tamen aut lienem tumidum, aut caput dolere, aut splendicans quiddam ante oculos obversari comperies; magna verò ex parte vna caput & lien hunc in modum se habere videntur, sec. 2. l. 2. præd.

Vide abscessum, gravidam, ortum.

### DOLOR IUGLI

& Cervicis.

Dolores sensim ingravescentes, si ad jugulum & superiores partes transeant, perniciem minantur, 70. sec. 2. l. 2. co.

Cervicis cubitorumque dolores, convulsiones minantur ex facie autem ad fauces.



procedunt, 270. sect. 2. l. 2. co.

Cervicis dolor in omni quidem febre ma-  
lum, in his verò pessimum in quibus etiam  
vehementis insanix merus est, 273. sect. 2.  
l. 2. co.

Quibus capitis & Cervicis dolor, ac to-  
tius corporis impotentia quaedam cum tre-  
more adest, ab his sanguinis eruptio liberat,  
fortasse ista dissolvuntur, verum interim ver-  
sicæ interceptiuntur, 170. sect. 2. l. 2. co.

Ex Cervicis dolore cum sopore & sudore  
inflata alvus siquidem ex medici industria li-  
quida demittat cum aliqua proluvie, deinde  
quæ biliosa non sunt resistunt, huiusmodi  
asservata diuturniorem morbum efficiunt, in  
his animadvertendum est num proluxus al-  
vi non biliosæ benigniores sint ac flatuoso  
tumori conducunt, 98. sect. 2. l. 1. præd.

#### DOLOR LUMBORVM.

In intenso lumborum dolore, & alvi sub-  
ductione, largiore sumpto veratro, spumo-  
forum crebra vomitio predest, 310. sect. 2.  
l. 2. co.

Quibus lumborum dolor in caput recur-  
sat & manus torpore affectæ, ac oris ventri-  
culi dolorem sentiunt, aut aurium sonitus,  
ij liberaliter sanguinem profundunt, sed ex  
his alvus effunditur & mentis perturbatione  
vt plurimum tentantur, 308. sect. 2. l. 2. co.

Ex lumborum dolore, liberales sunt &  
urgæ sanguinis fluxiones, 307. sect. 2. l. 2. co.

Lum-

Lumborum dolores, sanguinis profluvium  
excitant, 306. l. 2. l. 2. c.

Diuturni lumborum dolores, qui cum fe-  
bre ad tertianæ naturam propius accedente  
ingravescent, sanguinis grumosi successuri  
spem faciunt, 305. sect. 2. l. 2. co.

Quibus lumborum dolor in caput & ma-  
nus recurat, & torpore affecti oris ventri-  
culi dolorem sentiunt, tenuibus ac serosis  
humoribus abundant, ij liberaliter sangui-  
nem profundunt. At verò his cum mentis  
perturbationibus effunditur, 139. sect. 2. l. 1.  
præd.

Lumbis dolentibus si oris ventriculi do-  
lor accesserit futuræ per hæmorrhoidas va-  
cuationis signum est, ac fortè etiam præces-  
sisse significat, 130. sect. 2. l. 2. co.

Lumborum dolores diuturni qui sensum  
sunt circum præcordia involuti, cum febre  
& ciborum fastidio, si intensum capitis do-  
lorem advehunt, non sine convulsionis specie  
celeriter interfunt, 110. sect. 2. l. 1. præd.

Si lumborum dolor diu detinet cum æstu  
implacido, tenui sudore circa caput & thora-  
cem oborto, pernicies denunciatur: nam  
plerumque ij tremuli evadunt, & vox velut  
in rigore conspicuo tremula existit, 42. sect.  
2. l. 1. præd.

Qui lumborum & lateris dolore absque  
ulla occasione tentantur, ii in morbum re-  
gium incidunt, 315. sect. 2. l. 2. co.



Lumborum dolor cum æstu implacido & anxio, malum significat, 323. sect. 2. l. 2. co.

Lumborum dolor absque causa manifesta crebro invadens, morbi malignitatem indicat, 322. sect. 2. l. 2. co.

Considerandum est in lumborum dolore conflictatis & anxietate citra vomitum & paulisper ferociter desipientibus ægris; num nigra per secessum proditura sint, 319. sec. 2. l. 2. co.

Lumborum oris & ventriculi dolor, cum forti seriatione convulsionem quodammodo suspectam facit, 320. sec. 2. l. 2. co.

Qui lumborum dolore conflictantur, ii malè habent num his tremores fiunt, & maculæ rubentes quales in tibiis, cum rigore, 318. sec. 2. l. 2. co.

Lumborum ac tenuioris intestini, diuturni dolores & circum præcordia labores, in ægris unà cum febre cibum fastidientibus, eos dolor intensus ad caput progressus non sine convulsionis specie celeriter interficit, 117. sec. 1. 2. co.

Lumborum dolores ad os ventriculi recursantes cum febre, horrore, si tenuia & aquosa vomitione rejecerint, delirarint, voce defecti sint, ii post nigrorum vomitionem moriuntur, 316. sec. 2. l. 2. co.

Dolentibus lumbis si oris ventriculi dolor accesserit, futuræ per hæmorrhoidas vomitionis signum est, aut etiam præcessisse significat,

gnificat, 302. sec. 2. l. 2. co.

Quæ ex lumbis in cervicem & caput redundantia levis syderationis more, resolutionis sensum inducunt, convulsionem ac mentis emotionem minantur. Videndum est num talia convulsionibus solvantur aut in hujusmodi habentibus alvi malè habeant, atque eadem diutiùs perseverent, 313. sec. 2. l. 2. co.

Ex recurtatione doloris in lumbis, oculorum percussio, aut distortio mala est 314. sec. 2. l. 2. co.

Lumborum atque inferiorum partium dolores quibus etiam febris accedit, si relictis inferioribus septum transversum appetant, tum verò præsertim exitio sunt si aliquod periculosum signum accesserit: quod si reliquorum signorum nullum periculum ostenderit, futuræ suppurationis metus est, 108. sec. 2. l. 2. co.

Lumborum & capitis ac oris ventriculi dolor cum forti exortatione convulsionem suspectam facit, 106. sec. 2. l. 1. præd.

#### DOLOR VENTRIS.

Dolores ventris sublimes leviores, non sublimes fortiores, aph. 7. sec. 6.

Oris ventriculi dolores cum intestinorum cruciati interaneorum animalia dejiciunt, 285. sec. 2. l. 2. co.

Oris ventriculi dolor seniori crebro adveniens, repentiã mortem denunciat, 286. sec. 2. l. 2. co.



Ventris dolor à partu, in his purulenta expurgat, 520. sec. 2. l. 2. co.

Quibus inter ventriculum & septum transversum pituita concluditur; & dolorem adfert in alterutrum ventrem viam non habens iis per venas in vesicam pituita morbi fit solutio, aph. 54. sec. 7.

Oris ventriculi dolor ac præcordiorum pulsus cum febre, in qua totius corporis habitus perfrigeratur, malum denunciant; idque præsertim si cum tenuibus sudoribus contingunt, 283. se. 2. l. 2. c.

A diurno partium ad ventrem attinentium dolore, suppuratio, aph. 22. sec. 7.

Vide alvum, dolorem lumborum, præcordiorum.

### DOLORES PRÆCORDI- diorum.

Ex præcordiorum doloribus, alvus aliquantulum viscida paulatim transmittens stercoracea pauca effundit & fortassis sanguinem profundit, 292. sec. 2. l. 2. co.

Ingruentes ad præcordia dolores, cum pravi sunt, tum verò si alvos profundant, deteriores autem si parvo tempore fiant, quin & inde suborta ad aures tubercula, aliaque suppurationes malignitatem præ se ferunt, 274. sec. 2. l. 2. co.

Quos de repente absque febre, præcordiorum aut oris ventriculi dolor, aut crurum & inferiorum partium affligit, alvusque intumescit,

mescit, venæ sectio aut alvi fluxus solutionem adfert, his febricitate noxium est: Nam & longæ & vehementes febres subnascuntur, ac tussis, & spirandi difficultas atque singultus fiunt quibus in solutionem spectantibus vehemens coxarum dolor, aut crurum aut purulenta sputatio, aut oculorum orbitas succedit, 294. sec. 2. l. 2. co.

Qui præcordiorum doloribus, oris ventriculi, jecotis ac earum quæ sunt circa umbilicum partium consistuntur, cruenta alvi dejectione liberantur, secus autem moriuntur, 295. sec. 2. l. 2. c.

Præcordiorum dolores in febre ægro facti nequeunte si absque sudore solvantur, malum indicant, his ad coxendices dolores decumbunt, 297. sec. 2. l. 2. co.

Præcordiorum dolores in febribus cum loquendi impotentia, si sudore non solvantur maligni sunt, in his dolores ad coxendices cum ardenti febre, atque alvus affatim prorumpens, perniciem ostendant, 90. sec. 2. l. 1. præd.

Dolores in febre in præcordia assilientes, sine sudore soluti maligni sunt, in his dolores ad coxendices cum ardenti febre, atque alvus affatim erumpens perniciem ostendant, 209. sec. 2. l. 2. co.

Anxietate vexatis præcordiis oborta ad aures tubercula mortem afferunt, 302. l. 2. co.

Vide dolorem ventriculi, febres.



A  
DOLOR FAUCIVM.

Vbi fauces dolent, aut pustularum eruptiones oriuntur in corpore, excrementa spectare oportet, nam si biliosa fuerint, vna corpus ægrotat; si verò sanorum excrementis similia, tutò corpus alere poteris, aph. 15. sec. 2.

Faucium gracilium dolores suffocantes convulsionem minantur, tum verò præcipuè si à capite originem ducunt, quale quid Thrasynontis consobrina contigit, 104 sec. 2. l. 1. præd.

Vbi fauces in morbis acutis dolent, graciles sunt parvæ & suffocantur, atque vbi os hiarit non promptè adduci ac claudi possit, mentis emotionem portendi oportet, ex his phrenitis, perniciosa est, 11. sec. 2. l. 1. præd.

Vehementes faucium dolores aurium tubercula & convulsiones excitant, itemque cervicis, ac colli dolores, 268. sec. 2. l. 2. co.

Vehementer dolentes fauces absque tumore, cum labore & molestia, præceps exitium minantur, 265. sec. 2. l. 2. co.

Fauces gracilium præfocantes dolores vbi ex capitis dolore ortum duxerint, convulsiones adferunt, 262. sec. 2. l. 2. co.

Fauces exulceratæ cum febre, grave aliquid portendunt, at si aliud aliquod etiam signum adfuerit, ex his quæ ante prava esse censuimus ægrum in periculo versari denuntiandum est, pag. 55. sec. 2. l. 1. præd.

DO.

## DOLOR AVRIS.

Auris intensus dolor cum febre acuta, ac cæteris aliquanto gravioribus signis, juvenes quidem intra 7. diem aut etiam celerius cum delirio necat, nisi puris copia ex aure, aut sanguis ex naribus effluat, aut aliud quoddam laudabile signum extiterit, ætate autem proveciores tardius, aut minus tollit, nam & in his aures antè suppurant, & delirium minimè infestat, sed & in hac ætate multis morbus revertitur, ac proinde interficere solet, 189. sec. 2. l. 2. co.

Auris dolor acutus cum febre continua & vehementi gravis, periculum enim delirij ac mortis ægro adfert. Cùm igitur hic modus sit lubricus, celeriter à primo die ad omnia signa animum adhibere oportet. Moriuntur autem ex hoc morbo, juniores quidem 7. die aut citius, senes verò multò tardius. Nam & febres & deliria minus eis suboriuntur, auresq; eam ob causam suppuratio præoccupat, verum his quidem ætatibus succedentis morbi reversiones plurimos interficiunt, juniores verò priusquam aures suppurent, intereunt: quandoquidem si pus album ex aure fluxerit, juniorem superfuturum spes est, l. 1. sec. 2. prænot.

## DOLOR LATERIS.

Doloribus lateris & pectoris, cæterarumque partium ægri an multum differant, discernendum est, aph. 5. sec. 6.

C 2



In dolore lateris, sanguinis è naribus stil-  
latio mala est. 405. sec. 2. l. 2. co.

Lateris dolor cum biliosis sputis temerè ac  
præter rationem evanescens, ægros in vehe-  
mentem & furiosam mentis emotionem agit  
97. sec. 2. l. 1. prædic.

Vide pleuritidem, & febres.

### DOLOR DORSI.

Qui ex dorsii dolore initia ducunt ægritu-  
dines, difficiles, 309. sec. 2. l. 2. co.

### DOLOR COXÆ.

Quibus longo coxendicium dolore confi-  
ctis, femoris summum coxa excidit, rur-  
sumq; recidit, iis mucosa ibidem pituita col-  
ligitur, aph. 59. sec. 6.

Quibus diuturno dolore ischiadico laxa-  
tis femoris caput coxa excidit, iis femur con-  
trahescit & claudicant nisi vrantur, aph. 60.  
sec. 6.

De coxendicium autem doloribus sic exi-  
stimandum est, quibus senioribus vehemen-  
tissimi torpores adsunt, & lumbi ac crura fri-  
gescunt, nec pudendum erigere valent, al-  
vuskque non nisi coacta egerit, & mucosum  
alvi recrementum, plurimum prodit, his ma-  
ximè diuturnum fore, ac prædicendum ex  
quo morbus cœpit, annum vt minimum per-  
severatum, juvamentumq; non nisi aut  
verè aut ætate sperandum. At juvenibus qui-  
dem non minores dolores afferunt coxendi-  
cium morbi, sunt tamen breviores: etenim

40. die

40 die liberantur, quin nec vehementes tor-  
pores, neque crurum, ac lumborum perfu-  
siones sunt: quos autem morbus iste in  
lumbis & cruribus vexat, neque tamen adeo  
vt decumbere cogantur, animadvertere oportet,  
num aliquid vispiam in coxa concrescar,  
percontariq; num ad inguen dolor perve-  
niat: etenim si utraque adfuerint, morbus  
efficitur diuturnus, percontandum quoque  
num femur torpores sentiat & ad poplitem  
peringat, quo concessio rursus petendum  
num per tibiam ferantur ad primam summi  
pedis partem, quæ tarsos dicitur, qui enim  
istorum bonam partem fatentur, his ipsis crus  
modo calidum modo frigidum fieri rectè  
prædixeris, at quibus hic morbus relictis  
partibus quæ ad lumbos sunt, infra vergit,  
eos bene sperare jubeto: quibus vero coxen-  
dices & lumbos occupat, & supra vergit, iis  
gravem fore prædicitio: quibus autem ad ar-  
ticulos dolores oriuntur & tumores, desu-  
nantq; sine podagra, iis & magna viscera  
adesse comperies, in vrina quod subsidet al-  
bum, ac si cui tempora attollentur, ea sæpe  
dolerere fatebitur, & sibi nocturnos sudores  
contingere. Quod si neque tale quicquam  
in vrina subsidet, neque sudores contingunt,  
merus est nò articuli claudicant, aut in his  
abscessus fiat, melicerida vocant. Iis autem  
morbus iste contingit, quibus pueris aut ju-  
venibus ex naribus sanguinis fluxor consue-

C 3



tus desinit, ex quibus percontari oportet num in juventute sanguinis fluxus contigerit, & num pungentes prurigines ipsis in pectore aut dorso infint, aut eadem contingunt quibus vehementes alvi dolores absque perturbatione adsunt, aut quibus per ora venarum quæ sunt in ano sanguis effunditur, hinc namque istorum morborum origo petenda est. Quod si viris hujusmodi foedus color appareat, num etiam capitis dolor adsit percontandi sunt, quod fatebuntur. Ex quibus qui ventris dextra parte dolores sentiunt, iis vehementes dolores fiunt, idque vel maxime si in præcordiis ad hepar dolor resisterit, quibus malis confestim levat strepitus qui in ventre fit, ac ubi dolor conquievit, vrina crassa, & pallida redditur. Atque hoc morbi genus neutiquam lethale est, sed valde diuturnum, at ubi jam morbus inveteravit, homines oculorum caliginè vexat. Percontari igitur oportet num sanguis in juventute fluxerit, aut oculorum caligatio contigerit, aut vrina pallida vacuata fuerit, aut intus incitati spiritus & supervenientes, juvenum attulerint. Ista namque omnia fatebuntur, pag. ult. l. 2. sec. 2. præd.

Vide anginam, & coxendicum morbos.

#### DOLORS RENVV.

Si quibus verò è renibus laborantibus, præter supradicta signa, dolores etiam circa spinæ musculos fiant, si quidem ad loca exteriora

teriora sentiantur, foras abscessum quoque fore expecta: si verò ad interiora magis vertant, introrsus etiam abscessum futurum potius sperandum est, aph. 36. sec. 7.

Derepente obortus renum dolor cum vrinæ suppressione, calculorum aut vrinæ crassæ mictionem indicat, 389. sec. 2. l. 2. co.

#### DOLOR SEDIS.

In longis periculis sedis dolor mortem affert, 71. sec. 2. l. 2. co.

Vide dolores capitis.

#### DOLOR PECTORIS.

Dolor in pectore fixus cum torpore suborta febre malum indicat, iique celeriter mortem opperunt, 315. sec. 2. l. 2. co.

#### DOLORS PVLMONVM.

Quæ ad pulmonem aut præcordia dolores faciunt, si in pus vertantur, malum denotat, 216. sec. 2. l. 2. co.

Dolores in locis hujusmodi de pulmonibus loquitur, qui neque ad expuitionem, neque ad venæ sectionem aut victus rationem desinunt, ad suppurationem tendunt, 294. sec. 2. l. 2. co.

Vide spurum.

#### DOLORS VMBILICI.

Dolores circa umbilicum cum palpitatione, mentis quidem alienatæ significationem quandam præbent: at iis sub judicationem conferta & crebra pituita cum dolore prodit, 300. sec. 2. l. 2. co.



Supra umbilicem labor, ac lumborum dolor qui remediis non cedit, in hydropem siccum definit, 304. l. 2. co.

Dolores circa umbilicem cum palpatione, mentis quidem alienatae significationem quandam præbent, sub iudicationem verò his plurimus & creber status cum singulari contentione prodit, & ad suram dolores in his mentis alienationem indicant, 36. sec. 2. l. 1. prædict.

### DOLOR IECORIS.

Quibus hepar dolet, cum oris ventriculi dolore, sopore, rigore, ij alvo exturbata cum corporis extenuatione, ciborum fastidio, multis tenuibus sudoribus disfluunt, & purulenta per alvum demittunt, 448. sec. 2. l. 2. co.

Quibus jecur dum repente vehementer dolet, iis febris succedens remedio est, 446. l. 2. co.

Vide jecur.

### DOLOR VTERI ET

durities.

Vterinæ ventris duritates cum dolore celerem perniciem denunciant, 528. sec. 2. l. 2. co.

### DOLOR MAMMARVM.

Quæcumque mammaram dolore & febris vexantur, eas sanguinis concreti spuitio non feculenta dolore liberat, 553. sec. 2. l. 2. co.

D O.

### DOLORES HVMERI.

Humerorum verò dolores, qui ad manus tendunt torporisque & dolores exhibent, abscessus certè non consequuntur, at bilis atra vomitione sanantur. Eos autem qui in humeris perdurant, & ad dorsum pertingunt, peris aut atra bilis vomitione effugunt, quorum hæc incunda est ratio. Facile quidem spirantes & extenuatos vomitione, nigram bilem effusuros magis sperare oportet. Ad difficultate spirandi laborantes, si in faciem color sububer aut niger antea non visus suboritur, pus spuitione potius teddituros spes est. Præterea etiam animadvertendam nunc pedes tumoribus infestentur. Hoc enim indubitatum est signum, hic autem morbus viris vehementissimus accidit à 40. anno ad 60. quam aratem etiam coxendicium dolores præcipue vexant, sec. 2. l. 2. prædicto.

### DOLOR CVBITI ET CER-

vicis.

Cubiti cervicisque dolores convulsionem minantur, ex facie autem prodeunt ista, fauciumque sonitus crebri cum salivatione, iis sudores in somnis bono sunt, nempe ex sudore levati plurimos consentaneum est, quibus si dolores invadunt inferiores partes proinde in his ex sopore aliquid convulsionis periculum impendere nemini mirum videri debet, 116. l. 1. sec. 2. prædic.

Quæ in cubitis alicuius sunt, præcipue cum

C 5



inflammatione ad suppuracionem sectionum  
& ad uisionem perveniunt, 102. l. 2. sec. 2.  
prædic.

Dormite, vide somnum.

### ELLEBORVS.

Elleborus perniciosus sanas carnes habentibus; convulsionem enim ingenerat, aph. 16. sec. 4.

Epoto veratro rubra spumantia, pauca vomitione rejicere juvat. Duritias tamen facit, & magnas puris in tunc collectiones eximit: qui vero talia vomitione refundunt, pectoris præcipue dolore consistantur, & in rigoribus crebro & tenuiter exudant, testes in tumorem sublatos habent, quo in casu subinde rigent & graciles evadunt, 520. sec. 2. l. 2. co.

Vide convulsionem, dolorem lumborum, purgationem.

### EMPHY.

Qui ex pleuritide emphyi sunt; si à rup-tione empyematis intra dies 40. repurgentur. liberantur, alioqui transeunt in tabem, aph. 77. sec. 4.

Si emphyi cum uruntur, aut secantur, puram & album pus efflant, evadunt: si vero suberuentum, fœculentumque, & fœtidum, pereunt, aph. 4. sect. 7. vide hydrops.

Vide pus, pleuritides, pulmones.

### EPILEPSIA.

Epilepsia laborantes pueros, cum loci vitiosusque, tum maxime ætatis mutatio liberat, aph. 45. sect. 2.

Epilepsia ante pubertatem a motionem recipit, post 25. annum ferè comitatur ad mortem usque, aph. 7. sec. 5.

Ex morbo sacro, quem comitalem dicunt, ægerime emergunt, quibuscum una à puero increfcit morbus, & in virilem ætatem simul adolefcit, deinde quibus ætate florente ortus est, nempe post annum quintum & vigesimum, ad quadragesimum quintum usque quos deinceps consequuntur, quibus morbus accidit, neque ante in corporis partibus aliquis venientis mali sensus est, quibus neque ex capite initium ducere videtur, aut latere, aut manu, aut pede, iis facilis sanantur. Hæc autem inter se differunt, ex his namque molestissimi sunt qui à capite originem trahunt, deinde ex latere, qui vero à manibus, ac pedibus, præcipue sanitatem recuperant. His autem manum admovere medicum oportet, qui recte curationis rationem tenuerit, ubi juvenes fuerint, & laboribus dediti, nisi secuti mens male sit affecta, aut quis attonitus fuerit. Ejusmodi namque vehementes mentis emotiones nihil conducunt, reliquæ vero omnes, naturæ emotiones, quæ ad inferna tendunt, probantur; longaque optima hoc loco censenda sunt, quæ maxime cruentæ. At senes qui corripici cœperunt præcipue moriuntur, ac nisi pereant celerissime, sua sponte servantur, minimeque à medicis juvantur, 98. præd. lib. 2.



## ERYSIPELAS.

Erysipelas foris intrò converti malum, in-  
tus verò foras existere bonum, aph. 2. sec. 6.

Si prægnavanti fiat in utero erysipelas, per-  
niciolum est, aph. 43. sec. 3.

Ab ossis nudatione erysipelas, malum, aph.  
19. sec. 7.

Ab erysipelate putredo, aut suppuratio, ma-  
lum, aph. 20. sec. 7.

Erysipelas verò foris quidem extare utile,  
intro autem vergere lethale; cuius quidem rei  
indiciu[m] est cum rubore evanescente, pectus  
gravatur, & ægrius spiritum trahit æger, 366.  
sec. 2. co.

Vide anginam.

## EUNUCHI.

Eunuchi podagra non laborant, nec cal-  
vi fiunt, apho. 28. sect. 6.

## EVACUATIO.

Athletarum plenior corporis habitus, si ad  
summum plenitudinis gradum perductus lu-  
brius est; neque idem permanere aut con-  
sistere potest, cum verò non consistat nec  
jam possit in melius proficere superest ut re-  
cidat in deterius, quamobrem plenior illa  
corporis habitudo hand cunctanter est sol-  
venda, quò corpus novæ nutritionis ini-  
tium capiat, non tamen vacuando usque eo  
pergi velim, ut vasa in se penitus confidant;  
hoc enim tutum non est, sed quatenus na-  
tura ferri; eousque progredi oportet: sic &  
extremæ

extremæ vacationes periculosa; contraque  
repletiones extremæ si fuerint similiter peri-  
culosa; aphor. 3. sect. 1.

Quæ educere oportet quoquo maxime  
vergere videbuntur ducere, viis ac locis utili-  
ter eò convenientibus, aph. 21. sect. 1.

Quæ vacuantur, multitudine metienda  
non sunt, sed si quæ oportet vacuentur, & fa-  
cile ferant, atque ubi ad animi deliquium  
educere convenit, faciendam, si ægrotus par-  
esse possit, aph. 23. sec. 1.

In turbationibus alvi, & vomitibus quæ  
sponte fiunt, si qualia oportet purgentur, con-  
fert & facile ferunt, sin minus, contra fit, sic  
& vasorum depletio, si qualem fieri oportet,  
fiat, confert & facile ferunt, sin minus contra  
accidit; proinde & regionis, & temporis, ha-  
benda est ratio; pro quibus talia vacuari de-  
bent necne, aph. 2. sec. 1.

Incipientibus morbis, si quid movendum  
videtur, move, vigentibus autem quiescere  
multò præstat, aph. 29. sec. 2.

Semel multum, & repente, vel vacuare,  
vel replere, vel calefacere, vel refrigerare,  
vel alio quovis modo corpus movere pericu-  
losum; omne siquidem nimium: naturæ ini-  
micum; paulatim verò quod fit tutum, cum  
alias tum maxime ab uno ad aliud faciendâ  
est mutatio.

Quibus venæ sectio aut purgatio prodest,  
his verò secanda est vena aut purgatio impe-  
tanda, aph. 47. sec. 6.



Quibus sanguinem è venis detrahere con-  
ducit, iis vere secunda est vena, aph. 53. sec. 7.

Vide purgationem.

EXCREMENTA ALVI.

Excrementa alvi nigra, sanguini atro si-  
milia sponte euntia, sive cum febre, sive ci-  
tra febrem pessima; & quanto ipsorum co-  
lores peiores fuerint plures, eo deteriora: à  
medicamentis autem talia exigi, melius est,  
idque quanto ipsorum plus fuerint colores,  
aph. 21. sect. 4.

Tenues ex alvo absque mordacitatis sen-  
su prodeunt, dejectiones, ei qui sibi bene  
constat, malum portendunt, velut nonnun-  
quam jecinoroso contingit, 78. l. i. præd.

Ex ventre quæ prodeunt sublivescencia,  
& turbulenta, urinæ etiam tenues, ac dilutæ  
suspectæ sunt, 108. l. i. præd. sect. 2.

Quæ inter se non coherent, sed faciliè dis-  
solvuntur, & aliquantulum friabilia sunt, al-  
vi excrementa liquida, cum summi totius  
corporis perfrictione, non sine febre impro-  
banda sunt; ac præter hæc, si rigores vesicam,  
& ventrem, cum dolore invadunt, proinde  
in his ex sopore aliquod convulsionis peri-  
culum impendere, nemini mirum videri de-  
bet, 116. sec. 2. l. i. præd.

Frequentes desidendi labores, pauca ali-  
quantulum flava, glutinosa excrementa, cum  
paucis alvi excrementis, præcordiorum & la-  
teris dolores, morbum regium prænuntiant:  
animad-

animadvertendum verò num ex istorum sup-  
pressionem ii exolvantur, aut fortasse sangui-  
nem profundant. In his lumborum tensio  
& dolores, sanguinis erupturi fidem faciunt,  
146. sec. 2. l. i. præd.

In alvi excrementis quæ cum torminibus  
dejectantur, sedimentum limosum, & subli-  
vidum malo est. Ac fortasse quidem ad præ-  
cordia dextra dolor adest: & in his viris exol-  
vuntur; videndum num abscessus ad aures  
paulò post cum dolore excitentur: in his  
omnibus alvus affatim prorumpens pericu-  
lum intentat, 156. sec. 1. l. i. præd.

Alvo stercorea nigra demittente, si sopor  
appareat, tubercula ad aures excitat, 166.  
sec. 2. l. i. præd.

Seccessus verò necesse est his qui defatigan-  
tur, dum parvo cibo aut potu contenti sunt,  
exiguos, è duos procedere, sive quotidie,  
sive tertio quoque aut quarto die, aut lon-  
giore ex intervallo prodeant, tuncque metus  
est ne febris aut alvi profluvium prehenda-  
t: quibus tamen peiores sunt dejectiones om-  
nes, quæ tam sunt liquidæ, ut in exitu figu-  
rata esse nequeant, frequentem verò cibum  
sumentibus, ac multum defatigatis, mollem  
in transitu dejectionem, siccam esse oportet,  
cibusque ingentium copiam pro defati-  
gationis ratione respondere, sumpta autem  
æquali horum copia, his quidem qui mi-  
nuta dejectionem præterierunt: his verò qui



plurimum defatigantur pauca dejectiones prodeunt, si sani sint & proba victus ratione utantur; (ea namque ad hæc conferre existimandum est) at liquidiores dejectiones, quæ citra febrem & die septima aut citius iudicio terminantur vitales, si semel vniuersæ affiant, neque repetant, quod si febris accesserit, alvi que profluvia repetant, si diu perseverent omnino vitiosa sive biliosa fuerint, sive pituitosa, sive cruda, egentque singula propria victus ratione tum medicatione, pag. 24. sect. 2. lib. 2. præd.

Alvi dejectio optima est, si mollis est & consistat, coque tempore, quo per sanitatem deijci soleat, copia verò ciborum ingestorum rationi responderit, talis enim exitus inferiorum alvum bene valere declarat, at liquida alvi egestio ex vñ est si neque stridet, neque crebrò, neque ex brevibus intervallis excernitur: frequens enim desidendi labor ægrum fatigat, eique insomnia adfert. Quod si assatim & sæpe deijcit, periculum est ne animus deficiat. Verùm pro ingestorum ciborum copia, bis aut ter interdum & nocte semel, deijci debet, plus tamen prima luce pro hominis consuetudine. Crassiorem autem fieri dejectionem oportet, morbo aut iudicationem procedente, sit etiam subfulvas neque admodum graveolens, lumbricos quoque prodire rotundos cum alvi excretionem, morbo in iudicationem tendente expedit.

In om-

In omni verò morbo ventrem mollem esse, & mediocriter extumescere convenit; at valde aquosum aut album, aut ex viridi pallidum, aut vehementer rubrum, aut spumans deijci, hæc omnia mala sunt. Præter hæc quoque malum est, quod exiguum, glutinosum, candidum, ex viridi subpallidum, & læve existit. His verò magis lethalia sunt, nigra; aut pinguis, aut livida, aut æuginosa, aut fœtida. Varia autem his quidem sunt diuturniora, nihilo tamen minus exitialia. Huiusmodi sunt strigmentosa, biliosa, cruenta, porracea, & nigra, modo simul inter se mixta, modò per vices prodeuntia. Flatum autem sine sonitu quidem & crepitu exire optimum. Præstat tamen cum strepitu prodire, quam istic revolvi, at qui eo modo prodit, ægrum aliquo dolore vexari, aut delirare indicat, nisi æger sua sponte hoc modo flatum emiserit, & præcordiorum dolores & tumores, recentes quidem & sine inflammatione murmur solvit, circa præcordia extortum, idque porissimum si cum stercore vrina, & flatu prodierit, alioqui vbi ipsum per se transmissum fuerit, juvat, idque magis si ad inferiores sedes descenderit, 48. sect. 2. præd.

Quibus prodeunte egestione biliosa, ad pectus morius ac amaritudo sentitur, ij male habere iudicantur, 43. sect. 2. l. 2. co.

In pluribus graveolentibus dejectionibus cum febre acuta, præcordiorum contentione,



ex longo intervallo oborta ad aures tubere  
la mortem adferunt, 201. sect. 1. l. 2. coac.

A sanguinis eruptione nigrorum per al-  
vum egestio, malo est. Quin & prærubræ  
& æruginosæ dejectiones damno sunt, qui-  
bus ejusmodi sanguinis eruptiones 4. die con-  
tingunt, tandem sopore & convulsione con-  
fiscati, moriuntur prægressis nigris dejectio-  
nibus & ventre in tumorem sublato, 330. sec.  
2. l. 2. coac.

Alvi recrementum optimum est molle,  
constans, aliquatenus fulvum, nec admo-  
dum graveolens, coque tempore quo per se-  
cundam valetudinem dejici solet excretum,  
copia verò ingestis cibis respondens. Crassum  
autem fieri oportet in judicationem eunte  
morbo, vtile quoque quod lumbricos teretes  
ad judicationem exire cogit, 901. sec. 2. coac.

In præcipitibus malis spumans & circum-  
biliosum excrementum, malo est, malum  
quoque, & exactè candicans: adhuc verò de-  
terius farinæ molitæ instar & stercorosum,  
præter hæc sopor malo est, & cruenta alvi  
dejectio, ac immoderata vasorum inanitio,  
602. sect. 2. coac.

Vbi alvus modicè intercepta, nigra ster-  
coribus caprarum similia, nec nisi coactè de-  
mittit, hoc casu nasus erumpens malo est, 603.  
sect. 2. coac.

Alvi recrementum glutinosum, syncerum,  
aut album in vitio est. Vitiosum quoque  
quod

quod abundè fermentatum est, & aliquantu-  
lùm pituitosum, pravum etiam cum ex his  
quæ densata feruntur; quod subsidet aliquan-  
tulum livescit, puruleatum ac biliosum est,  
604. sec. 2. co.

Sanguis splendidus alvo per secessum re-  
jectus, malo est, præsertimque si dolor ali-  
quis adsit, 605. sec. 2. coac.

Spumans & bile obductum alvi excremen-  
tum vitio est, iis verò præcipuè quos antea  
lumborum dolor, aut desipientia vexarit,  
fortèque dolores etiam iis adsunt, 607. sec. 2.  
co.

Tenue alvi recrementum & spumans, in  
quo quod subsidet aqueum est, & ex pallido  
virescens, malo est. Malum quoque purulen-  
tum, nigrum etiam, cruentum malum, cum  
febte atque aliàs. Vitiosum quoque varium  
abundè coloratum alvi excrementum, eo-  
que deterius quo colore formidandum ma-  
gis, præterquam in medicamenti portione,  
tunc namque periculo vacat, copia non exu-  
perans, friabilis quoque mollis in febte alvi  
secessus, vitio est. Vitiosus quoque siccus,  
qui facilè dissolvitur nec coheret, decolor  
idque præcipuè si alvum humectat, lethalis  
verò si nigra antea prodierint, 608. sec. 2. co.

Liquidum alvi recrementum & brevibus  
intervallis cumulatam malo est, partim nam-  
que vitium & infomnium, partim verò exo-  
lutionem pariet, 609. sec. 2. co.



Perliquidum aliquantulum friabile alvi recrementum cum summi totius corporis perfrictione, non sine febre, vitiosum est. Rigores præterea vesicam & alvum corripunt. Valde verò aquosa dejectio in præcipitibus malis non desinens, malo est, atque eo magis, si sitis vacuitatem fecerit, 610. sect. 2. co.

Prærubrum in alvi proluvio, excrementum vitio est. Vitiosum etiam admodum ex viridi pallescens, aut albicans, aut spumans, aut aquosum. Item malum est quod exiguum glutinosum, læve, & ex viridi subpallidum, pessima quoque dejectio liquida in sopore & torpore detentis: lethale verò est etiam multum sanguinem glutinosum ex alvo effluere: itemque candidum & liquidum excrementum, cum alvi tumore, 611. sect. 2. co.

Alvi excrementum nigrum, velut sanguis, & cum febre, & sine febre, malo est, mala item quæcunque varia, & quæ bile abunde sunt saturata, 612. sect. 2. coac.

Alvi recrementa quæ in spumosa & sincera desinunt, omnibus quidem ingravescentis mali significationem præbent, convulsionem verò tentatis vel maximè in hujusmodi casibus ad aures tubercula oriri solent, at quæ perliquida, ac rursus consistentia, sincera, stercoracea, morbi longitudinem denunciant, prærubrum verò; in febre delirium, candidans autem stercorosum, in morbo regio molestiam exhibet, ac liquidum etiam  
ubi

ubi resederit ruborem adeptum, 613. sect. 2. coac.

Sanguinem effudentibus glutinosum alvi recrementum maculis nigris distinctum, malignitatem denotat, præcipueque exalbidis, 614. sect. 2. co.

Alvus perturbata cum frequenti desidendi labore, maxillas intendit, rubores etiam faciei solvit, 616. sect. 2. co.

Exactè candidans alvi recrementum in febre, nullam bonam judicationem denunciat, 615. sect. 2. co.

Stercoracea alvi egestio cum tensione alvum malè affectam denunciat, pituitosa verò repente cum oris ventriculi dolore, intestinorum difficultatem & fortasse etiam lumborum dolorem: in talibus alvus circumtensa ex necessitate liquida demittens, celeriter intumescens quandam convulsionis significationem præse fert; in his novus subinde rigor periculum creat, 617. sect. 2. co.

Quibus nigra per alvum secedunt ij tenuibus & frigidis sudoribus disfluunt, 618. sect. 2. co.

Quibus circa initia alvus turbatur urinæ autem sunt pauca, temporis progressu alvus quidem resiccatur. Urina verò tenuis si abundat, his abscessus ad articulos fiunt, 619. sect. 2. co.

Frequentes desidendi labores rigorem adferunt, & quibus alvi recrementum vitiosum,



est, id maximam molestiam exhibet si 4. die initium fecerit, 620. sect. 2. co.

Frequentes & ex parvis intervallis desidendi labores, aliquantulum glutinosa excrementes cum paucis stercoraceis, præcordiorum & lateris dolore, morbum regium prænunciant; animadvertendum autem num ex istorum suppressione ij cum virore pallefant, eos verò etiam existimo sanguinem profundere, hos quoque lumborum dolores affligunt, & his sanguinem profundentibus, sanguis splendidus prodit, cum sopore & capitis dolore subinde incallescere, & perniciem denunciat, 621. sec. 2. coac.

Glutinosa, biliosa dejectiones, magis quodammodo abscessus juxta aures excitant, 622. sec. 2. co.

Quibus faciei incendium & intensus rubor solvitur & graveolens est alvi egestio, redundans & subrubra; in his infania metus est, 624. sec. 2. coac.

In biliosa alvo, molli stercoracea egerente, apparentes æstus tumorem ad aures excitant, 626. sec. 2. co.

Biliosas alvi dejectiones surditas, & surditatem biliosa alvi dejectio sedat, 627. sect. 2. coac.

Exitialis est dejectio pinguis & nigra, ac livida cum odoris gravitate, itemque biliosa simile quiddam lentium aut cicerum lomento continens, aut veluti bene florulentos sanguinis

guinis grumos, & infantium egestionem odore referens, ac varia, eidemque diu perseverans, talis etiam fuerit etuenta, strigentosa, biliosa, nigra, viridis, & simul & per vices excreta. Exitialis quoque quæcumque procedendo ægri sensum fallit, 611. sec. 2. co.

Vitiosa etiam sunt, prærubra dejectiones, æruginosa, 4. die apparentes, ac hujusmodi sanguinis profluvia soporem inducunt. In his casibus ex convulsione moriuntur, nigris ante procedentibus, 632. sec. 2. co.

Quibus nigra per alvum secedunt ii tenuibus & frigidis sudoribus disfluunt, 633. sect. 2. coac.

In iis qui longo tempore consumpti sunt, temeraria & quæ præter rationem sunt alvi exclusiones, vna cum vocis defectione tremula, perniciem denuntiant, 934. sec. 2. co.

Tenuis nigrorum dejectiones horrorem inducentes, in talibus meliores, tales præcipue juvant ætatem quæ vigorem antecedit, 635. sec. 2. co.

Quibus cum alvi perturbatione sub judicationem morbus ingravescit, iis nigra per alvum prodeunt, 637. sec. 2. co.

Ex dururno ventris affectu vomentibus, biliosis cibum averfantibus, copiosus sudor abortus cum repentina virium impotentia, lethalis, 638. sec. 2. co.

Vbi alvus humecta est, ægri lassitudine, capitis dolore, siri, insomnia torquentur, in



prærubro colore libertatis insaniam meruerere oportet, si spirandi difficultas adfuerit: quos etiam ex virore pallescentes, facili spiratio iuvat, alvo subinde prorumpente, 642. sec. 2. co.

Æstuosæ dejectiones, & cum contentione procedentes, malè affectam alvum prænuntiant, 643. sec. 2. co.

In biliosis perturbata alvus, pauca crebrò reddens, & cum paucis mucosis distentionem facientia, oborto circa tenue intestinum dolore, nec facile prodeunte vrina, ex his casibus in aquam inter cutem tendit, 644. sec. 2. co.

Qui æstum sentiunt, & prægressis dejectionibus, tenuibus sudoribus dissuunt, iis febris ingravescit, 646. sect. 2. co.

In humecta alvo perfrictio cum sudore, vitiosa, 647. sect. 2. coac.

Humescante alvo sanguis ex gingivis effluens, lethalis, 648. sect. 2. co.

Alvi recrementum purum succedens, febre rem acutem solvit cum sudore, 649. sec. 2. co.

Alvi prærubra prolavies, cum in omnibus quidem morbis, tum verò vel maximè in prædictis, malo est, 2. sec. lib. 2. præd.

In biliosis & sinceris dejectionibus, spumosa efflorescentia malo est, iis præsertim quos antea lumborum dolor ac desipientia vexavit, 21. sec. 2. l. i. præd.

In his

In his leves, & per intervalla lateris dolores, delirium significant, 22. sec. 2. l. i. præd.

Alvi recrementa, si in spumosa, & sincera desinant, mali incrementum significat, 50. sec. 2. l. i. præd.

In gravibus malis, & biliosis, exactè candidantes, spumantes, & circumbiliosæ ejectiones malo sunt, 53. sec. 2. l. i. præd.

Vide dysenteriam, lienteriam.

### EXCREATIONES.

Excreationes in febris non intermittentibus lividæ, cruentæ, foetidæ, biliosæ, omnes malæ. Commodè tamen si prodeunt bonæ: sed eadem quoque est eorum, quæ per alvum & vrinas excernuntur ratio, si quid verò quod non juvet per hæc loca excernatur, malum. aph. 47. sec. 4.

### EXTENUATIO.

In quovis morbo partes ad umbilicum & imum ventrem attinentes crassiores esse præstat: harum siquidem extenuatio & tabes mala, sed ad inferiores quoque purgationes parum tuta, aphor. 35. sec. 2.

Vide tabem, bilem etiam.

### FACIES.

Bene colorata facies tetrica, ac superciliosa, perniciosam intentat, 49. sec. 2. l. i. præd.

Facies ex tumida depressa, ac vox levior ac remissior evadens, spiritus quoque rarior, ac levior, postera die remissionem fore de-

D



nunciatur. 211. sec. 2. co.

Faciei corruptela lethalis est, minus tamen si ob pervigilium aut inedia, aut alvi perturbationem contingat; nam quæ ex his causis orta est corruptela species; vna die aut nocte in integrum restituitur, huiusmodi autem faciei hæ notæ sunt, oculi concavitate acuta, collapsa tempora, frigida aures contractæ quæ, cutis dura, color pallidus, aut niger. Ad hæc quoque livescens palpebra, aut labrum, aut nasus mortem in propinquo esse significat, 213. s. 2. co.

Bene colorata facies cum sudoribus diuturnis absque febre, vetusta stercore subesse, aut inordinatam victus rationem præ se fert, 214. sec. 2. co.

In morbis autem acutis imprimis quidem ægroti facies sit in consideratione adhibenda, si tunc benevolentium præcipueque sui ipsius similis, ita enim optima existimanda, quæ verò ab eo plurimum recedit, gravissimum periculum portendit. Qualis fuerit nasus acutus, oculi concavi, collapsa tempora, aures frigida & contractæ, imisque suis fibris invertæ, cutis circa frontem dura, inuenta & ressicata, & totius faciei color ex viridi pallescens, aut etiam niger, aut lividus, aut plumbeus. Itaque si per initia morbi ejusmodi facies fuerit, neque adhuc ex aliis signis conicere poteris, interrogare convenit, num ægrotus vigilaverit, aut alvus admodum

modum liquida fuerit, aut enim inedia aliqua oppresserit. Quod si quid horum fateatur, minus formidandum esse existimandum. At si nihil horum præcessisse dixerit, neque intra prædictum tempus ad pristinum statum redierit, in propinquo mortem esse sciendum est. Si verò vetustiore jam morbo, aut triduo, aut quadriduo, talis facies exierit, inquitenda ea sunt de quibus antea præceptum ex corpore & oculis in considerationem adhibenda, ex l. præd.

#### FAUCES.

Quibus ad fauces irritamenta sunt, iis moderata aurium tubercula excitantur, 264. sec. 2. coac.

Fauces leviter exasperatæ, & alvus inanibus exurrectionibus fatigata, frontis dolores in ægris palpitantibus & more investigantium sensim contractantibus, aut dolore affectis, si quæ ex his crescunt, molestiam exhibent, 267. sec. 2. co.

Vbi fauces dolent, aut pustularum eruptiones oriuntur in corpore, excrementa in pectore oportet, nam si biliosa fuerint vna corpus ægrotat: si verò sanorum excrementis similitudo corpus alere poteris, aphor. 15. sec. 2.

Vide præga.

#### FAMES.

Fame dominante vacandum est à labore, aph. 16. sec. 2.

Famem thorexis solvit, aph. 21. sec. 2.



## FEBRES.

Febriticantium non omnino leviter corpus sibi constare, nec minui, aut etiam plus æquo colliqueferi, malum. Hoc siquidem virium inbecillitatem, illud morbi diuturnitatem significat, aph. 28. sec. 2.

Febriticantibus si sexto die rigores fiant, judicacionem habent difficilem, aph. 29. sec. 4.

Æstiva quartanæ, plerumque breves, autumnales longæ, & inter eas maximè quæ ad hyemem vsque pertinent, aph. 25. sec. 2.

Quibus accessiones fiunt, quæcunque hora febris dimiserit, eadem si postero die repetat, judicatu difficilis esse solet, aph. 30. sec. 4.

Qui per febres laetudinem sentiunt, iis ad articulos, & juxta maxillas potissimum abcessus fiunt, aph. 31. sec. 4.

Febres quæ tertio quoque die vehementius affligentes non intermittunt, periculosiores: quoquo modo autem intermiserint, periculum abesse significant, aph. 41. sec. 4.

Tertianæ exquisita septenis ad summum circuitibus terminatur, aph. 59. sec. 4.

Si febre ardente laboranti rigor superveniat, solutio fit, aph. 57. sec. 4.

Febriticantem nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet reverti, aph. 61. sec. 4.

Quibus in febribus sexto die rigores repetunt, eodem die solvantur, aph. 63. sec. 4.

In febribus circa ventriculum vehemens pulsus, & cordis motus, malum, aph. 65. sec. 4.

In acu-

In acutis febribus convulsiones, & circa viscera vehementes dolores, malum. aphor. 66. sect. 4.

In febribus per somnum pavores aut convulsiones malum portendant, aph. 67. sec. 4.

Convulsioni febrem accedere satius est, quàm febrî convulsionem, aph. 26. sect. 2.

Qui quartana corripuntur, non admodum convulsionibus tentantur; si verò prius tentati fuerint, superveniente quartana liberantur, aph. 70. sec. 5.

Quibus in febribus ardentibus tremores, æstus solvantur, aph. 26. sec. 6.

Si febris sit non ex bile orta, multa aqua calida capiti superfusa, febrem solvit, aph. 42. sec. 7.

In febre convulsio, manuum quæ ac pedum dolores malignum quiddam prænunciant: malignus quoque ex femore doloris impetus, sed & neque genuum dolor probari potest: quin & surarum quoque dolores maligni sunt, ac mentis emotio, tum verò præcipue, si sablime quid in urina innatet, 30. sect. 2. l. 2. co.

Ex præcordiorum dolore obortæ febres, malignæ sunt, in his profundus ac altus sopor pessimus, 31. sec. 2. l. 2. co.

Qui in febre non intermittente renirent, & crebriò exudant, cum præcordiorum distentione, si ut plurimum malignè habent, atque in iis dolores in humeri caput ac jugulum aff-

D.



fixi parvi sunt, 32. sec. 2. l. 2. co.

Febres quæ proximè ad tertianarum naturam accedunt cum incontinenti corporis mutatione, malignæ sunt, 31. sec. 2. l. 2. co.

In febre unum esse, malo est, 34. sec. 2. l. 2. co.

Febres ad tertianarum naturam accedentes, vagæ & errantes, ubi in dies patet transierint, molestiam exhibent, 37. sect. 2. l. 2. co.

In febribus alvo & flatibus distenta, flatum non emittunt, multat, 44. sec. 2. l. 2. co.

Quibus in febre ardente tumores cum somnolentia & corpore obveniunt, eos lateris dolor accedens cum levi partis alicujus syderatione necat, 60. sec. 2. l. 2. co.

Quibus cum febre lateris dolore accedente, alvus aquosa multabile permixta transmittens alienationem adfert, deinde verò cibos averlatur, & sudoribus diffluit, cum hæc colorata facie, ac humefcente alvo. & dolor alicuius oris ventriculi succedit, ii diutius morbum trahentes pulmonum vitii laborantium more intereunt, 67. sec. 2. l. 2. co.

Judicationis cessationes in febribus, temporis quidem longinquitatem, non tamen perniciem inducunt, 74. sec. 2. l. 2. co.

Ex vehementibus doloribus abortæ febres, diurnæ, 75. sec. 2. l. 2. co.

Qui accessione correpti, postero die gravius habent, iis malum denunciatur, 78. l. 2. l. 2. co.

Quibus

Quibus tertio die accessio subsistit & 4. ingravescit, malum denunciatur, ac metus est hujusmodi accessiones phrenitim inducant, 79. sec. 2. l. 2. co.

Febres si alio die quàm judicatorio desint recidivam metuere oportet, 80. sect. 2. l. 2. co.

Qui circa initia tenuiter febricitantes, ad judicationem cum capitis pulsatione, & urina tenui ingravescant, eos mentis emotione ac insuper pervigilio corrumpi, nihil mirandum est, 81. sec. 2. l. 2. co.

In anhelatoribus & suspirosis, febris postea acuta cum præcordiorum contensione perfurgatis, magnum circa aures expectare tumorem oportet, 107. sec. 2. l. 2. co.

In pueris febris acuta cum alvi suppressione & pervigilio, calces veluti jactare, ac colorem mutare, & ruborem contrahere, convulsionem minatur, 109. sec. 2. l. 2. co.

Qui per accessiones ruffiunt, & exudant, ii malignè habere judicandi sunt, sec. 2. l. 2. co. Febres assidue, quæ 3. quoque die intenduntur, cæ periculum inducunt, 116. sect. 2. l. 2. co.

Si quibus aliquando febris intermiserit, periculum abelle significat, 117. sec. 2. l. 2. co.

In febribus longis, aut tubercula, aut ad articulos dolores proveniunt, quos neque tamen temere fieri existimandum est, 118. sec. 2. l. 2. co.

D 4



Febres lypriæ, non nisi per choleram effusa bile solvantur, 120. sec. 2. l. 2. co.

Qui in febribus tertianis ingravescent dolores tertianarum naturam assument, & sanguinis grumos per secessum egerunt, 122. sec. 2. l. 2. co.

In febribus, venæ quæ est in cervice pulsatio & dolorem ad intestinorum difficultatem inducit, 124. sec. 2. l. 2. co.

Si venæ temporum in febribus pulsant & facies bene habita fuerit, absque præcordiorum mollitie, longum fore sperare oportet, qui nec sine liberali sanguinis ex naribus profusione, aut singultu, aut convulsione, aut coxendiculi dolore desinet, 128. sec. 2. l. 2. co.

Alvus in febre ardente affatim prorumpens, mortis periculum adfert, 129. sec. 2. l. 2. co.

Febris ardens ex laborioso ventris dolore, perniciem minatur, 130. sec. 2. co.

In febre ardente laborantibus, si aurium sonitus cum visus hebetudine & ad nares gravitate accesserit, nisi sanguis ex naribus profluat, furiosa & vehemens mentis emotio metuenda est, 131. sec. 2. l. 2. co.

In febribus ardentibus tremores, delirio solvantur, 132. sec. 2. l. 2. co.

In febre ardente laborantibus cum aliqua corporis perfrictione, egestionibus aquæ similibus, & crebris, oculis periculum attenditur, tum verò præcipue, si alto stupore, quem  
cato-

catochon vocant, detineantur, 134. sec. 2. l. 2. co.

Febrem ardentem succedens rigor solvitur, 135. sec. 2. l. 2. co.

Febres ardentes quæ recurrere solent, quatuor diebus de se significationem exhibent, deinde exudant in multis die 7. 11. 136. sec. 2. l. 2. co.

De febre ardente laborantibus dies 14. aut allevando, aut perimendo deveniunt, 137. l. 2. l. 2. co.

Ex febre ardente, nisi qui circa autem sit abscessus suppuret, non admodum liberantur, 138. sec. 2. l. 2. co.

Quos febris detinet cum faciei rubore, & capitis vehementi dolore, in iis si venæ pulsant, sanguinis fluxus plerumque expectandus est; quos verò stomachi fastidia vexant, cum oris ventriculi morstu; & crebra sputatione, iis vomitio ad futura est: quibus autem ructus adsunt, flatu, ventu, sopitus cum inflatione, iis alvus exturbatur, 142. sec. 2. l. 2. co.

In febribus non intermittentibus, si partes externæ algeant, & internæ urantur, & sitiunt, lethale, aph. 48. sec. 4.

Quibus febris assidua diutius cum securitate trahitur, si neque ex dolore, neque ex inflammatione, neque ex alia ulla manifesta causa contingat, in iis abscessum cum dolore & tumore, præcipueque ad inferiores partes



sperrari oportet: maxime autem in his expectare abscessum oportet, qui trigessimum annum superarunt: cum vero in his considerandi sunt abscessus, ubi febris vigesimum diem præterierit, majoribus autem nam minus accidunt, nisi febres longo tempore detinent: que vero febres intermittunt incertoque ac vago ordine præcedunt, ex autumno præcipue in quatuordecim feriæ transeunt, idque in his maxime qui trigessimum annum superarunt; per hyemem vero abscessus potius accidunt & rarius cessant, minusque recurrunt, 143. sec. 2. l. 2. co.

Quæcumque febris ex aduerso respondet, nisi abscessum faciant, malignitatem denuntiant, 145. sec. 2. l. 2. co.

Febres quæ neque diebus criticis, neque post apparentes solutionis notas dimittunt, repetere solent, 146. sec. 2. l. 2. co.

In febribus ex glandularum tumore dolor, morbi diurnitatem prænuunt, 73. sec. 2. l. 2. co.

Tertiana exacta 5. aut 7. ad summum nono circuitu terminatur, 148. sec. 2. l. 2. co.

Febre acuta incipientibus, sanguinis stillationes cum sternutatione accedentes, & quod in urina desidet album 4. die visum, septimo solutionem afferre denuntiat, 149. sec. 2. l. 2. co.

Qui per febres tenuiter exudant, cum capitis dolore, & alvo intercepta, ad convulsionem.

siones proueniunt, 154. sec. 2. l. 2. co.

Qui per febres intermittentes, inæqualiter incalecentes, aluum habent stantibus distentam, paucam transmittentem, iis post iudicationem lumborum dolore orto alui prorumpunt; qui autem ad manus contactum exardescunt, torpore, sili, ac corporis incontinenti iactatione vexantur, si alvo intercepta gravati exolvantur. Interdum vero etiam præcubo in pedibus ambusta eadem denuntiant, 158. sec. 2. l. 2. co.

Hybernæ quartanæ ferè in morbos acutos transeunt, 159. sec. 2. l. 2. co.

In febre acuta continens capitis dolor, cum gravibus aliis signis mortem minatur, quod si neque alia præterea signa mala sunt, & viginti dies superat aut sanguinis ex naribus, aut puris effluxum, aut abscessus ad inferiores corporis partes denuntiat, præcipue quidem in his qui nondum 35. annum atigerunt, fluxiones, in senioribus vero abscessus sperare convenit: si vero dolor vehemens circa frontem ac tempora affligat, fluxiones expectandæ sunt, 160. sec. 2. l. 2. co.

Febrium initio si atra bilis sursum aut deorsum prodeat, lethale, 168. sec. 2. co.

Ex præcipitibus morbis in febribus ardentibus maxime tubercula ad aures exoriuntur, ac nisi iudicatorie solvantur & maturescant, aut sanguis e naribus profluxerit, aut crassum sedimentum urina acceperit, ægros interi-



munt. Prius verò huiusmodi tumores subsi-  
dant ac conquiescunt, sed & insuper febres  
iplas in considerationem adhibere convenit,  
num intendantur aut remittantur, atque ita de  
tota re sententiam ferre. 207. sect. 2. l. 2. co.

Qui in febribus ad tactum nullum ardoris  
sensum præ se ferunt, phrenitici sunt, idque  
magis si sanguis fluxerit, 128. se. 2. l. 2. co.

In febre cum sudore, vocis & capitis do-  
lore, defectiones, si per se resolvuntur ægri,  
ac præter voluntatem excrementa demittantur,  
malumque remitti videantur, diurni  
morbi metus est: in his subinde obortus ri-  
gor damnari non debet 257. sec. 2. l. 2. co.

Quibus ex rigore febris cum lassitudinis  
sensu adest, in his muliebrum profluvium  
expectare oportet. Quod si cervicis dolor  
prehenderit, sanguinis è naribus eruptionem  
fore spes est. 555. sec. 2. l. 2. co.

In febre ardente si tinnitus aurium cum  
visus habitudine fiant, & ad nares accedat  
gravitatis sensus, furiosa mentis emotio in-  
dicatur, 132. sec. 2. præd.

Febres quæ soporem lassitudinemve, in-  
ducunt, aut in quibus caligant ægri, insom-  
nia ac tenuibus sudoribus vexantur, malignæ  
sunt, 74. sect. 2. præd.

In febribus ardentibus cum aliqua summi  
corporis perficiatione, ac egestionibus aquæ  
similibus, & crebris, oculorum perversio, &  
distensio, malum significat, tum verò præ-

cipue (si alto quodam stupore quem cato-  
chon vocant) deprehensi detineantur, 81.  
sect. 2. præd.

Febribus & lassitudinis sensu detento, cum  
oculorum perversione, rigor perniciem mi-  
natur: atque in huiusmodi casibus soporari.  
malum denunciant, 89. sec. 2. l. 2. præd.

Præcordiorum dolores in febribus cum  
loquendi impotentia, si sudore non solvan-  
tur, maligni sunt: in his dolores ad coxen-  
dices cum ardente febre atque alvus affarim  
prorumpens, perniciem ostentant. 90. l. 2.  
se. 2. præd.

Quibus cum febribus voces post judica-  
tionem deficiunt, ii tremore & sopore cor-  
repti intereunt, 91. sec. 2. l. 2. præd.

In febre cum sudoribus, vocis & capitis  
dolore defectiones; si per se resolvantur  
ægri, ac præter voluntatem excrementa de-  
mittunt, malumque remitti videatur, diurni-  
niorem morbum metuere oportet, in his  
novus subortus rigor damnandus non est,  
49. sec. 2. l. 2. præd.

Febricitanti cum sudore spura defluentia  
levia sunt & minime maligna, in quibus vi-  
dendum est num ad aliquos dies alvi ma-  
descant, quod equidem reor, animadverten-  
dum quoque est num his ad articulos aliquid  
abscessurum speres, 128. sec. 2. l. 1. præd.

Quibus ex rigore febres adsunt, cum las-  
situdinis sensu in iis muliebrum profluvium



expectare oportet, quod si cervicis dolor prehenderit, sanguinis è naribus eruptionem fore spes est, 142. sect. 2. l. 2. præd.

Si febres 3. quoque die vehementiores fiant nec intermittant, periculosa: quoquo modo autem intermiserint, periculo vacare significatur, aph. 62. sec. 7.

Quibus febres longæ, his tubercula in articulis aut labores fiunt, aph. 63. sec. 7.

In febribus non intermittentibus, si externa frigeant, interna vrantur, & febris adfit, est moriferum, aph. 72. sec. 7.

In febre non intermittente si labrum, aut nasus, sicut oculus, aut supercilium pervertatur, si non videat, si non audiat, quidquid horum ægro debili acciderit, in propinquo mors, aph. 73. sec. 7. eandem repetit sententiam 49. sec. 4.

Quibus per febres circa dentes lentor quidam obaascitur, iis vehementiores sunt febres, aph. 53. sec. 4.

Quibus per febres aures obsaruerint, iis sanguis è naribus profluens, aut perturbata alvus, solvit morbum, aph. 60. sec. 4.

Quibus febres cessant neque apparentibus signis solutionis, neque diebus iudicatoriis, iis recidiva expectanda est: in longa febre, salutariter tamen affecto ægro, si neque ob inflammationem aliquam neque ob vllam aliam evidentem occasionem dolor detinet, in hoc abscessus cum tumore, aut dolore ad articu-

articulum aliquem expectandus maximèque in inferioribus locis: magis tamen & breviori tempore contingere solent huiusmodi abscessus iis qui trigessimum annum non attigerunt, at statim in considerationem adhibenda sunt quæ ad abscessum spectant, si vitra 20. diem febris detinet, quæ tamen per longiores febres senioribus minùs contingunt: huiusmodi autem abscessum expectate convenit si febris continua fuerit, in quartana verò firmari debere; vbi intermiserit & errabundum in modum prendit, & ita ad autumnum deducatur. Vt verò abscessus oriuntur in his qui triginta annis minores sunt, ita quartanæ potius annum agentibus trigessimum, aut senioribus. Scire autem convenit abscessus hyeme magis contingere, & tardiùs desinere, & minùs interdò recurrere; si quis in febre non lethali dixerit caput dolere, aut tenebricosum quiddam ante oculos obversari, si etiam oris ventriculi morsus accesserit, biliosa vomitio aderit: quod si quoque rigor suboritur fuerit, & inferiores præcordiorum partes frigidæ habuerit, adhuc citiùs vomitio aderit. Si verò sub id tempus biberit quidpiam aut ederit, id quàm celerimè evomitur. Inter hos autem quibus 1. die dolor cœpit. 11. 4. & 5. die potissimùm affliguntur, at 7. liberantur; quin etiam eorum plerique 3. die dolore vexari incipiunt, conflictantur autem maximè 5. ve-



rùm 9. aut 11. periculo defunguntur. Quis  
verò 5. die dolore affligi cœperint, & reli-  
qua pro ratione prioribus respondeant, ad 14.  
diem iudicatur morbus. Ista autem viris qui-  
dem & mulieribus, in tertianis præcipuè  
contingunt. Iunioribus verò cum in ipsis,  
tùm etiam magis in febribus perafflictis &  
legitimis tertianis. At quibus per huiusmo-  
di febrem caput dolet, & pro tenebris ante  
oculos apparentibus visus hebetudo contig-  
git, vibrantesque splendores observari vi-  
dentur, & pro oris ventriculi morfu, in præ-  
cordiis dextra aut sinistra parte contentio  
quædam, neque cum dolore, neque cum in-  
flammatione suboritur, iis pro vomitu san-  
guinem è naribus profluxurum expectandum  
est, potius tamen eo casu in juvenibus san-  
guinis fluxorem expectato: iis verò qui 30 an-  
num attingunt & senioribus minus, & in his  
vomitiones expectabis. Pueris convulsionem  
accidunt, si febris acuta fuerit, si venter non  
desiciat, si vigilent, perterreantur, plerum  
assiduè & color immutetur, & ex viridi pal-  
lidus, aut lividus aut rubor contrahatur.  
Hæc autem pueris quidem recens natis ad  
septimum annum usque promptissime adve-  
niunt. At grandiores pueri & viri non ad-  
per febres convulsionibus prehenduntur, ni-  
si vehementissimum & pessimum quoddam  
signum, ex his quæ in phrenitide fieri solent  
aduerit. Morituros autem & superfuturos

tunc

tum pueros, tum alios ex omnibus signis  
conspicies, velut in singulis singula descripta  
sunt, qui verò superfuturos ex morbo, & mor-  
ituros, eosque quibus pluribus diebus &  
quibus paucioribus perseverabit morbus,  
rectè prænoscere volet vires, excrementa  
& conditionem morborum vulgariter graf-  
fantium considerare debet, pag. 56. sec. 2.  
prænotio.

Febres acutas cum mentis perturbatione,  
in oris ventriculi dolore non bilioso, insaniam  
solvit, 550. sec. 2. l. 2. co.

In febribus ex glandularum tumoribus  
dolores, morbi diuturnitatem prænantiant,  
73. sec. 2. l. 2. co.

Vide crifim, convulsionem, lumborum  
dolores, tubercula, hæmorrhagiam, excre-  
menta, hypochondria.

## FISTULA.

Ex fistulis maximè molestiam adferunt,  
quæ in cartilaginosis aut carne vacuis locis  
fieri solent, cava sunt, & longius excurrunt,  
assidueque manant, & in quarum osculo ca-  
runcula inest: facilius autem curantur, quæ  
in mollibus & carnosissimis locis, & non nervo-  
sis oriuntur, 511. sec. 2. l. 2. co.

## FLATVS.

Flatum verò absque crepitu aut sono emit-  
ti, inter optima signa est; præstat tamen cum  
strepitu prodire quàm illic revolvi: quan-  
quam hoc pacto prodians dolorem & deli-



fluxum denunciat, nisi sua sponte id æger fecerit & flatum emiserit, 465. sec. 2. l. 2. co.

Vide excrementa.

### FLUXIO.

In uterum gerentibus falliginosæ ad fauces fluxiones malum denunciant, 537. sec. 1. l. 2. co.

Pregnantibus fluxiones cum serpentibus oris ulceribus, malo sunt, hæc convulsionibus, exolutionibus, postea perfrictionibus tentatæ celeriter calefiunt, 539. sec. 2. l. 2. co.

### FRIGIDVM.

Caput, pedes, manus esse frigidas, ventre & lateribus calentibus, mali morbi signum est, optimum verò totum corpus, æquè calidum & molle esse, 492. sec. 2. l. 2. co.

Si per sanitatem hyemis tempore lumborum frigiditas & gravitas levi ex occasione orta sit, & alvi suppressio, superiore ventre probè officio suo fungente, coxendicium, vel tenum dolor, urinae stillatio fortè expectanda est, 487. sec. 2. l. 2. co.

Frigidum verò convulsiones, tetanos, nigrores, & rigores febriles adfert, aph. 17. sec. 5.

Frigidum inimicum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, dorso, medullæ calidum verò amicum, aph. 18. sec. 5.

Quæ perfrigerata sunt excalescere oportet, præterea quæ sanguinem profundant, aut brevis sunt profutura, aph. 19. sec. 5.

Fri-

Frigidum ulceribus mordax, cutem obdurat, dolorem insuppurabilem facit, nigrorem inducit, rigores febriles, convulsiones & tetanos creat. aph. 20. sec. 5.

Frigido verò his utendum, vide fluit, aut fluxurus est sanguis, non quidem eodem loco, sed ad ea loca unde influit admoto: & si quæ partium inflammationes aut deflagrationes ad rubrum sanguineumve colorem tenent recentem efflorescente sanguine, hisdem ipsis adhibito, nam inveteratus nigrescit. Erysipelas etiam non ulcerarum juvat: siquidem exulcerarum lædit. aph. 23. sec. 5.

### FRIGIDA.

Frigida veluti nix & glacies pectori inimica, tusses movent, venarum ruptiones & distillationes efficiunt, aph. 14. sec. 5.

In morbis acutis frigus partium extremarum, malum, aph. 1. sect. 7.

Vide calidum & calorem.

### GENERANDI IMPOTENTIA.

Quæ frigidos & densos locos habent, utero non concipiunt, & quæ præhumidos habent, gravidari nequeunt: extinguitur enim in ipsis genitura, & quæ sicciore & æstuosæ: nam alimenti defectu, semen corrumpitur, quæ verò ex utraque oppositione moderatam naturam sunt locorum temperationem, cæcæcunditate valent, aph. 62. sec. 5.

Par est de maribus ratio, aut enim propter corporis raritatem spiritus foras dissipatur,



ita ut genituram ejaculari nequeant : aut propter densitatem humor foras non profilit; aut propter frigiditatem non incenditur : ut eo loci coacervari possit : aut propter caliditatem hoc idem ipsum usu venit, aph. 63. sec. 5.

## GIBBI.

Qui gibbi ex asthmaute aut tussi ante pubertatem fiunt, statim moriuntur, aph. 46. sec. 6.

## GINGIVÆ.

Sanguis ex gingivis cum humecta alvo produens, perniciem minatur, 241. sect. 2. l. 2. co.

Vide excrementum.

## GRAVIDA.

Mares dextra uteri parte, femine sinistra magis gestantur, aph. 48. sec. 5.

Mulier gravida si marem gerit, coloratior est; si foeminam, discolor, aph. 42. sec. 5.

Vterum gerentibus præcordiorum dolor malum denunciat, his etiam alvi euntes & rigore subinde corripitur, malo est. Ventris dolor si limosa expurget, in hujusmodi levius malum indicat, quæ ex his faciles partus habent, ex postea vehementer anguntur, 525. sec. 2. l. 2. co.

Quibus prægnantibus tabi opportunis faciei rubor exoritur, hunc distillationes è naribus anteverrunt, 524. sec. 2. l. 2. co.

In uterum gerentibus capitis dolores cum sopore & gravitate malo sunt; forteque hujusmo-

justi modi naturæ unâ etiam convulsionibus quibusdam sunt obnoxia, 534. sec. 2. l. 2. co.

Prægnantibus fluxiones cum serpentibus oris ulceribus, malo sunt; hæ convulsionibus, exolutionibus, postea perfrictionibus tentare, celeriter calescunt. Quin etiam prægnantibus molestiam, exhibent, qui circa tenue intestinum contingunt tumores, quales circa extremas uteri osculi oras, in re-ctæ cervicis spirationis difficultate detentis, eveniunt, quin etiam fortassis hujusmodi tumores, gemellorum partum prænunciant, aut fortè convulsiones, tumores hujusmodi indicant. 539. sec. 2. l. 2. co.

Vide dolores capitis, & fluxiones, prægnantem.

## GRAVITAS.

Ægrum quoque facile converti oportet, & dum surgit levem esse; at gravitas quæ totum corpus, vel manus ac pedes premit, vitiosa est. Quod si cum gravitate digiti quoque ac ungues lividi fiant, in propinquo mors est. at si omnino nigrescant minus quam liventes, periculum portendunt; verum tunc reliqua consideranda sunt, etenim si facile morbum sustinet æger, & aliud quiddam ex his quæ securitatem pollicentur se prodit, morbus in abscessum vergit, & denigratæ corporis partes decidunt, 495. sec. 2. l. 2. co.

Vide jacere.



## HÆMORRAGIA.

Qui statis temporibus sanguinem fundunt, si sicculosi sunt, neque sanguinem profuderint, comitiali morbo pereunt, 345. sec. 2. l. 2. coac. idem repetit 131. lib. 2. sec. 2. prædict.

Vbi sanguis ex naribus effluxit, totius corporis perfrictio cum tenuibus sudoribus, morbi malignitatem denunciat, 342. sec. 2. l. 2. co. idem repetit, 126. l. 1. sec. 2. prædict.

Sanguinis è naribus stillationes, quæ undecimo die contingunt, molestiam afferunt, tum verò præsertim si bis sanguis stillarit, aut tursus nares stillare cœperint, 337. sec. 2. l. 2. coac. idem repetit, 148. l. 1. prædict.

In copiosa sanguinis fluxione aut singultus aut convulsio, malum denunciat, 339. sec. 2. l. 2. co.

Diuturnis in morbis parvæ apparentes sanguinis è naribus fluxiones, perniciem ostentant, 341. sec. 2. l. 2. co.

Qui suppressa alvo sanguinem ex naribus fundunt, & unâ cum sanguinis profusio subinde rigent, iis alvus intestinorum levitate laborat & adurescit, aut tenues lumbrici ascarides dicti infestant, aut utrumque, 344. sec. 2. l. 2. coac. idem repetit, 138. lib. 1. prædict. sec. 2.

Large sanguinis ex naribus eruptiones per vim suppressæ interdum convulsiones accersunt, unde liberat venâ sc̄tio 336. sec. 2. l. 2. co.

Qui

Quibus cum surditate, & torpore, paucus è naribus sanguis stillat, nonnihil molestiæ exhibet, iis vomitus & alvi perturbatio confert, 335. sec. 2. l. 2. coac.

Quæ magnæ sunt in principiis sanguinis eruptiones, dum ægri vires recolligunt, alvos effundunt 335. sec. 2. l. 2. coac.

Ex sanguinis eruptionibus, vehementes die judicatoria obvenientes perfrictiones, pessima. 326. coac. idem repetit, 134. l. 1. sec. 2. prædict.

Sanguinis ex parte adversa profusio malum est, velut si in lienis tumore ex dextra nare effluat, & circa præcordia idem spectari oportere existimandum est, 327. sec. 2. l. 2. coac.

Qui ex vulnere subinde rigentes sanguinè profundunt, ii malignè habent, ac inter loquendam derepente moriuntur, 328. sec. 2. l. 2. coac. idem repetit, 18. l. 1. prædict. sec. 2.

Quibus quinto die liberales sanguinis profusiones contingunt, & sexto novo oborto rigore corripiuntur, septimo perfrictionibus tentati celeriter recalescunt, iis alvi malè afficiuntur, 325. sec. 2. l. 2. coac.

Quibus sanguinis eruptiones perseverant, in iis temporis progressu alvus malè afficitur, nisi urina concocta prodierit, ac fortassis tale aliquid urina diluta denunciat, 332. sec. 2. l. 2. co.

Mulierî menstruis præter naturam desin-



cientibus sanguis è naribus profluens bono est, aph. 13. sect. 5.

Sanguinis è naribus fluxus, in febre ardente 4. die obueniens, malo est, nisi aliud quidpiam bene ceciderit, quòd si die 5. contingat, minùs adfert periculi, 133. sec. 2. l. 2. coac.

Quibus per febres sanguis aliunde effluerit largiter, iis dum sese recolligunt, alvi humescentes effunduntur, 133. sec. 2. l. 2. coac.

Quæ ex parte aduersa & præpostere fiunt sanguinis eruptiones, malo sunt, velut in lienis tumore, si ex nare dextra effluat. Quòd circa præcordia eodem modò se habere expectandum est. Majus autem malum denunciatur, si cum tenui circa frontem sudore istud contingat, 125. l. 1. sec. 2. præd.

Quibus sanguinis fluxus diu perseveraverit, in his temporis processu alvus malè habet, nisi vrinæ concoctionem præ se ferant, 133. l. 1. sec. 2. præd.

Quibus pauca sanguinis è naribus stillatio cum surditate & torpore obueniens, molestiam quandam exhibet, iis vomitio, & alvi perturbatio confert, 141. sec. 2. l. 1. præd.

Larga, vehemens & multa sanguinis è naribus eruptio, interdum ad convulsiones deducit, ex quo venæ sectio liberat, 145. l. 1. præd.

Liberalium ab initio sanguinis eruptionum cursum rigor sistit, 150. sec. 2. l. 2.

Quibus

Quibus per febres sanguinis vndecumque exuperit copia, convalescentibus ventres humectantur, aph. 27. sec. 4.

A forti in vlceribus pulsu, hæmorrhagia malum, aph. 21. sec. 7.

Vide alvum; crissim, desipientiam, dolorem capitis & lumborum febres & excrementa.

### HÆMORRHOIDES.

Melancholicis, & nephriticis, hæmorrhoides supervenientes bono sunt, aph. 11. sec. 6.

Diuturnas curanti hæmorrhoidas nisi vna quæpiam servetur, periculum aquæ intercutem vel tabis impendet, aph. 12. sect. 6.

Vide colorem, melancholiam, sopores & hydropes.

### HERPES.

Vide ætatem.

### HORRORES.

Crebri ex dorso horrores subinde locum commutantes graves sunt & difficiles. Laboriosam quippe vrinæ suppressionem minantur, his tenuiter exudare pessimum, & sec. 2. l. 2. co.

A sudore horror non bonum, aph. 4. sec. 7.

Qui subinde inhorrescunt, ex capite laborantes, tenuiter exudantes, ii malignè habent, 12. sec. 2. l. 2. co.

Qui subinde inhorrescunt, sæpe tenui sudore corripiuntur, difficili morbo laborant.

E



13. sect. 2. l. 2. coac.

Qui per sanitatem crebro inhorrescunt, ii ex sanguinis fluxu purulenti evadunt, 26. l. 2. l. 2. co.

Vbi horror in malis subinde incidit cum difficultate spirandi, tabes denunciatur, 17. l. 2. l. 2. co.

Qui subinde inhorrescunt, ac incontinenti corporis jactatione, cum lassitudinis sensu & lumborum dolore consistantur, iis alvi effunduntur, 19. sec. 2. l. 2. co.

Quibus vbi inhorruerint, judicatorij simul sudores contingunt, postridie vero si horror repetierit & temerè pervigilent, iis fortè sanguinem erupturum sperare oportet, 24. sect. 2. l. 2. co.

Horror, anxietudo, oscitatio, vinum pariaque portione epotum solvit, aph. 56. sec. 7.

Horror & lassitudinis sensus, capitis gravitas cum cervicis dolore, muliebres purgationes dejiciunt, quòd si quid hujusmodi circa judicationem cum tussicula contingit, subinde rigorem adfert, 548. sec. 2. l. 2. co.

Vide febres lassitudinem.

#### HUMIDA CORPORA.

Corporibus humida carne præditis præferenda fames est: nam fames siccat corpora, aph. 59. sec. 7.

#### HUMERI.

Vide dolores humerorum.

#### HYEMS.

#### HYEMS.

Vide tempus.

#### HYSTERICA PASSIO.

In mulieribus, quæ uteri suffocationibus tentantur, idque sine febre, faciles convulsiones, quale quid etiam Dorcadi contingit, 554. l. 2. sec. 2. co.

Mulieres quæ ab utero promptè strangulantur, idque sine febre, in convulsiones propensa sunt, 119. l. 1. præd.

Mulieri hysterica, aut difficulter parienti, sternutamentum superveniens, bonum, aph. 35. sec. 5.

Vide convulsionem.

#### HYDROPS.

Aqua inter cutem quæ ex acuto morbo coepit, molestiam ac perniciem adfert. Oritur vero ferè & à laterum inanitate, vel à jecore, sed vbi à laterum inanitate ortum contraxit, pedum tumor, & alvi diuturnus fluor consequitur, qui neque ventrem emollit, neque lumborum auxilium tumorem solvit, at quibus è jecore aqua inter cutem proficiscitur, ii promptè etiam tussi vexantur, pedes intumescunt, & alvus non nisi dura & ægrè perdit, tumoresque modò dextra, modò sinistra parte oriuntur, ac rursus desinunt, 452. sec. 2. l. 2. co.

In hydropse sicca vrina stillatim effluens malum denunciat, mala quoque est quæ exigua habet sedimenta, 453. sec. 2. lib. 2. co.



Hydropicis succedentes morbi comitialis  
offensiones, perniciem adferunt, pravis in-  
vicem succedentibus sigais; & alvos hume-  
tant, 454. sec. 2. l. 2. co.

Aqua inter cutem laboranti cum febre  
urina pauca, & conturbata, perniciem de-  
notat, 456. sec. 2. l. 2. co.

Aque inter cutem initio aquosum alvi  
profluvium absque cruditate exortum, mor-  
bum solvit, 457. sec. 2. l. 2. co.

Vbi hydrops siccus de se significationem  
præbet, tormina ad tenue intestinum incumb-  
entia malum denunciant, 458. sec. 2. l. 2. co.

Ex aqua inter cutem morbus comitialis  
perniciem adfert, 459. sec. 2. l. 2. co.

Aqua inter cutem quæ curationi cessit,  
vbi recurrit, spem tollit, 460. sec. 2. l. 2. co.

Aqua inter cutem laboranti, aqua quæ in  
venis est, ad alvum erumpente solvitur mor-  
bus, 461. sec. 2. l. 2. co.

Quos ex aliqua ægritudine hydrops cir-  
cumvenit, iis alvi relicteæ caprinis sterco-  
ribus similia deiciunt, cum mucosa eliqua-  
tione, neque laudabili urina, præcordiorum  
autem distentiones, ventris dolores ac tu-  
mores, & circa laterum inanitates ac spinæ  
mufculos dolores incidunt, febres quoque  
sitis & tussis sicca comitantur, & ad motio-  
nes spirandi molestia; & crurum gravitas  
cibos etiam averfantur, paucisque sumptis  
expleantur, 481. sec. 2. l. 2. co.

Aqua

Aque inter cutem vitio, cui leucophleg-  
matis nomen est, laborantes, alvi proflu-  
vium sedat, animi abjectiones cum silentio  
& ab hominibus solitudines ferè eos confu-  
ciunt, 482. sec. 2. l. 2. co.

Hydrope detentis, si aqua è venis in ven-  
trem conflaverit, solvitur morbus, aph. 14.  
sec. 6.

Quicumque empyi, aut hydropici, vruntur  
aut secantur, si pus aut aqua vniuersim  
effluerit, omnia moriuntur, aph. 27. sec. 6.

Hydropicis, tussis si superveniat, malum,  
aph. 35. sec. 6.

Quibus jecur aqua refertum eruperit in  
omentum, his venter aqua expletur atque  
moriuntur, aph. 55. sec. 7.

Qui aqua inter cutem detentus est, & ser-  
uari vult, cum robustis visceribus & conten-  
tis viribus esse convenit, simulque suapte  
natura facile concoquere, ac bene spirare, si-  
ne dolore esse, totumque corpus æqualiter  
calere, neque extremis partibus esse colli-  
quesfactum. Præstat namque potius extrema  
tumefacta esse, etsi optimum est nihil hor-  
rum adesse. Verum tum mollia, tum gracilia,  
extrema esse oportet, ventrem contactu  
mollem. At neque tussim neque sitim ad-  
esse convenit, neque linguam, cum alias  
tum ne à somno quidem, quod admodum  
fieri assolet, inarescere, cibos autem suavitè  
assumere, ac vbi quis abundè comederit, ni-

E. 3.







aliud quoddam ex salutaribus signis adfuerit, morbum ad abscessum converti sperandum, ita vt æger quidem morbo superesse, & partes corporis denigrata decidere debeant. Testes autem & pudenda vbi sursum contrahuntur vehementes, dolores & mortis periculum denunciant, 47. prænot.

Albæ pituitæ aqua intercus superuenit, aph. 74. sec. 7.

Qui aqua inter cutem detentus est, & seruari volet, cum robustis visceribus & contentis viribus esse conuenit, simulque suapte natura facile concoquere, ac bene spirare, sine dolore esse, totumque corpus æqualiter calere, neque extremis partibus esse colligatum. Præstat namque extrema potius tumefacta esse, etsi optimum est nihil horum adesse. Verùm tum mollia, tum gracilia extrema esse oportet; ventrem contactu mollem. At neque tussim neque sitim adesse conuenit, neque linguam, cum alias, tum ne à somno quidem, quod admodum fieri assolet, inarefcere, cibos autem suaviter assumere, at vbi quis abundè comederit, nihil affligi. Ventrem quoque medicamentis quidem celeriter moueri, aliàs verò mollia & figurata excernere, vinam in transitu pro instituta victus ratione, & vinorum mutatione mutationem sentire, defatigationem facile sustinere, nec lassitudinem sentire, atque sic quidem in totum hominem se gerere optimum.

timum, vt quam securissimè conualecat. Siminibus horum vt plurima habeat, sic enim spem fore vt evadat. In quo verò nihil horum inest, sed contraria subsequantur, in eo spem tolli animadvertendum est, & cui ex his quæ in aqua inter cutem laborante probauimus, pauca affuerint, parum relictum est spei. At ne in his quibus multus sanguis supra infraque præterperit, prætereaque febribus accesserit, aqua impletur, magnus metus est, & huius generis aqua intercus brevissimi est temporis, & inter inuitabiles numeranda, idque alteri denunciare oportet: quibus autem tumores magni suborti desinunt, rursumque assurgunt, hi potius supersunt quam qui ex sanguinis eruptione complentur: tollunt tamen ægros huiusmodi hydropes cum eos relietis medicis in exitium præcipient, 96. prænot.

### HYPOCHONDRIA

seu præcordia.

Præcordia in tumorem sublata, omnibus quidem mala sunt; præsertim verò his, qui ex longo intervallo tabidi existunt, 442. l. 2. l. 2. co.

Ex his qui cum pernicie consumpti sunt, nonnulli ante mortem subinde rigoribus corripuntur, 443. sec. 2. l. 2. co.

Præcordia optima quidem quæ dolore vacant, mollia sunt & æqualia, tum dextra, tum sinistra parte, in cœca verò, aut dolentia,



aut intenta, aut inæqualiter affecta dextra parte ad sinistram, hæc omnia animadvertenda sunt. Quod si etiam pulsus in præcordiis insint, perturbationem aut delirium indicant. Verùm etiam eorum oculos intueri oportet: si namque oculi crebro moveantur, infania expectanda est. At tumor in præcordiis durus & dolens, pessimus quidem ubi tota præcordia occupat, si verò altera parte sit, minori cum periculo sinistra, hujusmodi tumores circa principia quidem mortem brevi tempore significant. Quod si neque intra vigesimum diem febris quiescat, neque tumor subsidat, ad suppurationem revertitur: his autem primo circuitu etiam sanguinis è naribus fluxus contingit, valdeque juvat: verùm eos interrogare oportet, num capite doleant, aut obrusam oculorum faciem sentiant. Quod si quid ex his accidat, eo rem tendere sciendum, in junioribus rariè neque dum 35. annum attingentibus sanguinis eruptio magis expectanda est. Molles autem tumores & doloris expertes digitisque cedentes, longiores indicationes faciunt, illisque minus graves sunt. Quod si intra dies sexaginta, neque febris cesset, neque tumor subsidat, fore suppurationem hoc loco, & reliquo ventre eodem modo significat. Itaque tumores dolentes, duri & magni, periculum mortis intra paucos dies affore significant. Molles verò & minimè dolentes qui que

quique digito pressi cedunt, illis diuturniores esse solent, ac ventris tumores minimè abscedere nati sunt, quàm qui in præcordiis oriuntur, minimè verò qui infra umbilicum in pus vertuntur, sed ex superioribus locis sanguinis eruptio magis expectanda est. Longorum verò omnium in his regionibus tumorum suppurationes in considerationem adhibendæ. Suppurationum autem quæ inde proveniunt, ea observatio facienda est, quæ quidem foràs vertantur, optimæ sunt, ubi parvæ sunt. At quàm maximè foràs feruntur, & in acutum tendunt, at pessimæ verò quæ magnæ sunt, & late minimeque in mucronem attolluntur, quæ intro erumpuntur optimæ, ubi nihil cum externa sede communicant, in sese contrahuntur, nullo dolore afficiunt, totaque regio externa unius coloris apparet, pus verò optimum est album & æquale & læve, & quàm minimum graveolens: huic autem contrarium pessimum pus, 47. sec. 2. præti.

Ex alvi suppressione sublata præcordia, malum denunciant; præcipuè verò in his, qui ex longo intervallo contabescunt, & quibus alvi humectantur, 301. sec. 2. 1. 2. coac.

Quibus elata hypochondria murmurant, lumborum superveniente dolore, alvus humectatur, nisi infernè flatus erumpant, aut utinam multitudo prodeat, atque hæc in febribus, aph. 73. sec. 4.



Præcordia verò sine ullo doloris sensu æqualiter mollia esse oportet, ac inflammatione tentata, aut inæqualiter affecta, aut dolore vexata, non contemnendæ aggritudinis notas præ se ferunt, 279. sec. 2. l. 2. coac.

Præcordia verò tumida, dura ac dolentia, si in uniuersum sint afflcta, maximum quidem malum portendunt; si verò altera parte duntaxat, ex sinistra minis periculum impendit, ceterum per exordia quidem mortem prope affore ista denunciant, ubi verò 20. diem superatint, & febris detinuerit, in pus vertuntur, atque intrâ primum circuitum istud contingit, ac sanguis è naribus fluxus plurimum conducit, etenim plerumque his caput dolet, & oculorum acies habescit, atque tunc sanguinis eruptio magis expectari debet, idque circa quintum & trigésimum ætatis annum. In senioribus verò non item. 280. sec. 2. l. 2. co.

Præcordia sublata subsistente alvo, malum denunciant; præcipue verò in his qui ex longo intervallo contabescunt, & quibus alui defluunt, 287. sec. 2. l. 2. co.

Quibus præcordia inflammatione tentantur & pus colligunt, ii sub mortem nigra dejiciunt, 288. sec. 2. l. 2. co.

Præcordiorum contentio cum sopore & incontinenti corporis jactatione, capitis dolore vexato, tubercula ad aures excitat, 289. lib. 2. sec. 2. co.

Præcordia

Præcordia non mollia & facies bene habitata non nisi liberali sanguinis ex naribus profusio, aut convulsione, aut coxendicum dolore solutionem accipiunt, 296. sec. 2. l. 2. co.

Ex præcordiorum tumore, biliosis spiratio magna & febris acuta, tubercula ad aures suscitât, 290. sec. 2. co.

In præcordiis ex longo intervallo afflictis & gravolente alvo, subnatum ad aures tuberculum mortem adfert, 292.

In præcordiorum dolore cum aliquo murmure, succedens lumborum dolor in febribus, alvos plerumque humectat, nisi status eruperit, aut urinæ copia prodierit, 291.

Quos de repente absque febre præcordiorum aut oris ventriculi dolor, aut crurum, & inferiorum partium affigit, alvûsque intumescit, venæ sectio, aut alvi fluxus solutionem adfert, iis febricitare noxium est. Nam & longæ & vehementes febres subascuntur, ac tusses, & spirandi difficultas atque singultus fiunt. Quibus in solutionem spectantibus, vehemens coxarum dolor, aut crurum, aut purulenta sputatio, aut oculorum orbitas succedit, 294. sec. 2. co.

Quibus ardore conflictatis, fatiurate & alto stupore (quem catochô dicunt) detentis, præcordia variant, & in contrarias subinde affectiones mutantur, ac venter in tumorem præter naturam sublatus est cum cr-



borum interceptione, & tenui circa caput oborto sudore: in his animadvertendum est, num sit concitatus & magnus spiritus, aut genitura similis excretio accidat, singultum prænuntiet, aut etiam ex alvo spumantia proditura sint; eos splendens quiddam aut coruscans per urinam redditum iuvat; alvus verò in his etiam commovetur, 92. sec. 2. l. 7. præd.

Præcordiorum contentio cum capitis gravitate & surditate, ad hæc quæ oculorum aciem perturbant, sanguinis eruptionem naribus prænuntiant, 147. sec. 2. l. 2.

## IACHRE.

Optimus ille quidem jacentis habitus, quem sanus aliquis usurpare consuevit. Supinum verò jacere cruribus porrectis, probari non potest. Idque deterius ubi subinde deorsum ad pedes protabitur. Exitiosum est ubi hiat, aut assidue dormit. Aut ubi supinus jacet cruribus vehementer contractis ac reductis. Pronum autem jacere ei qui non consuevit, delirium ac circa ventrem dolores portendit. Quod si pedes & manus nudat, neque vehementer calor ei subest, & erura dispergit, mali morbi signum est, angorem namque portendit. Vbi verò residere vult æger, malum quidem indicium in acutis morbis, sed longe pessimum in pulmonum, & laterum affectibus. Nocturni dormiendum, interdum vigilandum, contra verò malum, minimi-

mum.

num autem offendit. Si quis matutino tempore ad tertiam diei partem dormiat, qui vero ab hoc tempore somnus est, malus. Pessimum tamen est si somnus neque nocturne neque interdiu accedit, id enim ob dolorem laboremque accidit, vel delirium fore significatur, 497. sec. 2. l. 2. co.

Ægrum à medico in latus dextram aut sinistram recumbentem deprehendi oportet, manibusque & cervicæ, ac cruribus paululum reductis, totoque corpore molliterposito. Hic enim ferè jacentis est habitus. Is autem habetur optimus decubitus, qui bene valentium similis est. Supinum verò jacere, manibus, cervicæ & cruribus porrectis, minus bonum. Quod si pronus ad pedes delecto delabatur, magis formidandum. Vbi verò pedes nudos, neque admodum calidos habere comperitur, & manus, cervicem, & erura inæqualiter dispersa & nuda, malum. Anxietatem enim indicat. Lethale quoque & hianti ore assidue dormire, & ubi supinus jacet cruribus valde contortis & implexis. At in ventrem jacere ei qui per bonam valetudinem ita dormire minimè consuevit, delirium, aut partium circa ventrem dolorem indicat. Ægrum verò residere velle in ipso morbi impetu, pravum quidem in inflammatione laborantibus, pessimum, ex l. præd.



## IACTATIO.

Corporis iactationes, & incontinentia cum perfrictione; pessima; 2. sec. 2. l. 2. co.

In præcipitibus malis corporis motio, iactatio, ac turbulentus somnus, nonnullis convulsionem portendit, 82. sec. 2. l. 2. co.

Corporis iactationes & incontinentia in febre cum perfrictione & superiorum partium tenui sudore, phrenitim denuntiant (quod in Aristagora compertum est) atque etiam perniciem. 27. sec. 2. præm.

Considerandum est in aestuabundis & corporis iactatione & inquietudine, & lumborum dolorem, confictatis ægris, si audacter desipuerint, num nigra per fecesum proditura sint, 85. l. 1. præd.

Qui in somniis vexantur cum subita corporis iactatione & inquietudine, iis sanguinem erupturum sperare oportet, idque præsertim si non antea quid proflexerit. Animadvertendum verò num id post horrores sensum contingat, 136. sect. 2. præd.

Corporis aestuatione & inquieta iactatione confictati, citra vomitum ingravescentes male habent, atque etiam qui vellicantur citra vomitum, 557. sec. 2. l. 2. co.

Vide febres.

## ICTERVS.

Quibus per febres morbus regius supervenerit ante diem septimum, malum, aph. 62. sec. 4.

Quibus

Quibus per febres morbus regius die 7. aut 9. aut 11. aut 14. supervenerit, bonum, nisi dextrum hypochondrium durum sit; alioquin minimè bonum, aph. 64. sec. 4.

Regio morbo laborantibus jecur durum fieri, malum, aph. 42. sec. 6.

Morbus regius si ante diem 7. accesserit, malum significat, 7. autem 9. 11. ac 14. iudicationem adfert, dum præcordia non inducet. Quod si secus contingat, res in dubium vertitur, 121. sec. 1. 2. co.

In morbo regio affectis, nec admodum sentientibus, quibus singulus adest, iis alvus effunditur, fortè verò etiam supprimitur, atque hi cum virore palleseunt. 490. sec. 2. l. 2. co.

In spirituosis & anhelatoribus morbo regio laborantibus & febre acuta, cum præcordiorum duritie & tumore, si corporis summa refrigerentur, in gnorum circa aures abscessuum exortum fortassis expectare oportet, 164. sec. 2. l. 2. præd.

Vide morbum, colorem.

## I E C V R.

Quibus purulentum jecur adurit, si purum pus effluerit & album, salvi fiunt. In tunica enim ipsius pus continetur, si verò qualis amara profuat, increunt, aph. 45. sec. 7.

Quibus jecur vehementer dolet, iis febris superveniens solvit dolorem, aph. 52. sec. 7.



Vide dolores jecoris.

I L E V S.

Quibus à stranguria ileus supervenerit, intra 7. diem moriuntur, nisi febre superveniente copiosa urina fluxerit, aph. 44. sc. 6.

Ab ileo vomitus & singultus, & desipientia, & convulsio, malum, aph. 10. sc. 7.

I N S A N I A.

Ex infania, in raucedinem cum tussi sit secessio, 44. sc. 2. l. 2. co.

Infantibus accedens convulsio oculorum aciem retundit, 485. sc. 2. l. 2. co.

Veementes mentis emōtiones silentes, absque quiete, oculis quoque versum intuentes, spiritum efflantes, perniciem minantur, diurnas verò faciunt partium resolutiones.

Quin etiam vehementer insaniunt hoc modo affecti. Quibus autem eum ventris perturbatione hujusmodi affectus ingravescunt, iis nigra per alvum ad judicationem prodeunt, 486. sc. 2. l. 2. co.

Desipientiæ cum voce stridula & linguæ convulsione tremula, voces quoque ipsæ tremulæ mentis vehementem alienationem significant, in his durities aut asperitas perniciem minatur, 19. sc. 2. præd. idem repetit, 99. sc. 7. co.

Desipientiæ quæ circa necessaria fiunt, pessimæ, & quæ in his ingravescunt, exitium portendunt, 98. sc. 2. co.

Veementi infania detenti, tremuli, cum crebra

crebra sputatione, metus est ne phrenitici evadant, 94. sc. 2. co.

Desipientiæ quæ jam admodum fractis & debilitatis viribus succedunt, pessimæ sunt, non secus ac Thrasynonti, 8. l. 1. præd.

Dementiæ in quibus tremuli sunt agri, obscuræ aut vix quidem desipere videntur, aut aliquid investigantium more sensim contrahunt & palpant, miro quodam modo phrenitum prænunciant, non secus ac Didymarcho Coo contigit, 34. sc. 2. l. 2. præd.

Quæ præter vacuationem sunt impotentia, neque vacuatione existente, perniciem intentant, 40. l. 1. præd.

Vide desipientiam, & delirium, dolores capitis, phrenitum.

I N S O M N I A.

Qui insomniis vexantur cum subita corporis jactatione & inquietudine, iis sanguinem è naribus erupturum sperare oportet: inique præsertim si quid antea profluxerit, animadvertendum verò num in modice perfrigeratis id post horroris sensum contingat, 111. sc. 2. l. 2. co.

I N T E S T I N A.

In tenuibus intestinis si quod dissectum fuerit, non coalescit, 503. sc. 2. l. 2. co.

In tenuioris intestini morbis graveolentibus, cum febre acuta, & ex longo intervallo tumescentibus præcordiis, qui ad aures



oboriuntur abscessus, mortem afferunt, 152.  
lib.1. præd.

### IMPETIGINES.

Impetigines, lepræ, albicantesque vitiligines, si juvenibus quidem aut pueris horum aliquando contingat, aut sensum prodiens, diurnitate temporis augetur: in iis quidem ea pustulæ abscessus esse minimè existimanda sunt, sed morbi. At quibus ex his aliquid subito multumque contingit, id cerè abscessus dici possit. Oriuntur autem albicantes vitiligines, & maximè quidem lethalius morbis, velut quæ tabes dicitur. Lepræ verò & impetigines ex his qui ab atrabile fiunt. Ex quibus quæ valde juvenibus contingunt, & recentissima quæque sunt, & facilius curationem recipiunt, tum quæ in summè mollibus & carnosus corporis partibus nascuntur, in fine lib.2. præd.

### IUVENTVS.

Vt traducenda iuventute liberalis & speciosa corporis magnitudo, ita senecturi gravitas & parvitate deterior, aph.54. sec.2.

Quibus alvus est humida iuventam quidam agunt facilius quam qui eandem siccam habent, sed senectute difficilius defunguntur. In ipsis siquidem senescentibus ferè resiccatur, aph.53. sec.2.

### LABOR.

Vide consuetæ.

L A

### LABRVM.

Contractum labrum biliosæ alvi perruptionem denunciat, 240. sect.2. l.2. co.

Vide oculum.

### LAC.

Si neque pragnans neque puerpera est, & lac habeat, ei menstrua defecerunt, aph.39. sect.5.

Mulieri partum gerenti si lac è mammis copiosè fluat, foetum imbecillum significat: si verò firmæ solidæque mammæ fuerint, valentiorè conceptum indicant, aph.52. sect.5.

Lac præbere capite dolentibus, febricitosis, & quibus hypochondria elata, aut mutantia, & sticulis, malum; malum item quibus biliosæ dejectiones, febres acutæ, & copiosa sanguinis vacuatio facta est. Convenit verò tabidis non admodum valde febricitantibus, & febribus longis & languidis, si nullam ex supra dictis signis adsit, & præter rationem extenuatis, aph.64. sect.5.

### LACRYMÆ.

Vide oculos.

### LATVS.

Quibus latus in tumore sublatum est ac calidius existit, ubi in alterum latus incumbentibus, pondus quoddam suspensum esse viderit, iis pus vna in parte collectum est, 428. sec.2. l.2.

Vide dolorem lateris, pleuritidem.



## LASSITUDO.

Spontaneæ lassitudines, morbos præsentiant, aph. 5. sec. 2.

Lassitudine laborantes cum horrore, iudicii modò leviter exudantes, celeriter ad calorem revocati, malè habent; tum verò præsertim si ista insuper sanguinem è naribus stillarint. Circa hæc aurugine admodum fœdatis, & largiùs colorati moriuntur, iisque album alvi recrementum prodit, 36. sect. 2. l. 2. co.

Lassitudine confictati ægri linguæ turgenti, & alto stupore (quem catochum vocant) detenti, malè habere significatur, 45. sec. 2. co.

Delassati ægri caligine obducti pervigiles, & sopore detenti, cum tenui sudore tecalescentes, malè habent, 35. sec. 2. co.

Vide gravitatem, febres.

## LETHARGVS.

Qui lethargo aut veterno confictantur, & manibus tremunt somnolenti, malè colorati, tumidi, pulsus habent tardos & lentos, ac oculorum genas inferiores sublatas, sudores superveniunt, alvi quæ subtumescunt, impotentes sunt, ac biliosa effundunt. Quòd si resiccata fuerint vrinæ alvi quæ recrementa clam prodeunt, vrinæ quales in veterno solo genere redduntur, neque potum, neque aliud quicquam postulant. Mentis verò compotes facti, de cervicis dolore conquiescunt, ac incertos sonitus per aures impetu ferri

ferri sentiunt. 139. sec. 2. l. 2. co.

Qui verò ex lethargo evadunt, magna ex parte pus intrò colligunt. 140. sec. 2. l. 2. coac.

## LIEN.

Quibus lienes magni, iis gingivæ vitiantur, & os graveolet. Quibus autem lienes magni, neque sanguinis eruptiones contingunt, neque os graveolet, in tibiis ii mala ulcera habent, & nigras cicatrices, quòd si manifestus quispiam adfuerit faciei abscessus, aut vox gravis sit, aut dentium dolor, iis sanguinis eruptionem ex naribus fore spes est. At qui partes eas quæ subsunt oculis vehementer sublatas habent, magnos habere lienes comperies. Quòd si pedum quoque tumores adsint, ex aqua etiam laborare videbuntur. Sed & ventrem & lumbos præter hæc inspicere oportet, 109. l. 2. sec. 2. prædict.

Vide dysenteriam.

## LIENOSVS.

Vide lienteriam.

## LIENTERIA.

Levitates autem intestinorum, assiduæ quidem & multo tempore perseverantes, ac omnibus horis & cum strepitu & sine hoc exturbatæ, & similiter noctu & interdiu affligentes, si quod excernitur valde crudum est, aut nigrum, & læve ac mali odoris, ex quidem omnes malæ sunt. Nam & sitim exhibent, neque potionem per vrinam red-



dunt, quod in vesicam non descendat, os exulcerat, & clarum faciei ruborem, ejusque cutis vitia omni colorum genere distincta (nephelidas vocant) excitant simulque ventrem quasi fermentatum, sordidum, ac rugosum, efficiunt, ex quibus aut cibum capere, aut deambulare, ad res obeundas, nequeunt. Morbus hic seniores gravissime infestat, quin & viros vehementer affligit, ceteras vero ætates multo minus. At qui eas ætates quas ab hoc morbo malè affici diximus, non attingit, & paucissima signa habet quæ mala esse scripta sunt, is securissime constitutus est. Curationem autem postulat hic morbus, quoad & vrina pro potionis modulo feratur, corpusque cibos ingestos sentiat & vitiosum cutis dolorem deponat 105. l. 2. sec. 2. co.

Dysenteriam, aqua intercutem aut intestinorum lævitas excipit, & moriuntur, aph. 43. sec. 6.

In intestinorum lævitate laborantibus, cum sævissimis vlceribus, dolores ex intestinorum cruciату soluti, articulorum partes attollunt, ac ex hujusmodi tenues squamæ cum rubore & pustulis fiunt. Ii post multos ac tenues sudores, velut acceptis ex flagris vicibus, rubescunt, 467. sec. coac.

Intestinorum levitates cum spirandi difficultate, & pectoris morfu, ad tabem tendunt, 469. sec. 2. co.

Loa

Longis intestinorum lævitatibus laborantes, vna cum sævissimis vlceribus, intestinorum cruciату, & dolore, iis solutis intumescunt. His inuper exortus rigor, malo est, 468. sec. 2. co.

In diuturna lævitate intestinorum si ructus acidus superveniat, qui prius non exiterit, bonum est signum, aph. 1. sec. 6.

Qui lienosi difficultate intestinorum corripuntur, iis supervenientem longam dysenteriam, aqua intercutem aut intestinorum lævitas excipit, & moriuntur, aph. 43. sec. 6.

Lienosis difficultas intestinorum superveniens bono est. aph. 48. sec. 6.

Vide excrementa, hydropem, alvum, tenesimum, dysenteriam.

## LINGVA.

Lingua circa initia quidam horrida, in eodem vero colore perseverans, procedente verno tempore, ubi exasperatur, livescit, finditur; mortem denunciat, quod si admodum pigrescat, 14. die judicationem promittit: periculi autem maxime plena est nigra ex virore pallefcens, 229. sec. 2. l. 2. co.

Lingua bifidum velut saliva alba obductum, febris remissionem indicat, eo quidem quod agnotum est crasso existente, eodem die, si vero tenuis fuerit postridie, perinde quoque si adhuc tenuis fuerit, eadem etiam significatio est, si hæc circa summam linguæ contingant, minus tamen firma; 230.

F



sect. 2. l. 2. coac.

Lingua tremula cum narium rubore & alvo humecta, si reliqua quæ sunt circa pulmonem nullam indicationis significationem præ se ferant, malo est, ac celeres perniciosas purgationes denunciat. 231. sectio: ne 2. libro 2. coac.

Lingua præter rationem mollis reddita, ac nauseabunda, cum sudore frigido, ab alvo liquida, nigra vomitionis significationem affert, in iis lassitudinis sensus malum denunciat. 232. sec. 2. l. 2. co.

Lingua tremula quibusdam etiam alvum humectam nonnunquam reddunt. In his autem si nigricent, etiam mortem denunciant, ac fortassis lingua tremula instabilem mentem, & à sede constantiæ deturbatam significat, 233. sec. 2. l. 2. co.

Lingua densa & perarida, phrenitidem portendunt, 214. l. 2. l. 2. co.

Lingua tremula nonnullis proruptæ alvi significationem præbet, 645. sec. 2. l. 2. co.

Lingua ex resiccatione densa & aspera, phrenitidem portendit, 2. l. 1. præd. sec. 2.

Lingua tremula instabilem mentem & à sede constantiæ deturbatam significant, 20. l. 1. præd. sec. 2.

Si derepente lingua incontinens fiat, aut aliqua corporis pars attonita stupeat, signum est melancholiæ, aph. 40. sec. 7.

Vide pleuritidem & pulmones, convulsio- nem, vocem.

L I

## LIPOTHYMIA.

Qui sæpe & vehementer sine causa manifesta animo linquuntur, ii derepente moriuntur, aph. 41. sec. 2.

## LIPPITUDO.

Lippitudine affecto suborta febris solutionem affert, sin minus cæcitatatis, aut mortis, aut etiam vtriusque metus est, 222. sect. 2. l. 2. co.

Quibus eum lippitudine capitis dolor accedit, & longo tempore perseverat, cæcitatatis metus impendet, 223. sec. 2. l. 2. co.

Lippitudine laborantem sponte alvus pro-  
uens iuvat, 224. sec. 2. l. 2. co.

Vide febres, oculos.

## LIVOR.

Vbi livores in febre fiunt, propè affore mors significatur. 66. sec. 2. l. 2. co.

Propter os ægrotans caro livide, malum, aph. 2. sec. 7.

Vide gravitatem.

## LOCHIA.

Vide concipere.

## MAMMÆ.

Quibus in mammis sanguis colligitur, furorem significat. aph. 40. sec. 5.

Vide abortum, concipere, dolores mammarum.

## MANVS.

De manuum motione ita cenfeo. In febris æcutis, aut pulmonum inflammatio-

F 2



nibus, aut phrenitide, aut capitis doloribus, quibus ante faciem feruntur, & aliquid frustra venantur, & festucas colligunt, aut floecos è vestibus evellunt, & ex pariete palcas carpunt, ex his omnibus malum & mortem portendi, pag. 45. lib. præno.

## M A R E S.

Vide gravidam.

## M A X I L L Æ.

Vide convulsionem.

## M E D I C V S.

Operæpretium mihi facturus medicus videtur, si ad providentiam sibi comparandam omne studium adhibeat: cum namque præsenferit & prædixerit apud ægros, tum præsentia, tum præterita, tum futura, quæque ægri omittunt exposuerit, res utique ægrotantum magis agnoscere credetur, adeo ut majore cum fiducia sese homines medico committere audeant. Curandi verò rationem optimè molietur, si ex præsentibus affectionibus futura prænoverit. Neque enim fieri potest ut omnes ægroti sanitatem assequantur: Hoc verò longè præstantius foret, quàm futurorum consecutionem prænoscere. Quandoquidem verò quidam vi morbi intereant priusquam medicum accersant, quidam etiam vocato medico confestim partim quidam vnum diem, partim etiam paulò diutius vitam trahentes mortui sint, priusquam arte sua singulis morbis viriliter se opponere.

ponere possit. Proinde ubi talium affectionum naturam quantum scilicet vires corporis superant, cognoverit, simulque & si quid divini in morbis inest; hujus quoque providentiam ediscere oportet. Hac enim ratione meritò sibi admirationem, & boni medici existimationem conciliaverit. Qui namque morbo superiores esse possunt, eos utique longè rectius conservaverit, ex longo antea intervallo ad singula consilium dirigens, tum etiam morituros, tum evasuros ubi prænoverit & prædixerit, extra culpam positus erit. In morbis autem acutis in primis quidem ægroti facies consideranda sine benevolentium, præcipueque sui ipsius similis, ita enim optima existimanda, quæ verò ab eo plurimum recedit, gravissimum periculum portendit. Initio prænot.

## M E L A N C H O L I A.

Quæ sensim sunt mentis emotiones, in vehementes & melancholicas evadunt. Quod si ex muliebrium suppressione accidat, in ferinos tendunt, qualia sæpius contingunt. Videndum igitur num foeminae hujusmodi convulsionibus sint obnoxie, animadvertendum quin etiam est, num vocis defectiones cum alto sopore convulsionem quoque minentur, quales Cerdonis filia comparantibus muliebribus purgationibus contingere cœpit, 123 l. i. præd.

Si merus atque moestitia longo tempore



perfeverent, melancholicum est signum, aph. 23. sect. 6.

Infans si varices vel hæmorrhoides supervenerint, infantiæ solutio fit, aph. 21. sec. 6.

Ab infania, quam Maniam Græci vocant, difficultas intestinorum aut hydrops aut ecstasis, bonum, aph. 5. sec. 7.

### MELICERIDA.

Vide coxendicum morbos, & dolores coxæ.

### MENSES.

Mulieri menses decolores, nec eodem semper modo & tempore prodeuntes, purgationem indicant esse necessariam, aph. 36. sec. 5.

Mulieri si placeat menstrua sistere, cucurbitulam quam maximam ad mammas appone, aph. 50. sec. 5.

Si muliebri profluvio conynsio, aut animi defectus, superveniat, malo est, aph. 56. sec. 5.

Ex purgamentis muliebribus ad pedes & lumbos pertingentes tensiones, suppurationes indicant, & viscosa graveolentia ex alvo cum dolore prodeuntia, ex præscriptis quoque suffocationes, suppuraciones denunciant, 527. sec. 27. co.

Menstruis abundantibus morbi eveniunt, & subsidentibus accidunt ab utero morbi, 57. sect. 5.

Si prægnanti purgationes menstruæ cursum

sum suum teneant, bene valere factum est impossibile, aph. 60. sec. 5.

In muliebribus purgamentis quæ ante partus aquosa prodeunt, malum denunciant, 513. sec. 2. l. 2. co.

Muliebria purgamenta non subsistere vitale, ac fortè ex talibus comitiales morbi oriuntur, partim verò diurnæ alvi subduktiones, partim etiam sanguinis per ora venarum profluvium, 521. sec. 2. l. 2. co.

Quibus ex muliebribus purgamentis dolores inrensi ad superiorem ventris partem & tenue intestinum excitati alvos humectant, & levem anxietatem inducunt, hi ad judicationes in somnum propensiores fiunt, & impotentes ex capitis dolore cum tenuibus sudoribus, & perfrictionibus vexantur. Hujusmodi recidivæ plurimis post remissionem obortæ, celeriter interimunt, 518. sec. 2. l. 2. co.

Quibus à partu alba prodeunt, & his subsistentibus furditas cum febre & lateris dolor acutus excitatur, eæ in vehementem & perniciosam mentis emotionem incidunt, 525. sec. 2. l. 2. co. Idem habet sent. 80. l. 1. præd.

Prægnantibus saluginosa post partum, molestias ex albis mordacibus denunciant. Purgationes hujusmodi duritiem afferunt. In his singultus malo est, & vterum proci-dentia quæ & vna interificat, 526. sec. 2. l. 2. co.



Quæ ex partu & abortu copiosa celeriter cum impetu feruntur, si subsistant molestiam exhibent, hujusmodi muliebris rigor inimicus est & alvi perturbatio, præcipue verò si præcordiorum dolore vexentur, 516. sec. 2. l. 2. co.

Horrore subinde tentatis, lassitudine & capitis gravitate conflictatis, muliebres purgationes erumpunt, 541. sec. 2. l. 2. co.

Vide convulsivam, concipere, prægnantes, partum, gravidam.

## MORBI.

Sed neque ante pubertatem occupant hi morbi, pulmonum inflammationes, laterum dolores, podagræ, renum vitia, varix in tibia, fluor sanguineus, cancer non innarus, albicans vitiligo non cognata, defluxio in spinalem medullam, sanguinis per ora venarum profluvium, tenuioris intestini morbus (quem *per se* vocant) non à natura infusus. Horum morborum nullus ante pubertatem metuendus est, ab anno autem 14. ad 42. vsque natura omnis generis morborum corporis ferax est. Contrà verò ab hac ætate ad annum 60. neque strumæ fiunt, neque vesicæ calculus, nisi antea occupet, neque in spinalem medullam defluxio, neque renum morbus, nisi ex alia ætate sequantur, neque sanguinis per ora venarum profluvium, neque fluor sanguineus, nisi priùs adfuerit. Atque hi morbi ad senectutem vsque ab-

sunt,

sunt, 512. sect. 2. coac.

Vide ætatem.

In gravibus & præcipitibus malis disforqueri velut qui vomitione conflictantur, malum est, quin & albæ alvi egestiones molestæ sunt. Quæ ex iis prodeunt non viscosa, in vehementem mentis emotionem cum multo ardore agunt, videndumque est, num postea soporatur ac torpescentes evadant qui ex his conflictantur, diutius laborant. In his considerandum est, num imminente judicatione ardescunt, difficultate expirandi tententur. 117. sec. 2. præd.

Quilibet in quibusvis temporibus morbi fieri possunt: nonnulli tamen in quibusdam magis tum fiunt tum irritantur, aph. 19. sec. 3.

Pueris maximam partem morbi judicantur, alii intra dies 40. nonnulli intra menses 7. aliis ipsis etiam ad pubertatem accedentibus; qui verò permanserint, neque pueris circa pubertatem, neque fœminis cum menstrua erumpunt, soluti fuerint, inveterascere consueverunt, aph. 28. l. 3.

Juvenibus sanguinis eruptiones, tabes, febres acutæ, epilepsiæ aliique morbi, sed præcipue nunc dicti, aph. 29. sec. 3.

Vltra hanc ætatem protracti, a sinuata, pleuritides, peripneumoniz, lethargi, phrenitides, ardentes febres, diuturna alvi profluvia cholæræ, dysenteriarum, lienteriarum, hæmorrhoides, aph. 30. sec. 3.



Morbi alii ad alia tempora bene vel malè se habent, & quædam ætates ad tempora alia, & loca & aliud victus genus, aph. 3. sec. 3.

Circa initia & finem morborum remissiona sunt omnia, in vigore vehementiora, aph. 30. sec. 2.

Vide tempus, ætatem, medicum, febres, sudores, acutum.

### MORBVS REGIVS.

Vide icterum.

### MORSVS VENTRICVLI.

Vide excrementum.

### MVTATIO.

Celeres summitatum corporis in vtraque extrema permutationes, perniciem denunciant. Quin & situs huiusmodi (hoc est celeriter in contraria permutata, malo est, 50. sec. 2. l. 2. co. Idem repetit, 43. l. 1. præd.

Vbi toto corpore mutatio, & corpus refrigeratur vicissimque calefit, aut colorem alium ex alio mutat, morbi significatur longitudo, aph. 60. sec. 7.

Vide calorem.

### MVTVS.

Vide febres.

### NATVRA.

Vide tempus.

### NARES.

Narium rubores, alvi liquida & diffusiva sunt indicia, 215. sec. 2. l. 2. co.

NER.

### NERVVS.

Præcisus nervus, aut quod in vena est tenue, aut præputium non coalescit, 504. sec. 2. coac.

Nervi quicumque crassi vulnus accipiunt, vt plurimum claudos reddunt, præcipueque si obliquum vulnus fuerit ac in muscutorum capitibus, præsertim femorum, 508. sec. 2. co.

### NOMÆ.

Nomæ verò maximè sunt lethales, quæ putredines altissimè descendentes habent, suntque nigerrimæ & siccissimæ. Vitiolæ quoque & in periculum præcipitant, quæ sanem nigram reddunt. At albæ & mucosæ putredines, mortem quidem afferunt minus, sed potius recidivas faciunt & eo diutius perseverant. Herpetes autem ex his quæ depascendo serpunt, minus habent periculi. At secundum abditos cancos difficiliter tolluntur. At his omnibus febrem vno die succedere confert, & pius quam maximè candidum & crassum Prodest quoque in altè conditis & nigris putredinibus, nervi syderatione aut ossis, aut anborum, pus enim multum in syderationibus effluit & putredines liberat, ex l. 2. præd.

### NYCTALOPIA.

Quos nyctalopas nuncupamus, qui nocturno cernunt, hi morbo præhenduntur iuvenes aut pueri, aut etiam adolescentes, & sponte evadunt, partim quidem 40. die, partim ve-



id 7. mense, quibusdam etiam toto anno perseverat, & tempus quidem aestimari debet, & magnitudinis morbi, & ægri ætatis ratione adhibita. Hos juvant quidem supervenientes abscessus & ad internas partes tendentes, qui tamen per juventutem non admodum contingunt. At neque mulieres, neque virgines, quibus menses apparent, hoc morbo tentantur. Qui verò ex diuturno lachrymarum fluxu nyctalopes fiunt, eos interrogare oportet, num quis dolor ante istorum indicationem occupaverit, l. 2. præd.

## O C V L I.

Quibus in febris aut alii morbis voluntariè illachrymant oculi, absurdum non est, quibus verò præter voluntatem, absurdius, aph. 52. sect. 4.

Oculorum dolores meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut plebotomia, aut purgatio solvit, aph. 31. sec. 6.

Dolores oculorum post meracis vini potum & aquæ calentis balneum, venæ sectione curato, aph. 46. sec. 7.

Oculorum claritas, ac eorum album ex nigro aut livido clarum fieri, ad judicationem confert. At quo clarius clarescunt, eo celeritatem judicationem, ac tardius tardiorum significat, 217. sec. 2. l. 2. co.

In febre ortus oculorum rubor, diuturnam alvi malignitatem præ se fert, 219. sec. 2. co.

Caligi-

Caligine obducti oculi aut eorum album rubescens, aut livescens, aut nigris venis refertum, nihil probi præ se fert. Malum quoque est lacem refugere aut illachrymari, aut perverti, atque ex his alterum minorem esse perniciem denunciat, & oculos crebro deficere, graminis ac patvæ sordes ipsis adhaerescere, avi albescentem humorem concretum & tenuem (ægida nominant) habere, aut eorum album augeri, nigrum autem imminui, aut nigrum à superiore palpebra contegi. Vitiola quoque est oculorum cavitas, & vehemens oculi foras expressio, ac splendoris elisio, adèd vt pupilla extendi nequeat, & cilia retorta, ac fixi oculi & continenter conniventes, coloris immutatio, aut palpebras per somnum non committeres perniciem ostentat, quin & distortus oculus malo est, 218. sec. 2. l. 2. co.

Quibus dam convelluntur oculi fixi & immoti splendent, iis mens è sede constantè deturbatur, & diutius morbum trahunt, 124. sec. 2. l. 1. præd.

Eruptentes circa oculos eminentiæ, dum ægri ex morbo recreantur, prorumpentis alvi spem faciunt, 220. sec. 2. l. 2. co.

Oculi hebescentes & obtusi, concreti ac caligantes malum portendunt, 225. sect. 2. l. 2. co.

Cum oculorum perversione, febribus & lassitudinis sensu detento rigor perniciem



minatur. Atque in hujusmodi casibus soporari, malum denunciat, 121. sec. 2. l. 2. co.

Oculorum hebetatio cum animi defectio-  
ne, promptam convulsionem denunciat, 206.  
sec. 2. l. 2. co.

In præcipiti malo rectus oculorum obtu-  
tus ac motus pernicious, somnus turbulen-  
tus, pervigilium interdumque sanguinis è  
naribus stillationes nihil boni denunciant,  
227. sec. 2. l. 2. co.

Oculorum caligines crebris apparentibus  
mensibus, solvuntur, 552. sec. 2. l. 2. co.

Hebescentes oculi & obtusi improbandi  
sunt. Quin & fixi ac caligine obducti ma-  
lum portendunt, 146. sec. 2. lib. 1. præd.

Cervicis dolor, oculi prærubri, sanguinis  
eruptionem prænunciant, 137. sec. 2. lib. 1.  
præd.

In præcipitibus malis oculi obseratio, aut  
perfrictio, malo est, 184. sec. 2. l. 1. præd.

Oculi si lucem refugiunt, aut illachry-  
mant præter voluntatem, aut perversuntur,  
aut alter ex his minor fiat, aut quæ in iis  
alba esse debent rubescunt, aut in iisdem  
venulæ livescunt, aut nigricant, aut lippien-  
tium oculorum sordes circa eorum aciem ap-  
pareant aut etiam assidue mobiles, aut tumi-  
di, aut vehementer cavi fuerint, aut eorum  
aspectus squalidus & minimè lucidus, aut  
totius faciei color immutatus, hæc omnia  
mala perniciosaque existimanda. Quia et-  
iam

iam per somnum, an ex oculis aliquid sub-  
appareat spectare oportet. Vbi namque non  
commisissis palpebris ex albo quid subappa-  
ret, id, si neque alvi profluvium neque me-  
dicamentum purgans expressit, neque ita  
dormire consueverit æger, pravum est indi-  
cium & lethale admodum. Quod si perva-  
tatur aut corrugetur palpebra, aut livescat,  
aut pallefcatur, itemque labrum, aut nasus,  
cum alio aliquo signo, mortem in propin-  
quo esse sciendum est, lethale quoque labra  
resoluta, pendencia, frigida, & exalbida,  
pag. 2. prænot.

Oculi gramiosi optimum habent succesi-  
sum, si simul lachryma & gramia & tumor  
cæperint, aut si lachryma gramia permix-  
ta, neque vehementer calida fuerit, gramia  
verò alba & mollis, & tumor levis ac solu-  
tus. His etenim sic se habentibus noctu  
oculus conglutinabitur ut dolorem non sen-  
tiant, isque casus minimè periculosus, mini-  
meque diuturnus fuerit. At si lachryma mul-  
ta & calida, cum paucissima gramia & exi-  
guo tumore, idque ex altero oculo profluat,  
valde diuturnum id quidem, sed sine peri-  
culo fit, idque lippitudinis genus doloris  
expers est. Et in his præcipue judicatio con-  
sideranda est, quæ prima quidem fit circa  
vigefimum diem. Quod tempus si superet,  
quadragessimus dies expectandus est, aut si  
neque in his desinit, in 60. diebus solvitur.



At toto tempore ad gramiam attentum esse oportet, num in digito misceatur, & alba ac mollis fiat, idque præcipue sub iudicationis tempus, tum namque ubi finitur, id evenire solet. Quod si hæc utrumque oculum invaserunt, majus est ulcerum periculum, sed brevi solvantur. Gramiæ autem sicæ vehementes dolores afferunt, brevi tamen solvantur, nisi oculus yulans acceperit, tumor verò magnus, doloris expertis & siccus, sine periculo est. Quod si cum dolore est siccus quidem malus metulque est ne oculum exulceret ac palpebræ coeant, formidabilis quoque est, ubi cum lachryma conjunctum dolorem habet, nam si lachryma calida & falsa profluit, in pupilla & palpebris, exulcerationis periculum est. At si tumor quidem constiterit, lachryma verò diutius effunditur, & gramia tenent, viris quidem palpebrarum everisionem rectè prædixeris, at mulieribus & pueris exulcerationem & palpebrarum everisionem. Si verò gramia pallida aut livida fuerint, lachrymaque multa & calida, caput ardor occupet ex temporibus ad oculum dolor tendat, insomniæque his accesserit, vlcus in oculo factum esse necesse est, ac ut rumpatur metus est. Iuvat autem succedens febris, aut dolor in lumbos firmatus. His verò futurorum prædictionem rectè institues si & temporis & eorum quæ ex oculo fiunt rationem inieris, tum  
etiam

etiam gravissimorum dolorum, tum vigiliarum. Sed ubi oculum introspicere licet, si quidem ruptum inveneris, & per rimam pupilla extiterit, malum significat, nec facile restituitur. Quod si etiam putredo subsit, nulli amplius est usus. Reliqua verò ulcerum genera prædicere licet, & locorum putredines, & altitudines intuenti, pro ulcerum magnitudinæ cicatrices fieri necesse est, quibus igitur rumpuntur oculi, posteaque adeo extant ut pupilla loco mota esse videatur, iis nec vilo tempore, neque arte ut videant opem ferre licet. At parvæ pupillarum dimotiones restitui possunt, dum ne quid mali accesserit, & juvenis sit æger. Ulcerum verò cicatrices, si non aliud malum subsit, omnes & à tempore & ab arte juvari posse existimandæ sunt. Ac præcipue quæ recentissimè & in juvenum corporibus contractæ sunt. Ex locis autem insignem facit noxiam pupillæ acies, si exulceretur secundum eam id quod est supra supercilia, deinde verò quicquid his locis fuerit proximum, pupillæ quoque casium aut argenteum, aut ceruleum colorem noctæ, improbandæ sunt. His aliquantulum meliores existimandæ sunt quæ aut minores, aut ampliores apparent, aut angulos habent sive id ex manifesta causa, sive sponte contingat. Caligines & nubeculæ, ac subalbicantes cicatrices, ægides dictæ, exterruntur ac evanescent, nisi eo in loco vulnus



aliquod subortum sit, aut illic antea cicatricem, aut vnguem esse contigerit. Quod si in oculi nigro resplendens cicatrix orta sit, nigri aliquid dealbat, ita vt si diutiùs perseveret, & aspera & crassa, etiam vestigium aliquod postea relinquat. Indicationes verò non secus ac in febribus scripti, ita & hic se habent. Sed & observatis signis, pro genere quidem lippitudinum, prædictionem instituas licet, nempe diurnas lippitudines forte, vbi pessima signa affuerint velut in singulis descriptum est. Breves verò vbi optima signa comparuerint, easque 7. die ac proximis diebus finiendas prædicere, ac aliqui in toto esse existimare oportet. Quibus autem levamentum adfuerit, si id neque iudicatoriis diebus, neque cum bonis signis contingat, in iis recidivæ metuendæ sunt, imprimis verò in oculorum affectibus vrinæ status in considerationem adhibendus est. Occasio namque præceps est & lubrica, p. 103. l. 2. præd.

Vide convulsionem, dolorem capitis & lumborum, lien, lippitudinem, puerum.

### OPHTHALMIA.

Ophthalmia laborantem alvi profluvio corripit bonum, aph. 17. sec. 6.

### OMENTVM.

Quibus omentum procidit, ut putrescat necesse est, 502. sec. 2. l. 2. co.

O S.

Neque corporis os quodecunque resectum, neque cartilago augetur, 505. sec. 2. l. 2. co.

### OS HIANS.

Vide jacere.

### PALPITATIO.

Quos palpitationes in totum occupant plerumque voce defecti pereunt, 30. l. 2. l. 1. præd.

Quæ contingunt in febre circa ventrem palpitationes, mentis emotiones adferunt. Quin & sanguinis ex naribus profluvium cum horrore sensu interdum accidit, 298. sec. 2. l. 2. co.

Quæ contingunt circa ventrem palpitationes cum præcordiorum contentione oblonga & intumescente, sanguinis profluvium è naribus denunciant, idque quandoque cum horrore sensu, 144. l. 1. præd.

Vide cervicem.

### PALLOR.

Vide colorem, concipere.

### PALPEBRÆ.

Vide oculos, somnum.

### PARTES.

Vide extenuationem.

### PRÆCORDIA.

Vide hypochondria.

### PRÆGNANS ET PARTVS.

Quæ ventrem ferunt, iis uteri os connivet, aph. 51. sec. 5.



Mulierem gravidam morbo quoque acuto corripit perniciosum, aph. 31. sec. 5.

Mulieri in utero ferens secula vna abortit, eoque magis si sit foetus grandior, aph. 30. sec. 5.

Quæ gestantes uterum febribus corripiuntur, aut vehementer sine evidenti causa extenuantur, eæ difficulter & cum periculo pariunt, aut abortientes periclitantur. aph. 55. sec. 5.

### PURGAMENTA.

Vide gravidas, menses, concipere.

Si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre superveniente, cibi-que fastidium accidat, prægnantem esse putato, aph. 61. sec. 5.

Spirationes suspiriosæ quæ foras educuntur, ac citra rationem facta colliquatio in uterum gerentibus, abortiones indicant. 519. sec. 2. l. 2. co. idem repetit 540.

Ventris dolor à partu, in his purulenta expurgat, 520. l. 2. l. 2. co.

Quæ torporis sensu afficiuntur, præcipue quæ ad motiones impotentes & perfractæ, circa judicationem vexatæ, anxietate laborantes multo & tenui sudore distillant, in his alvus effusa malum denunciat, 521. sec. 2. l. 2. co.

Muliebria purgamenta non subsistere utile, ac fortè ex talibus comitiales morbi oriuntur, partim verò diurnæ alvi subductiones, partim

partim etiam sanguinis per ora venarum profluvium, 522. sec. 2. l. 2. co.

Quæ ante partionem in modum cholerae morbi affliguntur, faciles quidem partus edunt. Febre autem tentatæ, malignè habent, tum verò præcipue, si quid fauces vexet, aut in febre aliquid maligni appareat, 535. sec. 2. l. 2. co. ac.

Eruptentia ante partum aquosa, malo, 536. sec. 2. l. 2. co.

Ante partus subinde rigore corripit, & citra dolorem parere, periculum indicat, 538. sec. 2. l. 2. co.

Quæ ex partu & abortu copiosa celeriter eum impetu feruntur, si subsistant, molestiam exhibent. Hujusmodi mulieribus rigor inimicus est, & alvi perturbatio, præcipue verò si dolore præcordiorum vexentur, 516. sec. 2. l. 2. co.

Quibus à partu alba prodeunt, & his subsistentibus, surditas cum febre, & lateris dolor acutus excitatur, eæ in vehementem & perniciosam mentis emotionem incidunt, 525. sec. 2. l. 2. co.

Prægnantibus saluginosa post partum, molestias ex albis mordacibus denunciant. Purgationes hujusmodi duritiam adferunt. In his singultus malo est, & veterum proci-dentia, quæ & vna interficit, 526. sec. 2. co.

Quæ ex partionibus contingunt exolutiones cum torpore molestiam quidem exhi-



bent & mensis movent, nullam tamen perniciem afferunt, verum etiam purgamentorum muliebrium abundantiam denunciant, 546. sec. 2. l. 2. co.

Quæ gestantes utrum febribus corripiuntur, aut vehementer sine evidente causa extenuantur, ex difficulter & cum periculo pariunt, aut abortientes periclitantur, aph. 55. sec. 5.

Si muliebris profluvio convulsio aut animi defectus superveniat, malo est, aph. 56. sect. 5.

### PODAGRA.

At de his qui podagra tentantur ista nobis dicenda videntur; qui in senectute callos aut totos in articulis induratos habent, aut laboriosè vitam tolerant, cum alvo sicca, ii sanè omnes (vt sentio) humana arte sanari nequeunt. His certè succedentes difficultates intestinorum optimè medentur, quin & quæcunque aliæ colliquationes infernæ, eos valde juvant. Juvenis v. cui topi nondum circum articulos induruerunt, cuique victus ratio curæ est, ad laborem est impiger, alvumque habens vitæ instituto probe cedentem, is sanè prudentem nactus medicum, sanus evadet, ex lib. 2. sec. 2. præd.

Mulier podagra non laborat, nisi ipsam menstrua defecerint, aph. 29. sec. 6.

Puer podagra non laborat ante veneris usum, aph. 30. sec. 6.

De

Dolores podagrici vere & autumnano ferè moventur, aph. 55. sec. 6.  
Vide eunuchum.

### P V S T U L Æ.

Pustularum eruptiones velut summa cute leviter lacerata, aut vellicata, totius habitus tabem, & corruptionem denunciant, 444. sec. 2. l. 2. co.

Quibus ad articulos prærubræ pustulæ superficiales enatæ sunt, ac subinde rigent, iis velut ex acceptis plagis cum dolore venter, & inguina rubescunt & pereunt, 489. sec. 2. l. 2. co.

Quibus per febres assiduas pustulæ toto corpore enascuntur, lethale est, nisi quid purulentum abscedat, in his verò præcipuè adnasci ad aures tubercula solent, 114. sec. 2. l. 2. co.

Lata pustulæ non admodum pruriginosæ, aph. 9. sec. 6. Vide ætatem.

### P R U R I T Y S.

Quibus inferiores partes malè afficiuntur, vehementibus pruritibus prius obortis, iis vrina fabulosa fit, & subsistit. At qui perniciosè habent, iis mens obtorpescit, 488. sec. 2. l. 2. co.

In corporis pestificatione cum torporis sensu, sanguinis detractio mala est, 343. sec. 2. l. 2. co.

Quibus autem torpores & prurigines pungentes per caput, interdum quidem totum,



interdum etiam aliquam partem percurrunt, sæpius verò frigidus alicuius sensus caput pervagari videtur, ab iis sciscitari oportet, num etiam ad summam linguam pungens ille pruritus pertingat. Sic enim magnus morbus est, & qui ægrè solvatur, alioqui verò facilis. Auxilium autem consequuntur ex abcessibus, velut antea confessorum est. Qui tamen his moribus quam illis contingunt: mulieres autem pungentes pruriginis, & atræ bilis vitia minus quam viri sentiunt, nisi menses penitus evanuerint, ex l. 2. sect. 2. prædic.

### PURGATIO.

Corpora quæcunque quis purgare volet, ea fluxilia facere oportet, aph. 9. sect. 2.

Si qualia oportet purgentur, confert & facilè ferunt, si contraria, difficulter, aph. 25. sect. 1. idem repetit, aph. 3. sect. 4.

In morbis acutis rarè & per initia medicamento purgante utendum est. Idque diligentibus cum præmeditatione facere oportet, aph. 24. sect. 1.

Concocta maturaque medicari ac movere non cruda: nec per initia, nisi suo prædicantur impetu, id quod perraro fieri solet, aph. 22. sect. 1.

Quæ decernuntur decretæve sunt iustè, nec movere, nec aliud quicquam novare, seu medicamentis, seu aliis irritamentis fiat, sed omittere, aph. 20. sect. 1.

Quæ

Quæ educere oportet, quoquo maxime vergere videbuntur, ducere, viis ac locis vitæ literè ferentibus, 21. sect. 1.

Qui corporum salubritate sunt præditi, purgante hausto medicamine statim deficiunt, ut qui pravo alimento utuntur, aph. 36. sect. 2.

Qui integra sunt corporis valetudine medicaciones ægrè molesteque ferunt, aph. 37. sect. 2.

Prægnantes purgabis, si materia urgeat quadrimestres, & vsque ad 7. mensem, sed has parcius, minore verò & grandiore conceptu, cautius religiosiusque agendum, aph. 1. sect. 4.

Purgantium medicamentorum vsu talia è corpore educenda, qualia sponte etiam prodeuntia, juvant; contrario verò modo ex-cuntia, sistenda, aph. 7. sect. 4.

Æstate superiorem potius, hyeme inferiorem purgare convenit, aph. 4. sect. 4.

Sub canicula, & ante caniculam difficiles sunt purgationes, aph. 5. sect. 4.

Graciles & ad vomendum faciles per superna purgato, nisi hiems adsit, aph. 6. sect. 4.

Ægrè vomentes & modicè carnosos, quos eularcos appellant Græci, infernè purgato, devitans æstatem, aph. 7. sect. 4.

Obnoxios phthisi supra ne purgato, aph. 8. sect. 4.

Melancholicos infra vehementius purgato.

G



bis, eadem ratione contraria iniens vacuandi viam, aph. 9. sec. 4.

Purgandum in valde acutis, si inciter materia, eadem ipsa die, differre enim in talibus malum, aph. 10. sec. 4.

Quibus propter levitatem ventris cibi sunt incontinentes, hyeme supra purgare malum, aph. 12. sec. 4.

Qui ad veratrum non facile supra purgantur, eorum corpora ante portionem copiosiore alimento, & quiete præhumeclanda, aph. 13. sec. 4.

Poto elleboro corpus movendum potius quam somno tradendum aut quieti, nam vel navigatio indicat motione turbari corpora, aph. 14. sec. 4.

Cum elleborum ditare voles, move corpus: cum verò sistere, somnum concilia, nec move, aph. 15. sec. 4.

Non febricitanti cibi fastidium, cordis dolor, vertigo tenebriosa, & oris amaritudo purgatione per superna opus esse significant, aph. 17. sec. 4. Idem repetis, aph. 70. sec. 7.

Supra septum transversum dolores quinque egent purgatione, per superna purgandum esse significat, qui verò infra sunt, per inferna, aph. 18. sec. 4.

Qui portione medica dum purgantur non siccant, ipsorum purgandi finis non fit donec siccaverint, aph. 19. sec. 4.

Si

Si citra febrem tormina adfusi, & genuum gravitas & dolor lumborum, inferna purgatione opus esse significant, aph. 20. sec. 4.

Prægnantes purgabis, si materia inciter, quadrimestres, & vsque ad 7. memsem, sed has minus, minore verò aut grandiore fetu religiosius cunctantiusque agendum, aph. 29. sec. 5.

Corpora quæ quis purgare volet, fluxilia faciat oportet, & siquidem supra valet, alvus sistenda: si verò infra laxanda, aph. 70. sec. 7.

Recta ratione facienti omnia si secundum eam minus succedat, protinus non est ad aliud transeundum, dummodo id constet quod ab initio visum fuit, aph. 52. sec. 2.

In omni superflua purgatione, frigus cum sudore exitiale. Et inter hæc qui subinde evomunt, & siticulosi sunt, malè habent, qui verò anxietate laborant cum lumborum dolore, iis alvus humectatur, 568. sect. 2. l. 2. co.

Ex epoto veratro prærubrorum, & nigrorum purgatione vitiofa, virium exolutio cum talibus mala est, 569. l. 2. co.

### PLEURITIS.

Qui pleuritide laborant nisi intra dies 14. supernè repurgentur, iis in empyema fit mali translatio, aph. 8. sec. 5. Idem repetit, aph. 15.

Pleuritide aut peripneumonia detento

G 2



diarrhoea interveniens malum, aph. 16. sec. 6.

A pleuriteide peripneumonia malum, aph. 11. sec. 7.

Lateris dolore circa inflammationem affecti, cum turbulentis, tenuibus, moderatis, in phrenitidem labuntur, 411. sec. 2. l. 2. co.

Lateris dolor cum diurna febre, puris ejectiones fore denotat, 421. sec. 2. l. 2. co.

Qui subinde horrore corripuntur, ad suppurationes deveniunt. Quin etiam febris ad talem suppurationem ducit, 422. f. 1. l. 2. c.

Quos ex lateris dolore cibi fastidia comitantur, iis os ventriculi aliquantulum dolet, & sudoribus distillant. Vbi autem facies ruboribus velut efflorescit, & alvus est liquidior, pus in pulmonibus collectum habent, 423. sec. 2. l. 2. co.

Lateris dolores in febris leviter firmatos, & absque ulla significatione, venæ sectio lædit, sive aversum à cibis animum, sive sublata præcordia æger habeat. Quin etiam in corporis perfractione torpescentes non sine febre, sanguinis detractio lædit, & cum videantur levius habere, moriuntur, 431. sec. 2. l. 2. co.

Ad lateris dolorem insuper accedente strangulatu, suppurationis futuræ spes est, 113. sec. 2. l. 2. co.

Morbi laterales fici, & in quibus nihil exspuitur gravissimi sunt, metuendi quoque in quibus dolores ad superiora tendunt.

187. sec. 2. l. 2. co.

Morbi laterales graviores qui sine divulsionibus quàm cum divulsionibus contingunt, 382. sec. 2. l. 2. co.

Quibus in morbo laterali lingua circa initia biliosa est, hi intra septimum judicantur, quibus verò 3, aut 4. die, circa nonum, 383. sec. 2. l. 2. co.

Quod si bulla aliquantulum livescens in lingua appareat initio, qualis excitatur ferro candenti in oleum intincto, difficilior fit solutio, & judicatio quidem ad 14. diem deducitur, sanguinem autem ut plurimum expunt, 384. sec. 2. l. 2. co.

In morbo laterali affectis, dolores & alvum emolliiri vile est. Sputa colorari, nullo in pectore strepitus fieri, urinam rectè procedere. Quibus contraria molesta sunt, sputumque dulcescere, 386. sec. 2. l. 2. co.

Quibus ex morbo laterali suppurantur in quadraginta diebus postruptionem, pus per spuitionem rejiciunt, 385. se. 2. l. 2. co.

At vero biliosi simul & sanguinei morbi laterales ferè 9. die aut 11. judicantur, ac maxime sanescunt. Quibus autem in morbo laterali initio quidem dolores leves sunt, 5. verò aut 6. die ingravescent, ferè ad 12. perveniunt. Raroque servantur, sed præcipuè 7. ac 12. die periculum subeunt: quod si bis 7. evaserint, servantur, 387. sec. 2. l. 2. co.

Quibus in morbo laterali plurimum ex-



sputo strepitus in pectore sonat, & vultus demissus est, oculisque aurigine suffusus, & caligine obductus, in his mors expectanda est, 388. sec. 2. l. 2. co.

Densa & exercitationi dedita corpora, citius ex morbo laterali & pulmonis inflammatione intereunt, quam quæ sine exercitatione degunt, 398. sec. 2. l. 2. co.

Lateris dolor cum bilioso sputo præter rationem evanescent, ægros in vehementem & furiosam mentis emotionem agit, 418. sec. 2. l. 2. co.

In dolore lateris, sanguinis è naribus stilatio mala est, 405. sec. 2. l. 2. co.

In morbo laterali quibus circa initia in totum purulentæ sunt sputationes, ii 3. dies aut 5. moriuntur, quos si superent, nec longè meliùs habuerint 7. aut 9. aut 11. suppurrati fiunt, 379. l. 2. l. 2. co.

Quibus autem rubor contingit neque aliter quàm morbo laterali affecti incalescunt, alvusque biliosa, & graveolentia exturbat, ii 20. & 40. die periculum subeunt, quos si superaverint servantur, 380. sec. 2. l. 2. co.

Vide dolorem lateris & pulmonis.

**PULMONES ET PULMONUM INFLAMMATIO.**

Ex lateris morbo præcipuè aut pulmonis inflammatione purulentos calores interdum quidem tenues, noctu verò intensiores consequuntur, neque quicquam efflatu dignum expuunt,

expuunt, circa cervices & claviculari sudores occupant, oculi cavantur, mala verò rubent, digiti quidem manuum summè calenti & scabri redduntur, vngues autem vni calenti, & perfrigescunt, in pedibus tumores & pustulas toto tempore habent, ac cibos refugiant. Atque hæc sunt diuturnarum vomitarum notæ. Quæ verò celerem eruptionem habent, tum ex notis quæ ad eas consequuntur, comprehenduntur, tum etiam ex doloribus qui circa initia fiunt, simulque si spiritus aliquando majori cum difficultate trahitur. Rumpuntur autem magna ex parte sputationes, partim quidem 20. die, partim 40. partim etiam 60. quibus igitur inter initia intensus dolor instat, nec non spirandi difficultas & tussis, cum frequenti sputatione, circa vigesimum diem aut celerius ruptio expectanda est. Quibus autem hæc leviora insunt, pro ratione, serior eruptio futura est. Sed & dolores & spirandi difficultates ac crebram respirationem, eruptionem ipsam præcedere necesse est. Temporis autem ratio ineunda est, ex quo primum quis dolorem aut gravitatem sensit, aut febricitavit aliquis, aut si quando etiam rigor apprehendit. Ut plurimum igitur brevi servantur, quos febris statim atque eruptio facta est, dimittit, & cibos appetunt & quibus pus facile educitur album odoris expers, læve ejusdemque coloris, sine pituita ac alvus exigua



& cocta reddit. At verò ii moriuntur quos febres consequuntur, & sitis & cibi fastidium, si pus lividum, aut ex pallido virescens, aut pituitosum, aut spumans, aut insuper si alvus est liquida. Quibus autem ex prædictis partim quædam adsunt, partim verò abunt, hi quidem moriuntur. 402. sec. 2. l. 2. co.

Qui pus intrò collecturi sunt, iis primum quidem falguginosum sputum expuitur, deinde dulcius, 403. sec. 2. l. 2. co.

In morbis pulmonis gravedines, & sternutamenta tum præcedere, tum verò succedere, malo est, in reliquis verò morbis sternutamentum utilitate non vacat, 399. sec. 2. l. 2. co.

In pulmonis inflammationibus, si lingua tota alba fiat aspera, ambæ pulmonis partes inflammatione vexantur, quibus verò dimidiata lingua, qua parte id apparet, inflammatio affligit. At quibus quidem ad vnam clavicularum dolor subit, iis vna superior pulmonis ala laborat, quibus verò ad ambas clavicularum dolor extenditur, ambæ superiores pulmonis alæ laborant, quibus ad mediam costam, media, quibus verò ad quam partem pulmo extenditur dolot permeat, inferna ala laborat, quibus vnà tota pars laborat, quæ ei parti respondent omnia ægrotant. Si quidem igitur suspensæ vtrinque pulmonis partes aortæ dictæ tanta inflam-

matio-

matione tententur vt ad latus adhæreat, illa corporis parte resolutionem sentiant, & ad costam livores foris fiunt, quos veteres ictos aut sydere percussos vocabant. Quòd si tanta non est inflammatio vt adhæreant, dolor quidem totum occupat neque tamen resolutionem sentiant, neque livores habent. 400. sec. 2. co.

Quibus autem vnà cum corde pulmo totus inflammatur, ita vt in latus incumbat, ii toto corpore nervorum resolutionem sentiunt, & sine sensu jacet æger frigidus, 2. autem aut 3. die interit. Quòd si contingat vt cor nihil tale quiddam, aut etiam minus patiatur, diutius vivunt, nonnulli verò etiam servantur, 401. sec. 2. l. 2. co.

Pulmonis inflammationes quæ ex morbo laterali permutationem accipiunt, iis quæ ab initio fiunt securiores sunt, 397. sec. 2. l. 2. co.

At verò in pulmonis inflammationibus quæ periculum creant, abscessus in cruribus non inutiliter fiunt, quibus nec potest quicquam melius accidere, quàm si sputum pro flavo purulentum existat. At si neque sputum pro ratione excernitur, neque in vrina bonum apparet sedimentum, periculum est ne elaudicet æger, ac ne res multum negotii sit exhibitura. Quòd si abscessus intro recurrant perseverante febre neque procedente sputo, periculum aut mortis aut delirij ita-

G 5



minet. Quicumque verò pulmonis inflammatione laborant, neque diebus judicatoriis repurgantur, verùm cum delirio 14. dies superarunt, iis suppurationis metus impendet, 396. sect. 2. l. 2. co.

Quibus ex pulmonis inflammatione accessus ad aures aut inferiores partes sunt, tum suppurant, tumper fistulam via aperta effunduntur. His autem secunda valetudo contingit, quos febris & dolor consequitur, si sputum non satis pro ratione ejicitur, neque biliosæ fuerint alvi dejectiones, sed solutu faciles, ac synceræ, neque vrina admodum crassa, aut multum habens sedimentum, ac in reliquis omnia securitatem polliceantur. Fiunt autem, aliis quidem in partibus inferioribus quos circa præcordia inflammatio fatigat, aliis in superioribus partibus, quibus præcordia tumoris & doloris sunt expertia, spirandi autem difficultas pro tempore accesserit, quæ deinde sine vlla occasione evidenti quiescat, 395. sec. 2. l. 2. co.

In his igitur omnibus qui pulmones affligunt morbis, bonum quidem est facillè morbum sustinere, dolore defungi, sputum promptè expuere, facillè spirare, sibi esse vacuum, reliquum corpus æqualiter incalescere, ac molle esse, ad hæc somnos, sudores, vrinarum educationem laudabiliter fieri: quibus contrà malo sunt, quandoeunque ergo  
bona

bona hæc omnia huic sputo aderunt, poterit secunda valetudo contingere, quod si quædam adfuerint, quædam etiam abfuerint, non vltra 14. diem vita producitur. At verò si contraria signa accesserint, celeritùs mors contingit, 393. sec. 2. lib. 2. co.

In pulmonum vitii supra modum rubræ sanguinis stillæ malum denuntiant, 412. sec. 2. l. 2. co.

In pulmonis inflammationibus siccis, qui pauca concocta educunt, metuendi sunt, 416. sec. 2. l. 2. co.

His aliquantulum extensi in pectoribus rubores fiunt, & perniciem denuntiant, 417. sec. 2. l. 2. co.

In pulmone pus colligentibus per alium pus secedere mortiferum, 419. sec. 2. l. 2. co.

Ex suppuratis autem quos pulmonum morbi concitarunt, fetè seniores moriuntur. At ex cæteris suppurationibus juniores potius intereunt. At lumborum & inferiorum partium dolores qui cum febre affligunt, si relicti inferioribus ad septum transversum transeant, exitiales sunt admodum. Ad alia signa igitur animum adhibere oportet. Si quidem ex pravis signis quippiam apparuerit omni spe destitutus est æger, etiam verò suppurati videntur, quibus purum quidem pus est, & album, & minimè fetidum, si servantur. At quibus suberuentum & coagulatum, moriuntur. Quod si inruente ad



Septum transversum morbo reliqua signa minimè prava se ostenderint, hunc suppurationum fore magna spes est. At vesicæ tum graves, tum duræ, tum dolentes, grave prorsus & exitiale periculum iniantur.

Vide anginam, dolores, pulmones, spuita, pus.

## P V S.

Dum pus sit dolores ac febres fiunt magis quam confecto, aph. 147. sec. 2.

Quibus in corpore pus nullam sui dat significationem, ob crassitudinem sui aut loci non se prodit, aph. sec. 6.

Quæ ob parit intro collectionem febris intermittit, in his magna ex parte ægri tenuibus sudoribus diffiunt, 419. sec. 2. l. 2. co.

Quibus purulentis ab humeris concussis, multus editur strepitus, si minus habent puris quam quibus paulo difficilior inest spiratio, iique melius colorati videntur. Quibus verò nullus intrus sit strepitus, difficultas tamen spirandi vehemens adest, & livescunt vngues, si pure pleni sunt & perniciosè habent, 432. sec. 2. co.

At sanè ex suppurationibus quas pulmonum morbi excitantur ferè senes moriuntur, ex cæteris verò juniores, 431. l. 2. co.

Quibus ex hepatis vstione, pus amurea simile prodit, lethale, 451. sec. 2. l. 2. co.

Qui

Quibus tubercula in pulmone oriuntur, pus intra dies 40. ex quo fit ruptio, expuunt, quos si superent, ut plurimum tabidi fiunt, 404. sec. 2. l. 2. co.

Quibus si concutiuntur, pus lutulentum & graveolens prodit, ut plurimum moriuntur, 409. sec. 2. l. 2. co.

Quibus specillum à pure velut ab igne coloratur, si ferè moriuntur, 410. sec. 2. l. 2. co.

Quibus ad palatum humor colligitur, plerumque in pus convertitur, 138. sec. 2. l. 2. co.

Vide dolorem capitis, jecur, pleuritidem, pulmonem, urinam.

## PHRENITIS.

In phreniticis cum omnia circa initia moderatè & sederatè se habeant, ac subinde permittantur, malum denunciatur, 92. sec. 2. l. 2. co.

In vehementi & furiosa mentis emozione accedentes tremores, exitio sunt, 93. sec. 2. l. co.

Vehementi insanis detenti, tremuli cum crebra spuratione, metus est ne phrenitici evadant, 94. sec. 2. l. 2. co.

Vehementer & acuta mente emoti, si febris iterum repetat, phrenitici evadunt, 95. sec. 2. co.

Phrenitici parum bibunt, ex levibus strepitibus facillè irritantur, tremuli sunt, aut



convulsionibus tentantur, 96. sec. 2. lib. 2. coac.

In intensa phrenitide tremores lethales sunt, 95. sec. 2. l. 2. co.

Desipientiæ quæ circa necessaria sunt pessimæ, & quæ ex his ingravescent, exitum portendunt, 98. sec. 2. l. 2. co.

In phrenitide albicans dejectio ac torpor malum denunciant, his succedens rigor, pessimus, 91. sec. 2. l. 2. co.

Quæ in phreniticis manifesta apparent insomnia probanda sunt, 90. sec. 2. l. 2. co.

Quibus adsunt superiorum partium tenues sudores cum perfrictionibus nec sine febre, ii corporis incontinentia & phrenitide vexati præceps periculum denunciant, 69. sec. 2. l. 2. co.

Desipientiæ cum voce stridula, linguæ revulsione, ac ipsi quoque tremuli vehementem mentis alienationem significant, in his durities, aut asperitas, perniciem minatur, 95. sec. 2. l. 2. co.

Desipientiæ quæ jam admodum fractis viribus & debilitatis succedunt, pessimæ sunt, 100. sec. 2. l. 2. co.

Crebræ in phreniticis permutaciones, convulsiones denuntiant, ac prævæ sunt, 101. sec. 2. co. idem reperit, 28. sec. 2. præd.

Qui inter initia sopore detenti, capitis, lumborum, præcordiorum cervicis dolore, ac insomnia consistantur, eos considerare oportet

oportet num sint phrenitici, in his narium stillatio perniciem ostendunt, idque præcipue si 4. inter initia die contingat, 1. sec. 2. l. 1. præd.

Vehementes phrenitides in tremores desinunt, 9. sec. 2. l. 1. præd.

Quæ paucò tempore furiosiores sunt mentis emotiones, in ferinas evadunt, 26. sec. 2. l. 1. præd.

In furiosa & vehementi emozione succedentes tremores, malignitatem denunciant, 14. sec. 2. præd.

Crebræ in phreniticis sputaciones cum perfrictione, non longè postea nigrorum vomitum futurum indicant, 31. sec. 2. l. 1. præd.

A peripneumonia phrenitidis malum, aph. 12. sec. 7.

In phreniticis initio moderatum esse, sedatum & facilem, crebrò verò permutari malum est, quin & sputatio frequens mala est, 12. sec. 2. præd.

Vide dementia, insaniam, jactationem, tempus, ætatem.

### PHLEBOTOMIA.

Vide sanguinem, evacuationem, oculos, partum, urinam, spinam.

### PVERI.

Pueris maximam partem morbi judicantur, alii intra dies 40. nonnulli intra 7. mens.



ses quidam intra annos 7. aliis ipsis etiam ad  
pubertatem accedentibus. Qui verò per-  
manferint, neque pueris circa pubertatem,  
neque foeminis cum menstrua erumpunt, so-  
luti fuerint, inveterascere consueverunt, aph.  
18. sec. 3.

Pueri verò quibus oculi derepente per-  
vertuntur, aut pejus affecti sunt, aut tuber-  
cula sub cervicem enascuntur, aut aliquan-  
tulùm lingua hæsitant, aut tussis sicca tra-  
hentes permanent, aut ubi adoleverint, ad-  
ventrem dolor contendit, neque conturba-  
tur, aut iis latera distorquentur, aut venæ  
crassæ circa ventrem in varices convertun-  
tur, aut omentum descendit, aut testis intum-  
uit, aut manus extenuatur, & impotens  
redditur, aut pes & tibia tota citra aliam  
occasionem claudicat. In his omnibus ani-  
madvertendum est morbum ista omnia præ-  
cessisse. Id quod plerique eorum qui pue-  
ros educunt, interrogari fatebuntur, quidam  
etiam, quòd eos lateat, tale quid accidisse se  
scire negant, ex l. 2. prædict.

#### RATIO.

In quovis morbo valere rationem, rectè  
se habere ad ea quæ assumuntur bonum; con-  
trà verò se habere, malum, aph. 33. sec. 2.

#### RAUCITAS.

Raucitas cum, tussi, & alvo liquida pus  
educit, II 4. l. 2. l. 2. co.

R. E.

#### RECIDIVÆ.

Quibus sæpius recidivæ contingunt, si  
sexto mensem superaverint, in tabem co-  
xariam ferè incidunt, 144. sec. 2. l. 2. co.

Crebræ iisdem perseverantibus morborum  
reversiones, impendente judicatione, san-  
guinem profundentes, nigram vomitionem  
excitant, quin etiam tremulos ægros fa-  
ciunt, 122. sec. 2. co.

Vide febres.

#### REMEDIUM.

Ad extremos morbos extrema exquisitè  
remedia comparata optima sunt, aph. 6. sec. 2.

#### RESPIRATIO.

Respiratio frequens quidem & parva, aut  
inflammationem, aut dolorem principalium  
partium indicat, magna verò ex longis in-  
tervallis delirium & convulsionem. Et fri-  
gidus quidem spiritus lethalis est, mortem  
quoque affert, febriculosus & fuliginosus,  
frigidus tamen minus. Et magnus foràs quo-  
que expiratus, parvus verò intrò & parvus  
foràs, magnus verò intrò, pessimus quidem  
ad mortemque proximè accedit & proten-  
sus est, ac virens, & obscurus, duplicataque  
intrò revocatio, qualis inspirationem redup-  
licantibus, facilis autem expiratio in om-  
nibus morbis, qui cum febre acuta infestant  
& in 40. diebus indicantur, magnum habe-  
re ad salutem momentum existimandæ est,



260. sect. 2. l. 2. coac.

Cervicis ac dorsi perfrictiones, quæ etiam totum corpus pervadere videntur, convulsiones denuntiant, in quibus urinae hordei non exactè moliti crassioribus frustulis similia continent, 193. sec. 2. l. 2. co.

Spirationes quæ non nisi erecta cervice ducuntur, hydropem siccum faciunt, 424. sec. 2. l. 2. co.

Spirationes suspiriosæ quæ foras educuntur, ac citra rationem facta colliquatio, in uterum gerentibus abortiones indicant. 516. sec. 2. l. 2. co. Idem repetit. 540. co.

Quæ puellæ erectæ cervicis spiratione venturæ, iis uterum ferentibus mammae pus colligunt. Muliebria purgamenta circa initia apparere, malum. 549. sec. 2. l. 2. co.

In febribus spiritus offendens malo est, & convulsionem significat, aph. 68. sec. 4.

Spiritus frequens dolorem aut inflammationem, in locis septo transverso superioribus indicat; qui verò magnus inspiratur, & ex magno intervallo delirium & frigidus ex naribus & ore expiratur exitialis admodum est. Facile autem spirare valde magnum ad salutem momentum existimandum, cum in omnibus morbis acutis in quibus febris conjuncta est, tum in iis qui intra dies 40. judicantur, ex 1. præd.

Quibus spiritus retrahitur & vox strangulabunda est in cervicis vertebra initio desinet,

det, & ad exitum velut ex convulsione quadam respiratio ducitur, 266. sec. 2. co.  
Vide senes.

### RESPONSIO.

Ab homine moderato ferox & audax responsio, malum portendit, 44. l. 1. præd.

### RIGOR.

Vbi sanguinis eruptioni rigores succedunt, diuturni fiunt, 151. l. 1. præd.

Propter dolorem vehementem partium ad ventrem attrinentium extremorum perfrigeratio, malum, aph. 20. sec. 7.

In iis quibus rigores imminet urina restitit, & in convulsione affectibus velut huic mulieri contigit, quæ vbi inhorruit, sudore correpta est, 110. sec. 2. l. 1. præd.

Quin etiam nonnihil metuendus est cum judicatione rigor, 101. l. 1. sec. 2. præd.

Summi totius corporis perfrictiones in diebus judicatoriis cum angore & corporis inquietudine si sine sudore fiunt damno sunt; præcipuè verò damnatur qui ex his superveniunt rigores, 61. sec. 2. l. 1. præd.

Ex rigore perfrictiones quæ ad calorem non revocantur, malæ sunt, 63. prædict.

In rigore familiares non agnoscere, & eorum quæ gesta sunt oblivisci, malum indicat, 94. sec. 2. l. 1. præd. Idem repetit 65. sec. 2. co.

Ex perfrictione exudantes ad calorem tran-



vocari periculum denuntiant, præsertim verò si accedat lateris æstus, cum dolore & subinde rigeant, malum impendet, 66. sec. 2. præd.

Rigores cum æstu non nihil periculi denuntiant, & facies incensa cum sudore in iis malum significat, super posteriorum partium frigus convulsionem provocat, 97. sec. 2. l. 2. præd.

Ex sanguinis eruptionibus vehementes die judicatorio perfrictiones, pessimæ, 329. f. 2. l. 2. co.

Rigores incipiunt mulieribus ex lumbis magis & per dorsum perveniunt in caput; sed & viris parte corporis posteriore magis quàm anteriore veluti ex femoribus & cubitis, inditio est cutis raritas, quam ipsam pilus ostendit, aph. 69. sec. 5.

A multa potatione rigor & delirium, malum, aph. 7. sec. 7.

Vbi corpus ita perfricit, ut obrigeat, perniciosa affert, 3. sec. 2. l. 2. co.

Crebri ex dorso horrores subinde locum commutantes graues sunt & difficiles, laboriosam quippe vrinæ suppressionem minantur, his tenuiter exudare pessimum, 8. sec. 2. coac.

Continenter & assiduè vexans rigor, imbecillo jam corpore, lethalis est, 9. sect. 2. coac.

Qui crebrò tenuiter exudant & subinde rigent,

rigent, ii perniciosè habent, & tandem sub mortem suppurati & alvum conturbatam habere deprehenduntur 10. sec. 2. co.

Qui rigores ex dorso proficiscuntur grauiore sunt & molestiores, ubi verò quis 17. die rigore correptus, 4. ac 20. die insuper rigerit, difficulter habet, 11. sec. 2. coac.

Qui subinde inhorrescunt, sæpe tenui sudore corripuntur, & difficili morbo laborant, 13. f. 2. co.

Qui subinde inhorrescunt & capite laborantes tenuiter exudantes, ij malignè habent, 12. sec. 2. co.

Rigores multi cum torpore malignum quiddam denunciant, 14. sec. 2. co.

Rigores qui in sextam diem incidunt difficile iudicium ferunt, 15. sec. 2. co.

Qui per sanitatem crebrò inhorrescunt, si ex sanguinis fluxu purulenti evadunt, 16. sec. 2. co.

Vbi horror in malis subinde incidit, cum difficultate spirandi, tabes denunciatur, 17. sec. 2. co.

Qui subinde inhorrescunt ac incontinenti corporis jactatione cum lassitudinis sensu, & lumborum dolore conflictantur, iis alvi effunduntur, 19. sec. 2. co.

Qui subinde rigore prehendantur, & sub noctem aliquante gravitatis habent, pervigiles in somnis nugantes ac delirantes, interdum sese lotio persuadentes, ii in convulsio-



nem tendunt, 19. sec. 2. co.

Continentes in malis præcipitibus rigores, malo sunt, 21. sec. 2. co.

Rigor cum posteriorum partium distentione mortem adfert, 21. s. 2. co.

Virium exolutiones ex rigore, cum capitis dolore perniciem denunciant, cruentæ in iis urinæ malo sunt, 22. sec. 2. co.

Quibus ubi inhoruerint, judicatorii simul sudores contingunt, posttridie verò si horror repetierit, & temetè pervigilent, iis fortè sanguinem erupturum sperare oportet, 23. sect. 2. co.

Rigores velut in febribus, quæ propriè ad tertianarum naturam accedunt, si in medio ingravescunt, febre nullum ordinem servante, maligni valde sunt, quæ verò contrà ingravescunt in convulsione vexatis, cum rigore & febre perniciem denuntiant, 26. sec. 2. co.

Quæ ex rigore sicut vocis defectio tremore solvuntur, atque eos qui subinde novo rigore corripuntur, succedentes tremores indicant, 27. sec. 2. co.

Qui ex rigore virium exolutiones aut capitis dolores sentiunt, si in dubium de vita veniunt, in iis cruenta urina malum denunciat, 28. sec. 2. co.

Quibus rigor adest iis urina restitit, 29. sec. 2. co.

Qui in diebus judicatoriis cum angore aut  
incont-

incontinenti corporis jactatione absque sudore perfrigerantur, circa indicationem male habent, 38. s. 2. co.

Quin & qui subindefrigerunt, post hæc sincera vomitione refuderunt, anxietate vexati, tremuli in febre, malum portendunt quin etiam ex rigore vox intercepta perniciem denunciat, 39. sec. 2. co.

Qui verò post sanguinis ex naribus eruptionem ex tenuibus sudoribus perfrigescent, male habent, 40. sec. 2. co.

Cervicis & dorsi perfrictiones, & quæ totum corpus videntur pertingere, insuper & spumantes mictiones, cum animi deliquio, & oculorum hebetatio convulsionem in proximo esse significant, 43. sec. 2. l. i. præd.

Subabsurdus est qui cum judicatione rigor fit, 321. sec. 2. co.

Qui ex rigore perfrictione detinentur, cum capitis ac cervicis dolore, vocis defectio-  
ne, ac tenui sudore, si ubi vires resumpserint ac sese velut recollegerint, moriuntur, 1. sec. 2. co.

Rigores cum sopore nonnihil periculi denunciant, & facies incensa cum sudore malignitatem significat, insuper posteriorum partium frigus, convulsionem provocat. Ac omnino posteriorum partium refrigeratio, convulsionem minatur, 7. sec. 2. co.

Febrem ardentem succedens rigor solvit, 335. sec. 2. co.



Ex his qui cum peracicie consumpti sunt, nonnulli ante mortem subinde rigoribus corripuntur, 44. sec. 2. co.

Vide febres, abscessum, abortum, hæmorrhagiam.

## R V B O R.

In febribus ex prægresso dolore rubores ad aures subnascentes, ignis sacri in facie spem faciunt, quin & convulsiones cum vocis privatione & vitium exolutione ad hæc consequi par est, 200. sec. 2. co. Vide anginam, cerebrum, tumores, testiculos.

## R V C T V S.

Vide hienteriam.

## S A L I V A.

Vide Linguam, tussim.

## S A N G V I S.

Sanguinem supernè quidem efferri qualicumque sit, malum: infernè verò niger, si deiciatur bonum, aph. 25. sec. 4.

Sanguinem spuitione rejicientibus sine febre esse conducit, ac tussi & dolore leviter consistari, sputumque ad dies 14. tenuari. Intense autem febricitare, ac tussire, sanguinemque recentem semper spuerè, minime conducibile, 427. sec. 2. l. 2. co.

Sanguinis eruptiones vehementes cum totius corporis perfrictionibus judicatoriis pessimæ sunt, 134. sec. 2. co.

Sanguinis ex parte adversa profluvium malum

malum est; veluti si in lienis tumore ex dextra nare effluat, & circa præcordia idem spectari oportere existimandum est, 327. sec. 2. l. 2. co.

Quibus sanguinis eruptiones diu perseverant, in iis temporis progressu alvus male afficitur, nisi urina concocta prodierit, ac fortassis tale aliquid diluta urina denunciat, 332. sec. 2. l. 2. co.

Quibus ex larga & frequenti sanguinis eruptione copiosa sit nigrorum dejectio, cum alvi vero suppressione sanguinem profundunt iis alvus dolore consistatur, una autem cum quibusdam statibus tolerabilius ferant, ac fortè si copiosis, frigidis, & tenuibus sudoribus diffuunt, in iis returbata urina mala non est, neque quod in ea insidet genitali femini simile, ut plurimum autem, hi dilutas urinas reddunt, 333. sec. 2. l. 2. co.

Perpusilla sanguinis è naribus stillæ damno sunt, 57. sec. 2. l. 2. co.

Si in ventrem sanguis præter naturam effusus fuerit, is suppuret necesse est, aph. 20. sec. 6.

Spinae perversionem, & spirandi difficultatem sanguinis fluxus liberat, 311. sec. 2. l. 2. co.

In corporis perfrictione cum torporis sensu, sanguinis extractio mala, 343.

Sanguinis fluxus si 4. die oriatur, diurnitatem indicat, & alvus effunditur crux-



que intumescunt, 533. sec. 1. lib. 2. co.

Vide excrementa, hæmorrhagiam.

### SANGVIS GINGIVARVM.

Vide excrementum.

### SATIETAS.

Vbi præter naturam copiosior cibus ingestus est, morbum inde creati indicat sanatio, aph. 17. sec. 2.

Vide cibum.

### SECESSVS.

Vide excrementa.

### SEDES.

Vide dolorem.

### SENES.

Senes magnam partem iuuenibus mitis ægrotant: semel autem diuturnis morbis correpti ferè vna moriuntur, aph. 39. sec. 2.

Senibus spirandi difficultates, desillationes cum tussi, stranguriæ, dysuriæ, articularum dolores, nephritides, vertigines, apoplexiæ, malus corporis habitus, cachexiæ Græcis dictus, pruritus totius corporis, vitigiliæ, alvi, oculorum & aurium humiditates, visus obtusior, glaucomata, auditus hebetior, aph. 31. sec. 3.

Vide victum.

### SECUNDINA.

Ad secundinas deturbandas sternutatio immisso nates & os, manu obruta, aph. 49. sec. 3.

SEC:

### SECTIO.

Perfectum os, aut cartilago, aut nervus aut genæ tenuis particula, aut præputium neque augetur, neque coalescit.

Pertula perfective vesica, cerebro, corde, septo transverso, tenui quoque intestino, ventriculo, jecore, lethale est, aph. 18. sec. 6. Sive os, sive cartilago, sive nervus sectus fuerit in corpore, neque augetur, neque coalescit, aph. 8. sec. 7.

Vide nervum.

### SINGULTVS.

Propter inflammationem singultus, malum, aph. 17. sect. 7.

Si senibus supra modum purgatis singultus accidat, non bonum, aph. 41. sec. 7.

Singultu fatigante sternutatio superveniens liberat, aphor. 13. sec. 6.

Ex synceris vomitionibus singultus malus est, mala quoque convulsio, quin etiam idem existimandum est in immodicis purgationibus quæ ex medicamentorum portionibus fiunt, 565. sec. 2. l. 2. co.

A vomitu singultus & oculorum rubor malum, aph. 3. sec. 7.

Vide hæmorrhagiam, ileum, tus.

### SITIS.

Sitis si temerè ac præter rationem cesset in præcipitibus malis, malo est, 57. sec. 2. l. 1. præd.

H 2



In gravi morbo sitim temerè ac præter naturam cessare penitus malum est, 52. sec. 2. l. 2. co.

Vide dolores capitis.

Quibus noctu bibendi est aviditas, iis admodum sitientibus obdormiscere bono est, aph. 17. sec. 5.

### SICCITAS.

Vide tempus.

### SOLVITIO.

Vide sectio.

### SOMNVS.

Ybi somnus delirationem sedat, bonum, aph. 2. sec. 2.

Somnus & vigilia si modum excefferint, malum, aph. 3. sec. 2. Idem repetit, aph. 71. sec. 7.

Profundi somni neque turbulenti, judicij firmitatem denunciant, turbulenti verò non sine corporis offensione instabiles sunt, & infirmi, 151. sec. 2. co.

Somni quales sopore oppressis, & totius corporis perfrictiones, perniciem ostentant, 181. l. 2. co.

Sed in somnis etiam num de oculis aliquid subappareat, spectare oportet. Nam si quid non coactè commissis palpebris de albo appareat, modò non ex alvi profluvio, aut medicamenti portione accidat, malum signum est, & valde perniciosum, aph. 52. sec. 6.

Quod ad somni rationem attinet, quemadmo-

admodum à natura nobis est consuetum, interdum quidem vigilandum, noctu vero dormiendum. Quod si istud immutatum fuerit, deterius existimandum. At minimè offenditur æger si prima luce dormiat ad tertiam diei partem. Qui verò postea somnus contingit deterior est. Pessimum autem, si neque noctu, neque interdum dormiat, nam aut ob dolorem insaniã adest, aut delirii adfuturi nota est, 47. præn. Idem repetit, 497. sec. 2. co.

Vide furorem, insomnia, soporem, oculos, convulsionem.

### SONITVS.

Vide cerebrum, tinnitum.

### SOPOR, & SYDERATIO.

In syderatis succedentes hæmorrhoides vtilis: refrigerationes verò ac torpores malum denunciant, 478. sec. 2. co.

In syderatis ex magna spirandi molestia subortus sudor, mortem adfert, in his rursus si febris accedat, solutio contingit, 479. sec. 2. co.

Syderationes quæ repente fiunt, si insuper febris in modum exolutionis contingat quæ diutiùs trahat, perniciem minantur, 489. sec. 2. l. 2. co.

Qui sopore detinentur cum incontinenti corporis iactatione, præcordiorum dolore, & parva vomitione, ii tubercula ad aures.



habent, sed & antea circa faciem tumores apparent cum sopore, 183. sec. 2. l. 2. co. Idem repetit, 165. lib. 1. præd.

Sopor profundus & altus omnino dammandus est, 178. sec. 2. l. 2. co.

Qui inter initia sopore detenti, capitis, lumborum, cervicis, præcordiorum dolore ac infomnis conflitantur, considerandi num nephritici evadant, in his narium stillatio perniciousa ostentat, tum verò vel maximè si 4. die aut inter initia contingat, alvi quoque prærubra proluvis, malo est, 179. sec. 2. co.

Qui sopore oppressi circa initia tenuiter exudantes concoctas urinas emittunt cum magna corporis æstuatione, citra judicationem verò perfrigescunt, & rursus ex brevibus intervallis peruruntur, torpore, sopore, aut convulsione tentati perniciosè affecti sunt, 180. sec. 2. co.

Sopore, lassitudine & surditate tentatos alvus erumpens & ad indicationem rubra demittens juvat, 182. sec. 2. l. 2. co.

Quibus in morbis subita fit mentis perclusio cum inquieta corporis jactatione, iis sanguinis eruptionem fore spes est. 184. sec. 2. l. 2. co.

Qui sopore, corporis inquietudine, præcordiorum dolore affinguntur, cum frequentibus, & pauca sputatione, iis tubercula ad aures exoriuntur, ac fortassis sopore tentati ad aliquam convulsionem deveniunt, 185. sec. 2. co.

Qui-

Quibus sopore conflatis fatigatis & alto stupore (quem catochum vocant) detentis præcordia variant, ac venter in tumorem præter naturam sublatus est cum ciborum fastidio, ac alvi interceptione, tenui circa caput & thoracem oborto sudore, in his animadvertendum est, num concitatus magnus spiritus, aut genitura similis excretio prodians singulorum prænunciet, alvus verò fortassis etiam biliosa demittat, eos splendetis quiddam per urinam redditum juvat, alvus verò in his etiam commoveatur, 186. sec. 2. l. 2. co. Idem repetit, 92. l. 1. præd.

Vbi cerebrum syderatione periclitatur, quidam tribus diebus, quidam etiam sæpe moriuntur, quos si evaserint servantur, ex quorum numero pereunt quibus per sectionem os disparatum apparuerit, 187. sec. 2. co.

Ex capite dolentes & alto stupore (quem catochum dicunt) detenti ac delirantes cum alvi interceptione, ac ferociente intuitu, floridi, in scapulas rigescunt, ac posteriorum partium distentione tentantur, 162. sec. 2. co. Idem repetit, 88. l. 1. præd.

Syderationes quæ repente contingunt si insuper febris medicinis accedat, quæ diu trahat perniciousè minatur, quale quid Namenti filio contigit, 82. sec. 2. l. 1. præd.

In sopore affectis ægris spumantibus prodentibus dejectionibus, febris acuta ingrauescit, 93. sec. 2. l. 1. præd.



Qui sopore detinentur cum incontinenti corporis iactatione, præcordiorum dolore, & parva vomitione, ii tubercula ad aures habent, sed & antea circa faciem tumores apparent cum sopore, 183. sec. 2. co.

Animadvertendum est diligenter num profundus & altus sopor omnino damnari debeat, 63. sec. 2. l. i. præd.

Vocis ejectiones cum virium exolutione alto sopore (carochum vocant) detentis perniciem minantur, 96. l. i. præd.

Quæ ex lumbis in cervicem & caput redundant, & levis syderationis more resolutionis sensum inducunt, convulsionem ac mentis emotionem minantur. Videndumque est num talia convulsione solvantur, qui huiusmodi conflantur, variè morbum trahunt, atque eadem diutius perseverant, 118. sec. 2. l. i. præd.

In his qui quodam sopore aut morbo regio detinentur nec admodum sentiunt, & quibus singulus adest, alvus assatim prorumpit, fortassis etiam supprimitur, atque ii exolvuntur, videndum num abscessus ad aures in his spectare oportet, 154. l. i. præd.

In leviter syderatis abscessus qui ad aures contingunt malo sunt, 160. l. i. præd.

Quibus cerebrum syderatum est intra tres dies inereunt, si verò hos superaverint salvi fiunt, aph. 50. sec. 7.

S P I.

## SPINALIS MEDULLA.

Aut verò si spinalis medulla aut ex casu, aut aliqua quapiam externa causa, aut sua sponte laborarit, & crurum impotentiam facit, ut ne tactum quidem percipiat æger & ventris, & vesicæ, aded ut ne primis quidem diebus stercus aut urina nisi coactè reddatur. Quod si morbus inveteraverit & stercus, & urina ægro infcio prodit, tandemque non longo post intervallo perit, ex l. 2. sec. 2. præd.

Spinæ peruerfionem & spirandi difficultatem sanguinis fluor liberat, 311. sec. 2. co.

## SPIRATIO.

Vide respirationem.

## SPVTA &amp; SVPPVRATIO.

A sanguinis sputo puris spuitio, malum, aph. 15. sec. 7.

A puris sputo phthisis & fluxio, cum verò sputum retentum fuerit, moriuntur, aphor. 16. sect. 7.

Sputa ex angina viscida, & crassa, ex albidis, vi educta malum denunciant, omnique ejusmodi maturatio mala est: In his multa deorsum purgatio levis syderationis modo mortem adfert, 377. sec. 2. lib. 1. co.

Sputa ex angina subarida, crebra, per tussim & cum lateris dolore educta perniciem minantur. Atque ea quæ inter potandum per tussim rejiciuntur, quæque difficulter deglu-

H 5



incur; malum portendunt, 378. sec. 2. l. 2. co.

In morbo laterali, quibus circa initia interiorum purulentæ sunt spuitiones, ii 3. die aut 5. moriuntur: quod si superent nec longè meliùs habuerint 7. aut 9. aut 11. suppurati sunt, 379. sec. 2. l. 2. co.

Sputum vero in morbo laterali ubi maturefcere & expui 3. die cœperit, celeriores solutiones facit, quòd si posterius cardiores, 386. sect. 2. l. 2. co.

Sputum autem quodcumque dolorem non tollit, malum significat; quod verò solvit bonum, 391. sec. 2. co.

In omnibus autem laterum & pulmonum morbis sputum promptè, ac citò excreari necesse est, flavumque sputo permixtum esse. Quod si multo post dolorem flavum aut non commixtum rejicitur, nec non sine multatussi, vitiosum censetur, omnino autem pravam, flavum si syncerum est, & glutinosum, & candidum, & rotundum, itemque multum ex virore pallescens, quodque spumosum & syncerum, & lividum, & æruginosum. Aliquanto verò deteriùs, quod sic est syncerum, aut nigrum quoque videatur. Aut flavum cui paulum sanguinis admixtum est, initio quidem salutem pollicetur, quod verò 7. die aut longiore spatio tale apparet, non adcurtum. Admodum autem sanguinolentum, aut quod statim initio livescit perniciem præse-

se fert, pravitate etiam indicant & spumantia, & flava, & nigra, & æruginosa, viscosaque, & quæcumque celeriter colorantur. Mucosa autem & fuliginosa tum celeriter colorantur, tum secutiora sunt; quæ verò intra quintum diem, dum coctionem accipiunt, colorantur, meliora censentur, 390. sec. 2. l. 2. co.

Quibus cum biliosa purulentum sputum, aut serosum, aut simul permixtum educitur, ii ut plurimum 14. die intereunt, nisi bonum aut malum aliquod ex his quæ superius dicta sunt, contingat. Alioqui certè pro ratione mors expectanda est, atque in his præcipuè quibus 7. die sputum huiusmodi procedere cœpit, 392. sec. 2. l. 2. co.

Purulentos moderatius habentes, si sputa graveolentia consequantur, recidiva interimit, 406. sec. 2. l. 2. co.

Qui in morbo laterali sputa rejiciunt purulenta aliquantulum biliosa, rotunda, aut purulenta aliquantulum cruenta, iis temporis progressu periculum creatura, perniciem autem denunciant sputa nigra, fuliginosa, aut quibus qualia ex vino nigro fiunt, 407. sec. 2. co.

Qui spumantem sanguinem spuitione rejiciunt cum præcordiorum dextrorum dolore, iis ex jecinore prodit, & plerumque pereunt, 408. sec. 2. co.

Sputa viscida saluginosa cum raucitate



malo sunt. Quod si ad hæc aliquid etiam in pectore sublatum sit, malum significat, in his extenuatis cervicis dolores perniciem denotant, 413. sec. 2. co.

Hepaticis spurum multum cruentum sive intus subputridum, sive sincerè biliosum fuerit, statim perniciem denotat, 446. sec. 2. coac.

Quicumque spumantem sanguinem expunt cum præcordiorum dextrorum dolore, iis ex jecinore spuitur, & pereunt, 450. sec. 2. co.

In febre sputi excreationes lividæ, nigrae, biliosæ, subsistentes quidem malæ sunt, si verò pro ratione excreantur, vitales, 242. sec. 2. coac.

Quibus salsa sputa cum tussi subsistunt, iis corpus velut efflorescentibus pustulis rubescit, antè verò exasperatur, 243. sec. 2. co.

Excreatio frequens & irrita, si quidem etiam aliud quoddam signum affuerit, phrenitidem portendit, 244. sec. 2. co. Idem repetit, 6. sec. 2. præd.

At de sputo & tussi eorum quos tabes male habet, eadem mihi dicenda sunt, quæ de purulentis scripsi. Eum namque qui probe levari volet, convenit spurum facile tussi rejicere, esseque album & æquale, vnius coloris, & sine pituita, quod à capite defluit ad nares vertatur, neque febris prehendat, ut nec cibos impediatur, neque sitim faciat,

alyus

alyus autem quotidie deiciat, & quod secedit durum esto, & iis quæ assumuntur conveniens, hominem quam minimè tenuem esse convenit, pectus verò laudandum, quadratum & hispidum cujusque cartilago exigua & admodum carnosa est. In quo namque hæc omnia inerunt, is maximè superstes futurus est. At qui nihil horum habuerit, exitio maximè est affinis. Juvenes verò qui in pectore pus colligunt ex humorum decubitu, aut fistula, aut alio quopiam id genus, aut ex abscessus reversione, ii nisi multa admodum bona signa assecuti sint, minimè evadunt. Moriuntur verò hujusmodi homines sub autumnum, valdeque & ex aliis morbis longis plerisque sub hoc tempore pereunt. Ex reliquis verò minimè evadunt tum virgines, tum mulieres, quibus ex menstruorum suppressione tabes contigit. Quod si ex his aliqua superesse volet, cum multa laudabilia signa accedere, tum verò menses luculenter & manifestè comparere oportet, alioqui nihil spei relictum est. At qui ex sanguinis eruptione in pectore pus colligunt, tum viri tum mulieres ac virgines, ii certè haud minus supersunt. Cæterum omnia signa tam suppuratorum quam tabescentium animo reputantem tum superfururum, tum etiam periturum prædicere oportet. Ex sanguinis autem eruptione maximè supersunt, quibus in dorso & pectore dolores



ad sunt melancholici, & sanguinis eruptione ac colore quodammodo levantur. Neque enim tusses admodum neque febres succedunt, ac plerique sitim ad extremum vsque facile tolerant, sed recurrit ferè sanguinis eruptiones nisi abscessus succedant, ex quibus si sunt optimi, qui maximè eruenti. Qui verò in pectore dolores sentiunt, & temporis tractu extenuantur tussi & spirandi difficultate consistantur, si neque febres prehendant, neque suppuraciones succedant, ex iis percontari oportet si quando tussiant, & difficulter spirant, num etiam concretum quoddam & modicè oleus per tussim rejiciant, ex lib. 2. præd.

In omnibus pulmonis & laterum doloribus, sputum celeriter, promptèque expui, convenit, sputoque flavum valde permixtum apparere; etenim si multo post doloris initium, quod flavum est, aut fulvum, aut mul-ram tussim enibeat, neque valde permixtum expuat, deterius est. Flavum quippe si syncerum fuerit periculum subesse restatur, album autem, & viscidum, & rotundum inutile. Malum quoque valde viride, aut pallidum, itemque spumans. At si adèd syncerum fuerit, vt etiam nigrum appareat, id illis deterius est. Malum quoque vbi nihil expurgatur, neque ipsum projicit pulmo sed propter multitudinem fervet in guttore. In omnibus pulmonis morbis gravedines, &

ster-

sternutationes, tum præire, tum subsequi, malum. Verùm in aliis maximè lethalibus morbis sternutationa viuitate non carent. At in pulmonis inflammationibus, si inter initia morbi sputum exsernitur flavum, non multo permixtum sanguine, salutare est, & confert admodum. 7. vero die, ac tardius non adèd securum: omnia autem sputa mala sunt, quæ dolorem non sedant. Pessima etiam nigra, vt prius scriptum est. At omnium quæ exerceantur optima quæ dolorem sedant. Horum verò locorum dolores, qui neque per venæ sectionem, aut medicamenta purgantia, & victus rationem sedantur, eos ad suppuracionem tendere sciendum est. Ex suppuracionibus autem admodum exitiales sunt, quæ sputo adhuc bilioso existente suppurantur, idque potissimum si ab huiusmodi sputo suppuratio procedere cœperit cum morbus ad diem septimum pervenerit. Qui verò talia sputa, ne 14. die moriatur metus est, nisi quid boni accesserit. At in bonis quidem signis hæc numerantur, facile morbum sustinere, bene spirare, dolore levari, sputum sine difficultate rejicere, corpus æqualiter calidum & molle videri, sine siti esse, vrinas etiam & alvi excrementa, & somnos & sudores, velut descriptum est, singula supervenire bona existimanda sunt. His enim omnibus sic contingentibus haudquaquam æger morietur, quod si ex his quædam qui-

dcim



dem contingant, quædam minimè, non ultra 14. diem æger vitam producet. Contra verò ægrè morbum sustinere, spirationem magnam & densam esse, dolorem minimè sedari, sputum ægrè rejicere, vehementer sitim esse, corpus à febre inæqualiter detineri, alvum quidem & latera vehementer calere, fronte, manibus & pedibus frigidis, urinas verò & alvi excrementa & somnos & sudores vnaquaque qualia descripta sunt mala esse non convenit. Si quid enim ex his sputo supervenit morietur æger priusquam ad 14. diem perveniat, aut 9. aut 11. die: sic igitur conjicere oportet, quod cum sputum istud valde lethale sit, neque etiam ad 14. diem perducit, ex his verò tum bonorum, tum malorum subducta ratione prædictiones facere oportet. Sic enim quis potissimum verum assequatur. Reliquæ verò suppurationes magna ex parte rumpuntur, partim quidem 20. die, partim etiam 30. quædam quoque 40. aliquæ etiam ad 60. perveniunt. Suppurationis autem initium fore ratione comprehendere oportet, ab eo die quo primum æger febricitavit, aut etiam primum vigorprehendit, & si pro dolore sibi pondus inesse in eo loco qui dolore affligebatur dixerit, ista namque circa suppurationis initia fieri solent. Ex hoc igitur tempore suppurationum ruptionem fore: intra prædicta tempora expectandum est. Quod

si in

si in altero tantum latere suppuratio fuerit, tum vertere, tum edificere ad hæc convenit, num dolor aliquis alterum latus detineat, & num altero calidius fuerit, atque ubi in latus sanum decubuerit, interrogare si quod ei pondus desuper impendere videatur. Sic enim altero latere in quo pondus extiterit suppuratio est. At purulentos omnes his signis dignoscere oportet. Primum quidem si febris non dimiserit. Verum interdum levior quidem, noctu verò major detinet, & sudores multi oboriuntur, tussisque & tussienti cupiditas ipsis inest, nihil tamen effatum dignum expuant, oculique cavi redduntur, malæ ruborem contrahunt, & vngues quidem in manibus adunci fiunt, digiti verò maximeque summi incalescunt, & in pedibus tumores fiunt, cibos minimè appetunt & pustule toto corpore oriuntur. Diuturnæ igitur suppurationes his indicantur signis, quibus multa fides habenda est. Quæ verò breve habent spatium sic indicantur, si quid eorum appareat quæ inter initia fiunt. Simulque si etiam aliquanto difficilius æger spiret. At ex his quæ citius aut tardius rumpuntur sic deprehendere licet, si quidem dolor inter initia oriat, & spirandi difficultas, ac tussis sputatioque perseverant, & ad 20. diem extenduntur intra hoc tempus, aut adhuc prius ruptionem expectato. Quod si minor dolor fuerit, illisque cætera omnia



pro hujus ratione respondeant, tardius ruptionem expectato. At ante puris eruptionem dolores oboriri, & spirandi difficultatem, & sputi excreationem necesse est. Superfunt autem ex morbo hi potissimum quo febris eodem post ruptionem die dimisit, quique cibos celeriter expetiverint & sibi liberantur, venterque tum exigua tum cocta desicit, & si pus album & laeve, ejusdemque coloris fuerit, & à pituita liberum, circaque dolorem aut tussim vehementem edecatur. Sic quidem optimè ac celerrimè liberantur, sin minus, qui ad ista, proximè accedent. Moriuntur verò quos febris non dimiserit, iterum accenditur & sibi quidem vexantur, cibos verò non expetiverint, & si alvus livida dejecerit, pusque ex viridi pallidum & lividum aut pituita permixtum & spumosum expuerint. Si hæc omnia contigerint, partim quædam contigerint, moriuntur. At quibus eorum partim quædam contigerint partim minime, ex his nonnulli quidem intereunt, quidam etiam ex longo temporis intervallo supersunt, sed ex omnibus his signis existentibus, tum in his, tum in reliquis omnibus conjecturam facito. Quibus ex morbis pulmonis ad aures abscessus oboriuntur, & ad inferiores sedes suppurant, & fistula facta aperiantur, iis secunda valetudo contingere solet. Ista verò hunc in modum consideranda sunt, si febris detinet, neque dolor

dolor conquiescit, neque sputum ex ratione procedit, neque biliosa sunt alvi dejectiones, neque bene soluta ac lyacera, neque vrina admodum multa & copiosum habet sedimentam, suffragantur verò ad salutem reliqua omnia salutaria signa, in his hujusmodi fore abscessus expectato. Ac hi oriuntur quidem in locis inferioribus circa præcordia inflammationis aliquid subest, illi autem in superioribus. Quibus præcordia mollia & doloris expertia perseverant, cumque difficultate spirandi aliquandiu vexatus fuerit, quæ citra ullam aliam evidentem occasionem quieverit, invehementibus & periculo proximis pulmonum inflammationibus, abscessus ad curas omnes sanè utiles. Optimi verò qui sunt sputo mutationem subeunte. Si namque tumor & dolor suboritur sputo pro flavo in pus verso & foras prodeunte, hoc modo tum securissimè æger superstes futurus est, tum citissimè citra dolorem abscessus conquiescet, quòd si neque sputum rectè excernatur, neque vrina bonam subsidenciam habere videatur, periculum est ne articulo claudicat æger aut ei multum negotii exhibeatur. Si verò dispareant abscessus & intrò recurrant, sputo non prodeunte, & detinente febre, gravis morbi periculum, & delirii & mortis ægro imminet. Ex suppuratis autem quos pulmonum morbi concitarunt, ferè seniores moriuntur,



at ex cæteris suppurationibus juniores potius intereunt. At lumborum & inferiorum partium dolores qui cum febre affligunt, si relictis inferioribus ad septum transversum transeunt, exitiales sunt admodum. Ad alia igitur signa animam adhibere oportet, siquidem ex pravīs signis quidpiam apparuerit, omni spe destitutus est æger. Cum verò suppurati vrantur, quibus quidam purum pus est & album, & minimè fœtidum, ii servantur, at quibus subcrentum & cœnosum, moriuntur. Quòd si irruente ad septum transversum morbo reliqua signa minimè prava se ostenderint, hunc suppuratum fore magna spes est, ex l. præm.

Vide dolores capitis, excretiones, pleuritidem, pus, tabem.

### STRANGURIA.

Ad recti intestini & vteri inflammationem purulentosque renes accedit stranguria, iecore inflammatione laborante intervenit sanguis, aph. 58. sect. 5.

Vide ileum, dysuriam.

### STATVS.

Vide jacere.

### STERNUTAMENTVM.

Sternutamentum cietur ex capite cerebro excalesceto, perhumectato spatio in capite inani, aer enim intus contentus foràs erumpit, strepit autem quia per angustum ipsi est exitus, aph. 51. sec. 7.

Vide

Vide pulmonem, hysteriçam pluritudem.

### STRIDOR.

Vide dentes.

### SVDOR.

Sudores febricitantibus boni qui manare cœperint die 3. 5. 7. 9. 11. 14. 17. 21. 27. 31. 34. hi enim sudores morbos indicant, qui secus evenerint laborem & morbi longitudinem aut ejusdem reditum significant, aph. 36. sec. 4.

Frigidi sudores cum febre acuta, mortem, cum mitiore verò morbi longitudinem significant, aph. 37. sec. 4.

Qua corporis parte sudor, ibi morbus, aph. 38. sec. 4.

Sudor multus & per somnum factus, copiosiore cibo corpus vti significat; quòd si parcitius epulanti hoc accidat, vacuatione indigere sciendum est, aph. 41. sec. 4.

Sudor multus frigidus calidusve semper fluens, frigidus graviores, calidus minorem morbum significat, aph. 42. sec. 4.

Febricitanti sudor superveniens febre ægrotum non deficiente, malum, prorogatur eam morbus, & plus humiditatis inesse significat, aph. 56. sec. 4.

Sudor optimus sanè qui febrem die judicatorio tollit, utilis autem & qui allevat. Malus verò frigidus, & vbi caput duntaxat & cervix insudat, nam & temporis diuturnitatem, & periculum denuntiat, 572. sec. 2. co.



Sudor autem frigidus, cum acuta quidem febre exitium, cum mitiore verò diuturnum fore morbum significat, 573. sec. 2. co.

Sudor unà cum febre, acuto morbo virgente, malus, 574. sec. 2. co.

Sudores autem partium seorsim quidem procedentes juvant, partim verò vniuersim effusi, & quæ affatim fiunt languinis detractiones, nocent, 360. sec. 2. l. 2. co.

Qui crebrò tenuiter exudant & subinde rigent, ii perniciosè habent, & tandem sub mortem suppurati & alvum conturbatam habere deprehenduntur, 10. sec. 2. co.

Ex tenuibus sudoribus pervigiles, ad calorem revocati, malè habent, 41. sec. 2. co.

In febre tenuiter exudantes, malignè habent, 42. sec. 2. co.

In præcipitibus malis tenues circa caput maximè suboriri sudores, & corporis incontinentia quadam jactari, malum indicat, tum verò præcipuè perniciosis intenditur, si ista cum vrinis nigris coniegetur, & spiritus magnus & concitatus adfuerit, 49. sec. 2. co.

Qui ex sudoribus perfrigerantur, ac celeriter recalescunt, malè habere iudicantur, 52. sec. 2. co.

Qui in gravibus malis tenuiter exudant, & quadam corporis incontinentia jactantur, malè habent, 53. sec. 2. co.

Qui per febres tenuiter exudant cum capitis

pitis dolore & alvo intercepta, ad convulsiones proni sunt, 154. sec. 2. co. Idem repetit, 115. l. 1. præd.

Tenuiter exudantes cum capitis dolore & alvo intercepta, ad convulsiones proni sunt, 177. sec. 2. co.

Sudor in febribus acutis multus & copiosus, damno est, 58. sec. 2. l. 1. præd.

Quibus circa initia tenues suboriuntur sudores & vrinæ coctæ emittuntur cum magna torius aestuatione, si præter rationem perfrigescant, & rursus celeriter peruruntur, & torpore, sopore, aut convulsione tenentur, ii perniciosè affecti sunt, 102. sec. 2. l. 1. præd.

Sudores optimi quidem per omnes morbos acutos qui diebus iudicatoriis contingunt, & penitus febre liberant: boni verò quæcumque toto corpore oriuntur, faciuntque ut æger morbum facilius ferre videatur. At qui nihil tale efficiunt, minimè sunt vitales, pessimi autem frigidi, quique circa caput tantummodo, faciem & cervicem exoriuntur. Ii namque cum acuta febre mortem, cum mitiore verò morbi longitudinem præstant, quique per totum corpus eodem modo atque ex capite fiunt. Qui verò nulli formam referunt, & circa cervicem tantum oboriuntur prævi, boni autem qui guttatum & cum exhalatione fiunt. Atque hoc in totum de sudoribus animadvertere oportet.



ret, quod nonnulli quidem ex corporis dissolutione, quidam etiam ex inflammationis vehementia contingunt, 45. prænor.

Vide febres, horrorem, rigorem.

### SVFFITVS.

Suffus aromatum muliebria educit, ad alia verò multa utilis esset, nisi capitis ingeneraret gravitatem, aph. 28. sec. 5.

### SVFFOCATIO.

Si febre detento suffocatio derepente supervenerit, nullo in faucibus apparente tumore, est mortiferum, aph. 34. sec. 4.

Per febrem strangulari, & devorare non posse citra tumorem, malum est, 277. sec. 2. coac.

### SVRDITAS.

Qui surditate cum capitis gravitate ac præcordiorum contentione vexatur, si oculorum acies perturbatur in iis sanguinis è naribus fluxum sperare oportet, 195. sec. 2. co.

In acuta febre aures obtuse vehementem insaniam portendunt, 197. sec. 2. co.

In surditate ac torpore ex naribus stillatio molestiam quandam exhibet, iis vomitio ac alvi perturbatio conveniet, 208. sec. 2. coac.

Surditatem in febribus, enatum sanguinis è naribus profluvium, ac alvi perturbatio tollit, 210. sec. 2. co.

In præcipitibus & turbulentis morbis obve-

obveniens surditas malo est, quin & in longis morbis malum portendit, ac in his ad coxendies labores convehit, 190. sec. 2. co.

In febribus enata surditas alvum romoratur & sistit, 191. sec. 2. co.

Surditas cum vrinis prærubris, non subdendibus & sublimamentis, mentis emotionem minatur. In his morbo regio corripimale est. Quin etiam malo est, ex morbo regio fatuitas, aut stupiditas. His quidem vox deficere solet absque sensuum læsione, quin & alvus nunquam affatim prorumpit: quale quid Hermippo contigit & mortuus est, 32. sec. 2. l. i. præd.

In præcipitibus & turbulentis morbis obveniens surditas perniciem minatur, 33. l. i. præd.

Ex surditate abscessus ad aures contingere consentaneum est, præsertim verò si implacitas quædam aut inquietas corporis iactatio succedat. Ac inter hos in iis qui sopore detinentur, ista magis sperare oportet, 159. sec. 2. l. i. præd.

Surditas pus intro colligentibus suborta sanguinolentam dejectionem denuntiat. His sub mortem nigra egeruntur, 420. sec. 2. coac.

Vide dolores capitis, excrementa, febres.

### SVSPIRIA.

In morbis acutis cum febre quasi gementium suspiria, mala, aph. 54. sec. 6.



## TABES &amp; TABIDI.

Tabes iis maximè ætatibus fit quæ à 18. ad sunt ad 34. aph. 9. l. 5.

Qui tabe vexantur, si sputum quod extulsiunt carbonibus injectum olet graviter & capilli diffuunt, perniciosum signum, aph. 11. sec. 5.

Quibus per tabem capilli desiquunt, iis fluxione alvi superveniente, in propinquo mors, aph. 12. sec. 5.

Si tabe detento profluvium alvi superveniat, perniciosum, aph. 14. sec. 5.

Tabidi quorum sputum igni impositum gravem nidorem redolet, & capilli è capite diffuunt, moriuntur, 434. sec. 2. l. 2. co.

Tabidis in aquam marinam expuentibus, si pus fundum petis, celerem perniciem denunciat, sit autem marina aqua in æneo vase, 43. sec. 2. co.

Sputorum retentiones in tabescentibus mentem ad deliria verba commovent, in his sanguinis profluvium per ora venatum in ano sanguinem fundere solita existere posse spes est, 437. sec. 2. l. 2. co.

Tabes maximè periculosa sunt, quæ ex eruptione venarum crassarum & ex capitis distillatione contingunt, 438. sec. 2. co.

Tabes maximè periclitantur ætates ab anno 18. ad 35. 439. sec. 2. co.

In tabidis pruritus sentientia corpora alvi suppressione, malo sunt, 440. sec. 2.

sect. 2. l. 2. coac.

In naturis ad tabem promptè comparatis si fluxiones ad gingivas & dentes cum febre compareant, malum denuntiant, 441. sect. 2. coac.

Præcordia in tumorem sublata omnibus quidem mala sunt, præferrim verò his qui à longo intervallo tabidi sunt, 422. sect. 2. l. 2. coac.

Vide gravidam respirationem, sputum, utemur.

## TEMPVS &amp; TEMPESTAS.

Quotidianæ tempestates Aquiloniæ cogunt corpora firmantque, mobilia, item expeditioraque, & coloratiora & auditu valentiora reddunt, alvum siccant, oculos mordent, & si pectus dolor aliquis priùs habuerit, exasperant, contra austinae eadem solvunt & humectant, auditum heberant, caput gravant, vertigines oculis, tarditatem & languorem corporibus adfuerunt, alvum humectant, aph. 17. sec. 3.

Afiduis imbribus morbi ferè sunt, febres longæ, fluxiones alvi, putredines, epilepsie, apoplexiæ, anginae, siccitatibus autem, morbi tabifici, ophthalmiæ, articulorum dolores, vrinae & intestinorum difficultates, aph. 16. sec. 5.

Auster auditum hebetat, caligines visui obducit, caput gravat, corpori tarditatem & languorem conciliat, cum itaque is incre-



breceit, talia invalidis accidunt. Contrà Aquilo tussis exasperat, alvum indurat, vrinam supprimit, horrores excitat, lateris & pectoris dolores facit; hoc itaque dominante, talia infirmos expectare oportet, aph. 5. sect. 3.

Cum ætas sit similis veri, sudores in febribus multos expectare oportet, aph. 6. sec. 3.

Æstate verò superiorum quoque nonnulli, & febres & continuæ, & ardentes, & tertianæ, plurimæ, quartanæ item & vomitiones, alvi profluvia, ophthalmiæ, aurium dolores, oris ulcerationes, genitalium putredines & lutationes, aph. 21. sec. 3.

Autumno æstivi etiam multi morbi & febres quartanæ & incertæ, lienes tumor, aqua inter cutem, tabes, vrinæ difficultas, intestinorum tum lævitas tum difficultas, coxæ dolores, angina, anhelatio, intestinorum parte quapiam coarctatio, epilepsia, infania, melancholia, aph. 22. s. 3. Hyeme pleuritides, peripneumoniæ, lethargi, gravedines, raucitates, tussis, pectoris laterum & lumborum dolores, cephalalgia, vertigines, apoplexiæ, aph. 23. s. 3.

Vere infania, melancholia, epilepsia, fluxiones sanguinis, angina, gravedines, destillationes, tussis, lepra, impetigines, vitiligines & pustulæ ulcerosæ, plurima tubercula, articularum dolores, aph. 20. sec. 3.

Muta-

Mutationes temporum potissimum pariunt morbos, & in ipsis temporibus magnæ mutationes frigoris aut caloris cæteraque ad proportionem his similiter, aph. 1. sec. 3.

Naturarum quædam ad ætatem, aliæ ad hiemem bene aut malè se habent, aph. 2. sec. 3.

In temporibus cum eodem die, modò calor, modò frigus, autumnales morbi expectandi, aph. 4. sec. 3.

Certis temporibus & suam tempestatem servantibus certè & tempestivi ac iudicati faciles morbi sunt, incertis autem & alienis incertæ quoque ægrotationes sunt & ad iudicandum difficiles, aph. 9. sec. 3.

Magnis siccitatibus febres sunt acutæ, quòd si annus talis esse pergat, qualem temporis statim effecerit, tales ferè morbos expectare oportet, aph. 7. sec. 3.

Autumno in vniuersum morbi acutissimi & perniciosissimi: verò autem saluberriima & minimè exitiosum, aph. 6. sec. 3.

Autumnus tabidis nocuus, aph. 30. sec. 3.

Inter anni partes si hyems sicca & aquilonia, verò pluviosum & australe fuerit, ætate necesse est febres acutas fieri, ophthalmias & dysenterias, mulieribus præsertim & vitis natura humilioribus, aph. 11. sec. 3.

Contrà verò si australis hyems & pluviosa & tepens fuerit, verò siccum & aquilonium, mulieres quibus partus in verò incidit



quavis occasione abortiunt: aut si pariant tam infimos & morbosos partus edunt vt vel statim ipsi intereant vel tenues & valedudinarij vivunt. Ceteris dysenterix & ophthalmix sicca fiunt & senibus catarthi perniciem brevi allaturi, aph. 12. sec. 3.

Æstate verò sicca & aquilonia, autumno pluvioso & australi, vehementes capitis dolores in hyeme & tussies, & raucitates, & gravedines, nonnullis etiam tabes expectanda, aphor. 13. sec. 3.

Aquilonio verò & sicco autumno, hominibus natura humidis & mulieribus commoditas parabitur, alios ophthalmix sicca, & febres partim acutæ, partim longæ, quosdam etiam melancholix malè habent, 14. sect. 3.

Ex tempestatibus anni, in universum siccitates assiduis imbris salubriores, & minime mortiferæ, aph. 15. sec. 3.

Vide morbum, frigidum, febres, ætatem.

### TĒNĒSMŪS.

Si prægnanti tenesmus supervenerit, abortus est causa, aph. 27. sec. 7.

Vide excrementum.

### TESTICVLI.

Testiculi pudendumque retractum, malum denuntiant, 494. sec. 2. co.

Quibus in tumorem sublato ventre, pudendum rubor occupavit, mulieribus, purgamentum.

mentis albis humidis subito procedentibus, diuturnis febribus, intereunt, 530. sec. 2. co.

### TORPOR.

Torpor in contraria celeriter permutatatus perniciem denuntiat, 56. sec. 2 l 2. co.

Torporæ & stupores præter consuetudinem evenientes, adfuturam syderationem denuntiant, 47. sec. 2. co.

Vbi rigori torpor succedit, mentis alienatio significatur, 35. l. i. præd.

### TVMOR.

Manuum ac pedum tumores cum rubore, perniciem denuntiant, 63. f. 2. l. 2. co.

Parvi in longis morbis aurium tumores, si subinde sanguis è naribus profluat, & tenebriosa vertigo excitetur, exitio sunt, 104. sec. 2. co.

Molles & doloris expertes tumores longiore spatio finiuntur, nec ita grave periculum afferunt. Quod si neque intra 60. dies desinunt ac febris detinet, suppurationem expectare oportet. Idem verò haud secus quam in præcordiis penditur in tumoribus qui circa ventrem fiunt, nisi quòd hi quam illi minus suppurant, minimum verò qui sub umbilico constituntur. Atq; hi quidem in tunica concluduntur, illi autem sursum diffunduntur. Ex quibus etiam mortem magis afferunt, quicunque intus rumpuntur. Reliquas autem suppurationes quæ



quidem foràs erumpunt, maximè sanè con-  
ducit in quam exiguum & acutissimum lo-  
cum colligi, quæ autem intus vergunt, ut  
neque tumore, neque dolore, neque colore,  
manifestas foris notas edant, quod verò con-  
trà fit, pessimum est. Harum autem quæ-  
dam propter puris crassitudinem nullam de  
se significationem ostendunt. At recentes  
præcordiorum tumores, inflammationis ex-  
pertes, ac dolores qui in ipsis fiunt, murmur  
circa præcordia exortum solvit, sed potissi-  
mum quidem ubi per urinas ac dejectiones  
elapsum fuerit, sin minus ubi etiam hoc ip-  
sum transmissum fuerit, quin etiam ad in-  
fernas sedes devolutum juvat, 281. sec. 2. co.

Ex præcordiorum tumore, biliosis spiratio  
magna, & febris acuta, tubercula ad aures  
fulcit, 290. sec. 2. co.

Temerati ventris tumores in morbis lon-  
gis convulsiones afferunt, 36. sec. 2. co.

Molles autem tumores & doloris expertes  
digitiisque cedentes, longiores iudicationes  
faciunt, illisque minimè graves sunt. Quod  
si intra dies sexaginta neque febris cesset, ne-  
que tumor subsidat, fore suppurationem hoc  
loco reliquo ventre eodem modo significat.  
Itaque tumores dolentes, duri & magni peri-  
culum mortis intra paucos dies affore signifi-  
cant. Molles verò & minimè dolentes qui-  
que digito pressi cedunt, illis diuturniores  
esse solent. At ventris tumores minimè abscer-  
dere

dere nati sunt, quoniam qui in præcordiis oriun-  
tur, minimè verò qui infra umbilicum in-  
tus vertuntur. Sed ex superioribus locis  
sanguinis eruptio maximè expectanda est.  
Longorum verò omnium in his regionibus  
tumorum suppurationes in considerationem  
adhibenda. Suppurationum autem quæ in-  
de proveniunt observatio facienda est, quæ  
quidem foràs vertuntur, optimæ sunt ubi  
parvæ sunt, & quam maximè foràs feruntur,  
& in acutum tendunt. Pessimæ verò quæ  
magnæ sunt & latæ, minimeque in micro-  
nem attolluntur. At quæ intus rumpuntur,  
optimæ, ubi nihil cum externa sede commu-  
nicant, in sese contrahuntur, nullo dolore  
afficiunt, totaque regio externa unius colo-  
ris apparet, ex lib. præn.

Tumores humefcente alvo, sublati in al-  
tum cum doloribus, malo sunt, Alvo verò  
suppressa, dum ne quid aliud innovetur, eccle-  
riter rumpuntur, maligniores sunt, in his  
vomitus pravi & maligni, 623. sec. 2. co.

Articulorum tumores & colores absque  
ulcere & podagricas convulsiones magna ex  
parte, frigida largè affusa levat, & extenuat,  
solvitque dolorem, nam modicus torpor do-  
loris solvendi vim habet, aph. 25. sec. 5.

Quibus sunt cum ulceribus tumores conf-  
picui, ii non admodum convelluntur, nec  
insaniunt: quibus verò repente evanescunt,  
siquidem postica parte affectum sit, convul-



fiones & tetani accidunt, si verò à fronte, infania lateris dolor acutus, empyema & dysenteria, si rubicundi fuerit tumores, aphor. 65. sec. 5.

Si in magnis vulneribus & pravis tumor non appareat, ingens malum, aph. 69. sec. 5.

Incontenta bona, contenta verò cruda mala, aph. 67. sec. 5.

In diuturnis morbis suppurati ad aures tumores nisi pus admodum album ac sine odore reddant exitium, præcipueque mulieribus adferunt, 206. sec. 2. l. 2. co.

Vide anginam, febres, oculos, hypocondr. hydropem.

### TVBERCVLA.

A tuberculi introsum eruptione, oxolutio, vomitio, & animi defectio fit, aph. 8. sec. 7.

Quos febres longæ exercent, iis tubercula ad articulos vel labores fiunt, aph. 44. sect. 4. Idem repetit, aphor. 53. & 64. sec. 7.

Quibus tubercula ad articulos, vel labores post febres fiunt, si cibus pluribus utuntur, aph. 45. sec. 4.

Quibus in meatu urinario generatur tuberculum, ubi suppuraverit, & eruperit, doloris fit solutio, aph. 57. sec. 7. Idem repetit. aph. 82. sec. 4.

Quæ cum dolore exoriuntur ad aures tuberculor

bercula, perniciem minantur, 199. sec. 2. co.

Tubercula ad aures excitata in leviter syderatis, malo sunt, 202. sec. 2. co.

In diuturnis morbis non suppurantia guttur tubercula mortem adferunt, iis autem alvi fetè demittuntur, quia & in his considerandum in quibus speramus abscessus circa aures futuros, num ex capite dolent, num superiorum partium tenuibus sudoribus distant, nunquid etiam subinde novum rigorem sentiant, an fortè etiam alvi affatim perumpant, aut aliquo sopore detineantur. Videndum quoque num & in his vrina diluta cum sublimibus quibusdam in medio suspensis albidis & aliquantulum variantia exalbicantia, aut graveolentia appareant, 203. sec. 2. co.

In præcordiis jam longo intervallo afflctis & graveolente alvo, subnatum ad aures tuberculum mortem adfert, 292. sec. 2. co.

Quibus tuberculum ad vesicam adnascitur, urinæ difficultatem adferens, iis quibus corporis habitus negotium facessit, cujus quidem solutio contingit per puris eruptionem, 473. sec. 2. co.

Vide anginam, ætatem, dolorem præcordiorum.

### TVSSIS.

Tusses cum crebra salivæ, abscessum



circa aures emolliunt, 167. sec. 2. l. 2. præd.  
Idem repetit. 204. sec. 2. l. 2. co.

Quibus siccaë tussis paululum irritantes in febris ardentibus perseverant, si non admodum stiticolosi sunt, aph. 54. sec. 4.

Qui spumantem sanguinem extullunt, iis ex pulmone educitur, aph. 13. sec. 5.

Vide hydropem, tabem, sputum.

### TREMOR.

Qui cum furiosa mentis emotione tremuli evadunt, malignè habent, 88. sec. 2. co.

Quibus capitis ac cervicis dolor & totius corporis impotentia cum tremore adest, ab iis sanguinis eruptio liberat, quin etiam ista tempore dissolvuntur, 152. sec. 2. l. 1. præd.

Timores senioribus in febre contingunt, atque ubi apparent calculi, fortasse per urinas excluduntur, 590. sec. 2. co.

Vide dementia, rigorem, frigus.

### TINNITVS.

Aurium sonitus cum visus hebetudine & ad aures gravitatis sensus, mentis excessum aut sanguis ex naribus profluvium præsignunt, 194. sec. 2. co.

In præcipitibus morbis murmur edentes ac tintientes aures; mortem prænuntiant, 193. sec. 2. co.

Aures frigidaë, pellucidaë, contractaëque perniciem minantur, 192. sec. 2. co.

Vide

Vide dolorem auris & capitis, & in angustia

### TORMINA.

Tormina ea quidem omnia mala sunt, si cum febre quidem incidunt, aut variis alvicrementis, aut jecoris inflammatione, aut præcordiorum, aut ventris aut quæcunque doloribus eruciant, aut cibos cohibent, sitimque inferunt. At celerrimè is perit, quem maxima pars horum malorum occupat. Hinc verò plurimum inest speci, cui horum paucissima adsunt. Itaque morbus præcipuè pueros à quinto anno perimit, & qui eum superant ad decimum vsque, cætera ætates tutiores sunt. Utilia autem tormina sunt quæ his malis, non affligunt. At ubi sanguis & frumenta per alvum rejecta fuerint 7. die declinunt, aut 14. aut 20. aut 40. aut intra hoc tempus. Hujusmodi namque dejectiones etiam eos qui ante fuerunt in corporibus morbos tollunt. Inveteratos quidem spatio temporis majore, recentes verò etiam paucis diebus levare possunt: Siquidem & prægnantes ipsæ etiam plerumque ad partum supersunt, & ex parte, foetumque conservant, etiam si per multos menses sanguis & frumenta per alvum secedunt, nisi si dolore affligantur, aut aliquod ex malis signis quæ in difficultatibus intestinorum adesse scripta sunt, accesserit. Quòd si horum aliquod adesse visum fuerit, & foetui perniciem ac



prægnanti periculum denunciât, nisi postfectus absolutioem, aut secundarum dimissionem, ipsa tormina, eodem die, non multum post cessaverint, ex l. 2. præd.

### VARICES.

Vide calvum.

### VENTER.

Vide excrementa.

### VERTIGO.

Tenebrosas vertigines circa initia sanguinis ex naribus fluxio solvit, 341. sec. 2. coac.

Ex venis in ano fundere solitis aliquantulum apparentibus, tenebrosæ vertigines obortæ, parvam, ac sensim factam partium resolutionem indicant, ex quo liberat venæ sectio, & quicquid hujusmodi apparere solet, mali aliquid denuntiat, 346. sec. 2. co.

Febres vertiginosæ, & cum tenuis intestinali morbo, & sine hoc, perniciem intentant, 106. sec. 2. co.

### VMBILICVM.

Vide dolorem vmbilici.

### VERMES.

Lumbricis tenuibus, & longis qui ascari-des dicuntur in capitis dolore vexatis consequente surditate, & sopore, tubercula ad aures excitantur, 165. sec. 2. co.

VEN-

### VENTRICVLI MORSVS.

Vide febres, hæmorrhagiam.

### VICTVS.

Victus tenuis & exquisitus, & in morbis longis semper, & in acutis, ubi non convenit, parum tutus, rursusque victus qui ad summam pervenerit tenuitatem, molestus. Siquidem quæ ad summam plenitudinem productæ sunt repletiones, molestæ, aph. 4. sec. 1.

In tenui victu peccant ægroti, quo fit ut magis lædantur. Siquidem quodvis peccatum gravius hic quam in paulo pleniore victu solet esse. Eadem de causa sanis etiam valde tenuis staturaque & exquisita victus ratio parum tuta, quia errata gravius ferunt, quare tenuis exactusque victus paulo pleniore existit maxima ex parte periculosior, aph. 5. sec. 8.

Cum itaque morbus peracutus est, extremos protinus labores habet summeque tenuissimo victu est vitendum, quum verò non est, sed pleniorum victum licet exhibere, tantum de extrema victus tenuis ratione remittendum, quanto extremis morbus fuit remissior, aph. 7. sec. 1.

Cum morbi vis est maxima tunc vel tenuissimo victu est vitendum, aph. 8. sec. 1.

Sed ex ægroti conjecturam facere oportet, an cum præscripto victu perftet ad



morbi vsque rigorem, an prius deficiat, imparque cum tali victu succumbat, quam cedat morbus & obtundatur, aph. 9. sec. 1.

Quibus itaque vigor statim futurus est, tenuiter statim alere oportet: quibus autem posterius, & in ipso vigoris tempore, & paulo sub ipsum de victu demendum, antea verò plenius alendum vt ægrotus perferre queat, aph. 10. s. 1.

In ipsis tamen exacerbationibus cibum adimere oportet; nam præbere noxium, & cum per circuitus redeunt morbi, in ipsis accessionibus abstinendum, aph. 11. sec. 1.

Accessiones verò, & constitutiones morborum indicabunt, tum morbi ipsi, tum tempora anni, tum periodorum proportionis inter se observatio, sive eæ quotidie, sive alternis, sive maiore intervallo fiant. Sed ex iis quæ postea apparent, indicia sumuntur, velut in pleuritide, sputum si statim initio appareat, brevem fore denuntiat, si verò posterius conspiciatur, longam, quin etiam vrinæ, alvi fæces, sudores, & iudicatu faciles, aut difficiles, & breves, aut longos morbos fore, quum superveniunt, demonstrant, aph. 12. sec. 1.

Ieiunium senes non decrepiti ferunt facillimè, secundum hos qui constantem ætatem agunt, minùs adolescentes, minimè omnium pueri, atque inter eos maximè qui ætiorè sunt, & vividiorè ingenio præditi, aph. 13.

aph. 13. sec. 1.

Qui crescunt nativum calidum habent plurimum, copioso itaque cum egeant alimento abunde ipsis suppeditate oportet, alioqui corpus consumitur. In senibus verò inest calidi parum, paucis propterea succendiculis egent; siquidem multis extinguitur. Ob eandem causam, nec senibus febres perinde acutæ fiant, frigidum enim eorum corpus, aph. 14. sec. 1.

Ventres hieme, ac vere natura calidissimi & somni longissimi. Per ea igitur tempora plus cibi dare oportet, siquidem plus nativi caloris habent, quo fit vt copiosiore alimento egeant. Argumento sunt ætates & athletæ, aph. 15. sect. 1.

Victus humidus cum febricitantibus omnibus utilis, tum pueris maximè, atque aliis qui tali victu vti consueverunt, aphor. 16. sect. 1.

Quibus etiam semelne an bis & plus, minùsve & gradatim præbere cibum conveniat, spectandum. Dandum etenim aliquid temporis, regioni, ætati, & consuetudini, aph. 17. sect. 1.

Æstate & autumno cibi copiam ferunt difficillimè, hyeme facillimè, vere minùs, aph. 18. sect. 1.

Quibus per statos circuitus accessiones fiunt, nihil dare, nec cogere, sed demere ante iudicationes, aph. 19. sec. 1.



Quæ longo tempore extenuata sunt corpora sensim reficere oportet, quæ verò brevi, breviter, aph. 7. sec.

Impura corpora quo magis nutriveris, eo magis læseris, aph. 10. sec. 2.

Facilius est potu refici quam cibo, aph. 11.

Vide cibum

### VISVS.

Vide odorem.

### VITILIGINES.

Vide impetigines.

### VIGILIA.

Vide convulsionem.

### VITA.

Vide crifim.

### VER.

Vide tempus.

### VOX.

Quibus voces cum dolore deficiunt, ij tandem non sine summo cruciatu vitam cum morte commutant, 249. sec. 2. co.

Vocis defectiones cum virium exolutione ac alto sopore, quem catochon vocant, perniciem minantur, 250. sec. 2. co.

Contractæ voces post medicamenti purgantis potum considerandæ num pravæ sint. Horum plerisque tenues sudores diffiunt, & alvi humectantur, 251. sec. 2. co.

In vocis defectione respiratio veluti iis qui suffocantur conspicuè elata, & visui exposita, perniciem minatur: animadvertendum

dum etiam est num delirium prænuntiet, 252. sec. 2. co. Idem repetit, 25. lib. 1. præd.

Vocis defectiones rigore subinde correptis lethales, fereque in capitis dolores consistari solent, 255. sec. 2. co.

Vocis defectiones cum virium exolutione in acuta febre sine sudore, sunt quidem lethales, cum sudore verò, minùs, ac temporis diurnitas significatur. Ac fortasse quidem quibus ex morbi reversione tale quid contingit securissimè habent, ex iis autem maximè in periculo versantur quibus sanguis ex naribus profuit, & alvi effunduntur, 256. sec. 2. co.

Vox acuta ejulabunda ac oculorum hebetudo convulsionem minatur, his dolores ad inferiores partes demissi, toleratu sunt faciles, 257. sec. 2. co.

Crebræ, & quæ cum sopore quodam consistant vocis defectiones, tabem denuntiant, 259. sec. 2. co.

Quos vox cum febre, & absque vlla iudicatione deficit, ii tremuli, 247. sec. 2. co.

Vocis defectiones in febre quæ convulsionis speciem præ se ferunt, & in mentis emotionem cum silentio desinunt, perniciem ostentant, 248. sec. 2. co. Idem repetit, 54. l. 1. præd.

Quæ ex rigore fiunt vocis defectiones, tremore solvantur atque eos qui subinde novo rigore corripiuntur succedentes tremo-



res judicant. 27. sec. 2. co.

Quibus vox in morbis acuta redditur, iis præcordia intrò trahuntur, & tendunt, 45. l. 1. prædict.

Vox acuta & stridula, malo est, 47. l. 1. præd.

Vbi post vomitum anxiosum vox stridula est, oculi squalidi, & pulvere obfusi, insaniam portenditur, non secus ac Hermorygæ conjugii accidit, quæ vehementi insaniam correpta, voce defecta interiit, 17. sec. 2. præd.

Vocis defectiones cum singultu pessimæ, 23. sec. 2. l. 1. præd.

Vocis defectiones cum virium exolutione pessimæ, 24. l. 1. præd.

Vide convulsionem.

### VOMITVS.

Qui sanguinem vomunt, si sine febre accidat, salutare est; si cum febre malum, curatio verò refrigerandi, & abstergendi viri habentibus perficitur, aph. 37. sec. 7.

Vomitus virulenti, & æruginosi in capitis doloribus cum surditate, & insomnia, promptam insaniam significant, 169. sec. 2. co. Idem repetit. 10. l. 1. præd.

Vomitio maximè est innoxia, quæ pituita & bile permixta est, dum ne admodum copiosa sit. At syncieriores vomitiones deteriores sunt. Viridis quoque vomitus & niger, & lividus, vitiosus est; quod si omnes colores idem vomat, exitiale est. Celerrimum

autem exitium indicat lividus, & mali odoris: mortem quoque adfert ruber vomitus, adque præcipuè si cum majore conatu, & dolore contingat, 556. sec. 2. co.

Vomitiones exiguæ, biliosæ, malum denunciant, cum verò præcipuè si pervigilio conflitentur ægri, 558. sec. 2. co.

Vomitus parvi, & frequenter repetentes, beliosi, synceri, mali sunt in copiosa ventris subductione, & intenso lumborum dolore, 560. sec. 2. co.

Vbi ex vomitu anxietudo occupat, vox stridula est, oculi pulvere obfusi, insaniam portenditur, ac tales vehementi insaniam correpti voce defecti intereunt, 561. sec. 2. co.

In vomitu eum qui siti prematur sitis experrem esse, malum est, 562. sec. 2. co.

Crebrò repetentes iisdem perseverantibus casibus vomitiones, ad judicationem nigra vomitione refundunt, quin etiam tremulos ægros faciunt, 571. l. 2. co.

Vomitiones variæ malæ sunt, præsertim si continentes, & assiduæ prodierint, 60. l. 1. præd.

Vomitiones synceræ, & cum angore aut incontinenti corporis jactatione, damnandæ sunt, 62. sec. 2. l. 1. præd.

Vomitiones exiguæ, biliosæ malæ sunt, tum verò potissimum si pervigilio conflitentur ægri, in quibus stillans nasus perniciem minatur, 79. sec. 2. l. 1. prædict.



A sanguinis vomitione tabes & puris sup-  
pennè purgatio, aph. 78. sec. 2.

Vomitus perquam est utilis qui bilem pi-  
tuitæ, quàm maximè permixtam habet, ac  
neque admodum crassus est, neque multus.  
Qui enim sinceriores, pejores sunt. Si ve-  
rò quod vomitione rejicitur porrum colore  
referat, aut lividum aut nigrum fuerit, quil-  
quis horum colorum adfuerit, prauus existi-  
mandus est. Quod si eodem vomitu omnes  
hi colores rejiciantur, id exitiale est admo-  
dum. At liuidus vomitus si graviter olet,  
celerrimam mortem denuntiat ex l. præno-  
tiorum.

Bilis vomitus vulnere succedens malum  
denuntiat, præcipueque in capitis vulneribus,  
507. sec. 2. co.

Qui spumantem sanguinem evomunt  
partibus infra septum transversum dolorem  
nequaquam sentientibus, iis ex pulmone  
vomitio. At quibus quidem insignis in eo-  
venæ ruptio fit, copiosius vomitione rejici-  
tur periculumque imminet. Quibus verò  
minor, minus rejiciunt, & majorem sanita-  
tem promittunt, 433. sec. 2. co.

Qui sanguinem evomunt cum febre mul-  
ta, dolore ad mammam, thoracem, & dor-  
sum, quibus, inquam, hæc insunt omnia, ii  
brevis moriuntur, quibus autem non omnia,  
neque intensè adsunt, tardius, ad summum  
autem diebus 14. inflammationem conci-  
piunt,

piunt, 426. sect. 2. co.

Mulieri sanguinem evomentis menstruis  
erumpentibus solutio fit, aph. 32. sec. 5.

Vide alvum, dysenteriam, excrementa, hæ-  
morrhagiam, tabem, sanguinem.

### VVLNVS & VLVVS.

Vbi febricitanti fauces exulcerantur, si  
aliunde quoque ex grauioribus signis ali-  
quod affuerit, periculum denuntiandum est,  
276. sec. 2. co.

Qui ex vulnere subinde rigentes sangui-  
nem profundunt, ii malignè habent ac in-  
ter loquendum derepente moriuntur, 328.  
sec. 2. l. 2. co.

In tenuibus intestinis si quod dissectum  
fuerit, non coalescit, 502. sec. 2. co.

Serpentia oris ulcera in prægnantibus bo-  
no non sunt, ac fortè etiam alvi humectan-  
tur, 514. sec. 2. co. Idem repetit, 544.

In uterum jam gerentibus, fluxiones ser-  
pentina oris ulcera cum dolore excitantes ma-  
lum denunciant, in iis sanguinis per ora ve-  
narum profluvium pessimum. 529. sec. 2. co.

Si in magnis vulneribus & pravis, tumor  
non appareat, ingens malum, aph. 66.  
sec. 5.

Circumglabra ulcera, maligna, aph. 4.  
sec. 6

Aqua inter cutem laborantibus exorta in  
corpore ulcera non facilè sanantur, aph. 8.  
sec. 6



Si vlcera annua, aut etiam diuturniora fiant, os abscedere necesse est, & cicatrices cavas fieri, aph. 45. sec. 6.

Vulnere in thorace accepto, si quidem externa vulneris pars sanitatem receperit, interna verò nequaquam, suppurationis periculum impendit, quibus autem interni vulneris cicatrix debilis effecta est, promptè rescinditur. 430. sec. 2. co.

Quibus ex vulnere corporis impotentia accidit, si quidem febre citra rigorem oborta sani evadunt, altoqui dextra aut sinistra parte syderantur, 477. sec. 2. l. 2. co.

Vlcus lividum, & aridum aut pallidum effectum, mortem indicat, 496. sec. 2. co.

Ex cerebri vulnere febris ut plurimum ac bilis vomitus succedit, & corporis resolutio, utque perniciosè habent, 500. sec. 2. l. 2. co.

Serpentia vlcera supra inguina ad laterum inanitatem, ad pubem enata, male affectam alvum denunciant, 628. sec. 2. co.

Ex vulnere autem ferè mors contingit, si cui vulneratum fuerit cerebrum aut spinalis medulla, aut jecur, aut septum transversum, vel cor, aut vesica aut quædam grandis vena. Mors quoque subit, si in arteriam & pulmones insignes valde plagæ confictæ sunt, ita ut percusso pulmone minor sit qui per os prodit spiritus quàm qui per venas excidit. Intereunt verò quibus nervi interiores, sive tenuis

tenuis aliquis sive crassus vulnus acceperit. Si plaga transversa fuerit, & magna; quòd si parva, & recta, nonnulli periculo eximuntur. Minimè verò ab his vulneribus mors impendit quæ in corporis partes, in quibus hæc non sunt, aut ab his quàm longissimè ab sunt, infliguntur. 509. sec. 2. co.

At in vulneribus quæ in lupercilium, aut paulo altius inferuntur, visus acies obrunditur; at quo vulnus recentius est, eo magis vident, inveterascente autem aut tardante cicatrice magis obrundi solent, 510. sec. 2. co.

Ab ossis vulnere desipientia, si in vacuum usque penetraverit, aph. 24. sec. 7.

Vlcera qui nosse volet qualem quæque exitum habitura sint, is imprimis quidem hominum naturas animadvertere debet, quænam ad vlcera melius, quænam etiam deterius affectæ sunt, deinde ætates in quibus sua cuiusque generis vlcera non faciliè proficiantur. Locos etiam corporis in considerationem adhibere, quantum alii aliis præstent. At præcipuè quænam horum quique bona, malæ accedunt nosse debet. His si quidem omnibus cognitis, quænam cuiusque eventu futura sint faciliè assequetur, neque existimandum est enim qui hæc non cognoverit quinam futuri sint vlcerum exitus perspicere posse, corporis autem naturæ probandæ sunt, leves moderatæ, firmis vis-



ceribus, præditæ, neque admodum carnosæ, neque duræ, tum quæ colore sunt albo, aut nigro, aut rubro, hæc etenim omnes probantur si puræ sunt. Deterius est, si ex pallido mixtum, aut lividum, aut pallidum colorem habeant. Quæ verò naturæ supra positis adversantur, eas deteriores esse constat, ex l. 2. præd.

Vlcus sive ante morbum, sive in morbo natum sit, nosse oportet. Nam si periturus æger est, ante mortem, lividum & siccum, aut pallidum & siccum erit, ex l. prænot.

Vide convulsionem.

### VMBILICVM.

Vide dolores umbilici.

### VRINA.

Quibus non sine febre vrinæ sunt crassæ, grumosæ, & pauca, si ab his tenues & copiosæ meiantur, profunt; maximè verò tales redduntur in quibus statim ab initio, vel non ita multò post sedimentum apparuerit, aph. 69. sect. 4.

Vrinæ tenues nubeculam quandam in medio assumentes rigorem denuntiant, 532. sec. 2. co.

Quibus per febres vrinæ turbatæ quales jumentorum, iis dolor capitis, vel adest, vel aderit, aph. 70. sec. 4.

Quibus die 7. futura crisis est, iis vrina rubram die 4. nubeculam habet cæteraque pro

ratio-

ratione, aph. 71. sec. 4.

Quibus pellucidæ & albæ sunt urinæ malæ, maximè verò si in phreniticis appareant, aph. 72. sec. 4.

Vbi spes est ad articulos abscessum iri, abscessu liberat urina crassa, & alba reddita, quales in febribus laboriosis 4. die quibusdam exire incipit, quòd si ex naribus etiam sanguis proflexerit, brevi admodum solutio fit, aph. 74. sec. 4.

Quibus cum urina crassa exiguæ carunculae aut veluti pili exeunt, his à renibus excernitur, aph. 76. sect. 4.

Quibus cum urina crassa surfaracea quædam exeunt, his vesica scabie laborat, aph. 77. sect. 4.

Si quis sanguinem aut grumos meiat, aut urinam guttatim emitrat, dolore ad hypogastrium & perinæum pertinente, ad vesicam loca laborant, aphor. 80. sect. 4.

Si quis sanguinem aut pus, aut squamulas meiat, & gravis odor adfit, vesicæ ulceratio significatur, aph. 81. sec. 4.

Mictus noctu plurimus parvam dejectionem significat, aph. 83. sec. 4.

Difficultatem urinæ phlebotomia solvit, secare verò interiores, aph. 36. sec. 6.

Quibus per febres in urinis sedimenta crassiora referunt, longam in valetudinem fore significat, aph. 31. sect. 7.

Quibus in urinis biliosa sedimenta, sed su-



pra tenuia apparuerint , acutum morbum significat, aphor. 32. sec. 7.

Quibus diversæ sunt urinæ , iis vehemens fit in corpore turbatio, aph. 33. sec. 7.

Quibus in urinis bullæ inpatant , nephritim & longam fore invaletudinem significant, aph. 34. sec. 7.

Si quis sanguinem & grumos meiat , & stranguria laboret, dolore ad hypogastrium, & perinæum pertinente , ad vesicam loca laborant, apho. 80. sec. 4.

Urinæ quæ cum rigore restitarunt, malum & convulsionem prænunciant, tum verò præcipuè si antea alto sopore æger detentus fuerit, in his autem abscessus ad aures sperare oportet, 25. sec. 2. co.

In tumoribus ad aures urinæ celeriter ac paulo tempore concoctæ damno sunt, & perfrigerari, itidem malum, 205. sect. 2. coac. Idem repetit, 153. lib. 1. sec. 2. prædict. Idem repetit, 587. sec. 2. l. 2. co.

Si quis sanguinem, aut pus meiat, renum aut vesicæ exulceratio significatur, apho. 75. sect. 4.

Urinarum in præcipitibus malis ex perfrictione interceptiones pessimæ, 51. sect. 2. lib. 1. prædict.

Quin & laboriosæ urinæ damnantur, atque ab his detentæ rubræ quædam efflorescentiæ, & æruginosæ, parvæque veluti quædam stillæ apparentes, 59. sec. 2. lib. 2. præd.

Quibus

Quibus manus sunt tremulæ cum capitis & cervicis dolore, levi aliqua surditate affecti nigricantes reddunt urinas, & densas, in his calibus nigrorum progressum expectare, & suspectum habere oportet, 95. sect. 2. l. 2. præd.

Urinæ quæ cum rigore restitant, damno sunt, idque præsertim, si altus sopor prægressus; animadvertendum est, num in his abscessus ad aures sperare oporteat, 155. sect. 2. libro 1. prædict.

Si quibus urinæ non recordantibus, nec admonitis effluunt, perniciosis portenditur; animadvertendum etiam est, num & ab his tales redduntur, quales fiunt, ubi subsidentiam conturbaveris, 19. sect. 2. l. 2. prædict.

Urinam autem copia potui respondentem reddere oportet, & semper æqualem, & quàm maximè effusam, & ad paulo crassius inclinantem, quàm quod potu sumptum est. Quod si diluta fuerit, & copia major quàm quod potui sit assignatum, hominem dicto non audientem significat, sed abundantiore uti potu, aut non posse nutritionem accipere quandiu talis urina reddetur. Si verò paulatim cum stridore urina miratur, aut medicamenti potione hominem indigere, aut vesicam quodammodo malè affectam denuntiat. At sanguinis mixtus rarus quidem & sine febre ac dolore nihil mali indicat; verùm lassitudinum sensus solvitur. Quòd si

K 3



sæpius mictu reddatur, aut horum aliquid accesserit, periculum minatur. At prædicendum est, siue cum dolore, siue cum febre, mictu reddatur, pus insuper per urinam effluxurum, atq; eo pacto dolores tolli: urina verò crassa in qua quod subsidet album est, articularum dolorem aut tumorem denunciat. Quæ autem sunt reliquæ sedimenta in urinis eorum qui exercentur, ea omnia à morbis sunt qui circa vesicam affligunt; quod manifestum faciunt dolores qui aderunt, & à quibus vix liberari queant, ex lib. 2. prædict.

Vrina optima est in qua per omne tempus quoad morbus iudicatus fuerit, subsidet album, læve & æquale. Securitatem enim brevemque morbum fore significat, quod si intermittat & interdum quidem pura meiatur, interdum etiam subsidet album, & læve, diuturnior, & minus securus morbus evadit. At urina subrubra, simulque quod subsidet, & læve, hæc longè quidem diuturnior quam prima sit, valde tamen salutaris. Sedimenta autem in urinis crassiora hordei tostii non exactè moliti partes referentia, prava sunt, hisque pejora laminis similia; alba verò, & tenuia valde prava; atque his etiam deteriora suffuracea. Nubeculæ quæ per urinas feruntur, albæ quidem bonæ, nigre verò malæ sunt: quod autem urina fulva fuerit, & tenuis, crudum esse morbum indicat. Quod si diutius talis urina perseveret, periculum

culum est ne non possit æger sufficere quoad urina coquatur. At exitiosiores sunt urinae fetidæ, & aquosæ, & nigre & crassæ. Ad hæc in viris quidem & mulieribus urine nigre in pueris aquosæ deterrimæ. Quibus tenues, & crudæ multo tempore redduntur, si reliqua signa salutaria sunt, in his abscessus ad loca infra septum transversum expectari debet. Quin etiam pinguedines supra innatantes araneorum telas referentes, damnare oportet, colliquationem namque significant. In urinis autem quæ nubeculas habent, considerandum venit, an supernè, an infernè ferantur, & quosnam habeant colores, & quæ quidem deorsum feruntur, cum dictis coloribus bonæ censendæ, & commendandæ: at quæ feruntur sursum malæ, & vituperandæ. Neque verò tibi imponat vesica quoquo modo affecta si huiusmodi urinas reddiderit, non etiam totius corporis, sed ipsius per se indicium est, ex lib. 2. prænot.

Quibus incogitantibus urina decidit, ac pendulum contrahitur, ii desperari sunt, 474. sec. 2. co.

Quibus in urina adipalis superficies est & conferta, iis nephritim & acutum morbum adesse significat, aph. 35. sec. 7.

Vinarum ex pruritione interceptiones, pessimæ, 5. sec. 2. h. 2. co.

Procedente morbo surditas, ac urina subrubra cum nullo sedimento, sed cum sublima-



mentis in medio innatantibus, mentis emotionem prænuntiant. In his morbo regio corripit malum est, quin etiam malo est, ex morbo regio fatuitas. Hos voce defetos absque sensuum læsione præfocari contingit, ac fortassis etiam in his alvus male afficitur, 198. sec. 2. co.

Tenuioris intestini morbus urinæ stillicidio succedens intra 7. diem interimit, nisi suborta febre urina affatim prodierit, 475. sec. 2. l. 2. co.

Urina in febre album & læve depositum habens sedimentum, celerem liberationem denuntiat. Celerem quoque quæ diluta indiscretam quandam habent pinguedinem: Quæ vero aliquantulum rubet, subrubrum habet sedimentum, & læve, siquidem ante 7. diem appareat, 7 die solutionem fieri designat, post septimum autem tardiozem aut planè diuturnam. Et quæ quarta die subrubram nubeculam capit, 7. liberat, dum reliqua pro ratione habeant: tenuis autem & biliosa, & agrè lentum habens sedimentum, & quæ in melius ac deterius commutatur, temporis diuturnitatem postulat. Quòd si istud diutius perseverat, aut ad iudicationem temporis longinquitas requiratur, periculo non vacat, 575. l. 2. co.

Diluta verò & alba in diuturnis morbis perseverans difficilem & non securam iudicationem facit, 576. sec. 2. co.

In urinis nubeculæ, albæ quidem, & quæ infimum locum tenent, utiles sunt, rubræ verò nigra, ac livide molestiam exhibent, 577. sec. 2. co.

In præcipitibus morbis periculum denuntiat urina biliosa, neque aliquantulum rubra, & quæ hordei tosti, non exactè moliti crassioribus frustulis similia habet sedimenta alba, & quæ colore, ac sedimento variat, præcipueque in iis quæ ex capite sunt defluxionibus, perniciem etiam præ se fert, quæ ex nigra in biliosam tenuem transit, & quæ sedimentum habet divulsam, quæque ex his quæ densata per urinam feruntur, quod subsidet habet aliquantulum livescens & limosum. Ac fortasse ex his quidem præcordia dextra dolor occupat, aut ex virore pallescant, aut abscessus ad aures cum dolore excitantur, in his paulo post effusa alvus periculum denuntiat, 578.

Urinæ derepente præter rationem parum concoctæ, vitiosæ sunt, ac in totum quæ in morbo acuto urina præter rationem cocta est vitium denotat. In his quoque est prærubra efflorescentia contenta atque æruginosa. Alba verò effusa, & perspicua urina mala est, præcipue in phreniticis apparens, mala quoque quæ post potionem celeriter meitur, præsertimque in lateris doloribus, & pulmonis inflammationibus. Mala etiam quæ ante rigorem oleosa redditur. Mala



quoque & in acutis morbis & quæ ex viridi pallescunt, nec in colore persistunt, 579. sec. 2. co.

Perniciem verò indicat vrina, in qua nigrum est quod subsidet & quæ nigra est. In pueris etiam potius tenuis quam crassa, (in tenuibus autem contrà quàm in commutatis vrinis accidit) & quæ grandinem refert, & genituræ similis effunditur, item quæ dolorem exhibet. Perniciosa quoque est quæcunque ægro inscio redditur. At in pulmonum inflammationibus periculum indicat, quæ initio concoctionem habet, verum post quartum diem tenuis evadit, 580. sec. 2. co.

In laterum doloribus vrina cruenta, obscura, cum eo quod subsidet vario & indifcreto, vt plurimum in quatuordecim diebus mortem adfert. Laterum quoque dolore affectis in propinquo mortem esse significat. Quæ viridis nigrum habet sedimentum; aut fuscis simile: febre verò ardente cum alto stupore (quem catochon dicunt) dectentis, ex albida vrina pessima est, 581. sec. 2. co.

Vrina cruda quæ sic diu perseverat vt reliqua signa salubria sunt, abscessum & dolorem, præcipueque infra septum transversum denuntiat. Doloribus verò ad lumbos oberrantibus, ad coxam idque in febre, & sine febre. At quæ emittitur vrina in qua quod subsidet pinguedinem habet, febrem significat.

significat. Cruenta verò circa initia red-dita, morbi diuturnitatem. Returbida quoque, cum sudore morbi reversionem. Aibâ autem qualis in vterino genere redditur, capitis dolorem, membranosa convulsionem. Quæ verò sputo similia habet sedimenta, aut limosa, rigorem denuntiat, quæ araneorum telis similia quædam habet, colliquationem. At in errantibus febribus, nigræ nubeculæ quartanam denuntiant. Decolores autem vrinæ suspensa quædam in medio nigra habentes, cum pervigilio, & perturbatione phreniticam, cineritiæ verò cum spirandi difficultate, aquam intercutem, 582. sect. 2. co.

Vrina diluta, aut arenida, & facile dissolubili asperitate returbata, liquidam fore alvum denuntiat, quæ verò admodum tenuis, spissa evadit, fortasse erupturum sudorem indicat, jam autem erupisse quæ spumam in seipsam insidentem habet, 583. sec. 2. co.

In tertianis, cum horrore nubeculis nigris similia, inconstantem horrorem indicant. Membranosæ quoque mictiones, & quæ cum horrore subsidunt, convulsionem prædicunt, 584. sec. 2. l. 2. co.

Vrina in qua quod subsidet bonum est, & repente evanescit, dolorem ac mutationem denuntiat. At quæ sedimentum habet returbida residens, rigorem circa indicationem, fortè etiam & in tertianam aut quarta-



nam transcurum, 585. sec. 2. l. 2. co.

Laterum dolore affectis vrina aliquantulum rubra lavem habens subsidentiam, securam iudicationem prænuntiat, quæ verò aliquantulum pallida, bene florulenta est, & albam habet subsidentiam, celerem quoque. At quæ admodum rubra, & bene florulenta sedimentum pallidum, læve ac purum habet, diuturnum, valdeque turbulentum morbum fore, & in alium transcurum, non tamen perniciosum. Alba verò diluta hordei tosti non exactè moliti crassioribus frustulis simile habens sedimentum fulvum, dolorem & periculum denuntiat. At quæ pallida fulvum habet sedimentum hordei tosti non exactè moliti crassioribus frustulis simile, diuturnitatem ac periculum indicat, 586. sec. 2. co.

Fabricitanti vrina densitatem habens, divulsam morbi reversionem aut sudorem portendit, 593. sec. 2. co.

In febribus longis, parvis, vagis, tenuium vrinarum ejectiones, lenis affectionem denuntiant, 594. sec. 2. co.

In febre variarum interdum vrinarum mictiones, morbum producunt, 595. sect. 2. coac.

Vrinæ quæ non sentientibus effluunt aliàs perniciem denuntiant. Animadvertendum tales his reddantur quales sunt vbi subsidentiam conturbaveris, 596. sec. 2. co.

Qui-

Quibus vrinæ paucæ, grumosæ, non sine febre, si ab iis tenues & copiosæ prodierint, juvat, talibus autem circa initia procedunt, aut non multo post sedimentum habent, 597. sec. 2. co.

Quibus in vrinis citò aliquid subsidet hi brevi iudicantur, 598. sec. 2. co.

Vrinæ præter consuetudinem tenues, & crudæ, absque repletionem in morbo comitiali obnoxiiis, morbi insultum denuntiant, idque præcipue si in summum humerum, aut cervicem, aut dorsum dolor, aut convulsio incidat, aut torpor totum corpus occupet, aut turbulentum insomnium visum fuerit, 599. sec. 2. co.

Quæ parva copia apparent, velut stillæ sanguinis vrinæ vomitiones & dejectiones, malum quidem penitus denuntiant, pessimum verò si exiguis intervallis sese consequantur, 600. sec. 2. l. 2. co.

Vrina intercepta, & ad imum ventrem pondus, vt plurimum futurum vrinæ stillidium denuntiat, si minus, alvum aliquem morbum ex consuetudine affigentem, 591. sec. 2. co.

Vide abscessum, convulsionem, dolorem, surditatem, alvi excrementa, hydropem.

## VESICA.

Vesica intercepta maxime quæ cum capitis dolore convulsionem quandam minatur,



quæ in his cum torporis sensu exolvuntur, molestiam, non perniciem afferunt, ac fortè aliquantulum desipiunt, §28. sec. 2. co.

Vesica, & graviter dolens omnino quidem mala est, pessima verò si febris continua accesserit (vesicæ namque dolores interimendi vim obtinent) & alvus his nihil admodum reddit, hos autem metu liberat vrina purulenta procedens, in qua album & læve subsidet: Quòd si neque hæc lavata fuerint, neque vesica mollior reddatur, intra primos circuitus laborantem moriturum expectandum est. Hoc verò pueris à 7. anno ad 15. præcipuè contingere solet, 471. sect. 2. coac.

Vesica intercepta cum capitis dolore convulsionem minatur, quæ in his cum torporis sensu exolvuntur, molestiam exhibent, non tamen perniciem adferunt, videndumque est, num tale quid etiam mentem excutit, 120. l. 2. prædict.

Vide sectionem.

### VISVS.

Vide dolorem.

### VITILIGINES.

Vide impetigines.

### VITA.

Vide crissim.

VTE.

### VTERVS.

Quibus vteri os durum est, iis arctetur necesse est, aphor. §4. sec. 5.

Vterinæ ventris duritates cum dolore celerem perniciem denuntiant, §28. sect. 2. coac.

Vide dolores vteri.

FINIS.





