

Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych

dla

**Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem
Krakowskiem.**

Rok 1879.

Wydano i rozesłano dnia 11. Marca 1879.

Część IV.

Nr. 43.

Rozporządzenie

**c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 10. Grudnia 1878 l. 16.442
o wydaniu zmienionego cennika leków objętych szóstym wydaniem austryackiej farmakopei i dodatkiem też, wydanem rozporządzeniem z 10. Grudnia 1878 l. 16.442.**

Poniżej umieszczony zmieniony cennik leków obowiązuje z dniem 1. Stycznia 1879. r.

Rozporządzenie c. k. Ministra spraw wewnętrznych z dnia 28. Października 1876 Dz. u. p. Nr. 135, którem wydano austryacki cennik leków, obowiązuje zresztą nadal. Postanowienie §fu 2. tegoż, dotyczące artykułów oznaczonych krzyżykiem, odnosi się i do podobnych artykułów objętych tak wyżej wspomnianym dodatkiem do farmakopei, jakoteż i zmienionym cennikiem leków.

Wszyscy aptekarze, tudzież lekarze i chirurdzy upoważnieni do utrzymywania domowej apteki, winni zaopatrzyć się w drukowany egzemplarz tego zmienionego cennika leków.

Auersperg, w. r.

R O Z P O R Z A D Z E N I E

c. k. Ministra spraw wewnętrznych z dnia 28. Października 1876 r., o nowym austryackim cenniku lekarstw.

O załączonym nowym austryackim cenniku lekarstw wydaje się następujące postanowienia :

§. 1.

Wszyscy aptekarze bez wyjątku tudzież uprawnieni do utrzymywania domowej apteki lekarze i chirurgowie mają, począwszy od 1. Stycznia 1877 r. stosować się do tego nowego cennika lekarstw.

§. 2.

Artykuły, które w tym cenniku i w nowej farmakopei zaprowadzonej reskryptem z d. 15. Maja 1869 r. Dz. u. p. Nr. 77, oznaczone są krzyżykiem, mogą być wydawane tylko w skutek zwyczajnej ordynacyi uprawnionego w tej mierze lekarza, chirurga lub weterynarza.

§. 3.

Przy przyrządzaniu i wydawaniu lekarstw, wskazówki lekarskiej recepty powinny być we wszystkich szczegółach dokładnie przestrzegane.

Recepty jednak, w której przepisane w dodatku (str. 87) dawki maksymalne pewnego środka leczniczego przekroczone zostały, mogą być ekspedyowane w sposób ordynacyą wskazany tylko w takim razie, jeżeli do oznaczonej wagi dodany został przez lekarza wykrzyknik w nawiasie (!).

§. 4.

Przy obliczeniu ceny materiałów leczniczych, nie zawartych w farmakopei, krajowe władze polityczne postępuwać mają według tych samych zasad, według których oznaczoną bywa cena dla materiałów leczniczych zawartych w farmakopei.

§. 5.

Pijawki nie mają być uważane za przedmiot leczniczy. Cenę pijawek oznaczać będzie jak dotąd od czasu do czasu dla każdego kraju koronnego naczelnik tegoż kraju.

Od ceny tej nie będzie potrącony procent tym rachunkozdawcom, którzy na koszt funduszów publicznych lekarstw dostarczają.

Wszyscy aptekarze są obowiązani mieć zapas pijawek.

§. 6.

Nie mogą być ekspedyowane recepty z przypiskiem „secundum meam praescriptionem“ lub z inną podobną uwagą, któraby wskazywała na tajemnicę lub na porozumienie z lekarzem.

§. 7.

Jeżeli na receptce znajduje się przypisek „fiat expeditio simplex“, aptekarzowi wolno policzyć tylko naczynia, które w cenniku jako najtańsze są oznaczone.

§. 8.

Przy wydawaniu artykułów o jednej cenie, takowa ma być do każdej ilości zastosowaną; co do artykułów zaś z dwojakiemi cenami należy podług ceny niższej obliczać dopiero przy wydawaniu większej ilości.

Jeżeli jednak wskutek kilkakrotnego policzenia ceny przepisanej za dawki mniejszej wagi przekroczoną zostaje niższa cena dla większej ilości, to w takim razie ostatnia cena ma być zastosowaną, tak, że n. p. za 9 gramów jodu przypadnie cena nie 63 ct. lecz tylko 60 ct.

§. 9.

Na każdej receptce, według której w publicznej lub domowej aptece lekarstwo zostało sporządzone i wydane, ma być należytość dokładnie cyframi napisaną. Na receptach płatnych z funduszków publicznych i na żądanie stron ma być osobno oznaczona cena za materiały, za robotę i naczynia.

Jeżeli należytość w receptce nie dosięga jednego centa, może być za cały cent policzona. Jeżeli zaś za pewien artykuł oprócz jednego lub więcej centów przypada jeszcze do wypłaty ułamkowa część centa, to w takim razie ułamkowa część poniżej 0.5 ma być całkiem opuszczona, a część ułamkowa wynosząca 0.5 lub więcej, może być za cały cent policzona.

Za aqua communis w jakiegokolwiek ilości można policzyć jeden cent z wyjątkiem wypadków, jeżeli jest użyta do odwarów lub nalewów.

Aptekarz, który oznaczył cenę lekarstwa, powinien oznaczyć na receptce oprócz ceny także firmę apteki; a ten, który lekarstwo wydaje, powinien zawsze na sygnaturze umieścić datę ekspedycyi.

§. 10.

Jeżeli recepty zapisane są według dawniejszej wagi lekarskiej, przemiana nastąpić ma według poniżej podanej tabeli :

| Wagę | należy zmienić na centigramy |
|---------------------------------|------------------------------|
| $\frac{1}{3}$ grana . . . | 0·02 . . . (2) |
| $\frac{1}{2}$ " . . . | 0·04 . . . (4) |
| 1 " . . . | 0·07 . . . (7) |
| 2 granów . . . | 0·15 . . . (15) |
| 3 " . . . | 0·20 . . . (20) |
| 4 " . . . | 0·30 . . . (30) |
| 5 " . . . | 0·35 . . . (35) |
| 6 " . . . | 0·40 . . . (40) |
| 7 " . . . | 0·50 . . . (50) |
| 8 " . . . | 0·55 . . . (55) |
| 9 " . . . | 0·60 . . . (60) |
| 10 " . . . | 0·70 . . . (70) |
| 12 " . . . | 0·90 . . . (90) |
| 14 " . . . | 1·00 (1 gramm) . — |
| 15 " . . . | 1·05 (1 " . 5) |
| 16 " . . . | 1·10 (1 " . 10) |
| 18 " . . . | 1·25 (1 " . 25) |
| 20 " (1 skrupuła) . | 1·50 (1 " . 50) |
| 30 " ($\frac{1}{2}$ drachmy) . | 2·20 (2 " . 20) |
| 40 " (2 skrupułów) . | 3·00 (3 ") . — |
| 60 " (1 drachma) . | 4·50 (4 " . 50) |
| 120 " (2 drachm) . | 9·00 (9 ") . — |
| 180 " (3 drachm) . | 13·50 (13 " . 50) |
| 240 " ($\frac{1}{2}$ uncyi) . | 17·50 (17 " . 50) |
| 480 " (1 uncya) . | 35·00 (35 ") . — |

§. 11.

Lekarstwa wolno wydawać za ceny niższe od taksy; jednak w takim razie należy na receptcie oznaczyć cyframi tak należytość według cennika przypadającą jak i należytość dobrowolnie zniżoną.

Jednakże lekarstwa wydane za cenę niższą od taksy, powinny posiadać takie przymioty i powinny być tak prawdziwe i czyste, jak farmakopea przepisuje; także co do wagi nie wolno czynić ujemy.

§. 12.

Lekarze i chirurdowie uprawnieni do utrzymywania aptek domowych i przyrządów na wypadki naglące, mają sprowadzać potrzebne przetwory chemiczne i złożone środki lecznicze tylko od aptekarzy i wykazać się w tej mierze osobnemi książeczkami odbioru. W książeczkach tych mają być nazwiska i waga lekarstwa, tudzież czas sprowadzenia dokładnie wyrażone i podpisem aptekarza stwierdzone.

Zniżenie ceny pozostawia się w takim przypadku obopólnej ugodzie.

§. 13.

Co do lekarstw dla zwierząt, ma być zastosowany cennik na końcu podany.

Za czynności receptowe i za naczynia wolno przy wydawaniu lekarstw dla zwierząt zastosować ten sam cennik, który obowiązuje co do lekarstw dla ludzi.

§. 14.

Każde przekroczenie powyższych przepisów, podpada o ile nie może być zastosowana ogólna ustawa karna, karze pieniężnej do 100 złr. lub karze aresztu do 14 dni. (Rozp. minister. z 30. Września 1857 Dz. u. p. Nr. 198).

§. 15.

Istniejące oprócz tych postanowień przepisy o sprowadzaniu, utrzymywaniu i sprzedaży towarów leczniczych mają nadal obowiązywać.

Lasser, w. r.

Cennik środków leczniczych farmakopei.

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|---|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Absinthii herba sciss. | 50·0 | 5 | — | — |
| " " subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Acetum | 100·0 | 3 | — | — |
| " aromaticum | 50·0 | 6 | 250·0 | 25 |
| " pyrolignosum crud. | 100·0 | 4 | — | — |
| " " rectificat | 50·0 | 6 | 250·0 | 25 |
| " scillae | 10·0 | 1 | — | — |
| Acidum aceticum conc. | 10·0 | 5 | 50·0 | 22 |
| " " dilat. | 50·0 | 6 | 250·0 | 27 |
| † " arsenicum subt. pulv. | 0·01 | 1 | — | — |
| " benzoicum | 1·0 | 9 | — | — |
| " carbolicum | 10·0 | 6 | 50·0 | 24 |
| " chromicum | 1·0 | 4 | — | — |
| " citricum | 10·0 | 7 | — | — |
| " " subt. pulv. | 10·0 | 9 | — | — |
| " hydrochlor. conc. pur. | 10·0 | 3 | — | — |
| " " " crud. | 100·0 | 10 | — | — |
| " " " dilat. pur. | 50·0 | 9 | — | — |
| " nitricum conc. pur. | 10·0 | 2 | — | — |
| " " " crudum | 100·0 | 9 | — | — |
| " " " dilat. purum | 50·0 | 8 | — | — |
| " phosphoricum | 10·0 | 10 | — | — |
| " salicylicum | 1·0 | 4 | — | — |
| " sulfuricum anglic. | 100·0 | 6 | — | — |
| " " conc. pur. | 10·0 | 2 | — | — |
| " " " dilat. pur. | 50·0 | 5 | — | — |
| " tannicum | 5·0 | 16 | 50·0 | 140 |
| " tartaricum | 10·0 | 4 | — | — |
| " " subt. pulv. | 10·0 | 6 | 50·0 | 25 |
| † Aconitinum | 0·01 | 3 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|--------------------------------------|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| † Aconiti tubera sciss. | 10·0 | 2 | — | — |
| Aether aceticus | 10·0 | 17 | — | — |
| " crudus | 100·0 | 21 | 500·0 | 90 |
| " depuratus | 10·0 | 5 | 50·0 | 22 |
| Agaricus chirurgorum | 50·0 | 33 | — | — |
| Aloë lucida | 50·0 | 10 | — | — |
| " " subt. pulv. | 10·0 | 4 | — | — |
| Althaeae herba | 50·0 | 5 | 250·0 | 20 |
| " radix sciss. | 50·0 | 10 | 250·0 | 45 |
| " " subt. pulv. | 10·0 | 6 | — | — |
| Alumen | 50·0 | 4 | — | — |
| " subt. pulv. | 10·0 | 2 | 50·0 | 8 |
| " ustum | 50·0 | 6 | — | — |
| " subt. pulv. | 10·0 | 3 | — | — |
| Alumina hydrica | 10·0 | 29 | — | — |
| Ammonia | 50·0 | 10 | 250·0 | 40 |
| Ammoniacum | 50·0 | 12 | — | — |
| " subt pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Ammonium aceticum solut. | 10·0 | 5 | — | — |
| " carbonicum | 50·0 | 11 | — | — |
| " chloratum crudum | 50·0 | 7 | — | — |
| " " depur. | 10·0 | 3 | — | — |
| Amygdalae amarae | 50·0 | 11 | — | — |
| " dulces | 50·0 | 11 | — | — |
| Amylum pulv. | 50·0 | 8 | 250·0 | 35 |
| Angelicae rad. sciss. | 50·0 | 9 | — | — |
| " " subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Anisi stellati fructus | 50·0 | 15 | — | — |
| " " " rud. tus. | 50·0 | 21 | — | — |
| " " " subt. pulv. | 10·0 | 7 | — | — |
| " vulgaris fructus | 50·0 | 8 | — | — |
| " " " subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Apomorphin. hydrochloricum | 0·01 | 6 | — | — |
| Aqua amygd. amar. conc. | 5·0 | 2 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|---------------------------------------|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Aqua amygd. amar. diluta | 10·0 | 1 | 50·0 | 4 |
| „ aromat. spirit. | 50·0 | 6 | 250·0 | 25 |
| „ aurant. flor. | 50·0 | 21 | — | — |
| „ calcis | 100·0 | 2 | 500·0 | 6 |
| „ carminativa | 50·0 | 6 | 250·0 | 25 |
| „ chamomillae | 50·0 | 5 | 250·0 | 20 |
| „ chlori | 10·0 | 3 | 50·0 | 12 |
| „ cinnamom. simpl. | 50·0 | 5 | 250·0 | 20 |
| „ „ spirit. | 50·0 | 11 | 250·0 | 50 |
| „ destillata | 100·0 | 3 | 500·0 | 10 |
| „ foeniculi | 50·0 | 4 | — | — |
| „ kreosoti | 50·0 | 5 | 250·0 | 20 |
| „ laurocerasi | 10·0 | 5 | 50·0 | 22 |
| „ melissae | 50·0 | 6 | 250·0 | 25 |
| „ menthae pip. | 50·0 | 6 | 250·0 | 25 |
| „ plumbica | 50·0 | 5 | 250·0 | 15 |
| „ rosarum | 50·0 | 5 | 250·0 | 21 |
| „ rubi idaei | 50·0 | 5 | 250·0 | 20 |
| „ vegeto-mineralis Goulardi | 100·0 | 6 | 500·0 | 15 |
| Argentum nitricum cryst. | 1·0 | 13 | — | — |
| „ „ cum kalio-nitrico | 1·0 | 8 | — | — |
| „ „ fusum | 1·0 | 17 | 10·0 | 145 |
| Arnicae flores sciss. | 50·0 | 23 | — | — |
| „ folia | 50·0 | 5 | — | — |
| „ radix sciss. | 50·0 | 10 | — | — |
| Arrow-root | 50·0 | 16 | 250·0 | 70 |
| Asa foetida | 50·0 | 19 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 7 | — | — |
| † Atropinum sulfuricum | 0·01 | 3 | — | — |
| Aurantii cort. sciss. | 50·0 | 10 | — | — |
| „ „ flaved. sciss. | 50·0 | 36 | — | — |
| „ „ „ subt. pulv. | 10·0 | 11 | — | — |
| „ folia sciss. | 50·0 | 14 | — | — |
| Axungia porci | 50·0 | 10 | 250·0 | 45 |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|--|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Balsamum copaivae | 10·0 | 6 | — | — |
| " peruvianum | 10·0 | 17 | — | — |
| " vitae Hoffmanni | 10·0 | 7 | 50·0 | 30 |
| † Belladonnae folia sciss. | 10·0 | 2 | — | — |
| † " " gross. pulv. | 10·0 | 3 | 50·0 | 10 |
| † " " subt. pulv. | 10·0 | 4 | — | — |
| † " radix sciss. | 10·0 | 2 | — | — |
| † " " subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Benzoë | 50·0 | 30 | — | — |
| Bismuthum subnitricum | 1·0 | 7 | — | — |
| Calami rhyzoma sciss. | 50·0 | 7 | — | — |
| " " subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Calcium carbonic. nativ. | 50·0 | 2 | 250·0 | 8 |
| " " " pulv. | 50·0 | 10 | 250·0 | 45 |
| " " purum | 10·0 | 22 | — | — |
| " chloratum fusum | 50·0 | 29 | — | — |
| " hypochlorosum | 50·0 | 5 | 250·0 | 21 |
| " oxydatum | 100·0 | 4 | — | — |
| " " pulv. | 50·0 | 4 | — | — |
| " oxysulfuratum | 50·0 | 23 | — | — |
| " " solutum | 50·0 | 10 | 250·0 | 40 |
| " phosphoricum | 5·0 | 24 | — | — |
| Calumbae radix sciss. | 50·0 | 11 | — | — |
| " " subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Camphora | 50·0 | 17 | 250·0 | 69 |
| Cannabis indica sciss. | 10·0 | 3 | — | — |
| † Cantharides | 10·0 | 10 | — | — |
| † " subt. pulv. | 10·0 | 14 | — | — |
| Capilli Veneris frondes sciss. | 50·0 | 10 | — | — |
| Caragaheen sciss. | 50·0 | 10 | — | — |
| Carbo ligni depurat. subt. pulv. | 50·0 | 8 | 250·0 | 32 |
| Cardamomi sem. | 10·0 | 38 | — | — |
| Caricae sciss. | 50·0 | 10 | — | — |
| Carvi fructus | 50·0 | 7 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|---------------------------|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Carvi fructus subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Caryophylli | 50·0 | 25 | — | — |
| „ subt. pulv. | 10·0 | 9 | — | — |
| Cascarillae cort. | 50·0 | 9 | — | — |
| „ „ rud. tus. | 50·0 | 12 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Cassia fistula | 50·0 | 8 | — | — |
| Castoreum canadens | 0·10 | 1 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 0·10 | 3 | — | — |
| Centaurii herb. sciss. | 50·0 | 10 | — | — |
| Cera alba | 50·0 | 27 | — | — |
| „ flava | 50·0 | 21 | — | — |
| Ceratum cetacei | 10·0 | 8 | 50·0 | 35 |
| „ fuscum | 10·0 | 5 | — | — |
| Cetaceum | 50·0 | 21 | — | — |
| Chamomillae roman. flor. | 50·0 | 13 | — | — |
| „ vulgar. flor. | 50·0 | 11 | 250·0 | 46 |
| „ „ „ gross. pulv. | 50·0 | 18 | 250·0 | 80 |
| „ „ „ subt. pulv. | 10·0 | 6 | — | — |
| Chinae calisayae cortex | 50·0 | 92 | — | — |
| „ „ „ gross. pulv. | 50·0 | 95 | — | — |
| „ „ „ subt. pulv. | 10·0 | 27 | — | — |
| „ cortex fuscus | 50·0 | 61 | — | — |
| „ „ „ gross. pulv. | 50·0 | 64 | — | — |
| „ „ „ subt. pulv. | 10·0 | 19 | — | — |
| „ „ ruber | 50·0 | 98 | — | — |
| „ „ „ gross. pulv. | 50·0 | 101 | — | — |
| „ „ „ subt. pulv. | 10·0 | 29 | — | — |
| Chinidinum sulfuricum | 0·10 | 4 | — | — |
| Chininum | 0·10 | 7 | — | — |
| „ bisulfuric. | 0·10 | 4 | — | — |
| „ hydrochloricum | 0·10 | 6 | 1·0 | 54 |
| „ sulfuricum | 0·50 | 20 | 5·0 | 165 |
| „ tannic. | 0·10 | 2 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|---|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct | gramy | ct. |
| † Chloralum hydrat. | 10·0 | 20 | — | — |
| Chloroformium | 10·0 | 10 | — | — |
| Cinae flores | 50·0 | 8 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 6 | — | — |
| Cinnamomi cortex | 50·0 | 11 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Citri fructus cortex sciss. | 50·0 | 7 | — | — |
| „ „ flaved. | 50·0 | 33 | — | — |
| „ „ „ subt. pulv. | 10·0 | 11 | — | — |
| Coffeinum | 0·10 | 5 | — | — |
| † Colchicinum | 0·01 | 3 | — | — |
| Colchici sem. | 10·0 | 3 | — | — |
| Collodium | 10·0 | 5 | — | — |
| Collyrium adstring. luteum | 50·0 | 18 | 250·0 | 75 |
| Colocyntnidum fruct sciss. | 10·0 | 15 | 50·0 | 66 |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 22 | — | — |
| Conii mac. herb. | 10·0 | 1 | — | — |
| „ „ „ gross. pulv. | 50·0 | 8 | 250·0 | 35 |
| „ „ „ subt. pulv. | 10·0 | 4 | — | — |
| Coriandri sem. | 50·0 | 4 | — | — |
| Crocus austriac. | 1·0 | 24 | — | — |
| „ „ pulv. | 1·0 | 28 | — | — |
| „ gallicus | 1·0 | 12 | — | — |
| „ „ pulv. | 1·0 | 15 | — | — |
| Cubebae fruct. | 50·0 | 11 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Cuprum aluminatum | 10·0 | 12 | — | — |
| „ sulfuricum | 10·0 | 3 | — | — |
| Cydoniae sem. | 50·0 | 20 | — | — |
| Decoctum Zittmanni fortius | 250·0 | 51 | 500·0 | 59 |
| „ „ mitius | 250·0 | 42 | 500·0 | 47 |
| † Digitalinum depurat. | 0·01 | 10 | — | — |
| † Digitalis fol. sciss. | 10·0 | 2 | — | — |
| † „ „ subt. pulv. | 10·0 | 4 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|----------------------------------|--|------|--|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Dulcamarae caules sciss. | 50·0 | 3 | — | — |
| Elaeosacchara | patrz cennik robót aptekarskich | | | |
| Electuarium aromaticum | 10·0 | 4 | — | — |
| „ „ c. opio | 10·0 | 6 | — | — |
| „ lenitivum | 50·0 | 28 | 250·0 | 120 |
| Elemi | 50·0 | 9 | — | — |
| Emplastrum anglicanum | 10□cm. | 4 | t. j. 5□ cm. dług. i 2□ cm. szerok. | |
| „ cantharidum | 10·0 | 11 | 50·0 | 50 |
| „ „ perpetuum | 10·0 | 19 | — | — |
| „ cerussae | 10·0 | 4 | 50·0 | 16 |
| „ conii maculati | 10·0 | 5 | 50·0 | 22 |
| „ de meliloto | 10·0 | 4 | 50·0 | 18 |
| „ diachylon comp. | 50·0 | 20 | 250·0 | 90 |
| „ „ „ linleo extensum | ¹⁰⁰ □cm. | 6 | ⁵⁰⁰ □cm. | 25 |
| | t. j. 10□ cm. dług. i 10 □ cm. sze- kości. | | t. j. 20 □ cm. sze- rokości i 25□cm. długości. | |
| „ diachylon simplex | 50·0 | 14 | 250·0 | 60 |
| „ hydrargyri | 50·0 | 32 | 250·0 | 136 |
| „ minii adustum | 10·0 | 6 | 50·0 | 27 |
| „ oxycroceum | 10·0 | 20 | 50·0 | 79 |
| „ saponatum | 10·0 | 5 | 50·0 | 22 |
| Emulsio amygdalina | patrz cennik robót aptekarskich | | | |
| „ oleosa | „ | „ | „ | „ |
| Euphorbium | 10·0 | 2 | — | — |
| „ subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| † Extractum aconiti | 1·0 | 7 | — | — |
| „ aloës | 5·0 | 7 | — | — |
| † „ belladonnae | 1·0 | 8 | — | — |
| „ calumbae | 5·0 | 33 | — | — |
| „ cannabis indicae | 1·0 | 8 | — | — |
| „ centaurii | 5·0 | 11 | — | — |
| „ chelidonii | 5·0 | 33 | — | — |
| „ chinae fusc. | 5·0 | 52 | — | — |
| † „ colocynthidum | 1·0 | 12 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|---|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| † Extractum conii maculati | 1·0 | 6 | — | — |
| „ cubeborum | 5·0 | 18 | — | — |
| „ filicis maris | 5·0 | 40 | — | — |
| „ gentianae | 5·0 | 6 | — | — |
| „ graminis | 10·0 | 9 | 50·0 | 40 |
| „ hellebori virid. | 1·0 | 8 | — | — |
| † „ hyosциami fol. | 1·0 | 6 | — | — |
| „ liquiritiae | 5·0 | 9 | — | — |
| „ malatis ferri | 5·0 | 5 | — | — |
| † „ nucis vomicae | 1·0 | 13 | — | — |
| † „ opii aquos. | 1·0 | 30 | — | — |
| „ punicae granat. | 5·0 | 26 | — | — |
| „ quassiae | 5·0 | 30 | — | — |
| „ ratanhae | 5·0 | 31 | — | — |
| „ rhei | 5·0 | 38 | — | — |
| „ scillae | 5·0 | 11 | — | — |
| † „ secalis cornuti | 1·0 | 5 | — | — |
| „ taraxaci | 10·0 | 7 | 50·0 | 30 |
| „ trifolii fibrini | 5·0 | 6 | — | — |
| Fel tauri depuratum | 1·0 | 12 | — | — |
| Ferrum carbonic. sacchar. | 5·0 | 6 | 50·0 | 50 |
| „ hydro-oxydat. dialysat. liquid. | 10·0 | 4 | — | — |
| „ jodatum | 5·0 | 11 | — | — |
| „ lacticum | 5·0 | 9 | — | — |
| „ oxydato-oxydulatum | 5·0 | 14 | — | — |
| „ phosphoricum | 5·0 | 15 | — | — |
| „ pulveratum | 10·0 | 3 | — | — |
| „ sesquichlor. cryst. | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| „ „ „ solut. | 10·0 | 4 | 50·0 | 15 |
| „ sulfuric. cryst. | 10·0 | 2 | 50·0 | 7 |
| „ et natrium pyrophosphoric. | 1·0 | 3 | — | — |
| Filicis mar. rhyz. sciss. | 50·0 | 8 | — | — |
| „ „ „ subt. pulv. | 10·0 | 6 | — | — |
| Foeniculi fruct. | 50·0 | 7 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|--------------------------------|---------------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Foeniculi fruct. subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Galbanum | 50·0 | 26 | — | — |
| „ pulv. | 10·0 | 9 | — | — |
| Galeopsidis herb. sciss. | 50·0 | 10 | 250·0 | 45 |
| Gallae | 50·0 | 12 | — | — |
| Gelatina caragaheen | 10·0 | 24 | 50·0 | 32 |
| „ lichen. island. | 10·0 | 24 | 50·0 | 32 |
| „ „ „ pulv. | 10·0 | 10 | — | — |
| „ liquiritiae pellucida | 50·0 | 22 | — | — |
| Gentianae rad. sciss. | 50·0 | 6 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 4 | — | — |
| Globuli martiales | 1 galka | 20 | — | — |
| Glycerinum | 50·0 | 11 | 250·0 | 50 |
| Graminis rhyz. sciss. | 50·0 | 4 | — | — |
| Guajacum | 50·0 | 35 | — | — |
| „ subt. pulv. | 10·0 | 10 | — | — |
| Guarana pulv. | 1·0 | 3 | — | — |
| Gummi arabicum | 50·0 | 20 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 7 | 50·0 | 30 |
| Hirudo | eeny krajowe. | | | |
| Hydrargyrum | 50·0 | 28 | — | — |
| † „ bichlor. ammon. | 1·0 | 3 | — | — |
| † „ „ corros. pulv. | 1·0 | 1 | — | — |
| † „ bijodat. rubr. | 1·0 | 4 | — | — |
| † „ chlorat. mite pulv. | 1·0 | 2 | — | — |
| † „ chlorat. mite via humida | 1·0 | 4 | — | — |
| † „ jodatum flavum | 1·0 | 6 | — | — |
| † „ oxydatum flavum | 1·0 | 4 | — | — |
| Hydromel infantum | 10·0 | 4 | 50·0 | 18 |
| Hyoscyami fol. sciss. | 10·0 | 2 | 50·0 | 6 |
| „ „ gross. pulv. | 50·0 | 10 | 250·0 | 45 |
| Ichthyocolla | 10·0 | 37 | — | — |
| Infusum laxativum | 10·0 | 3 | 50·0 | 12 |
| Ipecacuanhae rad. gross. pulv. | 1·0 | 3 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|----------------------------------|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Ipecacuanhae rad. subt. pulv. | 1·0 | 4 | — | — |
| Ireos florent. rhyz. subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| J aceae herb. sciss. | 50·0 | 5 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 4 | — | — |
| Jalapae tub. subt. pulv. | 10·0 | 9 | 50·0 | 40 |
| † Jodoformium | 1·0 | 16 | — | — |
| Jodum | 1·0 | 9 | 10·0 | 80 |
| Juniperi fruct. | 50·0 | 2 | — | — |
| „ „ rut. tus. | 10·0 | 6 | — | — |
| K alium acetic. solutum | 10·0 | 5 | — | — |
| „ bromatum | 10·0 | 13 | 50·0 | 55 |
| „ carbonicum crudum | 100·0 | 17 | — | — |
| „ „ depurat. | 10·0 | 4 | — | — |
| „ „ solut. | 10·0 | 2 | — | — |
| „ chloricum | 10·0 | 3 | — | — |
| „ ferro-tartaricum | 10·0 | 25 | — | — |
| „ hydro-oxdatum | 10·0 | 10 | 50·0 | 40 |
| „ hydro-tartaricum pulv. | 10·0 | 6 | 50·0 | 25 |
| „ hypermanganicum cryst. | 10·0 | 41 | — | — |
| „ jodatum | 10·0 | 36 | 50·0 | 150 |
| „ manganicum crudum | 10·0 | 8 | — | — |
| „ natrio-tartaricum | 10·0 | 4 | 50·0 | 15 |
| „ „ „ pulv. | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| „ nitricum | 10·0 | 2 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 3 | — | — |
| † „ stibio-tartaricum pulv. | 1·0 | 2 | — | — |
| „ sulfuratum | 10·0 | 12 | — | — |
| „ „ pro balneo | 50·0 | 9 | 250·0 | 40 |
| „ sulfuricum | 50·0 | 6 | — | — |
| „ „ pulv. | 10·0 | 3 | — | — |
| „ tartaricum pulv. | 10·0 | 10 | — | — |
| Kamala | 1·0 | 3 | — | — |
| Kousso sciss. | 50·0 | 27 | — | — |
| „ subt. pulv. | 10·0 | 9 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|--|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Kreosotum | 5·0 | 12 | — | — |
| L auri bacc. gross. pulv. | 50·0 | 7 | 250·0 | 30 |
| „ „ subt. „ | 10·0 | 3 | — | — |
| Lavandulae flor. | 50·0 | 35 | 250·0 | 145 |
| Lichen islandicus sciss. | 50·0 | 6 | — | — |
| Lignum campechian | 10·0 | 1 | — | — |
| Linimentum ammoniatum | 50·0 | 18 | — | — |
| „ saponato-camphoratum | 50·0 | 14 | — | — |
| Lini sem. | 50·0 | 4 | — | — |
| „ „ pulv. | 50·0 | 12 | 250·0 | 50 |
| „ „ placent. pulv. | 50·0 | 4 | 250·0 | 16 |
| Liquiritiae rad. sciss. | 50·0 | 4 | — | — |
| „ „ decort. subt. pulv. | 10·0 | 6 | — | — |
| Liquor acidus Halleri | 10·0 | 3 | — | — |
| „ ammoni anisat. | 10·0 | 4 | — | — |
| Lobeliae inflatae herb. sciss. | 10·0 | 5 | — | — |
| Lupulinum | 1·0 | 1 | — | — |
| Lycopodii sem. | 50·0 | 23 | 250·0 | 101 |
| M acis | 5·0 | 4 | — | — |
| Magnesium carbonicum hydro-oxydatum subt. pulv. | 10·0 | 4 | 50·0 | 16 |
| „ citricum | 5·0 | 14 | — | — |
| „ hydro oxydatum | 50·0 | 13 | — | — |
| „ lacticum | 5·0 | 14 | — | — |
| „ oxydatum | 10·0 | 14 | 50·0 | 60 |
| „ sulfuricum | 50·0 | 5 | 250·0 | 20 |
| Maltum | 50·0 | 7 | — | — |
| Malvae flores | 50·0 | 10 | — | — |
| „ folia sciss. | 50·0 | 5 | — | — |
| Manganum hyperoxyd nat. subt. pulv. | 50·0 | 11 | — | — |
| Manna calabrina electa | 10·0 | 3 | 50·0 | 12 |
| „ „ canellata | 10·0 | 10 | — | — |
| Massa pilularum Ruffi | 5·0 | 17 | — | — |
| Mastiche | 10·0 | 15 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|----------------------------|---------------------------------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Mastiche subt. pulv. | 10·0 | 20 | — | — |
| Mel depuratum | 50·0 | 10 | 250·0 | 40 |
| „ rosatum | 50·0 | 17 | — | — |
| Meliloti herb. sciss. | 50·0 | 5 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 4 | — | — |
| Melissae folia sciss. | 50·0 | 12 | 250·0 | 50 |
| Menthae crisp. fol. sciss. | 50·0 | 12 | 250·0 | 50 |
| „ piper. „ „ | 50·0 | 12 | 250·0 | 50 |
| „ „ „ subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Millefolii herb. sciss. | 50·0 | 5 | — | — |
| Mixtura gummosa | patrz cennik robót aptekarskich | | | |
| † Morphinum | 0·05 | 4 | — | — |
| † „ hydrochlor. | 0·05 | 3 | — | — |
| Mucilago cydoniorum semin. | 10·0 | 3 | 50·0 | 12 |
| „ gummi arabic. | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| Myrrha subt. pulv. | 10·0 | 10 | — | — |
| Natrium aceticum | 5·0 | 4 | — | — |
| „ boracicum pulv. | 10·0 | 3 | — | — |
| „ carbonic. cryst. | 100·0 | 7 | — | — |
| „ „ dilaps. | 10·0 | 3 | — | — |
| „ hydro-carbonic. pulv. | 50·0 | 5 | 250·0 | 22 |
| „ phosphoricum | 5·0 | 3 | — | — |
| „ salicylic. | 1·0 | 4 | — | — |
| „ silicicum | 50·0 | 10 | 250·0 | 45 |
| „ sulfuricum cryst. | 50·0 | 8 | 250·0 | 35 |
| „ „ dilapsum | 10·0 | 4 | — | — |
| Nux moschata | 50·0 | 41 | — | — |
| „ „ pulv. | 10·0 | 12 | — | — |
| † „ vomica gross. pulv. | 10·0 | 3 | — | — |
| † „ „ subt. pulv. | 10·0 | 6 | — | — |
| ●leum amygdal. dulc. | 50·0 | 34 | 250·0 | 142 |
| „ anisi | 1·0 | 4 | — | — |
| „ aurant. cort. | 1·0 | 5 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|-----------------------------------|-------|------|----------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Oleum aurant. flor. | 1·0 | 61 | — | — |
| " bergamottae | 1·0 | 6 | — | — |
| " cacao | 10·0 | 6 | 50·0 | 25 |
| " cadinum | 50·0 | 12 | — | — |
| " camphoratum | 10·0 | 6 | 50·0 | 25 |
| " carvi | 1·0 | 3 | — | — |
| " caryophyllor | 1·0 | 4 | — | — |
| " cinnamomi | 1·0 | 4 | — | — |
| " citri | 1·0 | 5 | — | — |
| " croton. tiglii | 1·0 | 4 | — | — |
| " foeniculi | 1·0 | 2 | — | — |
| " hyoscyam. fol. coctum | 50·0 | 19 | 250·0 | 85 |
| " jecoris aselli | 50·0 | 8 | 250·0 | 35 |
| " juniperi | 1·0 | 2 | 10·0 | 10 |
| " lauri | 50·0 | 12 | 250·0 | 53 |
| " lavandulae | 1·0 | 2 | — | — |
| " lini | 50·0 | 8 | — | — |
| " macidis | 1·0 | 8 | — | — |
| " menthae crisp. | 1·0 | 8 | — | — |
| " " piper | 1·0 | 15 | — | — |
| " nucis moschatae | 1·0 | 3 | — | — |
| " olivarum | 50·0 | 18 | 250·0 | 79 |
| " ricini | 50·0 | 17 | — | — |
| " rosarum | 1·0 | 153 | 1 kropła | 6 |
| " rosmarini | 1·0 | 1 | — | — |
| " sinapis aether. | 1·0 | 14 | — | — |
| " terebinth. rectific. | 50·0 | 6 | 250·0 | 25 |
| " valerianae | 1·0 | 13 | — | — |
| Olibanum subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Ononidis rad. sciss. | 50·0 | 4 | — | — |
| † Opium subt. pulv. | 1·0 | 10 | — | — |
| Origani herb. sciss. | 50·0 | 5 | — | — |
| Oxymel scillae | 10·0 | 3 | 50·0 | 12 |
| " simplex | 10·0 | 3 | 50·0 | 12 |
| Papaveris rhoead. flor. | 50·0 | 30 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|--|--------------------------------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Papaveris somnifer. caps. | 50·0 | 5 | — | — |
| Pasta dentifricia dura | 50·0 | 50 | — | — |
| „ „ mollis | 50·0 | 50 | — | — |
| „ gummos. albuminat. | 50·0 | 38 | — | — |
| „ liquiritiae flava | 50·0 | 24 | — | — |
| Pastilli e natrio hydro-carbon. | 30 ^{placu- szków} | 40 | — | — |
| Petroleum rectific. | 50·0 | 18 | — | — |
| Pilulae laxantes | 5·0 | 11 | — | — |
| Pix liquida | 50·0 | 5 | — | — |
| Plumbum aceticum | 10·0 | 4 | — | — |
| „ „ basic. sol. | 10·0 | 4 | 50·0 | 16 |
| „ „ solut. | 10·0 | 2 | 50·0 | 8 |
| „ carbonic. pulv. | 50·0 | 12 | — | — |
| „ hyperoxydat. rubr. pulv. | 50·0 | 10 | — | — |
| „ oxydatum pulv. | 50·0 | 14 | — | — |
| Potio magnes. citric. efferv. | dawka | 54 | — | — |
| Pulpa cassiae | 50·0 | 52 | — | — |
| „ tamarindorum depurata | 50·0 | 25 | — | — |
| Pulvis aërophorus | 10 ^{dawek} | 35 | — | — |
| „ „ Seidlitzensis | 10 „ | 85 | — | — |
| „ dentifric. alb. | 10·0 | 6 | — | — |
| „ „ niger | 10·0 | 13 | — | — |
| „ Doveri | 1·0 | 2 | — | — |
| „ gummosus | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| Punicae granat. rad. cort. rud. tus. | 50·0 | 40 | — | — |
| „ „ „ „ subt. pulv. | 10·0 | 12 | — | — |
| Pyrethri rad. sciss. | 50·0 | 13 | — | — |
| Quassiae lign. | 50·0 | 6 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Quercus cort. scis. | 50·0 | 4 | — | — |
| „ „ rud. tus. | 50·0 | 8 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 4 | — | — |
| „ sem. tost. pulv. | 50·0 | 9 | 250·0 | 40 |
| Ratanhae rad. | 50·0 | 17 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 9 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|---|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Resina jalapae | 1·0 | 13 | 10 0 | 110 |
| „ pini | 50·0 | 2 | — | — |
| Rhei radix | 10·0 | 22 | 50 0 | 89 |
| „ „ sciss. | 10·0 | 23 | 50·0 | 95 |
| „ „ subt. pulv. | 1·0 | 3 | 10·0 | 25 |
| Roob juniperi | 50·0 | 38 | 250·0 | 160 |
| „ sambuci | 50·0 | 20 | 250·0 | 90 |
| Rosae damasc. flor. | 50·0 | 28 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 10 | — | — |
| Rosmarini fol. | 50·0 | 22 | — | — |
| Rotulae menthae piper | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| Sabadillae fruct. | 50·0 | 9 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| † Sabinae summitat. sciss | 10·0 | 3 | — | — |
| † „ „ subt pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Saccharum subt. pulv. | 10·0 | 3 | 50·0 | 11 |
| „ lactis subt. pulv. | 10·0 | 6 | — | — |
| Salep gross. pulv. | 10·0 | 10 | — | — |
| „ subt. pulv. | 10·0 | 14 | — | — |
| Salicis cort. | 50·0 | 5 | — | — |
| Salviae folia | 50·0 | 12 | — | — |
| „ „ subt pulv. | 10·0 | 5 | — | — |
| Sambuci flor. | 50·0 | 9 | — | — |
| „ „ gross. pulv. | 50·0 | 15 | 250·0 | 65 |
| Santoninum | 0·10 | 2 | — | — |
| Sapo kalinus | 50·0 | 8 | 250·0 | 35 |
| „ medicinalis | 10·0 | 3 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 6 | — | — |
| „ picis | 50·0 | 50 | — | — |
| „ sulfuratus | 50·0 | 50 | — | — |
| „ venetus | 50·0 | 8 | — | — |
| „ „ subt. pulv. | 10·0 | 4 | — | — |
| Sarsaparillae rad. sciss. | 50·0 | 37 | 250·0 | 158 |
| Scillae bulb. sicc. subt. pulv. | 10·0 | 4 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|---|--------------------------------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Sebum ovile | 50·0 | 13 | — | — |
| † Secale cornut. | 10·0 | 3 | — | — |
| † " " subt. pulv. | 1·0 | 1 | — | — |
| Senegae rad. | 50·0 | 49 | — | — |
| Sennae alexand. fol. | 50·0 | 28 | 250·0 | 119 |
| " " " subt. pulv. | 10·0 | 9 | — | — |
| " " " sine resina | 50·0 | 66 | — | — |
| " Tinnevely fol. | 50·0 | 11 | 250·0 | 50 |
| Serpylli herb. | 50·0 | 4 | — | — |
| Serum lactis | patrz cennik robót receptowych | | | |
| Sinapis sem. | 50·0 | 5 | — | — |
| " " pulv. | 50·0 | 10 | 250·0 | 45 |
| † Solutio arsenical. Fowleri | 1·0 | 1 | — | — |
| Species althaeae | 50·0 | 8 | 250·0 | 30 |
| " amaricantes | 50·0 | 9 | 250·0 | 40 |
| " aromaticae | 50·0 | 18 | 250·0 | 80 |
| " " pro catapl. | 50·0 | 22 | 250·0 | 100 |
| " emollientes | 50·0 | 9 | 250·0 | 40 |
| " " pro catapl. | 50·0 | 13 | 250·0 | 60 |
| " laxantes St. Germain | 50·0 | 50 | — | — |
| " pectorales | 50·0 | 9 | 250·0 | 40 |
| Spilanthes olerac. herb. sciss. | 50·0 | 20 | — | — |
| Spiritus aetheris | 50·0 | 18 | 250·0 | 75 |
| " anisi | 50·0 | 9 | — | — |
| " aromatic. | 50·0 | 20 | 250·0 | 90 |
| " camphorat. | 50·0 | 9 | 250·0 | 40 |
| " carvi | 50·0 | 9 | — | — |
| " cochleariae | 50·0 | 12 | 250·0 | 50 |
| " ferri sesquichlor. aeth. | 10·0 | 8 | — | — |
| " lavandulae | 50·0 | 20 | — | — |
| " menthae piper. | 50·0 | 14 | 250·0 | 60 |
| " rosmarini | 50·0 | 17 | — | — |
| " saponatus | 50·0 | 12 | 250·0 | 50 |
| " sapon. kalin. | 50·0 | 28 | — | — |
| " sinapis | 5·0 | 3 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|-----------------------------------|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Spiritus vini conc. 90% | 50·0 | 7 | 250·0 | 30 |
| " " dilut. 70% | 50·0 | 6 | 250·0 | 25 |
| Spongia pressa | 5·0 | 57 | — | — |
| † Stibium chlorat. | 10·0 | 18 | — | — |
| " sulfur. aurant. | 1·0 | 4 | — | — |
| " " nigr. | 50·0 | 6 | — | — |
| " " " subt. pulv. | 50·0 | 14 | — | — |
| Stramonii fol. | 10·0 | 1 | — | — |
| † Strychninum | 0·01 | 1 | — | — |
| † " nitricum | 0·01 | 1 | — | — |
| Styrax liquid. | 10·0 | 4 | 50·0 | 16 |
| Succus liquiritiae pulv. | 10·0 | 8 | 50·0 | 35 |
| Sulfur praecipitat. | 10·0 | 13 | 50·0 | 60 |
| " sublimatum | 50·0 | 16 | 250·0 | 70 |
| Syrupus acetos. citri. | 10·0 | 6 | 50·0 | 25 |
| " althaeae | 10·0 | 2 | 50·0 | 8 |
| " amygdalinus | 10·0 | 4 | 50·0 | 16 |
| " aurantior. cort. | 10·0 | 3 | 50·0 | 12 |
| " capillor. ven. | 10·0 | 4 | — | — |
| " cinnamomi | 10·0 | 5 | — | — |
| " diacodii | 10·0 | 2 | 50·0 | 8 |
| " ferri jodati | 10·0 | 14 | 50·0 | 63 |
| " ipecacuanh. | 10·0 | 5 | — | — |
| " mannaeus | 10·0 | 3 | 50·0 | 12 |
| " mororum | 10·0 | 3 | 50·0 | 12 |
| " rhei | 10·0 | 3 | 50·0 | 12 |
| " ribium | 10·0 | 3 | 50·0 | 12 |
| " rubi idaei | 10·0 | 3 | 50·0 | 12 |
| " simplex | 10·0 | 2 | 50·0 | 8 |
| Tabulae althaeae | 50·0 | 22 | — | — |
| Tamarindi pulpa | 50·0 | 7 | — | — |
| Taraxaci herba | 50·0 | 5 | — | — |
| " radix | 50·0 | 5 | — | — |
| Terebinthina comm. | 50·0 | 5 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|------------------------------------|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Thea Pecco | 50.0 | 63 | — | — |
| Tiliae flores | 50.0 | 9 | — | — |
| Tinctura absinthii comp. | 10.0 | 3 | 50.0 | 12 |
| † " aconiti | 5.0 | 3 | 50.0 | 25 |
| " amara | 10.0 | 4 | 50.0 | 16 |
| " arnicae | 10.0 | 3 | 50.0 | 12 |
| " aurantii cort | 10.0 | 4 | 50.0 | 16 |
| † " belladonnae | 5.0 | 3 | 50.0 | 25 |
| " benzoës | 10.0 | 4 | 50.0 | 16 |
| † " cantharidum | 5.0 | 4 | 50.0 | 35 |
| " cascarillae | 10.0 | 6 | — | — |
| " castorei canad. | 10.0 | 31 | — | — |
| " chamomillae | 10.0 | 3 | 50.0 | 12 |
| " chinae comp. | 10.0 | 7 | — | — |
| " cinnamomi | 10.0 | 3 | 50.0 | 12 |
| † " colchici | 5.0 | 3 | 50.0 | 25 |
| † " digitalis | 5.0 | 3 | 50.0 | 25 |
| " guajaci | 10.0 | 5 | 50.0 | 22 |
| " ipecacuanhae | 5.0 | 6 | 50.0 | 50 |
| " jodi | 5.0 | 8 | 50.0 | 68 |
| " lobeliae | 5.0 | 4 | 50.0 | 35 |
| " malatis ferri | 10.0 | 8 | 50.0 | 35 |
| " myrrhae | 10.0 | 5 | 50.0 | 22 |
| † " nucis vomicae | 5.0 | 4 | 50.0 | 35 |
| † " opii crocat. | 5.0 | 23 | 50.0 | 214 |
| † " opii simpl. | 5.0 | 8 | 50.0 | 70 |
| " ratanhae | 10.0 | 5 | 50.0 | 22 |
| " rhei aquos | 10.0 | 4 | 50.0 | 16 |
| " " - vinosa Darelli | 10.0 | 13 | 50.0 | 60 |
| " spilanthes olerac. comp. | 5.0 | 4 | 50.0 | 35 |
| " valerianae | 10.0 | 4 | 50.0 | 16 |
| † " veratri albi | 5.0 | 3 | 50.0 | 25 |
| Trifolii herb. | 50.0 | 6 | — | — |
| " " subt. pulv. | 10.0 | 4 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|-----------------------------------|---------------------------------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Trochisci ipecacuanhae | 5·0 | 7 | — | — |
| „ santonini | 5·0 | 10 | — | — |
| Unguentum aromaticum | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| „ Autenriethi | patrz cennik robót receptowych. | | | |
| „ cerussae | 10·0 | 4 | 50·0 | 16 |
| „ diachylon Dr. Hebra | 10·0 | 8 | 50·0 | 36 |
| „ emolliens | 10·0 | 9 | 50·0 | 40 |
| „ glycerini | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| „ hydrargyri | 10·0 | 8 | 50·0 | 36 |
| „ juniperi | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| „ plumbi acetici | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| „ pomadinum | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| „ sabadillae | 10·0 | 6 | 50·0 | 25 |
| „ simplex | 10·0 | 4 | 50·0 | 16 |
| „ sulfuratam | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| Uvae ursi fol. | 50·0 | 5 | — | — |
| Valerianae radix | 50·0 | 7 | — | — |
| „ „ sub. pulv. | 10·0 | 4 | — | — |
| Vanillae siliq. | 1·0 | 12 | — | — |
| † Veratrinum | 0·05 | 2 | — | — |
| Veratri alb. rhyz. | 10·0 | 1 | — | — |
| „ „ „ sub. pulv. | 10·0 | 4 | — | — |
| Verbasci flor. | 50·0 | 36 | — | — |
| † Vinum colchici | 10·0 | 10 | — | — |
| „ malagense | 50·0 | 22 | — | — |
| † „ stibiato tartaricum | 10·0 | 10 | — | — |
| Zedoariae rad. | 50·0 | 7 | — | — |
| „ „ sub. pulv. | 10·0 | 4 | — | — |
| Zincum aceticum | 10·0 | 24 | — | — |
| „ chloratum | 10·0 | 20 | — | — |
| „ oxydatum | 10·0 | 40 | — | — |
| „ sulfuricum | 10·0 | 5 | 50·0 | 20 |
| Zingiberis rad. | 50·0 | 16 | — | — |
| „ „ sub. pulv. | 10·0 | 6 | — | — |

Cennik robot receptowych.

| | | ct. |
|---|--|-----|
| 1 | Za sporządzenie odwaru wraz z cedzeniem do 500·0 włącznie, jeżeli gotowanie trwa $\frac{1}{4}$ godziny | 18 |
| | $\frac{1}{2}$ " | 22 |
| | 1 " | 28 |
| | Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 | 5 |
| 2 | Za sporządzenie naparu (infusio calida) włączając półgodzinne wytrawienie (digestio) wraz z cedzeniem do 500·0 włącznie | 18 |
| | Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 | 5 |
| 3 | Za sporządzenie zimnego nalewu (infusio frigida) tudzież za namoczenie (maceratio) wraz z cedzeniem aż do 500·0 włącznie | 5 |
| | Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500·0 | 2 |
| 4 | Za wytrawienie bez względu na ilość i wraz z cedzeniem w miarę czasu do 3 godzin włącznie | 12 |
| | 6 " " | 20 |
| | 12 " " | 26 |
| | 24 " " | 34 |
| 5 | Za sporządzenie odwaro-nalewu ma być policzona odpowiednia należytość za odwar a nadto połowa należytości za nalew. | |

U w a g a.

- a) Drzewka, kory, korzenie, zioła, kwiaty i nasiona, przepisane do sporządzenia odwarów i nalewów, jakoteż do ziółek (species) mają być uważane chociażby to w receptie nie było wyraźnie wymienione, jako przepisane w stanie pokrajanym, rozłuczonym lub rozgniecionym; należy ich w tym stanie używać i należytość według cennika lekarstw obliczać.
- b) Jeżeli lekarstwa na odwar lub nalew zapisane zostały w stanie sproszkowanym, natenczas należy rozumieć pod tem proszek na grubo tłuczony, i policzyć cenę ustanowioną w cenniku lekarstw za „pulvis grossus“.

| | | ct. |
|------------|--|-----|
| 6 | Za sporządzenie gorącego rozczyunu (solutio calida) do 500 0 środka rozczyunowego wraz z precedzeniem | 12 |
| | Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500 0 | 5 |
| U w a g a. | | |
| | a) W razie rozpuszczenia soli, wymienionych w cenniku w stanie skrystalizowanym i sproszkowanym, wolno policzyć tylko cenę soli skrystalizowanej. | |
| | b) Za rozpuszczenie lub zarobienie soli lub innych przetworów lecniczych w celu sporządzenia ciasta pigułkowego, powide- łek i kołaczyków, nie wolno policzyć. | |
| 7 | Za sporządzenie zimnego rozczyunu t. j. za pomocą tłuczka (solutio frigida cum pistillo peragenda) | 5 |
| 8 | Za wypienienie (clarificatio) za pomocą białka, wraz z białkiem | 20 |
| 9 | Za przesączenie (filtrowanie) płynu do 500 0 włącznie | 5 |
| | Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500 0 | 3 |
| 10 | Za jedno precedzenie | 3 |
| 11 | Za nasycenie (saturatio) | 15 |
| 12 | Za sporządzenie mleczańki z nasion wraz z precedzeniem do 500 0 włącznie | 15 |
| | Za nadwyżkę aż znowu do 500 0 | 5 |
| 13 | Za sporządzenie mleczańki wrzekomej (emulsio spuria) z wszel- kich rodzajów olejów, żywic, balsamów i t. d, jakoteż mię- szanki olejnej (mixtura oleosa) do 500 0 włącznie | 10 |
| | Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 500 0 | 5 |
| 14 | Za sporządzenie nieklarowanej serwatki, wraz z mlekiem i in- nemi przyprawami do 200 0 serwatki włącznie | 25 |
| | Za nadwyżkę aż znowu do 200 0 serwatki | 15 |
| 15 | Za sporządzenie wyklarowanej za pomocą białka i przesączonej serwatki wraz z mlekiem i innemi przyprawami aż do 200 0 włącznie | 40 |
| | Za każdą dalszą nadwyżkę aż znowu do 200 0 serwatki | 20 |
| 16 | Za mieszanie drobnego proszku bez względu na to czy jest przy wydaniu podzielone lub nie | 10 |

| | et. |
|--|-----|
| U w a g a. | |
| Jeżeli do proszku zapisany jest cukier olejny, policzyć należy za sporządzenie takowego o 2 et. więcej. | |
| 17 | 2 |
| Za rozdzielenie drobnych proszków na kilka dawek aż do pięciu włącznie wraz z torebkami, okładką i sygnaturą, za każdą dawkę | |
| | 1 |
| Za każdą dawkę po nad pięć | |
| 18 | 5 |
| Za mieszanie grubych proszków (pulverum per cribrum trajectorum vel grosse tussorum) bez względu na to, czy przy wydaniu są na dawki podzielone lub nie | |
| U w a g a. | |
| Za mieszanie samych ziółek (species) nie wolno policzyć żadnej opłaty. | |
| 19 | 2 |
| Za dzielenie grubych proszków lub ziółek (species) na kilka dawek wraz z torebkami, okładką i sygnaturą, za każdą dawkę | |
| 20 | 3 |
| Za papier i sygnaturę na wydanie ziółek (species) prostych środków leczniczych (simplicia) i t. p. bez podzielenia takowych na dawki do 200·0 włącznie | |
| | 5 |
| Za większą ilość w ogóle | |
| 21 | 5 |
| Za utarcie lub przetarcie proszku do mieszanki (mixtura) albo do maści | |
| 22 | 5 |
| Za sporządzenie cukru olejnego z wyjątkiem wypadku, jeżeli takowy ma być do proszku dodany | |
| 23 | 15 |
| Jeżeli w recepte wymagane jest ciągle przecieranie (trituratione continua), należy się za każdy kwadrans | |
| 24 | 25 |
| Za sporządzenie i uformowanie pigułek, kołaczyków (trochisci) i pastylek aż do 50 sztuk włącznie | |
| | 2 |
| Za dziesięć sztuk nad tę liczbę | |
| Należytość za proszek do posypania użyty, ma być policzona stosownie do spożerbowanej ilości. Jeżeli proszek do posypania nie został przez lekarza wskazany, ma być do tego użyty pulvis rad. liquiritiae. | |
| 25 | 15 |
| Za sporządzenie powidełka | |
| 26 | 10 |
| Za sporządzenie plastra lub maści (ceratum) za pomocą mieszania i wałkowania do 150·0 włącznie | |
| | 2 |
| Za każdą nadwyżkę 50·0 | |

Cennik naczyń.

| | ct. |
|---|-----|
| Zwykłe białe flaszki na lekarstwa: | |
| Za sztukę do 50 gramów włącznie | 5 |
| „ nad 50 „ do 200 gramów włącznie | 7 |
| „ „ 200 „ „ 300 „ „ | 8 |
| „ „ 300 „ „ 400 „ „ | 10 |
| „ „ 400 „ „ 800 „ „ | 15 |
| „ „ 800 „ „ 1500 „ „ | 22 |
| Flaszki podwójne, białe flaszki na proszki, flaszki hyalitowe lub czernione, mogą być policzone o połowę ceny drożej aniżeli zwykłe białe flaszki na lekarstwa. | |
| Zwykłe słoiki na lekarstwa: | |
| Za sztukę do 20 gramów włącznie | 3 |
| „ powyżej 20 gramów do 100 gramów włącznie | 5 |
| „ „ 100 „ „ 200 „ „ | 7 |
| „ „ 200 „ „ 300 „ „ | 8 |
| „ „ 300 „ „ 500 „ „ | 15 |
| Słoje porcelanowe: | |
| Za sztukę do 20 gramów włącznie | 6 |
| „ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie | 10 |
| „ „ 50 „ „ 100 „ „ | 14 |
| „ „ 100 „ „ 150 „ „ | 18 |
| „ „ 150 „ „ 200 „ „ | 24 |
| Jeżeli do słoików porcelanowych dodana zostanie nakrywka, to za taką nakrywkę z drzewa lub z kruszcu wraz z sygnaturą należy się przy słoikach porcelanowych do 20 gramów | 5 |

| | ct. |
|--|-----|
| przy słojach powyżej 20 gramów do 100 gramów włącznie | 8 |
| „ „ „ 100 „ w ogóle | 12 |
| Pudełka tekturowe bez falcu wraz z sygnaturą: | |
| Za sztukę do 20 gramów włącznie | 4 |
| „ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie | 6 |
| „ „ 50 „ „ 100 „ „ | 7 |
| „ „ 100 „ „ 200 „ „ | 9 |
| Pudełka tekturowe z papierem satynowym i falcem wraz z sygnaturą: | |
| Za sztukę do 20 gramów włącznie | 6 |
| „ powyżej 20 gramów do 50 gramów włącznie | 8 |
| „ „ 50 „ „ 100 „ „ | 10 |
| „ „ 100 „ „ 150 „ „ | 12 |
| Pudełka zasuwane wraz z sygnaturą: | |
| Za sztukę obejmującą do 5 proszków | 6 |
| „ „ „ nad 5 do 10 proszków | 10 |
| „ „ „ 10 „ 20 „ | 15 |

Cennik środków leczniczych dla zwierząt.

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|--|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| ▲ Absinthii herb. sciss. | 50·0 | 4 | 500 0 | 36 |
| Acetum | 100·0 | 3 | 500·0 | 13 |
| „ pyrolign. crud. | 100·0 | 4 | 500·0 | 18 |
| Acidum acet. conc. venale 1·028 | 50·0 | 10 | 500·0 | 90 |
| † „ arsenic. subt. pulv. | 50·0 | 8 | 500·0 | 70 |
| „ carbolicum | 50·0 | 22 | 500·0 | 209 |
| „ hydrochloric. conc. crud. | 100·0 | 10 | 500·0 | 45 |
| „ nitric. conc. crud. | 100·0 | 9 | 500·0 | 40 |
| „ salicylic. | 1·0 | 3 | — | — |
| „ sulfuric. anglic. | 100·0 | 6 | 500·0 | 27 |
| „ tannicum | 10·0 | 25 | 50·0 | 118 |
| Aether crudus | 100·0 | 18 | 500 0 | 85 |
| Aloë lucida | 50 0 | 8 | 500·0 | 72 |
| „ „ gross. pulv. | 50 0 | 11 | 500·0 | 99 |
| Althaeae herb. sciss. | 50·0 | 4 | 500·0 | 36 |
| „ rad. elect. (II ^{da}) sciss. | 50 0 | 7 | 500·0 | 65 |
| „ „ „ gross. pulv. | 50 0 | 13 | 500·0 | 116 |
| Alumen | 50·0 | 3 | 500·0 | 26 |
| „ pulv. | 50·0 | 6 | 500·0 | 55 |
| „ ustum | 50·0 | 6 | 500·0 | 54 |
| „ „ pulv. | 50·0 | 9 | 500·0 | 83 |
| Ammonia | 50·0 | 8 | 500·0 | 75 |
| Ammoniacum | 50·0 | 9 | 500·0 | 80 |
| Ammonium carbon. | 50 0 | 8 | 500·0 | 75 |
| „ chlorat. crud. | 50 0 | 6 | 500·0 | 54 |
| Amylum pulv. | 50·0 | 7 | 500·0 | 60 |
| Angelicae rad. sciss. | 50 0 | 7 | 500·0 | 65 |
| „ „ gross. pulv. | 50·0 | 10 | 500 0 | 90 |
| Anisi vulgar. fruct. | 50 0 | 7 | 500 0 | 65 |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|--------------------------------------|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Anisi vulgar. fruct. pulv. | 50 0 | 12 | 500·0 | 106 |
| Aqua calcis | 500·0 | 6 | — | — |
| „ chlori | 50·0 | 7 | 500 0 | 65 |
| „ destillata | 500 0 | 10 | — | — |
| „ kreosoti | 500·0 | 18 | — | — |
| „ laurocerasi | 50·0 | 20 | — | — |
| „ vegeto-miner. Goul. | 500 0 | 10 | — | — |
| Argentum nitric. fus. | 5·0 | 70 | — | — |
| Arnicae flor. sciss. | 50 0 | 6 | 500·0 | 55 |
| „ rad. „ | 50·0 | 8 | 500·0 | 70 |
| Asa foetida | 50·0 | 15 | 500 0 | 140 |
| „ „ pulv. | 50·0 | 20 | 500·0 | 188 |
| † Atropinum sulfuric. | 0·01 | 3 | — | — |
| Axungia porci | 50·0 | 7 | 500·0 | 64 |
| † Belladonnae fol. sciss. | 50 0 | 7 | 500·0 | 63 |
| Calami rhyzom. sciss. | 50·0 | 6 | 500·0 | 54 |
| „ „ gross. pulv. | 50·0 | 9 | 500 0 | 80 |
| Calcium carb. nativ. | 100·0 | 3 | 500·0 | 13 |
| „ „ „ pulv. | 50 0 | 5 | 500·0 | 40 |
| „ hypochloros. | 50 0 | 4 | 500·0 | 36 |
| „ oxydat. | 50·0 | 2 | 500 0 | 18 |
| „ „ pulv. | 50·0 | 4 | 500 0 | 35 |
| Camphora | 50·0 | 14 | 500·0 | 130 |
| † Cantharides | 50·0 | 38 | — | — |
| † „ pulv. | 50 0 | 48 | — | — |
| Carbo lign. depur. pulv. | 50 0 | 5 | 500 0 | 46 |
| Carvi fructus | 50·0 | 6 | 500 0 | 55 |
| „ „ pulv. | 50·0 | 12 | 500 0 | 106 |
| Cera flava | 50·0 | 18 | 500·0 | 175 |
| Chamomillae rom. flor. | 50·0 | 11 | 500 0 | 103 |
| „ „ vulg. flor. gross. pulv. | 50 0 | 12 | 500 0 | 106 |
| Chinae cortex fusc. | 50 0 | 57 | 500·0 | 540 |
| „ „ „ gross. pulv. | 50·0 | 60 | 500·0 | 570 |
| Chininum hydrochloric. | 0·10 | 5 | 1 0 | 44 |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|--|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| † Chloralum hydrat. | 10·0 | 18 | 50·0 | 80 |
| Chloroformium pur. venale | 50 0 | 35 | — | — |
| Cinae flores | 50 0 | 7 | 500·0 | 58 |
| „ „ pulv. | 50·0 | 12 | 500·0 | 110 |
| Cinnamomi cortex | 50·0 | 9 | 500·0 | 80 |
| „ gross. pulv. | 50·0 | 12 | 500·0 | 106 |
| Colloodium | 50 0 | 20 | — | — |
| Colocyntnidum fruct. sc. | 50·0 | 60 | — | — |
| Conii macul. herb. sc. | 50·0 | 4 | 500 0 | 34 |
| Cuprum sulfuric. | 50 0 | 9 | 500·0 | 86 |
| Digitalis fol. sc. | 50·0 | 5 | — | — |
| Emplastrum diachyl. simpl. | 50·0 | 11 | 500·0 | 100 |
| Euphorbium | 50·0 | 6 | — | — |
| „ pulv. | 50·0 | 14 | 500·0 | 132 |
| † Extractum belladonnae | 5 0 | 31 | — | — |
| „ filic. maris | 5·0 | 34 | — | — |
| † „ hyoseyami fol. | 5·0 | 23 | — | — |
| † „ nucis vomicae | 5·0 | 52 | — | — |
| „ punicae granat. | 5·0 | 22 | — | — |
| „ scillae | 5·0 | 10 | — | — |
| Ferrum sesquichl. sol. | 50 0 | 12 | — | — |
| „ sulfuric. cr. pur. | 50·0 | 4 | 500·0 | 34 |
| „ „ venale | 500·0 | 10 | — | — |
| Filicis mar. rhyz. sc. | 50·0 | 5 | 500·0 | 42 |
| „ „ „ gross. pulv. | 50·0 | 9 | 500·0 | 83 |
| Foeniculi fructus | 50·0 | 6 | 500·0 | 54 |
| „ „ pulv. | 50·0 | 11 | 500·0 | 102 |
| Gallae gross. pulv. | 50 0 | 13 | 500·0 | 122 |
| Gentianae rad. sc. | 50·0 | 5 | 500·0 | 45 |
| „ „ gross. pulv. | 50·0 | 8 | 500·0 | 72 |
| Glycerinum | 50·0 | 8 | 500·0 | 76 |
| Guajacum | 50·0 | 28 | 500 0 | 265 |
| Gummi arab. elect. (II ^{da}) | 50·0 | 9 | 500 0 | 85 |
| † Hydrargyrum bichl. corros. pulv. | 10 0 | 7 | 500·0 | 33 |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|---|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| † Hydrargyrum bijodat rubr. | 5·0 | 20 | — | — |
| † „ chlorat. mite pulv. | 5·0 | 7 | 50·0 | 62 |
| † „ oxydat. flavum | 5·0 | 16 | — | — |
| Hyoscyami fol. sc. | 50·0 | 5 | 500·0 | 46 |
| Ipecacuanhae rad. gross. pulv. | 50·0 | 87 | — | — |
| Jalapae tub. gross. pulv. | 50·0 | 22 | — | — |
| † Jodoformium | 10 | 14 | — | — |
| Jodum | 5·0 | 38 | — | — |
| Juniperi fructus | 50·0 | 2 | 500·0 | 15 |
| „ „ gross. pulv. | 50·0 | 5 | 500·0 | 40 |
| Kalium carbon. crud. | 50·0 | 6 | 500·0 | 55 |
| „ chloricum | 50·0 | 12 | 500·0 | 115 |
| „ hydro oxyd. pur. ven. | 50·0 | 39 | — | — |
| „ hydro-tartar. pulv. | 50·0 | 18 | 500·0 | 168 |
| „ hypermangan. cryst. | 5·0 | 19 | — | — |
| „ jodatum | 50·0 | 145 | — | — |
| „ nitricum | 50·0 | 6 | 500·0 | 56 |
| „ „ pulv. | 50·0 | 9 | 500·0 | 82 |
| † „ stibiat.-tart. pulv. (ven.) | 50·0 | 25 | — | — |
| „ sulfuratum | 50·0 | 51 | — | — |
| „ „ pro balneo | 50·0 | 8 | 500·0 | 70 |
| „ sulfuricum | 50·0 | 6 | 500·0 | 52 |
| „ „ pulv. | 50·0 | 8 | 500·0 | 76 |
| „ tartaric. | 50·0 | 39 | — | — |
| Kanala | 10·0 | 28 | — | — |
| Kreosotum | 10·0 | 6 | — | — |
| Lini sem. | 50·0 | 3 | 500·0 | 27 |
| „ „ plac. gr. p. | 50·0 | 4 | 500·0 | 30 |
| Liquiritiae rad. sc. | 50·0 | 4 | 500·0 | 36 |
| „ „ decort. gross. pulv. | 50·0 | 13 | 500·0 | 116 |
| Magnesium carb. hydr.-oxyd. pulv. | 50·0 | 16 | 500·0 | 148 |
| „ sulfuric. | 50·0 | 4 | 500·0 | 36 |
| Malvae fol. sciss. | 50·0 | 5 | 500·0 | 45 |
| Manganum hyperoxyd. nat. pulv. | 50·0 | 7 | 500·0 | 64 |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|--|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Mel depuratum | 50 0 | 8 | 500·0 | 72 |
| † Morphinum hydrochloric. | 0 05 | 3 | — | — |
| Myrrha | 50 0 | 28 | 500 0 | 265 |
| „ pulv. | 50 0 | 33 | 500·0 | 304 |
| Natrium boracic. pulv. | 50·0 | 11 | 500·0 | 101 |
| „ carbon. cryst. venal. | 50·0 | 2 | 500 0 | 17 |
| „ salicylic. | 1 0 | 3 | — | — |
| „ sulfuric. cryst. venal. | 50·0 | 2 | 500 0 | 15 |
| † Nux vomica gross. pulv. | 50·0 | 8 | 500 0 | 76 |
| Öleum amygdal. dulc. | 50·0 | 28 | — | — |
| „ cadinum | 50 0 | 9 | 500 0 | 80 |
| „ croton. tigllii | 1 0 | 4 | — | — |
| „ hyosciami fol. coct. | 50·0 | 13 | — | — |
| „ jecoris aselli | 50·0 | 6 | 500·0 | 55 |
| „ lauri | 50 0 | 10 | 500·0 | 95 |
| „ lini | 50·0 | 7 | 500 0 | 61 |
| „ olivarum (II ^{da}) | 50·0 | 10 | 500·0 | 95 |
| „ sinapis aether | 1·0 | 12 | — | — |
| „ terebinth. rectific. | 50·0 | 5 | 500 0 | 42 |
| † Opium subt. pulv. | 5·0 | 39 | — | — |
| Petroleum crud. (Polonic.) | 50·0 | 7 | 500·0 | 66 |
| Pix liquida | 50·0 | 4 | 500·0 | 34 |
| Plumbum acet. venale | 50·0 | 8 | 500·0 | 70 |
| „ acet. basic. solut. | 50·0 | 12 | 500·0 | 110 |
| „ carbonic. pulv. | 50·0 | 8 | 500·0 | 73 |
| „ oxydat. pulv. | 50·0 | 8 | 500·0 | 76 |
| Pulvis Doveri | 5·0 | 8 | — | — |
| Quercus cort. sciss. | 50·0 | 4 | 500·0 | 34 |
| „ „ gross. pulv. | 50 0 | 7 | 500·0 | 62 |
| Sabadillae fruct. | 50·0 | 8 | 500·0 | 70 |
| „ „ pulv. | 50·0 | 14 | 500·0 | 124 |
| Saccharum pulv. | 50·0 | 7 | 500·0 | 66 |
| Salicis cort. | 50·0 | 4 | 500·0 | 37 |
| Salviae folia | 50·0 | 9 | 500·0 | 85 |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|--------------------------------------|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Sapo kalinus | 500 | 6 | 500.0 | 52 |
| „ medicinal. | 500 | 12 | — | — |
| Scillae bulbus | 500 | 2 | 500.0 | 18 |
| „ „ sicc. pulv. | 500 | 9 | 500.0 | 84 |
| Sebum ovile | 500 | 12 | 500.0 | 106 |
| † Secale cornut. | 50.0 | 11 | 500.0 | 102 |
| † „ „ pulv. | 500 | 20 | 500.0 | 182 |
| Sinapis semin. | 500 | 5 | 500.0 | 45 |
| † Solutio arsenic. Fowleri | 5.0 | 2 | 50.0 | 16 |
| Species aromatic. | 500 | 11 | 500.0 | 104 |
| Spiritus camphorat. | 500 | 8 | 500.0 | 70 |
| „ saponatus | 500 | 10 | 500.0 | 90 |
| „ vini dilut. 70% | 50.0 | 5 | 500.0 | 44 |
| Spongia press. venal. | 5.0 | 29 | — | — |
| Stibium sulfur. aur. p. ven. | 500 | 33 | — | — |
| „ „ nigr. ven. | 500 | 4 | 500.0 | 32 |
| „ „ „ „ pulv. | 50.0 | 8 | 500.0 | 70 |
| † Strychninum | 0 05 | 2 | — | — |
| Styrax liquid. | 500 | 14 | — | — |
| Sulfur. sublim. lot. venal. | 50.0 | 3 | 500.0 | 26 |
| Terebinthina commun. | 50.0 | 4 | 500.0 | 36 |
| † Tinctura aconiti | 50.0 | 16 | — | — |
| „ arnicae | 500 | 11 | 500.0 | 100 |
| † „ belladonnae | 50.0 | 16 | — | — |
| † „ cantharid. | 500 | 25 | — | — |
| † „ digitalis | 500 | 16 | — | — |
| „ jodi | 50.0 | 49 | — | — |
| „ myrrhae | 500 | 20 | — | — |
| † „ nucis vomic. | 500 | 16 | — | — |
| † „ opii simpl. | 50.0 | 59 | — | — |
| † „ veratr. albi | 50.0 | 16 | — | — |
| Unguentum cerussae | 50.0 | 12 | 500.0 | 108 |
| „ glycerini | 500 | 16 | — | — |
| „ hydrargyri | 500 | 32 | — | — |

| | Waga | Cena | Waga | Cena |
|-----------------------------------|-------|------|-------|------|
| | gramy | ct. | gramy | ct. |
| Unguentum plumb. acetic | 50 0 | 17 | 500 0 | 158 |
| „ simplex | 50 0 | 15 | 500 0 | 138 |
| „ sulfurat. | 50 0 | 12 | 500 0 | 110 |
| Valerianae rad. sciss. | 50 0 | 6 | 500 0 | 54 |
| „ „ gross. pulv. | 50 0 | 9 | 500 0 | 83 |
| Veratri alb. rhyz. sc. | 50 0 | 5 | 500 0 | 40 |
| „ „ „ gross. pulv. | 50 0 | 8 | 500 0 | 70 |
| Zincum chlorat. | 10 0 | 16 | — | — |
| „ oxydat. pur. venale | 50 0 | 28 | — | — |
| „ sulfuric | 50 0 | 5 | — | — |
| Zingiberis rad. | 50 0 | 13 | 500 0 | 120 |
| „ „ gross. pulv. | 50 0 | 15 | 500 0 | 142 |

Dodatek do §. 3. str. 52.

T a b u l a

exhibens doses medicamentorum, toxicae indolis maximas pro adulto, ultra quas medicus ne praescribat pro usu interno nisi addito signo exclamationis:!

| | Pro dosi | | Pro die | |
|--|---------------|-------|----------|-------|
| | Grammata | Grana | Grammata | Grana |
| Acidum arsenicosum | 0 006 | 0 08 | 0 012 | 0 16 |
| „ carbolicum crystallisatum | 0 05 | 0 65 | 0 15 | 2 00 |
| „ hydro-cyanicum (Pharmac. austr. 1855.) | 0 05 | 0 68 | 0 20 | 2 7 |
| | sive gutt. 2 | | | |
| Aconiti tubera | 0 12 | 1 6 | 0 60 | 8 2 |
| Aconitinum | 0 007 | 0 09 | 0 04 | 0 55 |
| Apomorphinum hydrochloricum qua emeticum (injectione subcutanea adhibendum) | 0 010 | — | — | — |
| Aqua amygdalar. amarar. concentrata | 1 50 | 20 5 | 5 00 | 68 5 |
| | sive gutt. 40 | | | |

| | Pro dosi | | Pro die | |
|--|---------------|-------|----------|-------|
| | Grammata | Grana | Grammata | Grana |
| Aqua laurocerasi | 1.50 | 20.5 | 5 00 | 68.5 |
| | sive gutt. 40 | | | |
| Argentum nitricum | 0.03 | 0.4 | 0.20 | 2.7 |
| Atropinum | 0.002 | 0.02 | 0.006 | 0.08 |
| " sulfuricum | 0.002 | 0.02 | 0.006 | 0.08 |
| B elladonnae folia | 0.15 | 2.0 | 0.60 | 8.2 |
| " radix | 0.07 | 1.0 | 0.30 | 4.0 |
| C antharides | 0.07 | 1.0 | 0.20 | 2.7 |
| Colchicinum | 0.003 | 0.04 | 0.009 | 0.12 |
| Colocynthid. fruct. | 0.30 | 4.0 | 1.00 | 13.7 |
| Conii macul. herb. | 0.30 | 4.0 | 2.00 | 27.4 |
| Cuprum sulfuricum qua emeticum | 0.40 | 5.5 | — | — |
| D igitalinum | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.14 |
| Digitalis folia | 0.20 | 2.7 | 0.60 | 8.2 |
| E xtractum aconiti tuberum | 0.03 | 0.4 | 0.12 | 1.6 |
| " belladonnae foliorum | 0.10 | 1.4 | 0.40 | 5.5 |
| " " radicis | 0.05 | 0.7 | 0.20 | 2.7 |
| " cannabis indicae | 0.10 | 1.4 | 0.30 | 4.0 |
| " colocynthidis | 0.10 | 1.4 | 0.40 | 5.5 |
| " conii | 0.18 | 2.5 | 0.60 | 8.2 |
| " hyoscyami foliorum | 0.15 | 2.0 | 0.80 | 11.0 |
| " nucis vomicae | 0.04 | 0.55 | 0.20 | 2.7 |
| " opii | 0.10 | 1.4 | 0.40 | 5.5 |
| F errum jodatatum | 0.06 | 0.8 | 0.24 | 3.3 |
| H ellebori virid. rad. | 0.30 | 4.0 | 1.20 | 16.4 |
| Hydrargyrum bichloratum corrosivum | 0.01 | 0.13 | 0.04 | 0.5 |
| " bijodatatum rubrum | 0.01 | 0.13 | 0.04 | 0.5 |
| " jodatatum flavum | 0.06 | 0.8 | 0.40 | 5.5 |
| " oxydatatum flavum | 0.03 | 0.4 | 0.10 | 1.4 |
| Hyoscyami folia | 0.30 | 4.0 | 1.0 | 13.7 |
| J odum | 0.03 | 0.4 | 0.12 | 1.6 |
| K alium stibio-tartaricum | 0.30 | 4.0 | 1.00 | 13.7 |
| Kreosotum | 0.04 | 0.55 | 0.16 | 2.2 |

| | Pro dosi | | Pro die | |
|---|----------|-------|----------|-------|
| | Grammata | Grana | Grammata | Grana |
| L actucarium | 0·30 | 4·00 | 1·20 | 16·4 |
| M orphinum | 0·02 | 0·28 | 0·10 | 1·4 |
| " aceticum | 0·03 | 0·4 | 0·12 | 1·6 |
| " hydro-chloricum | 0·03 | 0·4 | 0·12 | 1·6 |
| N ux vomic. pulv. | 0·12 | 1·6 | 0·50 | 6·8 |
| O leum crotonis | 0·06 | 0·8 | 0·30 | 4·0 |
| O pium pulveratum | 0·15 | 2·0 | 0·50 | 6·8 |
| P hosphorus | 0·001 | 0·01 | 0·005 | 0·06 |
| P lumbum aceticum | 0·07 | 1·0 | 0·50 | 6·8 |
| S antoninum | 0·10 | 1·4 | 0·50 | 6·8 |
| S olutio arsenicalis Fowleri | 0·50 | 6·8 | 1·20 | 16·4 |
| S tramonii fol. | 0·25 | 3·3 | 1·00 | 13·7 |
| S trychninum | 0·007 | 0·09 | 0·02 | 0·27 |
| " nitricum | 0·007 | 0·09 | 0·02 | 0·27 |
| T inctura aconiti | 0·50 | 6·8 | 1·50 | 20·5 |
| " belladonnae | 1·00 | 13·7 | 4·00 | 55·0 |
| " cantharidum | 0·50 | 6·8 | 1·00 | 13·7 |
| " colchici seminum | 1·00 | 13·7 | 3·00 | 41·1 |
| " digitalis | 1·00 | 13·7 | 4·00 | 55·0 |
| " jodi | 0·30 | 4·0 | 1·00 | 13·7 |
| " nucis vomicae | 0·50 | 6·8 | 1·50 | 20·5 |
| " opii crocata | 0·50 | 6·8 | 2·00 | 27·4 |
| " " simplex | 0·50 | 6·8 | 2·00 | 27·4 |
| V eratri albi rhizoma | 0·30 | 4·0 | 1·02 | 16·4 |
| V eratrinum | 0·01 | 0·13 | 0·03 | 0·4 |
| V inum colchici | 1·00 | 13·7 | 3·00 | 41·1 |
| Z incum aceticum | 0·05 | 0·68 | 0·30 | 4·0 |
| " cyanatum | 0·005 | 0·06 | 0·012 | 0·16 |
| " sulfuricum | 0·05 | 0·68 | 0·30 | 4·0 |
| " " qua emeticum | 0·80 | 11·0 | — | — |

Nr. 44.

Rozporządzenie c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 10, Grudnia 1878 r. l. 16.442, dotyczące dodatku do farmakopei z roku 1869.

1. Począwszy od 1. Stycznia 1879 winni się urzędnicy zdrowotni, lekarze, chirurdzy i weterynarze tudzież aptekarze zastosować do dodatku do farmakopei, wydanego pod tytułem „Additamenta ad Pharmacopoeae Austriacae editionem sextam“.

2. Każda apteka winna się zaopatrzyć w drukowany egzemplarz tegoż.

3. O rozporządzeniu niniejszem winny urzęda polityczne w odpowiedni sposób zawiadomić służbę zdrowia i aptekarzy.

Auersperg m. p.

Acidum benzoicum.

Flores Benzoes.

Crystalli sublimatione Benzoes obtentae sint albae, nitoris sericei, odoris benzoini, saporis aciduli, in aquae frigidae partibus 200, fervidae 25, in spiritu vini et aethere facile et perfecte solubiles, calefactae primum liquescant, dein avolent nullum residuum relinquentes.

Solutio aquosa, addito acido chromico, ad ebullitionem evecta odorem amygdalarum amararum ne exhalet, neque colorem viridem induat.

Acidum salicylicum.

Acidum orthohydroxybenzoicum. Acidum spiricum.

Exhibet crystallos prismaticas sive pulverem microcrystallinum album, reactionis acidae, odoris fere expertem, saporis dulciusculi acidi, in aqua

frigida difficile, in aqua fervida et glycerino facile, in spiritu vini, aethere et fervido chloroformio plane solubiles. Solvitur quoque in solutionibus salium reactionis alcalinae.

Solutio aquosa cum ferro sesquichlorato mixta colorem violaceum induit.

Cum calce mixtum et in tubo probatorio calefactum decomponitur, vapores acidi carbonici emittens.

Acidum salicylicum in spiritu vini solutum evaporatione gignat efflorescentiam crystallinam albam, fuscam producens rejice.

Calefactum liquescat et deinde ex integro comburatur.

† Apomorphinum hydrochloricum.

Pulvis crystallinus griseo-albus, exiguis crystallis decoloribus, splendentibus intermixtus, aeri humido expositus viridescens, in aqua, spiritu vini, aethere et chloroformio solubilis. Solutio aquosa decolor est reactionis neutrius, calefacta citius virescit, reactionem alcalinam exhibens.

Solutio aquosa cum acido nitrico concentrato tractata colorem sanguineum, cum ferro sesquichlorato amethystinum, cum kalio hydroxydato nigrum colorem trahit; cum natrio hydrocarbonico praecipitatum album deponit, quod in aethere purpureo, in chloroformio violaceo colore solvitur.

Servetur vasis optime clausis in loco sicco.

Dosis maxima pro injectione subcutanea singula 0.010.

Cassia Fistula.

Cassia Fistula L. Arbor in India orientali indigena, in regionibus calidis plantata. Papilionaceae — Caesalpineae.

Legum'na (Fructus Cassiae Fistulae) cylindrica indehiscentia, 3—6 decimetra longa, 1½—2½ centimetra diametro, pericarpio lignoso, extus fusco-nigricanti nitido laevi, intus septis transversis orbicularibus lignosis

in loculos plurimos monospermos, pulpam atram tenacem, saporis dulcis continentibus divisa.

Rejiciantur legumina pulpa mucida, insectis corrosa aut nimis exsiccata.

Castoreum.

Castoreum Canadense s. Americanum s. Anglicum.

Castor Americanus Cuv. Animal Americam borealem habitans. Mammalia. Rodentia.

Folliculi inter anum et genitalia utriusque sexus positi, exsiccati oblongi vel oblongo-pyriformes, ex parte compressi, saepe duo inter se conjuncti, superficie plus minusve rugosi nigro-fuscescentes, membranis instructi duabus exterioribus arcte coalitis et difficulter separabilibus, integumentum tenue formantibus et duabus interioribus, lamellatim trajicientibus cavum, repletum massa subresinosa, in fractura nitenti, colore e rubrofusco vel e fusco-nigro, odore peculiari, sapore aromatico-amariusculo, masticando dentibus adhaerenti, in spiritu vini et aethere pro magna parte solubili.

Chininum tannicum.

Pulvis amorphus, flavescens, saporis adstringentis amari, in aqua difficilime, in spiritu vini rectificatissimo facile solvendus. Pulvis cum aqua calefactus conglobatur.

Solutio aquosa, addito ferro sesquichlorato, colorem caeruleo nigrum induit. Praeparatum cum dupla quantitate plumbi oxydati pulverati et aqua in pulvem intime contritum et modico calore siccatum, dein cum spiritu vini extractum, solutionem praebet, quae evaporata chininum relinquit.

† Chloralum hydratum.

Crystalli rhomboideo-prismaticae sive aciculares, decolores, reactionis neutrius vel paulum acidae, odoris peculiaris aromatici, saporis ingrati

amaricantis, in aequali parte aquae cito solubiles, solvuntur quoque in spiritu vini et aethere; solutio aquosa addito kalio hydrico turbatur et chloroformium deponit.

Versus temperaturam 50° circiter liquescat ad 96—98° calefactum destillet.

Cum acido sulfurico concentrato modicè calefactum, colorem fuscum ne trahat; acidum hydrochloricum ne redoleat; neve admota ammonia caustica nebulas efformet.

Servetur vase optime clauso in loco sicco a luce remoto.

Collodium.

Liquor syrupi consistentiae, opalescens, decolor, aere cito exiccans; servetur vase optime clauso, loco frigido, luce remoto.

Extractum Rhei.

E radice rhei contusa paretur ut extractum centaurei. Evaporetur ad siccum.

Ferrum hydro - oxydatum dialysatum liquidum.

Ferrum oxydatum dialysatum solutum.

Ex ferro sesquichlorato basico dialyseos ope paratum, praebeat liquorem limpium, coloris intense rubri, saporis modice adstringentis, qui addita acidi sulfurici diluti gutta cito in gelatinam abeat.

Viginti grammata liquoris ad siccitatem evaporatae residuum relinquunt, ponderis grammatis unius, quod ex ferro oxydato constet, cui exigua nonnisi quantitas ferri hydrochlorici basici admixta sit.

Ferrum et Natrium pyrophosphoricum.

Natrium pyrophosphoricum ferratum. Pyrophosphas ferri et sodae.

Sistit pulverem album crystallinum, saporis mite salsi non styptici. In aqua frigida tardius et difficile, in tepida facilius solvitur. Ex solutione aquosa sal integer spiritu vini rectificatissimo praecipitatur in flaccis caseosis albissimis. Solutio aquosa protracta ebullitione turbatur, efformato ferro orthophosphorico. Etiam acida hanc transmutationem efficiunt.

Solutio aquosa argento nitrico addito praecipitatum album in acido nitrico solubile producat, neque natrio carbonico turbetur.

Natrii chlorati et sulfurici nonnisi vestigia conceduntur.

† Jodoformium.

Pulvis microcrystallinus, pinquescens, coloris citrini, odoris crocei, saporis ingrati jodum referentis. In aqua insolubilis, in spiritu vini concentrato et in aethere solvitur.

Super laminam platineam calefactum liquescit dein avolat, residuum alcalinum ne relinquat.

Servetur vase vitreo epistomeo vitreo optime clauso.

Lignum Campechianum.

Haematoxylon Campechianum L. Arbor indigena in America centrali. Papilionaceae — Caesalpineae.

Lignum tinctorium in codicibus truncorum magnis, cortice et albarno destitutis, extrinsecus e caeruleoatris, intus e fusco-rubris, ponderosum, durum, in fissura grosse fibrosum, in segmento transverso zonis subconcentricis undulatis, per vices colore saturatiore et dilutiore et radiis medullaribus,

inter se proximis subtilissimis decussatum, saporis subdulcis subadstringentis, inter masticandum salivam colore violaceo tingens.

In officinis merx prostat *scissa* in ramenta et scobes extrinsecus interdum nitore ex aureo-viridescenti praeditas.

Liquor Ammonii anisatus.

Spiritus salis ammoniaci anisatus.

Rpe: **Spiritus vini 90%**

grammata centum 100

Olei Anisi

grammata quinque 5

Solve et adde

Ammoniae pur. liquid.

grammata viginti quinque 25

Servetur in vase bene clauso.

Mixtura gummosa,

Rpe: **Gummi arabic. pulv.**

grammata decem 10

Sacchari albi pulv.

grammata quinque 5

• solve sensim affundendo in

Aquae destillatae.

grammatibus centum et quinquaginta 150

Paretur ex tempore.

Natrium salicylicum.

Pulvis crystallinus, albissimus, inodorus, saporis mite alcalini, facillime in aqua, facile in spiritu vini solubilis. Solutio aquosa sit decolor, sedimentum fuscum ne demittat, neque acidum sulfuricum concentratum colore fulvo impertiat.

Servetur vase vitreo optime clauso loco obscuro.

Oleum Lini.

Oleum venale pingue siccescens e seminibus Lini usitatissimi expressione calida paratum, sit spissiusculum, limpidum, e subfusco flavum, odoris proprii debilis.

Rancidum, turbidum vel minus spissum rejiciatur.

Pulpa Cassiae.

Rpe: Cassiae Fistulae *q. v.*

Exime pulpam cum dissepimentis transversis et seminibus ope spatulae elue cum

Aquae fontanae tepidae *q. s.*

Traice per cribrum setaceum et inspissa cauta evaporatione in vase porcellaneo ad extracti liquidi consistentiam, dein admisce

Pulpa

ternis partibus

Sacchari pulverati

partem unam

et evaporatione in balneo aquae inspissa ad legitimam pulpa consistentiam.

Sit odoris melliti, saporis grate dulcis et nulla vestigia inquinacionis metallica prodat.

Spiritus Saponis kalini.

Rpe: Saponis kalini

grammata ducenta

200

Spiritus Lavandulae

grammata centum

100

Digere et filtratum serva.

Styrax liquidus.

Liquidambar orientalis Miller. Arbor Asiae minoris. Platanaceae.

Balsamum, e cortice praeparatum, sistit massam tenaci-liquidam, turbidam, in aqua demergentem et cum aliquanto aquae permixtam, coloris e griseo-fuscescentis, odoris peculiaris fragrantis, saporis aromatici subamaricantis.

Cum aequali spiritus vini concentrati pondere solutionem praebet, quae filtrata et evaporata massam fusco-flavescentem pellucidam, in aethere limpide solubilem relinquat.

Syrupus Ipecacuanhae.

Rpe: Ipecacuanhae rad. rud. tus.

| | | |
|--|--------------------------------------|-----|
| | <i>grammata tria</i> | 3 |
| Aquae communis calidae | <i>grammata centum et octo</i> | 108 |
| Spiritus vini 70% | <i>grammata quindecim</i> | 15 |
| Digere per diem et filtra. In liquoris | <i>grammatibus centum et viginti</i> | 120 |
| solve digerendo | | |
| Sacchari | <i>grammata ducenta</i> | 200 |
| ut fiat syrupus. | | |

Tinctura Cascarillae.

E cortice cascarillae grosse tuso paretur ut tinctura aconiti.

Tinctura Castorei canadensis.

E castoreo canadense contuso et minutim conciso paretur ut tinctura aconiti.

Tinctura Chinae composita.

| | | |
|--|---------------------------------------|-----|
| Rpe: Chinae fusc. cort. gr. pulv. | <i>grammata sexaginta</i> | 60 |
| Gentianae rad. sciss. | | |
| Aurantiorum cort. flaved. sciss. | <i>grammata viginti</i> | 20 |
| Spiritus vini 70% | <i>grammata trecenta et sexaginta</i> | 360 |
| Aquae Cinnamomi simpl. | <i>grammata centum et viginti</i> | 120 |
| Digere per sex dies, exprime et filtra. | | |

Unguentum diachylon Dr. Hebra.

| | | |
|--|-----------------------------|-----|
| Rpe: Emplastri diachylon simpl. rec. parati | <i>grammata centum</i> | 100 |
| Emplastro adhuc liquido admisce | | |
| Olei olivarum | <i>grammata septuaginta</i> | 70 |
| | (vel tantum) | |
| ut fiat unguentum molle, cui adde | | |
| Olei Lavandulae | <i>grammata quatuor</i> | 4 |
