

⌘

DRUGA DO ZDROWIA

NR. 10 i 11
1933



Choroby weneryczne
są uleczalne


Co sprzyja szerzeniu się chorób wenerycznych?



Choroby weneryczne są zaraźliwe. Głównym ich rozsadnikiem jest podobnie, jak w gruźlicy, człowiek zakażony. Przeszczepienie choroby następuje zwykle przez cielesne obcowanie z osobą zakażoną. Lekkomysłne stosunki płciowe z osobami, o których zdrowiu nie mamy pewności, zwłaszcza z prostytutkami, zawsze kryją w sobie niebezpieczeństwo zakażenia, nigdy bowiem nie można wykluczyć bez dokładnego badania, czy ktoś nie jest wenerycznie chory, lub też czy choroba jego nie jest utajona i nie daje łatwo dostrzegalnych objawów.

Badania wykazały, że na stu chorych 62 ulega zakażeniu w stanie nietrzeźwym. Wynika z tego, że zamroczenie alkoholem potęguje sposobność zakażenia, pijani bowiem tracą bystrość spostrzegania i sprężystość woli. Okazało się także, że podchmielenie jest w tym względzie groźniejsze, niż zupełne upojenie alkoholowe.

40% wszystkich zakażeń wenerycznych zawdzięczamy prostytutce, zwłaszcza tajnej. prostytutka, nawet wówczas, kiedy niema jeszcze objawów chorobowych, już może zakazić innych. Na podstawie statystyki, przeprowadzonej w jednym z większych miast Polski, stwierdzono, że każda niemal prostytutka (98%) przebyła trypra (rzeżączkę), a około 70% ulega zakażeniu kiłą.



Zmiany syfilityczne rdzenia kręgowego

Państwowa kontrola sanitarna nad prostytutką nie jest w stanie bezwzględnie wykluczyć możliwości zakażenia, jedynie może ją ograniczyć. Wobec tej statystyki staje się jasnym, że prostytutka w wysokim stopniu przyczynia się do szerzenia chorób wenerycznych.

Równie niebezpieczną sposobnością do zakażeń wenerycznych jest nieostrożne pozamażeńskie życie płciowe. Lekkomysłność jednego człowieka sprowadza nieraz chorobę całej rodziny. Niech za przykład posłuży przytoczony poniżej przypadek: pewien żonaty człowiek, przebywając poza domem, uległ przez nieostrożność zakażeniu tryprem czyli rzeżączką. W kilka dni potem, zanim zauważył pierwsze objawy utajonej jeszcze choroby, zaraził swą żonę, która później w następstwie choroby straciła płodność. Matka żony równocześnie korzystała wraz z nią z tychsamyh sprzętów, używanych do higieny narządów kobiecych (przybory do płukania, gąbki), w następstwie czego i ona zakaziła się tryprem, a od niej jej małżonek. Takich lub podobnych przykładów możnaby przytoczyć więcej.

Równoczesne używanie tychsamyh przedmiotów przez chorych i zdrowych np. używanie wani, szczotek, gąbek, bielizny, zakażonych ropą, zawierającą zarazki trypra, nieraz bywa przyczyną przeniesienia choroby z matki lub opiekunki na dziecko. Według niektórych obliczeń liczba takich zakażeń pozapłciowych (także przeszczepienie kiły przez pocałunek) wynosi ponad 10% ogólnej liczby wenerycznie chorych.

Lek. S.

Rodzaje chorób wenerycznych i ich nazwy

Trzy najważniejsze choroby weneryczne u nas spotykane:

Kiła (wrzód twardy)

czyli
Syphilis
czyli
Lues
czyli

Przymiot

wywołuje zarazek t. zw. krętek bładny

Rzeżączka

czyli
Wiewiór
czyli
Tryper

wywołuje zarazek t. zw. dwoinka Neissera (tryprowa)

Szankier miękki

czyli
Wrzód weneryczny
wywołuje zarazek t. zw. laseczka

Zarazki chorób wenerycznych nie są dostrzegalne dla gołego oka — widzieć je można tylko przez układ szkieł powiększających (mikroskop).



Plamy syfilityczne na czole



Plamy syfilityczne na rękach

CHOROBY WENERYCZNE



eszcze do dziś słowo: „choroby weneryczne“ wywołuje pośród mniej oświeconego ogółu pewien wstrząs natury uczuciowej. Dla jednych posądzenie o te choroby stanowi rodzaj obrazy, dla innych są one pełną tajemnicą groźbą. Przemilcza się je, ukrywa się je wstydliwie, uważa się je za coś hańbiącego.

Wszystkie choroby są równe, każda jest bowiem nieszczęściem. Nie można ich dzielić na „hańbiące“ i „nie hańbiące“.

Liczne choroby zakaźne najpraktyczniej jest dzielić podług „wrot zakażenia“. Wrotami zakażenia choroby zakaźnej nazywamy narząd, przez który zarazek dostaje się do ustroju i, co ważniejsze, w którym znajduje możliwość rozwoju. Naprzykład wiemy, że dla tyfusu, cholery i czerwonki wrotami jest przewód pokarmowy, dla innych chorób, np. węgla — skóra.

Chorobami wenerycznymi nazywamy zakaźne choroby, dla których wrotami jest



Syfilis wrodzony

narząd moczopłciowy, albo — które tylko za jego pośrednictwem mogą się przenieść

na inne narządy. Choroby weneryczne podobnie, jak wszystkie choroby zakaźne, przedstawiają największą możliwość leczenia i do zupełnego wyleczenia.

Od czasu wykrycia zarazków, wywołujących je, zdobyliśmy otwartą drogę do przyczynowego leczenia chorób wenerycznych. Odkrycie odczynu Wassermana, wynalezienie salwarsanu, leku swoistego przeciw kile, dało w ręce człowieka potężną broń przeciw temu wrogowi. Teraz od nas samych, od uświadomienia mas, od siły szeroko roztoczonej walki zależeć będzie rychłe usunięcie chorób wenerycznych z powierzchni ziemi. Ale każdy musi pamiętać: nie jest hańbą być chorym, natomiast zbrodnią staje się zaniedbanie choroby, a przez to przenoszenie jej na innych. Nie jest wstydem być chorym, natomiast obowiązkiem każdego jest leczyć się i wyleczyć się, aby

nie rujnować własnego ustroju i nie stanowić źródła zakażeń dla otoczenia. Dr. M.

PIERWSZE OBJAWY CHORÓB WENERYCZNYCH



ażda ze spotykanych u nas chorób wenerycznych, t. j. kiła, wiewiór czyli tryper, oraz szankier miękki — wywołana jest przez odmienny zarazek chorobowy, niedostrzegalny dla oka, nieuzbrojonego w silne powiększające szkła.

Pojawienie się pierwszych objawów chorobowych jest poprzedzone tak zwanym okresem utajonej choroby, trwającym od chwili zakażenia do jawnego wybuchu choroby. Okres ten jest dla każdej z trzech wymienionych chorób odmienny, podobnie, jak i objawy, które jednak mogą być do siebie podobne.

Podajemy krótki opis pierwszych objawów chorób wenerycznych.

1. Tryper czyli wiewiór: W 2—8 dni po podejrzanym stosunku płciowym występuje:

u mężczyzn pieczenie, swędzenie oraz ból w cewce moczowej, zwłaszcza podczas oddawania moczu, a u wylotu cewki pojawia się początkowo skąpa śluzowa, później obfitsza ropna wydzielina barwy żółto-zielonawej. Samoistne wzwody członka sprawiają ból.

U kobiet obok bólu i uczucia pieczenia spotykamy upławy.

Wydzielina, wydobywająca się z narządów rodnych zawiera zarazki, t. zw. dwinki tryprowe, toteż przeniesiona na inne



Paraliż postępowy

błony śluzowe, np. oczu, może wywołać groźne zapalenie oczu, grożące ślepotą.

2. Kiła nieleczone jest długotrwałą chorobą, która ciągnie się nieraz przez dziesiątki lat i powoduje olbrzymie szkody w całym ustroju ludzkim. Zarazek chorobowy, który dostanie się na naskórek, nawet niewidocznie uszkodzony, po upływie 3—6 tygodni wywołuje tzw. owrzodzenie twarde, niebolesne, któremu może towarzyszyć również niebolesny obrzęk najbliższych gruczołów chłonnych. Owrzodzenie to najczęściej powstaje na narządach płciowych lub w ich otoczeniu; może ono powstać również w każdym innym miejscu ciała, np. na ustach, wargach, piersiach, które zostało uszkodzone i zakażone. Wrzód ten goi się szybko, lecz nie jest to dowodem, że choroba się skończyła. Zarazki przechodzą do krwi, w której pozostają przez długi czas, wywołując dalsze objawy chorobowe.

3. Szankier miękki czyli wrzód weneryczny jest stosunkowo najłagodniejszą chorobą weneryczną. Po 48 godzinach w miejscu uszkodzonej i zakażonej skóry powstaje bardzo bolesne owrzodzenie (jedno lub kilka — w kile — tylko jedno), połączone z bolesnym obrzękiem gruczołów chłonnych, które zwykle ulegają zropieniu. Choroba ta zwykle przebiega bez późniejszych powikłań w innych częściach ustroju, jednak może wywołać głębokie uszkodzenie miejscowe.

Pouczenie dla chorych na kiłę



K

ięta jest chorobą bardzo zaraźliwą. Musisz być ostrożny(a) i uważać, aby nie przenieść swej choroby na drugich i to nie tylko przez obcowanie płciowe, ale również i przez pocałunek, spanie w tym samym łóżku, przez używanie tych samych naczyń do jedzenia i do picia, tych samych ręczników, mydła itp. Jednorazowym leczeniem nie wyleczysz swej choroby: może się ona powtórzyć po pewnym czasie. W razie ukazania się białych plam na błonie śluzowej jamy ustnej, na języku, na dziąsłach, lub plam na skórze, na częściach rodnych lub dokoła odbytnicy, mimo że nie sprawiają one żadnych dolegliwości, należy zgłosić się natychmiast do lekarza celem zbadania i przeprowadzenia leczenia. Ale nawet, kiedy nie wystąpią żadne podejrzane objawy, należy bezwzględnie zgłaszać się co pewien czas (np. co 2 miesiące) do lekarza celem dokładnego zbadania, łącznie ze zbadaniem krwi. Leczenie niekoniecznie musi być przeprowadzone w klinice lub szpitalu (z wyjątkiem przypadków, bezwzględnie przeznaczonych przez lekarza do leczenia w klinice lub w szpitalu) i, lecząc się, można wykonywać swe obowiązki zawodowe.

Jeżeli według wskazówek lekarza leczysz się będziesz przez czas dłuższy, około 3 lat, wówczas będzie można przypuszczać, że się wyleczysz tak, że późniejsze ciężkie schorzenia nerwowe lub choroby serca nie wystąpią. Tylko lekarz po dłuższej obserwacji, po kilkakrotnym zbadaniu krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego będzie w stanie orzec o zupełnym wyleczeniu.

Związki małżeńskie będzie można zawrzeć dopiero po kilku latach, po otrzymaniu pozwolenia od lekarza, w przeciw-

nym razie możesz przenieść chorobę na żonę i dzieci, narażając żonę na długotrwałą chorobę, na częste poronienia lub porody dzieci nieżywych albo niezdolnych do życia, a nawet kalek. W razie odpowiedniego leczenia i zachowania wskazówek lekarza choroba, na którą cierpisz, jest zupełnie uleczalna.

Do leczenia zgłaszać się należy punktualnie według wskazówek lekarza. W czasie leczenia (zwłaszcza rtęcią) należy dbać troskliwie o higienę jamy ustnej, czyścić zęby szczoteczką i proszkiem do zębów po każdym jedzeniu oraz płukać roztworem, przepisany przez lekarza.

Palenie tytoniu w czasie leczenia jest zakazane; nadmierne palenie działa drażniąco na błony śluzowe jamy ustnej i przyczynia się do powstania długotrwałych zmian, trudno dających się wyleczyć. Zakazane jest spożywanie potraw zbyt ostrych, surowych owoców, sałat i t. p., które mogłyby

wywołać biegunkę. Kiedy nastąpi biegunka, ślinotok, obrzmienie dziąseł, zaczerwienienie skóry, obrzęki nóg lub powiek, natychmiast należy zgłosić się do lekarza. W czasie leczenia należy prowadzić tryb życia spokojny, wczesnie udawać się na spoczynek, unikać napojów alkoholowych, gdyż one osłabiają obronne środki ustroju. Czas trwania leczenia i liczbę potrzebnych leceń określi tylko lekarz. *Należy pamiętać, że jedno leczenie nie wystarczy.* Jeżeli osoba świadoma tego, że nie jest jeszcze wyleczona, obcuje cieleśnie i zakaża zdrową kobietę, popełnia występki i podpada karze.



Pouczenie dla chorych na rzeżączkę



zeżączka (tryper, wiewiór) jest chorobą bardzo zaraźliwą. Przed zupełnym wyleczeniem nie wolno bezwarunkowo obcować cielesnie. Jeżeli kropla wydzieliny ropnej z cewki moczowej dostanie się do oczu, powstaje gwałtowne zapalenie, które doprowadza do ślepoty. Należy więc po każdym dotknięciu części rodnych starannie umyć ręce wodą i mydłem. W czasie trwania choroby należy zaprzestać uprawiania sportów, nie wolno tańczyć, jeździć konno i na rowerze. Wszelkie gwałtowne poruszenia są wzbronione ze względu na możliwość powstania poważnych powikłań chorobowych (np. zapalenia najądrza). Bezwzględnie są

wzbronione napoje wysokokowe (wódka, likiery, wino, piwo) oraz ostre i pieprzne potrawy.

Dozwolone są: kawa, herbata, kakao, mleko, limonada, woda (w dużych ilościach, zwłaszcza w początkach choroby), zupy, rosoly, mięso, jarzyny, potrawy słodkie, chleb biały i razowy.

Należy dbać o codzienne wypróżnienie.

Członek należy utrzymywać w czystości, zmywając wodą części płciowe kilka razy na dzień; w razie obfitego wycieku ropnego założyć nieco waty przed ujście cewki. Watę, zanieczyszczoną wydzieliną ropną, należy spalić.

Zalecone przez lekarza wstrzykiwania należy wykonywać punktualnie i starannie

według udzielonych wskazówek. Przed k a ż d e m wstrzyknięciem należy oddać mocz, aby przepłukać cewkę moczową z zawartości ropnej, obmyć żołądek i ujście cewki wodą oraz wstrzyknąć przepisaną ilość płynu do cewki moczowej, zatrzymując płyn w cewce moczowej co najmniej przez 5 minut. Liczbę dzien-

nych wstrzykiwań określi lekarz. Po skończonym wstrzyknięciu należy przepłukać strzykawkę ciepłą wodą i przechować ją najlepiej w naczyniu szklanym, zanurzysz jej koniec w roztworze, używanym do wstrzykiwań.

Aby uniknąć zmasz nocnych (mimowolnych wycieków nasienia w nocy), należy sypiać nie więcej, niż 7 godzin pod przykryciem lekkim, w temperaturze pokojowej chłodnej; wieczerzę należy jadać wcześniej. Jeżeli zmasz są częste, należy powiadomić o tym lekarza.


Zaprzestać leczenia można tylko wtedy, kiedy lekarz uzna to za stosowne.

Rzeżączka nie jest wyleczona, jeżeli ropa przestanie wydobywać się z cewki moczowej; wyleczenie stwierdzić może tylko lekarz po dłuższym i dokładnym badaniu i przez zastosowanie specjalnych sposobów badania. Pojawienie się niewielkiej kropli wydzieliny w ujściu cewki w godzinach rannych, lub obecność nitek w moczu może być objawem przewlekłej rzeżączki tak samo zaraźliwej, jak i rzeżączka ostra.

Przed każdym badaniem u lekarza należy zatrzymać mocz w pęcherzu przez dłuższy czas, oczywiście, jeżeli to jest możliwe, przez kilka godzin.

Nie należy wstępować w związki małżeńskie bez poddania się badaniu u lekarza i bez uzyskania jego zezwolenia. Podjęcie stosunku płciowego z kobietą zdrową przed zupełnym wyleczeniem choroby zakaża kobietę. Rzeżączka kobiet jest chorobą bardzo poważną, trudno uleczalną i nawet grozi ciężkimi powikłaniami i bezpłodnością.

W razie zastosowania powyższych wskazówek choroba Twa jest uleczalna. Niewyleczona przejść może w stan przewlekły, bardzo trudny do wyleczenia i groźny w następstwach, np. przez wytworzenie się zwężenia cewki.



SYFILIS A MAŁŻEŃSTWO




Yfiliis najzłośliwiej odbija się na potomstwie. Praktycznie rzecz się przedstawia tak, że ojciec zaraża matkę, a po matce chorobę dziedziczy dziecko. Aby wykazać fatalne skutki rodzicielskiej kiły, przytoczymy statystykę amerykańską, która mniej więcej odpowiada naszym stosunkom. Z 1700 ciężarnych kobiet 34% poroniło lub wydało na świat nieżywe dzieci; 56% z żywo urodzonych dzieci zmarło w pierwszych miesiącach, a więc tylko 10% przekroczyło pierwszy rok życia. Wynik to bardzo smutny. Należy jednak zwrócić uwagę na następujący fakt: fatalne następstwa kiły dziedzicznej występują tylko w razie świeżego zakażenia rodziców. Wedle ustalonego prawa w takim wypadku pierwsze dziecko bywa ciężko chore, następne zaś bywają co-

raz mniej dotknięte tak, że wkońcu mogą rodzić się zupełnie już normalne dzieci, nawet wówczas, jeżeliby rodzice wcale się nie leczyli.


Toteż lekarz nigdy nie powinien udzielać pozwolenia na małżeństwo człowiekowi, który świeżo przechodził syfiliis. Istnieje przepis, którego nie należy nigdy przekraczać: żenić się można conajmniej w trzy lata po zakażeniu, a w rok po ustąpieniu ostatnich objawów choroby.

Od czasu wprowadzenia leczenia salwarsanem okres ten da się znacznie skrócić. Obecnie stało się prawidłem, że tylko ci mężczyźni, którzy ze zbrodniczą lekomyślnością przechodzą do porządku dziennego nad przepisami lekarskimi i którzy z dziecinem niedbalstwem odnoszą się do zaleconego leczenia, zarażają swoje żony i stają się ojcami chorego potomstwa. Na-



Późny syfiliis

tomiast mężczyźni, którzy wyczekują odpowiednio długo i skrzętnie przeprowadzają leczenie pod kierunkiem biegłego lekarza, stają się ojcami zdrowych i silnych dzieci. Dr. O.




Macica i przydatki maciczne ze zmianami rzeżączkowymi

Rzeżączka a małżeństwo



Zakraplanie oczu niemowlęcia dla ochrony przed zapaleniem tryptowem



Macica i przydatki maciczne kobiety zdrowej



Kto przebył rzeżączkę, powinien przed wstąpieniem w związki małżeńskie poddać się badaniu lekarskiemu w celu stwierdzenia, czy choroba straciła już właściwości zaraźliwe. Jest to konieczne, zwłaszcza jeśli od zakażenia się tryptrem nie minęły jeszcze dwa lata, gdyż w ciągu takiego okresu czasu bardzo często (w 40—50%) jeszcze istnieje możliwość zarażenia. O wprost zbrodniczych jednostkach, które już w kilka tygodni po zarażeniu się zawierają zwią-

na przeszkodzie do zahamowania postępów nieszczęsnej choroby przez zastosowanie odpowiedniego leczenia. Nieszczerość ta staje się tem karygodniejsza, że lekarz, którego by wezwał troskliwy mąż, mógłby bez szkody dla wyników leczenia zataić przed żoną źródło jej choroby, a jednocześnie uratować ją od jej skutków, któreby mogły zaciążyć na całym jej życiu. Najczęściej o leczeniu rzeżączki u kobiety nikt nie myśli, rzeżączka przenosi się na wewnętrzne narządy płciowe i powoduje ciężkie, nieuleczalne zmiany. Dr. O.



Wypadanie włosów syfilityczne

zek małżeński, nie będziemy wcale mówili. Natomiast chory, obarczony przewlekłym tryptrem, często przypuszcza, że został już oddawna wyleczony i z czystym sumieniem żeni się, pomimo to jednak zaraża żonę.

Pomyślny wynik pewnych sposobów badania upoważnia lekarza do zezwolenia na małżeństwo. W przeciwnym razie chory na przewlekłą rzeżączkę najczęściej zaraża żonę. Choroba kobiety, której małżeństwo i tak przynosi wiele przykrych niespodzianek, czyni z niej pożałowania godną istotę, która często ukrywa swe dolegliwości nie tylko przed lekarzem, ale nawet przed sprawcą zakażenia — własnym mężem.

Brak szczerości u mężczyzn staje często



Wypadanie włosów niesyfilityczne

Tryper jako

klęska społeczna



Mało zapewne ludzi zdaje sobie sprawę ze społecznego znaczenia, jakie ma walka z tryprem i nieobliczalnymi wprost szkodami, jakie ta choroba wyrządza społeczeństwu.

W wielkich miastach zapadalność na trypra jest bardzo wysoka. Wynikiem tego są wielkie szkody materialne, związane z kosztami często wielomiesięcznego leczenia oraz ze straconymi przez chorych dniami pracy. Jeszcze większe znaczenie mają powikłania tryprowe: zapalenie stawów i najądrza u mężczyzn. Zapalenie stawów (często zwłaszcza kolanowych) może pozostawić zeszywnienie, powodujące inwalidztwo i niezdolność do pracy. Zapalenie najądrza może spowodować stałą niepłodność. Prawie 100% niepłodności męskiej jest pochodzenia tryprowego.

Największe spustoszenia szerzy jednak tryper wśród kobiet. Niedosć, że jest on u nich trudno wyleczalny, że leczenie wymaga długiego czasu i wielkiej cierpliwości, powoduje on jeszcze ciężkie powikłania: Za-



Zmiany reumatyczne na tle tryprowym


każenie wstępuje w górę, obejmuje błonę śluzową macicy, przechodzi do jajowodów, tkanki okołomaciczej i do jajników. Wszystkie te sprawy chorobowe powodują niepłodność (powyżej 90% wszystkich przypadków niepłodności u kobiet) oraz trwałe kalectwo dziesiątków tysięcy kobiet. Chore te zapełniają wszystkie szpitale i oddziały ginekologiczne. Przewlekłość tych chorób, oraz ich bolesność wyniszczają ustrój kobiety, uniemożliwiają jej pracę, nawet najlżejszą, i grożą jej tysiącem niebezpieczeństw: każda ciąża lub poród grozi jej zaostrzeniem choroby, a nawet tryprową gorączką połogową, grozi ślepotą nowonarodzonemu dziecku. Każde przerwanie ciąży czy zabieg leczniczy grozi w tych przypadkach ogólnym, nieraz śmiertelnym zakażeniem ustroju. Długotrwała choroba wyniszcza materialnie, rujnuje rodzinę, obciąża społeczeństwo istotami niezdolnymi do pracy. Nie można więc lekceważyć trypra, nie można go zaniedbywać tembardziej, że leczony od początku daje się łatwo usunąć.

Dr. M.

Jak chronić się przed zakażeniem wenerycznym?



By się ustrzec przed chorobami wenerycznymi, należy dbać o higienę swego życia płciowego. Najpewniejszym zabezpieczeniem przed nimi jest oczywiście zupełna wstrzemięźliwość płciowa do czasu zawarcia związków małżeńskich. Ta ochrona jednak, zwłaszcza dzisiaj, wobec ciężkich warunków gospodarczych nieraz nie zezwalających na małżeństwo, niezawsze może być przeprowadzona. Wszelkie inne środki



Późny syfilis

groźną sposobność zakażenia. W razie choroby nie wolno zwlekać z zasięgnięciem porady lekarskiej. Leczenie należy przeprowadzić według wskazań lekarskich, a wtedy można liczyć na zupełny powrót do zdrowia. „Cudowne“ uleczenia chorób wenerycznych tzw. środkami domowymi są zwykłym oszustwem, i mogą przynieść choremu tylko szkodę, narażając go na zaniedbanie choroby i różne powikłania chorobowe.

Lek. S.



Owrzodzenia syfilityczne

ostrożności mogą znacznie zmniejszyć niebezpieczeństwo zakażenia, lecz nie dają całkowitej pewności ochrony. Niemniej przeto należy je zachowywać zawsze, kiedy zakażenie jest możliwe.

Przekonano się, że stosowanie pewnych maści lub płynów możliwie najwcześniej po zakażeniu zmniejsza prawdopodobieństwo choroby do kilku procent. Im wcześniej po stosunku płciowym stosuje się owe środki zapobiegawcze, tem pewniejszy jest ich skutek. Jakich leków zapobiegawczych i w jaki sposób używać, może pouczyć lekarz lub poradnia zapobiegawcza.

Każdy powinien wiedzieć, że w interesie jego własnego zdrowia i w interesie jego rodziny leży ochrona przed zakażeniem wenerycznym. Chorobom wenerycznym można skutecznie zapobiegać. Już unikanie styczności z prostytutkami usuwa bardzo



Owrzodzenia syfilityczne



Syfilis wrodzony

OKRESY SYFILISU CZYLI KIŁY



e względów praktycznych zakażenie kiłowe dzielimy na cztery okresy:

Okres 1, zwany zmianą pierwotną, kiedy w 3—6 tygodni po zakażeniu zjawia się wrzód niebolesny, gładki, o twardych brzegach oraz twardnieją pachwinowe gruczoły chłonne.

Okres 2 — jest to okres rozsiania się krętka bladego, powodującego zakażenie kiłowe i szerzącego je przez krew po całym ustroju.

Okres 3 — okresowe nawroty choroby, zależne od leczenia i oporności ustroju itp.

Okres 4 — zmiany w układzie nerwowym: wiań rdzenia, porażenia postępujące i inne.




Syfilis wrodzony

Choroby weneryczne a alkoholizm



e dwie plagi ludzkości znajdują się w ścisłym przymierzu. Najlepszym tego dowodem jest statystyka, wykazująca ścisłą zależność natężenia alkoholizmu i zapadalności na choroby weneryczne.


Sklada się na to kilka przyczyn. Po pierwsze, upojenie alkoholowe przez usunięcie moralnych hamulców, a w wypadkach



Syfilityczne schorzenia serca

przewlekłego alkoholizmu przez zwyrodnienie, spaczenie umysłowości pijaka stanowi główną podniętę do korzystania z usług prostytutki. Po drugie, zamroczenie alkoholowe osłabia kontrolne działanie rozsądku, usuwa z pamięci niebezpieczeństwo, stosowanie środków ochronnych, czyni człowieka ślepy na możliwość zarażenia się w warunkach, w których jest ono zupełnie pewne. Po trzecie, alkohol, jak każda trucizna, bardzo osłabia naszą odporność: poraża białe krwinki i ułatwia zakażenie nawet wówczas, kiedy w stanie trzeźwym większa oporność ustroju je uniemożliwiłaby.

Dr. M.




Syfilis

Ilu ludzi choruje na choroby weneryczne?



rak należytego uświadomienia o chorobach wenerycznych, zwłaszcza zaś — o warunkach, w których powstaje zakażenie, bardzo sprzyja szerzeniu się tych chorób.

Im niższa jest kultura społeczeństwa, im mniejsze zatem uświadomienie sanitarne, tem większą bywa częstość chorób wenerycznych. W Południowej Ameryce, Hiszpanji i Portugalji chorowało według przedwojennych obliczeń około 20—30% całej ludności. W Afryce 56% wszystkich murzynów cierpiało na choroby weneryczne, przede wszystkim kiłę. W Niemczech zapada na kiłę 4% ludności — podobnie i u nas. Siedliskiem chorób wenerycznych są przede wszystkim miejscowości, gęsto zaludnione i dlatego znajdujące się w złych warunkach życiowych, zwłaszcza zaś miasta, gdzie przebywa dużo ludności napływowej, jak miasta stołeczne, portowe itp.



Syfilis