

Antavaciones Sobre la Cerecha et la Raymilla.

P. ¿Dónde se cría si se cría en la Raymilla, o si es en la Cerecha?

R. Se cría en la Cerecha y se cría en la Raymilla y cuando se da, nace muy poca y de muy un cuerpo.

P. ¿Como se multiplica, por crías, o por semillas?

R. Se siembra de bejas solamente mas que en demedia vara de largo, y como se cría en un arbol amarrandolo con otros bejas o mecate andor marcan al arbol.

P. ¿En que mes se siembra, y si es en caraje o en carajens preparado?

R. En qualquiera mes del año se puede sembrar.

P. ¿Medicancia se obra en la planta?

R. Se obra de una vara de distancia de un bejas al otro.

P. ¿Se cría en los bejas con crías o se sejan a un tiempo por el suelo?

R. Conforme el bejas se cría en el palo que al pie de el se siembra, el mismo se alza a las cumbres del palo, y solo quando es muy viejo se cae al suelo, y estando de esta manera no da fruto.

P. ¿En que mes se cría la Raymilla?

R. Desde ultimo de febr. en adelante.

P. ¿En que se cría quando es tiempo de recogerla?

R. Se cría quando es tiempo de coquea. Se tiene cuidado de ser quando se pone amarilla que es señal de que ya esta en sazón; y que si se da al ser muy o se sembrado el bejas.

P. ¿Qual es la preparacion que necesita desde que se coge hasta el tiempo de ponerla en sazón. y la conservacion?

R. Luego que se coge debe ponerse al sol tendida una por una libre de agua u agua fría que no se penetre la humedad, y así que el sol se de calentar que sea sobre las doce o una de la tarde se embolvera si el ambiente caliente en unas seradas u otros días que sea

de Lata y luego queda baguilla de paja prieta, se saca
de sol de modo que sale hasta que crezca, procurando que
quede mas bien sea que flexible, por que estando asi
se mancha. Despues de sea se pone en unas cajas
cajones que no crean humedad por que estando en el man
cha. Luego para embalar se casada la baguilla a
cajones de oja de lata y entre crean medido en uno de
pino, que despues se forran con corales de Campeche, sendo
cavescador despues de todo con cueros crudo de Peci.

P. ¿ Que cantidad de Cirimia que produce cada planta anualm^{te} ?

R. Sendo el bepus nuevo, que no este oprecada, y si sembrado
en buen terreno, da cada año hasta cincuenta y mas
baguillas.

P. ¿ Cual es la duracion de esta planta, y si varia en su produccion ?

R. El bepus no varia hasta que pare de treinta a quarenta
años, o se debe limpiar al pie de donde esta sembrado, puen
haviendo era que le irromide a su altura, no da mucho produccion.

P. ¿ Las lluvias antiguas y los soles demorados parecen ser cosas
perjudiciales ?

R. Quando el bepus esta en flor y le llueve demorados, se cae la flor
y no da el fruto, y por eso p^u que este para mejor y abundante,
se sembrara en los meses desde Marzo a Mayo. tambien
quando la baguilla esta pequena y le hace mucho sol
se seca en no cayendole alguna agua.

Q. Si hay en fin algun insecto ó algun otro animal que
haya danos a la baynilla?

R. Ningun animal haedano a la baynilla, por que era
estando vende es nociva para la leche

Handwritten text at the top of the page, including a large decorative flourish on the left side.

Middle section of handwritten text, featuring several lines of cursive script and a large decorative flourish on the left side.

Lower middle section of handwritten text, continuing the cursive script with a large decorative flourish on the left side.

Bottom section of handwritten text, including a large decorative flourish on the left side and a small dark circular mark near the bottom center.