

639987

IV RES.

39

KROWY



1. Krowom wysokocielnym nie zadawać ponad 15 kg kiszzonek z liści buraka cukrowego (płonienie).
2. Ilość pasz wodnistych (zielonki, okopowe, kiszonki) w stosunku do pasz suchych słomiastych musi być taka, aby odchody nie były płynne (zmniejszenie się mleczności).
3. Zadawanie krowom nadmiaru paszy słomiastej, objawiające się twardym kałem, powoduje zmniejszenie się mleczności.
4. Gwałtowne przejścia z paszy wodnistej na suchą i odwrotnie rujną mleczność krowy.
5. Zadawanie paszy treściwej po wodnistej utrudnia jej trawienie – zmniejsza wydajność mleka.
6. Zadawanie pasz zakurzonych, nieodsianych plew powoduje zapiecenie i zmniejszenie mleczności.
7. Zadawanie krowom większych ilości kiszzonek daje mleko niezdatne do przerobów.
8. Zadawanie krowom melasy ponad 2 kg na dobę powoduje płonienie.
9. Nie opóźniać pasz ponad 15 minut.
10. Zadawać paszę krowom jednocześnie. Widok jedzących krów powoduje u niejedzących stratę soków trawiennych, zmniejszenie wydajności mlecznej.
11. Przy kiszzonekach dodawać szlamkredy do paszy. Brak wpływa jak pod 7.
12. Przed dojem pozostawiać krowę, w zupełnej ciszy.
13. Z pastwiska pędzić krowę powoli, umożliwić korzystanie z wodopaju.
14. Doić krowę spokojnie nie uderzając, wydając całkowicie (zmniejszenie wydajności mlecznej).

15. Sieczkę, plewy, kołacze starannie przesiewać lub puszczać przez magnesy, aby wyciągnąć gwoździe i odłamki drutu (krowa te przedmioty łyka – wewnętrzne zranienia powodują śmierć).
16. Przepasanie przed ocieieniem i po ocieieniu pociąga zapalenie wymienia.
17. Niezdajanie siary (pierwsze mleko po ocieieniu) pociąga jak 16.
18. Zmywanie wymienia przed dojem zbyt ciepłą wodą zmniejsza mleczność.
19. Konwi z mlekiem udojonym nie stawiać na słońcu (traci wartość odżywczą).
20. Strzec mleko udojone przed dostaniem się mierzwy (procesy gnilne).
21. W czasie latowania się po ocieieniu nie zmniejszać paszy i prowadzić do buhaja.
22. W razie niepokrycia paść intensywnie przed drugim latowaniem.
23. Przy pierwszych objawach powtórnego latowania nie zwlekać z prowadzeniem do buhaja.
24. Racice wyrastające ku przodowi wycinać (utrudnia stanie, rani miękkie części racicy).
25. W czasie zimy nie wypędzać krów na zlodowaciałe okólniki (łamanie nóg).
26. Buhajki 10-cio miesięczne i starsze separować od rocznych jałoszek (możliwość przedwczesnego zapłodnienia).
27. Wyciskać bąble rozwijających się pod skórą larw i wyciskać ropę.

28. Nie wypędzać krów na orosiałą koniczynę (wzdęcie) zwłaszcza jałowiznę i krowy wysokocielne.
29. Cielęta w pierwszych dwu tygodniach pić mlekiem od matek jeszcze ciepłym.
30. Mleko do pojenia strzec od zanieczyszczeń mierzwą.
31. Skopek, z którego poi się cielę, nie może zawierać resztek skwaśniałego mleka.
32. Cielęta lepiej nie dopoić niż przepoić.
33. Jeśli cielę ssi krowę, nie pozwolić na długie ssanie (przeje się).
34. Cielętom kilkotygodniowym dodawać siana, a nigdy zielonki (biegunka).
35. Cielętom starszym (roczniakom) nie zadawać kiszonki.

