

Medicina

Geppert Matthias Jos: (Polonus Cra-
covienus): Theses inaugurales
medicæ. Vindob. 1771. ?

BIBLIOTE. UNIV.



JAGIELLOŃSKA

~~Medyc. 558.~~

1

Illu

F

U

R

Pe

Pe

Pe

D

v

Pe

In

N

THESES INAUGURALES MEDICÆ

QUAS AUCTORITATE, ET CONSENSU
Illustrissimorum, Perillustrium, Magnificorum
Spectabilium, Clarissimorum Virorum,

Perillustris, Consultissimi, ac Magnifici Domini
UNIVERSITATIS RECTORIS

Reverendissimi, Illustrissimi, ac Amplissimi Domini

UNIVERSITATIS CANCELLARII,

Perillustris, Magnifici, ac Clarissimi Inclytæ Facultæ
Medicæ

DOMINI PRIMI PRÆSIDIS,

Perillustris, Spectabilis, ac Magnifici, Inclytæ Ejusdæ
Facultatis

DOMINI SECUNDI PRÆSIDIS

Perillustris, Clarissimi, ac Spectabilis Inclytæ Ejusdæ
Facultatis

DOMINI DECANI,

D.D. Sacræ Cæsareo-Regiæ Apostol. Majestæ
Consiliariorum, ac Archiatrorum, nec non
Clarissimorum

D. D. PROFESSORUM,

Venerabilis Domini Senioris, atque totius Amplissimæ

DOMINORUM MEDICORUM COLLEGII,

Pro supremis in Medicina Honoribus, & Privilegiis
Doctoralibus legitime obtinendis.

In Antiquissima, ac Celeberrima Universitate Vindobonæ
Publicæ Disquisitioni submittit.

MATHIAS JOS. GEPPERT

Polonus Patritius Cracoviensis
Philosophiæ Doctor

IN PALATIO UNIVERSITATIS

Die Mensis Julii Anno M DCC LXXI

LITTERIS KIRCHBERGERIANIS.



43196

T

3
I
Q
M
V
li.
u
ta
ta
pe
ri
ci
di
su
re
m
in



PRÆFATIO.

L. B.

Quum pro more ac instituto Academico in utroque Examine quinquennalis Studii mei Medici, coram Amplissimis ac Expertissimis Viris dedissem specimen, de materia inauguralis Dissertationis cogitandum erat. In vastissimo artis hujus saluberrimæ campo, res tam graves, conservandoque generi humano, tam pernecessariæ occurrebant, ut etsi in hac perficienda, immortale sibi nomen pepererint plurimi, restent tamen tanta ac talia, quæ medicis non unum illudque copiosissimum disquirendi discernendique porrigant argumentum; & licet supra vires meas tanta moliri bene intelligerem, tentare tamen quid vetaret? Verum demandata mihi DE SUPER provincia abeundi in Regnum Bohemiæ pro præstanda Ægris assis-

assistencia medica, vix tantum temporis reliquit, ut Theses inaugurales Medicas, publicæ Disputationi potuissem exponere, pro quibus, ex parte illa Artis Medicæ, quæ quid circa gravidas, parturientes, puerperas, & neonatos sit faciendum, moliendumve, aut omitendum, ex duplici Artis hujus cursu selegi, quas ex ore Clarissimi Viri Domini LEBMACHER in hac Universitate Celeberrima in publicis collegiis audire obtigit.

Hæc igitur Theses benigno si susceperis L. B. animo, mihi gratulabor. Vale.

THE-



THESES PRACTICÆ.

I.

Puerpera, ut summe vulneratus, tractanda.

II.

Animi deliquia, convulsiones post partum contingentes, a sanguine, nunc liberius per systema mesentericum non amplius a mole uteri pressum, circulante, adeoque cerebro, cerebello, & consequenter etiam cordi detracto, frequentissime oriuntur; quæ sustentatione abdominis, lenique ejusdem fasciarum constrictione (minime vero spirituosus, volatilibus, nerveisve cardiacis, ut nec interne, ita neque externe applicandis) sopiendæ sunt. Orta vero mala hæc a jactu-



ra humorum nimia sub, ante, vel in ipso
partu facta aliam exposcunt medelam.

III.

Arcta autem, fortisque fasciarum abdomi-
ni puerperæ circumductio suppressionem
lochiorum, uterive hæmorrhagiam, oppres-
sionem pectoris, anxietatem summam, fe-
brem validam, delirium, alvi adstrictionem,
& alia mala causare solet.

IV.

Quare Medicus ad puerperam symptoma-
tibus (III.) enarratis laborantem vocatus,
abdomen, arctisne circumductum fit fasciis,
examinandum habet, persuadendus, sym-
ptomata (III.) descripta non citius (factis,
per me licet, venæ sectionibus, etiam re-
petitis; applicatis cuicumque parti vesicanti-
bus; mari quoque temperantium, refrige-
rantiumve exhausto) donec illa fasciarum
abdomini circumductarum arctitudo tollatur,
atque strictura, levatum iri.

V.

Febris puerperis tertio, quarto die, se-
rius, aut citius superveniens, vehementior
aliis,



aliis, aliis mitior, de essentia puerperii esse videtur.

VI.

Causa febris (V.) descriptæ, atque lacteæ in arte vocatæ, vel lac ex substantia uteri in massam sanguinis raptum, vel superficie uteri internæ ea, qua eidem adhærebat placenta, parte suppuratio facta statui potest.

VII.

Regimen puerperii, ut & medicamenta, alimentave, vel potulenta calida, stimulantia, minime sunt: hæc enim puerperam, laboribus partus antea divexatam, & defatigatam maximopere debilitant, spissitudinem inflammatoriam inducunt, atque vel suppressionem lochiorum, unde inflammatio uteri (malum puerperis tam exitiale, & vix non semper lethale), vel exanthemata puerperam provocata post se trahunt.

VIII.

Sed cavendum pariter est a frigidis, quæ perspirationem puerperis tam salutarem facile sufflaminare solent; unde iterato lochio-



rum suppressio, atque uteri inflammatio
(VII.).

IX.

Aër temperatus, sæpe renovatus, ita ta-
men, ut non immediate allambat puerpe-
ram; renovatio linteaminum, indusiorum,
bene exsiccorum, aut fumo aromatico lu-
stratorum, mutatio; potus aquæ recentis,
nec frigidæ, nec calidæ admodum, optima
puerperis cardiaca.

X.

Puerperæ lecto alligandæ non sunt, præ-
cipue ubi febris lactea jam deferbuit; nisi
procidencia uteri laborent. Cavento tamen
sollicite a perfrigeratione.

XI.

Dolores posthumi, mitiores primo, sæ-
viores communiter subsequenter partibus,
a flatibus, acrimonia humorum, alvo ad-
stricta, grumis, placentave in utero relicta
pendentes, elysmatibus emollientibus, oleo-
sis cum chamomilla, internisque lenissime
stimulantibus uti est aqua Melissæ simplex,
absorbentibus, diacodiatis, etiam pro re na-



ta ipsa essentia succini, felicissime debellatur.

XII.

Febris lactea (V.), nisi exorbitet, temperantibus, & absorbentibus, potibusque theatis, communiter cedit.

XIII.

Quæ si exorbitet, atque inflammationem aliquam topicam producat, vel lochia supprimat, venæ sectione, aliisque (XII.) erit oppugnanda. Clysmata oleosa, emollientia, & in febre lactea, & alio puerperii tempore nunquam nocere visa sunt.

XIV.

Hinc falsa est regula: *a recenti puerperii statu contraindicari semper venæ sectionem.*

XV.

Lac, tenello post partum destinatum a natura alimentum foetui, lege ejusdem naturæ fertur ad mammas, illac evacuandum. Verum ubi isthic offendit resistantiam, vagabundum in corpore ad varias tam nobiles, quam ignobiles defertur partes, diros ibidem,



atque non facile curabiles generaturum mor-
bos. Apoplexiæ inde, hydropes, & alia
mala inde orta observata sunt Auctoribus.

XVI.

Felix profecto est materiæ hujus lactææ meta-
stasis ad uteri cavum, sub nomine *Lochiorum la-*
teorum isthac postea eliminandæ. Non infausta
pariter in cavum intestinorum, vel ad vias uri-
narias depositio, excernendæ dein cum alvo,
urinave, caseosis. Sudor puerperarum
acidus, non semper miliaria, sed po-
tius evacuationem materiæ lactææ, quo-
dammodo jam immutatæ, denunciat, cum
plures puerperæ, quibus neque per mam-
mas, nec per uterum, nec cum alvo, uri-
nave evacuata fuit materies dicta, nullam
depositionem lacteam passæ fuisse observatæ
sint.

XVII.

Ergo lac post partum evacuari debet,
quod vel sensibiliter, vel insensibiliter fieri
potest.

XVIII.

Solet vero vel per mammas, vel per
uterum, vel urinas, vel per alvum, vel
per



per sudorem fieri sensibilis evacuatio hæc. Insensibilem ejusdem evacuationem per transpirationem contingere probat fors necessitas illa summa conservandæ in puerperis perspirationis Sanctorianæ.

XIX.

Verosimile igitur videtur, materiem hanc lacteam, in corpore puerperæ relictam, non amplius converti posse in humores ejusdem sanos, cum non evacuata (XVIII.) depositionem illam, *lacteam* dictam, fere semper producere solitum habeat.

XX.

Cognoscitur depositio hæc lactea fieri, si post puerperium deservescente jam febre lactea, nec per mammas, nec per lochia, nec per alvum, nec per urinas videatur evacuatio lactis, sed succedat sine ulla causa quadam in parte dolor, tumor albicans, tensio, & alia ejusmodi symptomata, quæ metastasim aliis etiam in morbis denunciare solent.



XXI.

Ad femora, inguina, &c. frequentissime deponi solita materies hæc facit ibidem tumorem, ab œdemate in eo distinguendum: 1mo quod depositio hæc fiat post puerperium defervescente jam febre lactea, vel post ablactationem; œdema omni tempore. 2do. Depositio incipit a supra, deorsum descendit; œdema ab infra incipiens superiora petit. 3tio. Depositionem præcedit dolor vehemens, & concomitatur; non ita œdema. 4to. Tumor lacteus est superius major, latior; inferius minor, angustior, contra ac in œdemate usuvenit.

XXII.

Indiciis futuræ depositionis lacteæ habitis mox cura summe antiphlogistica est adhibenda. Venam bis, ter, etiam quater secare; lenia purgantia interne assumenda, aliave revellentia exhibere, quosalia media lapidibus cancerorum maritata optime quadrant; cataplasmata (si manui accessus detur) discutientia, & resolventia ex mica panis, sapone veneto, sale alcalino, vel ejusdem lixivio cum tantillo campho-

phora
morisTu
(XXAc
drop
riculo
riculo
præcDi
puer
demDi
ticam
tioneC
incip



phoræ, vel & croci applicare, natura tumoris, & vehementia mali indicant.

XXIII.

Tumor lacteus externe patens, dictis (XXII.) non cedens, aperturam exposcit.

XXIV.

Ad articulos depositum lac, horum hydropem, & destructionem minitatur. Periculosa ejusdem depositio ad coxam. Periculosissima ad internas corporis partes, præcipue ad caput.

XXV.

Diarrhœa non admodum infrequens est puerperis; quamvis & alvus adstricta in iisdem observata fuerit.

XXVI.

Diarrhœa hæc in *criticam*, & *symptomaticam* non incongrue dividi solet, quod ratione curæ bene notari debet.

XXVII.

Critica sequentibus noscitur signis: Imo: incipit post tertium vel quartum a partu diem.



diem. 2do. Alvus est pultacea, flava, vel
 alba, vel ex his variegata, cum euphoria.
 3tio. Lochia, urina non supprimuntur, tan-
 tummodo imminuuntur. 4to. Appetitus,
 & somnus, integra manent, aut vix lædun-
 tur. 5to. Pulsus est pacatus. 6to. Abdo-
 men molle.

XXVIII.

Symptomaticam pronunciabis, si 1mo. ci-
 tius, quam (XXVII. 1mo.) incipit. 2do.
 Alvus limosa, & statim nigricans, mox in
 gryseam & ferosam, quandoque mucosam
 & sanguinolentam mutanda. 3tio. Lochio-
 rum suppressio. 4to. Tumor abdominis.
 5to. Prostratio virium. 6to. Appetitus de-
 letus. 7mo. Agrypnia. 8vo. Urina par-
 cior cum sedimento lateritio. 9no. Ardor
 internorum cum externorum frigore.

XXIX.

Criticam talem diarrhoeam inhibere ve-
 tant artis regulæ, hinc demulcentia, oleo-
 sa blanda, lubricantia exhibenda. Sym-
 ptomatica neque promovenda, neque sisten-
 da, sed antisepticis efficacibus putredo in-
 cep-



cepta corrigenda, simulque vires labascen-
tes erigendæ.

XXX.

Alvum adstrictam, nisi emollientibus, oleo-
sis, ano & cato exhibitis cedat, purgantia
rhabarbarina, myrobalani
compefcunt.

F I N I S.



13. Olinda e ...

Biblioteka Jagiellońska



stdr0023591

BIPLIOTH. UNIV.



JAGELLONICAE