


[Faint, illegible handwritten text on the spine]

524.

7-18



dd

dd

Michael Mexelburg.

M. IX. 78.

de
de
legis

HEPATIS FABRICAM,

*ACTIONEM, EIUSQUE AFFECTUS
POTIORES,*

In Celeberrima Porufforum Vniversi-
tate, Consensu Amplissimæ Facultatis
Medicæ,

Publico eruditorum examini subjiciunt,

PRÆSES

JOHAN LÖSELIUS, D.

RESPONDENS

JOHANNES MICHAELIS
Borufs.

In Auditorio Majori d. V. Octob.



REGIOMONTI,

Prælo Reufneriano M. DC. XL.

I N I
HEPATIS FA-
BRICAM.

ACTYONEM, EIVSQUE APPETITUS
POTYORES

In Celebratissima Pforstorum Vniuersi-
tate, Consensu Amplissimi Facultatis
Medicæ.

Publico examine examinatus.

P R E S E N S

JOHANN LOSELLIUS D.

R E S P O N D E N S

JOHANNES MICHAELIS

Borula.

In laboratorio ad portam N. 638.



R E G I S T R A T A

Pforst Reicheniano M. DC. XL



In Nomine Conditoris JESU,
Ingressus.

LAutitiis olim dediti tergemini macabant
laudibus anserum, suum, ac nulli piscis jeco-
ra. Gratiore autem palato quò existerent,
anserum alimenta lacte imbuebant, fatente
Galeno *lib. III. de alim. facult. C. XXI. p. 58. Clasf. II.* im-
mò sues ac anseres caricis faginabant, unde hepar
σικωτόν ἢ σενκασμένον nuncupatum Veteribus, teste Gal.
l. c. cap. XII. p. 53. In hoc nutritu seu porculatione
sues admodum obesæ reddebantur, hinc tradit Varro
lib. II. de re rustic. c. IV. p. 73. in Arcadiâ suem fuisse spe-
ctatam, quæ ita intumuit, ut præ pinguitudine carnis
non modo surgere haut potuerit, sed etiam in ejus cor-
pore forex, ex esâ carne, nidum fecerit, ac pepererit
mures. Nos in præsentia, misso brutorum jecore,
ejusdemq; esu, humanum duntaxat considerabimus, &
quidem duobus segmentis.

SEGMENTVM PRIMVM

Hepatis fabricam exhibens.

THEOREMA.

Hepar est pars dissimilaris ac prin-
ceps inferi ventris, sub dissepto latitans,
sanguinem amplexu calfactuq; suo ela-

borans, ac universam rempubl. membrorum succis vitalibus irrigans.

§. I. Hepar, aliàs jecur & jecusculum, vocamen suum sortitur ab *ἥπαρ δῶ*, quod irrigare est, quia totum nostri corporis tabernaculum ab ipso hubertim irrigatur. Quippe cum publico fungatur munere viscus illud, nequaquam admittit, ut ullum dispendium intertrimentumq; crediti sibi à ventriculo chyli fiat, quò minus eum & creditori ventriculo, & membris relliquis defecatiorem cum sanore redhibeat. Duci etiam potest ab *ἥπειρα*, operari sanguinem, cum sit officina sanguinis. Ab hepate derivatur hepatarius. Sic Plaut. in *Curcul.* 2. 1. v. 24. *Te igitur morbus agit at hepatarius.* Spigelius & Bauhinus *ἥπαρ* deducunt ἀπὸ τῆς ἥπαιας τῶν ἀλλῶν τῶν σώματων *μορῶν*, ab inopiâ, quod partium egestati succurrat, verùm apud Græcos *ἥπαια* vox spuria est, nec unquam legitur.

§. II. Concurrunt ad fabricam jecoris constituendam caro, membranula, nervuli, venæ & arteriæ. Caro seu maxima hepatis pars sanguinis concrementum est, & Erastro *παρὰ γλῶσσαν* nuncupatur, quasi *περὶ γλῶσσαν* circumfusum. Affunditur namq; vasis ad locorum inanitatem inferciendam, & ut sit torale & substerniculum vasorum, ac tandem fotu & accubitu suo venarum actionem juvet, atq; *αἱμάτων* procuret.

§. III. Membranula, quâ investitur hepar, textile est admodum subtile, ac natalitia sua debet venarum membranæ alteri, a peritonæo ortæ. Spigelius ab hepatis ligamentis ortum membranæ deducit. Hanc tunicam Syphilis vel morbus Gallicus aliquando penitus erodit, teste Alex. Benedict. *lib. XIII. c. XXIII.*

§. IV. Sextum nervorum conjugium nervulos duos hepatis defacrat, quorum alter à stomachico, qui cinctu suo lævum ventriculi orificium ambit, alter à costali exoritur ramo. Pullulos illos per tunicam hepatis, quæ cavum succingit, sparsos esse asseritur vulgò, verum notavit Riolanus, nervulos duos insignes venam Portam comitari, & subire substantiam ipsam hepatis. Et Vesal. *lib. V. de hum. corp. fabr. c. VII. p. 343.* tradit, ramulum costalem in jecoris tunicam raris modicisq; furculis dispergi, priore in jecoris quoq; substantiam pertinente.

§. V. Venarum in hepate numerus innumerus est. Censentur autem furculi venæ Portæ triplo esse plures, quàm Cavæ, quæ Hipp. *ἡπαρτίς* nominatur, *II. epid. sect. IV. p. 1034.* Portæ largius per imam visceris partem, parcius per gibbam sparguntur: contra cavæ radices plures per convexam, pauciores per simam. Accurate a. notandæ sunt inoculationes seu ἀνωσμοίσεις, quæ columbatim quasi junguntur, & se invicem exoculantur rami portæ & cavæ. Cui lubentia est discriminatas contemplari portæ ac cavæ radices, carnem circumfusam in aceto acerrimo, & calcis pauxillo elixatam & friabilem redditam, curioso digitorum attritu separet.

§. VI. Lactææ quoq; venæ plusculos in hepatis carnem quaquaverfum suos disseminant pullulos. Explantantur autem tubuli illi lactei ab intestinis, ac per mesenterium iter legentes in pancreate colliguntur, ubi capreolorum, aut calamistrorum eincinnorum more implexi, mæandros & anfractus inexplicabiles constituunt. Paulò post à pancreate majusculis ramis ad hepatis contendentes, tuguriolum ejus subeunt,

ac tandem tenuitatibus admodum exilibus in hepatis substantiam dispersi oblitescunt. Vectores sunt chyli, quem oscillorum suctu ex intestinis prolectum postea in ipsam hepatis carnem exspuunt, ut succus inde diviniorelaboretur.

§. VII. Arteriis admodum paucis donatum, est extorum caput, quæ à dextro Cæliacæ ramo oriundæ simam ipsius partem perreptant. Inter portarum ac cavæ radículas numerosâ sobole feruntur alii furculi tenues, qui coeuntes meatû *χοληδόχοι* efformât, purgamentum pessimi sanguinis ex hepate propè portarum explantationem sorbentem.

Q. hic, *An venarum actio sit αἱματωπίσις?* Dividua est inter Medicos hac super re. Galen. *lib. VI. de Hipp. & Plat. decret. c. VIII. p. 532. Class. I.* carni hepatis sanguificationem tribuit, ac illos damnat, qui venarum tunicis *αἱμάτωσι* assignât. Alibi verò *lib. IV. de us. part. c. XVII. φλεβῶν ὑπάρχει δύναμις τις αἱματῶ ποιητικῆς*. Nos lacteis leviculam præparationem, hepatis parenchymati coctionem, reliquis venis *πελειογονίαν* deberi statuimus.

Q. (2) *An venarum principium sit hepar?* Galeni affectæ hepar esse venarum principium adstruunt. Ast quando inaudiunt, nullam partem alterius esse sobolem, sed omnes simul formari, extemplò reponunt, jecur non esse principium *γενέσεως*, sed *διοικησεως*. Verùm responsum hoc exulat à mente Galeni. Nam Galenus expressè *lib. VI. de Hipp. & Plat. decret. c. VIII. p. 532.* scribit: *si primæ generationis venarum principium quæris, jecur est.* Et *lib. IV. de usu part. c. II. p. 270. Class. I.* tradit, *venas primum germen ex hepate ducere.* Immò neq; *διοικησεως* principium est hepar, cum dispensatio non venas, sed alibilem respiciat massam. Hoc Galen. *lib. VI. de Hipp.*

Plat. decret. c. VIII. sequentibus innuit: si principium dispensationis materia, quæ totum corpus nutritur, species, non inveneris commodius viscus jecinore. Restat itaq; ut sit *ἐξ ὕδατος* fons, non quidem lactearum, sed reliquarum sanguinem vehentium.

§. IIX. Principem esse partem viscus nostrum, superius proditum est. Hostes *πολυκαίματος* è principali familiâ illud excindere satagunt, quia exenterantur quandoq; cadavera, hepate carentia. Sic Antyverpiæ Matthias Ortelius hydrope extinctus, & apertus jecore ac liene destituebarur. Respondemus, naturam, contra semper analogo hostire, ac refarcire defectum: ita Ortelius carnulenta habuit intestina, quæ hepatis defungebantur munere, ac fulcimenta erant venæ cavæ. Vide *append. Bauhin. in tract. de partu. Cesar. Rousseti. p. 384.* Hoc modo exaudiendus est Arist. quando scribit: Jecore carens toto nullum notatum est animal, *lib. IV. de gener. animal. c. IV. p. 1315.*

§. IX. Septo transverso iecur ita subest, ne ipsi tanquam flabello præcordia ventilanti obsit. Occupat autem consveto naturæ ordine dextrum latus, & à dissepito digitum transversum abjungitur. *ὅπερ τὸ διάζωμα ἐν τοῖς δεξιῶν κείται τὸ ἥπαρ,* docet Arist. *lib. I. de histor. animal. c. XVII. p. 845.* *Supra diaphragma situm est hepar.* Circa hunc locum Bartholinus *lib. I. institut. Anat. c. XIV. p. 67.* autumat, voculam *ὅπερ* non significare super vel supra, sed trans vel ultra, cum Accusativo jungatur. Ast sciat Bartholin. *ὅπερ* Accusativo maritarum apud probatos Auctores etiam significare super vel supra. Ita Homer. *Odys. l. p. 260.*

*παντίοις ἀνέμοισιν ὅπερ μέγα λῆιμα θαλάσσης
ἐκαδὲ ἰέμενοι.*

Deinde

Deinde distinctione voculae ὄπερ nil respondet Barthol. ad textum Arist. nam hepar non situm est trans vel ultra septum, si ab infero ventre extorum instituat^rur scrutinium. Hepar itaq; ultra vel supra diaphragma situm est, à capite si quis exordium ducat Anatomes, quemadmodum Philosophus fecit.

§. X. Connexus jecoris, quo partibus conterminis adstringitur, varius est. Umbilico affirmatur interv^entu tubuli umbilicalis, qui intra Herophili διασφραγην, seu jecoris rimam, sese penitus abdit. Vena hæc embryoni nutricula est, adultiori ligamentum. Dissep^to seu phrenibus hepar subligatur firmis duobus vinculis, quorum dextrum latum ac membraneum est, sinistrum teres. Illud suspensiculum hepatis nuncupatur, oriundum à peritonæo. Adulteris quoq; costis villi quidam membranei hepar alligant, quos Galenus διαφύσεις nominat, lib. IV. de us. part. c. XVI. p. 280. Clafs. I. Omento jungitur lobo quodam exili, qui mollitudine spongiiis assimili intra omenti crumenam absconditus, eam aliquando vitiosè perpluit, & inebriat, unde hydrops, quo de Hipp. VII. aph. LV. ἐκασοισι ἀντὶ ἡπαρ ὕδατ^ο πληθύνει εἰς τὸ ἐπιπλυνεῖν γὰρ ἢ, τῆτέοισιν ἢ καὶ λίη ὕδατ^ο ἐμπιπλάται, καὶ ἀποθνήσκεισιν. In Lupo ex lobis hepatis (quorum octo notavi semel) unus membranâ palmam ferè latâ reni dextro firmiter annectebatur.

§. XI. Figuram lunatis cornibus obliquatam, sibi vendicat hepar, quæ foris convexa & gibba est, subtus concava, & extuberationibus quibusdam asperata. Gibbam hepatis faciem natura delævavit, semel tamen in Coleto Anglo repertum est hepar cirris prominentibus hirsutum, quemadmodum tradit Erasmi. in epist. lib. XV. epist. XIV p. 509. Convexam partem (sa-

burrâ

burrâ tamen prius eductâ) diureticis, siam cathar-
ticis expediunt Medici.

§. XII. Extuberantiæ illæ circa egressum Por-
tæ olim πύλαι dicebantur, teste Galen. *lib. de dissect. ven.
& arter. c. l. p. 109. & lib. IV. de us. part. c. II. p. 270. Class. l.*
Hesy chius memorat à sacrificulis. πύλας esse vocatas
τὰς ἐκτροπὰς τῆ ἥπατος καὶ τὰς φλέβας. Πυλαία verò τὴν μέσην
τῆ ἥπατος ἐνφυχωμένην, seu mediam jecoris amplitudinem,
olim denotabat victimariis.

Q. hîc, *An jecur humanum sit penulatam, vel in appen-
dices diremptum?* πέντε λοβοί, inquit Hipp. *lib. de
natur. ofs. p. 274.* Et Galen. *lib. IV. de us. part. c. VIII. p. 273.*
hepar quibusdam λοβοίς tanquam digitis ventriculum,
ad unguem complecti scribit. Immo antiquitas etiam
luxuriare voluit circa fibras, certa quædam nomina,
ipsis affingens, quæ facultatibus hepatis rectiori titu-
lo conferuntur. Quippe primam hepatis penulam
nuncuparunt ἐσίαν, alteram τράπεζαν, tertiam μάχαιραν,
quartam ἡνίοχον, de quibus appellationibus consulatur
Vesalius *lib. V. de hum. corp. fab. c. VII. p. 339.* Verùm si
ἐπεκρουφώσιες in rigore acceptentur pro frustulis, auda-
cius prominentibus, ac penulis discriminatis, quales
notantur in pulmonibus, tum pronunciandum erit,
naturaliter ἀλοβον esse humanum hepar: sin verò pro-
letariè & abusivè sumantur pro existantiis, & promon-
toriolis exiguis, tum concedi poterit, viscus nostrum,
suis quodam modo instructum esse pinnis. Dixi natura-
licer: nam ὡς φέρεται fieri potest, ut jecur in frustula sit
discissum. Ita Gemm. *lib. I. Cosmoer. c. VI. p. 105.* scribit,
hepar ut in suis & canibus, in plures fibras usq; ad ra-
dicem fuisse divisum. Aliàs in brutorum evisceratio-
nibus,

B

nibus,

nibus, bove excepto, veri notantur lobi, de quibus antistes nostri exaudiendi.

§. XIII. Magnitudo jecoris pro modulo & proportionem nostri corporis notatu digna est. Homo namque hepatis ac cerebri mole superat reliqua animalia. In timidis, gurgitibus, ac iis, qui digitorum *συνταλίδας* longiusculas habent, creditur esse grandius hepar. Sicgulosa illa mulier, quæ ne momentum quidem absque potus & cibi ingestu vivere potuit, hepar mole ineffabili ac impeniùs rubens habuit, teste Gemm. l. c. p. 104.

§. XIV. Temperies jecoris modestè calida est & humida. Ubi verò justò plus incaluit hepar, prope- riter nimis ad se rapere consuecit edulia, à ventriculo nondum satis decocta, unde *μόλυσσις* & imperfecta co- cctio, soboles ventriculi debilis & frigidæ.

Q. hinc, An particula jecoris, quæ felli subdita est, sit dulcissima? Hoc vult Arist. lib. IV. de part. animal. c. II. p. 1173. τὸ ὑπὸ τὴν χολήν τῆ ἥπατος γλυκύτατον ἐστίν. Arbitror hoc inde esse, quia capsula fellis à parte vicinâ fortius haurit purgamentum sanguinis, quo subtracto dulcior redditur particula subiecta.

Q. (2) Cur hepar, viscus calidum & humidum, ægrius intabescat seorsim servatum? Plin. lib. XI. c. XXXVII. p. 317. memoriæ prodit, obsidionum exemplis ductus, jecur maximè verustatis patiens centenis durare annis. Et Riolanus lib. II. anthropogr. c. XXI. p. 203. testatur, Parisiis sub scammis fuisse asservatum ab anno elixatum hepar humanum, quod nec rancorem contraxerat, nec odorem genuinum exuerat. Causam attribuo principio balsamico ac salino, quo incorruptum servatur plusculos annos.

§. XV.

§. XV. Actio jecoris maximè honorata est
αποτοροληος seu chymificatio, quam ingenità & dome-
sticà facultate exercet hepar. Chylum autem lactes ex
intestinis numerosà sobole sorbent & exhauriunt eun-
demq; sine cunctatione ad pancreas flexuoso tramite
deducunt, ubi in contortà lactium perplexitate, velut
rudimentum futuri sanguinis, nonnihil demutatur
chylus, & paulò post in carnulentam hepatis substanti-
am (multiplici namq; serie ibidem loci in tenues exi-
lites exhauriuntur lactes) exspuitur, ac in verum fan-
guinem mutatur. Confectam alimoniam vectores
tubuli postea quoquo versum didunt, ac famelicis ea-
dem instaurant partes.

§. XVI. Insuper focus & illicium amoris ac li-
bidinum hepar est. Horat. lib. I. od. XXV.

Cum tibi flagrans amor, & libido,

Quæ solet matres fieri ire equorum,

Sæviet circa jecur ulcerosum.

Et lib. IV. od. I. Veneris jugum excutiens ita fatur:

— — — — —
abi,

Quò blanda juvenum te revocant preces,

Si correre jecur quæris idoneum.

Proverb. VII. v. 23. Amens juvenis improbum sequi-
tur scortum, donec dissecet culter jecur ipsius. Luthe-
rus vertit, *Siß sie ih̄n mit dem Pfeil die Leber spaltet.* A-
moris itaq; ac lasciviæ scatebra æstimatur hepar, quia
conficit succum, cujus aliquota portio abit in semen,
unde voluptabilis titillatio, & Venereæ cupidinis irri-
tamentum. Hepar quoq; velut fons quidam vitæ est
juxta divum Codicem. Thren. II. v. 11. effunditur in
terram jecur meum, id est exanimalis & quasi mortuus
sum, Flac. part. I. Clav. script. col. 408.

§. XVII. Deniq; hepar olim etiam suum habebat usum in extispicinâ, quam Græci *ἰπατοσκοπίαν* nuncupabant. Antiquitas namq; ex inspectione jecoris salubritatem locorum argutè venata est. Quippe oppida constituere, aut statita habere ubi induxere animum, prisca, immolatis pecoribus, quæ in iis pascebantur, ex jecoris habitu aëris modum conjectabant: Etenim si livescens vitiosumq; in pluribus repertum, in salubritatis erat argumentum, pabuli & aquarum ratione, Cæli Rhodig. *lib. II antiq. lect. c. XLVII p. 87.* Jmmò ex attentâ hepatis inspectione multa etiam alia superstitiosè eruebant extispices. Gemina autem capita prius in hepate constituebâtur, quorum alterum hosti, alterum sacrificabatur illi, in cujus gratiam victima erat cæsa. Ex his capitibus marcidum, luridum, & quocunq; modo turparum caput, ruinam & adversa omnia minabatur: inflatum verò, turgidulum, ac optumè coloratum victoriam, & successus optabiles promittebat. Ita Lucanus, exâ Cæsarem victorem renunciassè contra Pompejum, memoriæ prodidit. Eidem Cæsari interitum portēdebat, ex opinatu haruspices, deficiēs hepar victimæ, quam paulò ante mortem ipse maectari jusserat. Huberius extispicinâ hanc cui inspicere lubentia est, adeat Peucer. *de divinac. p. 361.* Jam ad affectus hepatis potiores.

SEGMENTVM ALTERVM

Hepatis affectus proponens.

THEOREMA.

Hepar dyscrasix, oppilationes, inflammationes, *σιμφοσίματα*, scirrhi, ulcera, & consimilia mala pessimè exercent.

§. I. Formidolosus *λευκηπατίας* olim dicebatur Zenodoto, ob pallorem, ex jecoris frigidulâ intemperie ortum. Frigidinem autem hepatis præter pallorem arguunt venæ exiles, fumen depile, fitis prope modum nulla, micationes arteriarum segniore, pituitæ huber proventus, faccati humoris (ita Lucretius lotium appellat, cum per totum corpus q. per faccum percoletur) albedo ac tenuitas, &c.

§. II. Calidum hepar produnt extumidæ amplioresq; venæ, ac hypochondria hirta, alvus indurata, querquerus totum, cum primis manuum volas pedumq; plantas occupans æstus. Oblectamina quoq; & *ιδύσματα* ex potu & cibo avidius quærunt calidi hepate, & hircuitallientes reliquis magis lascivunt. *ψεύσματα* etiam & jonthis quibus variatur nasus (die *βινιγεν* rothnasen) plerumq; fucum facere, aliisq; imponere verba ahsolent. Siccius hepar habitus corporis frigosus & gracilis; humidius mollior & obesior indicant.

§. III. Infarctus hepatis malum frequentissimum est. Impinguntur autem fartilia non modò vaforum tubulis, verum etiam penitiùs sæpe humor in perviam jecoris affusionem, ejusq; recessus se infinuat, qui ni extemplò educatur, vel discussu auferatur, præfens scirrhi vel etiam calculi existit materies. Innotescit malum, si leviculum pondus, dolore obtuso stipatum, in dextro hypochondrio sentiat æger, vel etiam, anhelus fiat in acclivi graduum ascensu. Gibbum hepatis oppilatum septum transversum farctû suo tenet, ac respiratui incommodat; concavum verò saburratum *καθ' ὀμφιλίαν ἢ κοινωγίαν* ventriculum turbat, appe-

titum prostermit, & alvi proluviem multâ humiditate
disuit.

§. IV. Oppilatio illa plurimum ægritudinum ma-
ter est, icteri, hydropis, & consimilium. Icterus bilis
circumluvio est, quâ inquinamentum istud per pullu-
los venæ cavæ in universum diditur corpus, cutemq;
flavedine maculat. Luteus iste color in hirquo majori
corneam oculi initio collutulat, & postea ulterius
progreditur. Feces, quas conquiniscens cum nisu ex-
turbat, albicant, lotium verò crassescit, & ex flavo &
rubro in pullum tendit colorem.

§. V. Ab hoc ictero discriminatur ille, qui fe-
brium acutarum vel spuria, vel legitima proles est. Le-
gitima criticè generatur, ubi præfente pepasmo, bilis
in ambitum corporis profertur, & quidem die critico,
absq; ullâ hypochondrii duritie. In hac fellis suffu-
sione excrementa alvina cum humore saccato naturali
prorsus colore gaudent. Notha soboles symptomati-
cè excluditur, & quidem absq; signis concoctionis.
Circa symptomaticum icterum accuratè notetur locus
iste, quem habet Hipp. lib. de vict. rat. in morb. acut. p. 402.
ἐν πυρετῶν χαλῶσαι πρὸς τῆς ἐβδομῆς μετὰ ἕλκεθ' ἰκτεροῦ ἐπιγενομέ-
νῳ, λυαὶ τὸν πυρετὸν. ἀνευ δὲ ἕλκεθ' ἢν ἐπιγένηται, ἔξω τῶν και-
ρῶν, ἰλίθειον. Insuper in omni ictero verus est aph. XLII.
sect. VI. ἐν τοῖσιν ἰκτεράσιν τὸ ἥπαρ σκληρὸν γινέσθαι ποιεῖν.
Tandem etiam fervidum hepar, vipera, lepus marinus,
& consimilia, malum ictericum generant. Mirabile
est, quod scribit Scaliger exerc. CXCI. n. 3. p. 626. Pluit
à nubibus in Norvvegiâ bestiola quadrupes, magni-
tudine foricis, pilo vario. Lemner nomen habet. De-
pascitur omnia virentia. Consumpto pabulo mori-
ens aërem inficit, unde vertigine & regio morbo corri-
piuntur incolæ.

§. VI.

IX §. VI. Hydrops tripartitò dividitur in ἀσκίτην,
πυλαίτην, & σπυρίτην, Ascites prominulus ventris tu-
mor est, ab undâ ferosâ, capacitatem abdominis perplu-
ente ac distendente, ortus. In Bello Armato purus
sanguis è venis mesaraicis exciderat, eò loci, ubi aquo-
sus humor in asciticis colligi solet, Remb. Dodon. *prax.*
med. p. 581. Malum ubi vires acquirit eundo, respira-
tus accedit sufflamen, scrotum artusq; subditi impen-
diò intumescunt. Immò in extremo præputio semel
in quodam hydropico grandem notavi vesicam, lim-
pidâ plenam, quæ glandem oculatam ita occæcabat, ut
lotium mictu difficulter profundi potuerit. Prodigio
guttare pocula expetunt ægri, hinc eleganter Horat.
lib. II. od. 2.

Crescit indulgens sibi divus hydrops,

Nec sitim pellit, nisi causa morbi

Fugerit venis, & aquosus albo

Corpore languor.

§. VII. Haut rarentur ^{videntes} jecur occupant,
quæ laceræ ac disruptæ ichorem in abdomen evo-
munt. Frequentissima autem hydropis causa est ob-
structio vasorum ad lienem & hepar tendentium. Nam
ubi materia serosa in portarum furculis per mesenterii-
um & omentum sparsis copiosius congeritur, nec ad in-
testina properat, fluorem paritura, facile è suis vasis
in abdomen excidere, ac flumen hydropicum consti-
tuere potest. Tollitur autem facilius malum in servis,
quàm in liberis, quia cum desideret famem, sitim, mille
alia tædia, longamq; patientiam, promptius his succur-
ritur, qui facile coguntur, quàm quibus inutilis libertas
est. *Cels. lib. III. c. XXI. p. 340.*

§. IIX

§. IIX. Tympanites, qui Hipp. *IV. aph. XI.*
ἰσχυρὸς ἐν ἄσκει, maximam partem exoritur à flatibus, in
abdominis ergastulo, & intestinis quandoq; hospitan-
tibus. *ἰσχυροί* sunt & borborigmis infestantur di-
scrutiati malo. Periculosior est ascite, utpote qui
promptius obedit remediis, quàm tympanites, *Æt.*
tetrabib. III. serm. II. c. XX. p. 579. Cathartica in hoc af-
fectu disuadet *Ægineta lib. III. c. XLVIII. p. 164.*
commendans discutientia flatus, & cucurbitas leves,
abdomini imponendas. Huic subscribit *Dodon. l. c.*
p. 590. & insuper enemata nil quicquam proficere ad-
fruit. Verùm quia tympanites à flatuum & humo-
ris miscellâ originem ducit, imò ipsa intestinorum te-
la, quæ à fimbriato pyloro longâ serie detexitur, quan-
doq; distenditur materiæ copiâ, inutilis esse haut po-
test enematum & purgantium usus.

§. IX. Sarcites, aliàs anasarca vel hypofarca,
tuber est totius, à frigido & pituitæ humore, per uni-
versum corpus diffuso, orium. Quippe in leuco-
phlegmatia facies, crura, pedes, brachia, turgidula
sunt, universumq; corpus cum pallore intumescit, im-
pressorum digitorum vestigia diutinè retinet, ac emor-
tuum quasi apparet. Lotium albidum ac tenue effun-
dit æger, in simulq; difficulter respirat, & quandoq;
lente febrile occipit. Hepar in hoc affectu aliis quo-
dammodo est, ideoq; etiam crudiorum conficit suc-
cum, qui in totum ablegatus *ἰσχυροί* & *ἰσχυροί* parti-
bus nutriendis assimilari haut potest, unde spurius nu-
tritus & congestus vitiosus. In mulierculis mentes
superstagnantes idem malum parturire sæpicule no-
tantur.

§. X. Inflammatio jecoris tumor est à sanguine extravasato genitus, fidos habens focios, febrim, dolorem gravativum, ruffim aridam, ac difficilem respiratum. Ejusmodi hepatis incendiū semel induxit cucurbitarum appositus, in dextro hypochondrio, ad arcendam narium hæmorrhagiam institutus. Decubitus, qui ægrum in terga supinat, commodior est laterali. Alvum dejecturus *σπυροβάδεα*, fimo caprino assimilia, exturbat æger, nisi infirmo admodum sit hepate, tum namq; & mollia exonerat. Gibbo hepatis exæstuante, tumor manifestius conspicitur, pressu ac spiratione dolor exacerbatur, partesq; juguli dextri deorsum quasi trahuntur. Concavo inflammato appetitus prosternitur, sitis gravius affligit, vomitus ac nausea urget, nec obtutui nostro notabilis ulla ingeritur protuberatio. Singultus etiam ob nervorum communionem inflammatum hepar comitari assolet, quo de Hipp. VII. aph. XVII. ἐπὶ φλεγμονῇ τῆς ἡπατος ὁ λύγξ κακὸν. In abscessū ubi mutatur inflammatio, res periculo plena est. Hercul. Saxon. Nautæ cuidam in dextro hypochondrio abscessum hepatis aperuit, qui primo die puris albi octo libras, sequentibus verò diebus ultra decem reddidit. Vide lib. III. pract. med. c. XXIX. p. 288. Aliquando etiam per alvum egerunt pus, quem admodum Nautæ contigit: rarius per venas ad subjectos pedes excurrit materia, ibidemq; dolorem excitat.

§. XI. Hepatis ἐμφύσημα generat flatus crassior, parenchyma hepatis distendens, & involucrum visceris agitans. Notant malum tumor hepatis sine gravitate, ac dolor per intervalla feroculus. Murmur in affecta parte advertitur nullum. Sæpe interstitiis mu-

sculorum abdominis halitus intergeruntur, peritonæum & affines musculos divellentes, atq; dolorem excitantes, qui dolor perperam hepatis aut lieni assignatur.

§. XII. Scirrhus hepatis tumor est indolens ac durus, crassi & visceris humoris soboles. Humor autem vel congestu vel affluxu suo excitat scirrhum, partibus uvidis ac tenuibus in auram missis. In veterata durities in hypopem abire consuevit, ac feralia promittit. Malum juvenile foris ovis fimo, diu in aceto macerato, stercoreat Dominicus Leonus, ac lætamen illud valde professe adstruit, *lib. II. art. med. sect. III. c. V. p. 506.* Est & alius hepatis tumor *ἀνευ σκλήρωσ*, quem aliqui den *Κιελνφύχην* appellant. Oritur quandoq; à sinistro alterantium usu, quo humores & in crassantur, & penitus hepatis impinguntur, maxime in febrientibus, corpore haut evacuato.

§. XIII. Interdum quoq; ulceribus infestatur hepar. Aretæus abscessum hepatis expurgari vidit per ventriculum. Cavâ namq; parte exulceratâ ventriculum eroderat hepar, & in cavitatem ipsius exspuebat foedam puris materiam. In gibbâ visceris parte vomica feliciter sæpe evacuatur pyrotico appresso, docente Hipp. *VII. aph. XLV.* Alia insuper mala hepar nonnunquam cruciandum adoriuntur, de quibus

consultantur Practici. *καὶ πάντα μὲν
δὲ πάντα.*

Deo Conditori Gloria

Au-

Auctaria miscella.

I.
NUm in λορδώσει vel repanditate Chirurgo licitum sit musculos μεσοπλευρας cultello ferire, ac immisso instrumento luxatam repellere vertebra[m] ?

II.

Cur improba Venus dysenteria[m] remedium? Hipp. lib. VII. de morb. vulgar. text. 134. p. 1240. id ipsum annotavit: πορνείη ἀχρωμῶν δυσεντερίας ἀκῶν. Et Amatus Lusitan. centur. II. curat. XLVII. p. 333. narrat, Mulonem veterinarium à dysenteria[m] fuisse liberatum furtivâ Venere.

III.

Cur βραχιόνιοι καὶ ἀσθενεῖς, qui partem umbilico subjectam majorem, quàm superiorem habent, pertinentem ad pectus? Arist. sect. IX. problem. q. LXIII. p. 900.

IV.

Cur horologia automata, ponderibus librata, initio longiores, postea breviores; contra horologia, quæ moventur per laminam convolutam, primò breviores, postea longiores exhibent horas?

V. Cur


V.
Cur tubulus tabaci percussus in unâ extre-
mitate, in alterâ capitellum amittat?

VI.
Cur fundus lebetis vel aheni, ad ignem po-
siti, & aquâ repleti, frigeat etiam in intensissi-
mâ flammâ?

VII.
Cur veneno sublatorum, vel morbo Car-
diaco extinctorum, corda difficulter cremen-
tur? Ex hoc fundamento Vitellius probabat,
Germanicum Cæsarem à Pisone fuisse potiona-
tum, quia Germanici cor comburi non potuit:
Contra Piso salvabatur, quod Germanicus mor-
bo cardiaco decesserit.

VIII.
An halitus, qui ex inciso dissectoq; cane
expirat, eviscerantes inficiat, ac spleneticos
reddat?







863

P.P.

IX. 18



863 545 Bibliotheca 26.000,⁵
P.P. Camaldulensium in Bielany

Depozyt w Bibliotece Jagiellońskiej



06947

