

# GLONY STAWÓW

NA ZBRUCZU.

NAPISAŁ

ROMAN GUTWIŃSKI.



W KRAKOWIE.

NAKŁADEM AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI.

SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI SPÓŁKI WYDAWNICZEJ POLSKIEJ.

1893.

*Przeznaczony do sprzedaży*



Osobne odbicie z Tomu XXIX Sprawozdań Komisji fizyograficznej  
Akademii Umiejętności w Krakowie.

4807L  
11

Biblioteka Jagiellońska



1002841406

# Głony stawów na Zbruczu.

Napisał

Roman Gutwiński.

Dnia 25. lipca 1891 r. wyjechałem w towarzystwie kolegów: A. Libery i M. Matusiaka, oraz oficjała pocztowego p. B. Hrabara — koleją z Tarnopola do Podwołoczysk. Przepędziwszy noc w domu p. Kótkowskiego, gdzie nas po staropolsku podejmowano, ruszyliśmy ze świtem na stawy, jakie w okolicy tworzy Zbrucz. Naprzód zwiedziliśmy staw przy samej rogatce granicznej, a więc między Podwołoczyskami a Wołoczyskami leżący. Staw to średniej wielkości, o charakterze tym samym, jaki mają wszystkie niemal stawy na rzekach Podola. Roślinność jego wprawdzie bogata w osobniki, lecz mniej obfitująca w gatunki niż roślinność innych stawów. Rogoża wązkolistna (*Typha angustifolia*) i tatarak (*Acorus calamus*) tworzą porozrzucane kępy, liście grzybieni białych (*Nymphaea alba*) i *Hydrocharis morsus ranae* pływają po zwierciadle stawu, a tu i ówdzie rogatki (*Ceratophyllum*) razem z wodną rzęsą (*Lemna*) nurza swe pędy w wodzie. Brzegi, pomiędzy którymi wpływa Zbrucz na staw, podpusuje bujnymi oczeretami trzcina (*Phragmites communis*) a zdobi zielonym liściem i lśniaco-żółtym kwiatem grąźel (*Nuphar luteum*). Następnie pominawszy kilka wązkich stawów, zatrzymaliśmy się przy obszernym stawie wśród pól, należących do wsi Oczkowce. Tu przepływałam staw we wszystkich możliwych kierunkach. Jest też on więcej zarosły niż staw poprzedni i więcej liczy gatunków roślin. Łódka zrecznie kierowana wiosłem przesuwała się z nami to pomiędzy prostymi ścianami kęp rogoży (*Typha angustifolia et latifolia*) i trzciny (*Phragmites communis*), to znowu między zarostami tataraku (*Acorus calamus*) i situ (*Juncus*), — przedzierała się z trudnością przez waty nitkowatech



glonów, splecionych z pedami rogatka (*Ceratophyllum*), piórników (*Myriophyllum*) i rdestnic (*Potamogeton*), wśród których tu i owdzie wynurzały się *Stratiotes*, *Hippuris* i *Sparganium ramosum*, lub pogrążyć musiała białe kwiecie grzybienii (*Nymphaea alba*) i rzadszego grążela (*Nuphar luteum*).

Z tych stawów przywiezione glony, a następnie opracowane w pracowni gabinetu historii naturalnej gimnazjum tarnopolskiego, podaję niniejszem w systematycznym porządku.

## Class. Chlorophyceae (Kuetz. [1845] ex parte) Wittr.

### Ordo Confervoideae (Ag. [1817]) Falk.

#### Fam. Coleochaetaceae (Naeg. [1847]) Pringsh. [1860].

##### Gen. Coleochaete Bréb. [1844].

1. *C. orbicularis* Pringsh. Jahrb. II., Tab. I, fig. 5., De-Toni Syll. I., pag. 8.  
Staw pod Oczkowcami.

#### Fam. Oedogoniaceae (De Bary [1854]) Wittr. [1874].

##### Gen. Oedogonium Link. [1820].

1. *Oed. spec.?* (*Oe. Areschougii* Wittr. *simillimum*).  

lg. c. veg.	48 $\mu$ — 74 $\mu$ — 62 $\mu$ — 69 $\mu$
lt. c. veg. sup.	25 $\mu$ — 25 $\mu$ — 23 $\mu$ — 18 "
" " " inf.	21 $\mu$ — 21 $\mu$ — 16 $\mu$ — 14 "
lg. oogon.	57,5 $\mu$ lg. oosp. — 48 $\mu$
lt. " "	57,5 "                         lt. " — 50 "

Antheridia non vidi.  
Staw pod Oczkowcami.
2. *Oe. inversum* Wittr. De-Toni. Syll. I, pag. 69.  

lg. c. veg.	32 $\mu$ — 18 $\mu$ — 23 $\mu$ — 28 $\mu$ — 16 $\mu$
lt. c. veg. sup.	9 $\mu$ — 11,5 $\mu$ — 11,5 $\mu$ — 14 $\mu$
" " " inf.	7 $\mu$ — 9 $\mu$ — 9 $\mu$ — 11,5 $\mu$
lg. oog.	32 $\mu$ — 30 $\mu$ — 34,5 $\mu$ — 28 $\mu$
lt. " "	30 $\mu$ — 28 $\mu$ — 25 $\mu$ — 25 $\mu$
lg. oosp.	25,3 $\mu$ ; lat. oosp. 23 $\mu$
lg. cel. filam. masc.	23 $\mu$ — 28 $\mu$
lt. " " "	6 $\mu$ .

Filamenta masculina  $\text{CaCO}_3$  incrustata erant  
Staw pod Oczkowcami.
3. *Oe. Pringsheimi* Cram. Wittr. Prodr. f. 17. De-Toni. Syll. I, pag. 71.

cel. veg. foem. 42  $\mu$  longae et 20  $\mu$  latae  
 oogonia 40  $\mu$  longa „ 44  $\mu$  lata  
 oosporae 39  $\mu$  longae „ 39  $\mu$  latae  
 Antheridia quaterna.

Staw pod Oczkowcami.

Fam. **Ulotrichiaceae** (Kuetz. [1843]) Borzi [1883] em.

Subfam. **Ulotricheae** (Rabenh. [1868]) Borzi [1883].

Gen. **Hormiscia** Fries [1835].

1. *H. zonata* (Web. et Mohr) Aresch., De-Toni Syll. I, pag. 163.  
Staw pod Oczkowcami.

Subfam. **Chaetophoreae** (Harv. [1841]) Hass. (1845).

Gen. **Stigeoclonium** Kuetz. [1843].

1. *St. tenue* (Ag.) Rabenh., De-Toni. Syll. I., pag. 197.  
d) *uniforme* (Ag.) Kuetz.  
Źródło o dnie wapiennem przy drodze w pobliżu stawu  
pod Oczkowcami.

Ordo Protococcoideae (Menegh. [1838]) Kirchn. [1878] em.

Fam. **Volvocaceae** (Cohn [1856]) Kirchn. [1878].

Gen. **Pandorina** Bory [1824].

1. *P. Morum* (Muell.?) Bory.  
Stawy: w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.

Fam. **Palmellaceae** (Decais. [1842]) Naeg. [1847] em.

Subfamilia **Coenobieae** Falkenb. [1882].

Gen. **Scenedesmus** Meyen [1829].

1. *Sc. bijugatus* (Turp.) Kuetz., De-Toni Syll. I., pag. 563.  
Staw pod Oczkowcami.
2. *Sc. denticulatus* Lagerh. Pediastr. Tab. II, f. 13—17, De-Toni  
l. c. 564.  
Stawy w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.
3. *Sc. quadricauda* (Turp.) Bréb., De-Toni l. c. 565.  
Razem z poprzednim gatunkiem.  
var. *hyperabundans* Gutw. Flora glonów okolic Lwowa, pag.  
20, Tab. I, fig. 2.  
Staw w Podwołoczyskach.

4. *Sc. obliquus* (Turp.) Kuetz., De-Toni l. c. 566. (*Sc. acutus* Meyen).  
 Staw w Podwołoczyskach.  
 var. *dimorphus* (Turp.) Rabenh. De-Toni l. c. 567.  
 Staw pod Oczkowcami.

Gen. *Coelastrum* Naeg. [1849].

1. *C. sphaericum* Naeg., De-Toni l. c. pag. 570.  
 Podwołoczyska — staw i staw pod Oczkowcami.
2. *C. cubicum* Naeg., De-Toni l. c. 570.  
 Staw pod Oczkowcami.
3. *C. microporum* Naeg., De-Toni l. c. pag. 571.  
 Podwołoczyska — staw.

Gen. *Pediastrum* Meyen [1829].

1. *P. Boryanum* (Turp.) Menegh., De-Toni l. c. pag. 576.  
 var. *brevicorne* A. Br. forma *glabra* Racib. Ped. fig. 12.  
 var. *granulatum* (Kuetz.) A. Br., Racib. l. c. fig. 16.  
 Staw w Podwołoczyskach.
2. *P. duplex* Meyen., De-Toni l. c. pag. 578.  
 var. *clathratum* A. Br., Racib. Ped. f. 27.  
 Staw w Podwołoczyskach.  
 var. *asperum* A. Br., Racib. l. c. f. 35.  
 Staw pod Oczkowcami.  
 var. *reticulatum* Lagerh. Ped. pag. 56. Tab. II, fig. 1.  
 Staw w Podwołoczyskach.  
 var. *subgranulosum* Racib. Ped. fig. 3.  
 Razem z odmianą poprzednią.
3. *P. Tetras* (Ehrenb.) Ralfs., De-Toni l. c. pag. 581.  
 forma *granulata* Racib. Ped. fig. 43.  
 Staw w Podwołoczyskach.

Subfamilia *Eremobieae* Kirch. [1877].

Gen. *Ophiocytium* Naeg. [1849].

1. *O. cochleare* (Eichw.) A. Br., De-Toni l. c. pag. 591.  
 Staw pod Oczkowcami.

Gen. *Raphidium* Kuetz. [1845].

1. *R. polymorphum* Fresen., De-Toni l. c. pag. 592.  
 Staw w Podwołoczyskach.
2. *R. Falcula* A. Br., De-Toni l. c. pag. 595.  
 Razem z gatunkiem poprzednim.



Gen. *Selenastrum* Reinsch [1867].

1. *S. Bibrajanum* Reinsch Algfl. pag. 64. Tab. IV, fig. 2, a—c.  
De-Toni Syll. I. pag. 596.  
Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.

Gen. *Tetraëdron* Kuetz. [1845].

1. *T. trigonum* (Naeg.) Hansg., De-Toni l. c. pag. 598.  
var. *punctatum* Kirch. Alg. Schles. pag. 104.  
Podwołoczyska — staw.

Subfamilia *Tetrasporeae* (Naeg.) Klebs ampl.

Gen. *Crucigenia* Morren [1830].

1. *C. rectangularis* (Naeg.) A. Br., De-Toni l. c. pag. 655.  
Staw w Podwołoczyskach.

Subfamilia *Dictyosphaerieae* De-Toni [1888].

Gen. *Dictyosphaerium* Naeg. [1849].

1. *D. pulchellum* Wood., De-Toni l. c. pag. 660.  
Staw pod Oczkowcami.

Subfamilia *Nephrocytieae* De-Toni [1888].

Gen. *Nephrocytium* Naeg. [1849].

1. *N. Agardhianum* Naeg., De-Toni l. c. pag. 663.  
Staw w Podwołoczyskach.

Gen. *Oocystis* Naeg. [1855].

1. *O. Naegelii* A. Br., De-Toni l. c. pag. 663.  
Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.

Ordo *Conjugatae* (Link. [1826]) De Bary [1858].

Fam. *Zygnemaceae* (Menegh. [1838]) Rabenh. [1868].

Subfamilia *Zygnemeae* (Menegh.) De-Bary em.

Gen. *Spirogyra* Link. [1820].

1. *Sp. Grevilleana* (Hassall) Kuetz., Petit Spirog. d. Paris pag. 10.  
Tab. II, fig. 1—6., (*Sp. inaequalis* Kuetz) De-Toni Syll. I.  
pag. 769.

cell. veg. — 112  $\mu$  longae, — 32  $\mu$  latae  
 oosporae — 83  $\mu$  „ — 51  $\mu$  „  
 oogonia — 112  $\mu$  longa — 53  $\mu$  lata.

Staw pod Oczkowcami.

Fam. **Desmidiaceae** (Kuetz. [1833]) De-Bary [1858].

Subfamilia **Didymioideae** (Reinsch [1867]) Hansg. [1888].

Gen. **Closterium** Nitzsch [1817].

1. *C. acerosum* (Schrank) Ehrenb., Ralfs Brit. Desmid. pag. 164. Tab. XXVII, fig. 2, De-Toni l. c. pag. 824.  
Staw pod Oczkowcami.
2. *C. Dianae* Ehrenb. Delp. Desm. subalp. pag. 99. Tab. XVII, fig. 45—51, De-Toni l. c. pag. 838.  
Razem z poprzednim gatunkiem.
3. *C. parvulum* Naeg., Wolle Desm. U. S. pag. 45. Tab. VII, f. 7., De-Toni l. c. pag. 841.  
Staw w Podwołoczyskach.
4. *C. Leibleinii* Kuetz., Ralfs Brit. Desm. pag. 167. Tab. XXVIII, fig. 4, De-Toni l. c. pag. 846.  
Staw pod Oczkowcami.

Gen. **Cosmarium** Corda [1835].

1. *C. granatum* Bréb., Ralfs Brit. Desm. pag. 96. Tab. XXXII, f. 6.  
Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.  
var. *subgranatum* Nordst. De-Algis Sandwicensibus. pag. 13. Tab. II, fig. 8.  
Staw pod Oczkowcami.
2. *C. Meneghinii* Bréb., Ralfs Brit. Desm. pag. 96, Tab. XV, f. 6.  
forma *Reinschii* Istvanf. Jelent. pag. 227. Tab. I, fig. 18.  
Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.
3. *C. punctulatum* Bréb., Wolle Desm. U. S. pag. 74. Tab. XIII, fig. 4, De-Toni l. c. pag. 961.  
Razem z poprzednim gatunkiem.
4. *C. Nymannianum* Grun., Lund. Desm. Suec. pag. 36. Tab. III, fig. 1, De-Toni l. c. pag. 694.  
forma *pygmaea* nob.  
Long. 16  $\mu$ ; lat. 13  $\mu$ ; lat. isth. 2, 3  $\mu$ ; lat. apic. 9  $\mu$ .  
Staw w Podwołoczyskach.
5. *C. aphanichondrum* Nordst. Desm. Ital. Tyrol. pag. 36. Tab. XII, fig. 12., De-Toni l. c. pag. 967.  
Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.
6. *C. minus* Racib. Desm. zebr. przez Dra Ciastonia w podróży naokoło ziemi, pag. 14. (= *C. trachypleurum* var. *minor* Ra-



cib. Desm. okol. Krakowa, pag. 11. Fig. 5; Racib. De non-nul. Desm. pag. 17—18., De-Toni l. c. pag. 974).

Staw pod Oczkowcami.

7. *C. margaritiferum* (Turp.) Menegh., Ralfs Brit. Desm. pag. 100. Tab. XVI, f. 2, Wolle Desm. U. S. Tab. XIII, fig. 1, 2. De-Toni l. c. pag. 979.

Long. cell. 34  $\mu$  — 46  $\mu$ .

Lat. „ — — 41  $\mu$ .

„ isth. — — 14  $\mu$ .

Diam. zygoop. sine acul. 32  $\mu$ .

„ „ cum „ 51  $\mu$ .

Staw pod Oczkowcami.

8. *C. Botrytis* (Bory) Menegh., Ralfs Desm. Tab. XVI. fig. 1, De-Toni l. c. pag. 979.

Staw pod Oczkowcami.

$\beta$ ) *subtumidum* Wittr. Om Gotlands och Oelands Sötvattensalger pag. 57. Tab. IV, fig. 12, De-Toni l. c. pag. 981.

Long. 64  $\mu$ ; lat. 53  $\mu$ ; lat. isth. 11, 5  $\mu$ .

Razem z typowem.

9. *C. tetraophthalmum* (Kuetz.) Bréb., Ralfs Brit. Desm. pag. 98. Tab. XVII, fig. 11, Delp. Spec. Desm. subalp. pag. 122. Tab. IX, fig. 1—4, Wolle Desm. U. S. pag. 76. Tab. XIII. fig. 13.

Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.

10. *C. reniforme* (Ralfs) Archer (= *C. margaritiferum* var. *reniforme* Ralfs Brit. Desm. pag. 100. Tab. XVI, fig. 2, a—c). De-Toni l. c. pag. 982.

Staw pod Oczkowcami.

11. *C. formosulum* Hoff., Nordst. Desm. fr. Bornholm, pag. 194. Tab. IV, fig. 6—7, De-Toni l. c. pag. 989.

Razem z gatunkiem poprzedzającym.

12. *C. subcrenatum* Hantzsch., Wolle Desm. U. S. pag. 84. Tab. XVIII, f. 6—7., De-Toni l. c. pag. 1000.

Staw pod Oczkowcami.

13. *C. Phaseolus* Bréb., De-Toni l. c. pag. 1001.

Long. 46  $\mu$ ; lat. 41  $\mu$ ; lat. isth. 14  $\mu$ .

Razem z poprzednim gatunkiem.

14. *C. biretum* Bréb. in Ralfs Brit. Desm. pag. 102. Tab. XVI, f. 5, b.

Long. 55  $\mu$ ; lat. 48  $\mu$ ; lat. isth. 16  $\mu$ .

Staw pod Oczkowcami.

15. *C. Turpinii* Bréb., De-Toni l. c. pag. 1019.

a) *typicum*. *E vertice visum utrinque uno tumore praeditum.*

Stawy: w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.

16. *C. Quasillus* Lund. Desm. Suec. pag. 29. Tab. III, fig. 10., De-Toni l. c. pag. 1020.

Staw pod Oczkowcami.

17. *C. Gregoryi* Roy et Bisset in Gutw. Materyały do flory glonów Galicyi. Pars III, 1892, Tab. I. fig. 11. La Nuova Notarisia Serie III, 1892 pag. 19.  
Stawy: pod Oczkowcami i w Podwołoczyskach.
18. *C. Broomei* Thwait., Wolle Desm. U. S. Tab. XVII, fig. 6.  
Staw pod Oczkowcami.
19. *C. subquasillus* Boldt Studier, pag. 23. Tab. I, fig. 25, Gutw. Flora glonów okolic Lwowa, pag. 61. Tab. II, fig. 26., De-Toni l. c. pag. 1027.  
Razem z poprzednim gatunkiem.
20. *C. subcostatum* Nodst. Nordst. et Wittr. Desm. Ital. et Tyrol. pag. 37. Tab. XII, fig. 13, De-Toni l. c. pag. 1028.  
Staw w Podwołoczyskach.
21. *C. subpunctulatum* Nordst. Freshw. Alg. of N. Zeal. and Austral. pag. 47. Tab. V, fig. 8, De-Toni l. c. pag. 1049.  
Staw pod Oczkowcami.

Gen. **Staurastrum** Meyen [1829].

1. *St. muticum* Bréb., Ralfs Brit. Desm. pag. 125. Tab. XXI, f. 4.  
De-Toni l. c. pag. 1177.  
Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.
2. *St. orbiculare* (Ehrenb.) Ralfs l. c. Tab. XXI, fig. 5., De-Toni l. c. pag. 1180.  
Staw w Podwołoczyskach.
3. *St. cyrtocerum* Bréb. in Ralfs Brit. Desm. pag. 139. Tab. XXII, fig. 10., De-Toni l. c. pag. 1207.  
Podwołoczyska — staw.
4. *St. polymorphum* Bréb. in Ralfs Brit. Desm. pag. 135. Tab. XXII, fig. 9 et Tab. XXXIV, fig. 6.  
Staw pod Oczkowcami.

Class. **Bacillarieae** Nitzsch. [1817].

Ordo Raphideae H. L. Smith. [1872].

Fam. **Naviculaceae** (Kuetz. [1844]) Heib. p. p. [1863].

Gen. **Navicula** Bory [1826?]

1. *N. viridis* (Nitzsch) Kuetz. Bac. Tab. IV, fig. 18, Tab. XXX, fig. 12.  
Staw w Podwołoczyskach.  
var. *distinguenda* Cleve Diat. of Finl. pag. 22. Pl. I, f. 1.  
Staw pod Oczkowcami.

2. *N. hemiptera* Kuetz. Bac. Tab. XXX fig. 11.  
Staw w Podwołoczyskach.
3. *N. borealis* (Ehr.) Kuetz. Bac. pag. 96. Tab. XXVIII, fig. 68,  
De-Toni Syll. V. II. Sec. I, pag. 20.  
Staw pod Oczkowcami.
4. *N. stauroptera* Grun. var. *gracilis* Grun. Nav. Tab. (2) IV, f. 18.  
Razem z poprzednim gatunkiem.
5. *N. affinis* Ehrenb., Grun. Nav. Tab. III, fig. 2 i 3.  
Staw pod Oczkowcami.
6. *N. producta* Sm., Grun. l. c. Tab. II, fig. 35.  
Razem z gatunkiem poprzedzającym.
7. *N. appendiculata* (Ag.) Kuetz. Bac. pag. 93. Tab. III, fig. 28,  
De-Toni Sylloge Vol. II. Sect. I, pag. 28.  
Podwołoczyska — staw
8. *N. Rostellum* Grun. Navic. Tab. (2) IV, fig. 10.  
Źródło o dnie wapiennem przy drodze przed stawem  
pod Oczkowcami.
9. *N. rhynchocephala* Kuetz. Bac. Tab. XXX, fig. 35, De-Toni  
l. c. pag. 44.  
var. *brevis* Grun. Nav. Tab. (2) IV, fig. 31, c., De-Toni l.  
c. pag. 45.  
var. *elongata* Grun. Nav. Tab. (2) IV, fig. 31, a., De-Toni l. c.  
Staw w Podwołoczyskach.
10. *N. ambigua* Ehr., De-Toni l. c. pag. 137.  
Źródło o dnie wapiennem przy drodze przed stawem  
pod Oczkowcami.
11. *N. De-Toniana* Gutw. Diagnoses non. alg. nov. in Galicia  
orientali an. 1890. collect. La Nuova Notarisia Ser. III, p. 21.  
Staw pod Oczkowcami.
12. *N. sphaerophora* Kuetz. Bac. Tab. IV, fig. 7, De-Toni l. c.  
pag. 140.  
Staw pod Oczkowcami.
13. *N. limosa* Kuetz.  $\alpha$  *genuina* Grun. Nav. Tab. (3) V, f. 8b.  
Razem z poprzednim gatunkiem.
14. *N. inflata* Kuetz. Bac. Tab. III, fig. 36, De-Toni l. c. pag. 149.  
Stawy: w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.
15. *N. Peisonis* Grun. Nav. Tab. (1) III, fig. 28.  
Staw pod Oczkowcami.
16. *N. Bacillum* Ehrenb., Grun. Nav. Tab. (2) IV, fig. 1.  
Staw pod Oczkowcami.

Gen. *Amphipleura* Kuetz. [1844].

1. *A. pellucida* (Ehr.?) Kuetz. Bac. Tab. III, fig. 52, De-Toni l. c.  
pag. 227.  
Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.



Gen. *Pleurosigma* W. Sm. [1853].

1. *Pl. attenuatum* (Kuetz.) W. Sm., De-Toni l. c. pag. 248.  
Stawy: w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.
2. *Pl. acuminatum* (Kuetz.) Grun., De-Toni l. c. pag. 252.  
Razem z poprzedzającym gatunkiem.

Fam. **Cymbellaceae** (Kuetz.) Grun. [1860].Gen. *Cymbella* Ag. [1830].

1. *C. Ehrenbergii* Kuetz. Bac. Tab. VI, fig. 11, De-Toni l. c. pag. 349.  
Stawy: w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.
2. *C. cuspidata* Kuetz. Bac. Tab. III, fig. 40, De-Toni l. c. pag. 350.  
Staw pod Oczkowcami.
3. *C. amphicephala* Naeg., De-Toni l. c. pag. 350.  
Podwołoczyska — staw.
4. *C. affinis* Kuetz. Bac. Tab. VI, fig. 15, De-Toni l. c. p. 352.  
Staw pod Oczkowcami.
5. *C. leptoceras* (Ehr.) Rabenh. De-Toni l. c. 353.  
Razem z gatunkiem poprzedzającym.
6. *C. excisa* Kuetz. Bac. Tab. VI, fig. 17, De-Toni l. c. p. 357.  
forma *typica* nob. = Kuetz. l. c.  
forma *major* Gutw. Mat. do fl. gl. Galicyi Pars. II, pag. 25.  
Tab. I, fig. 21, De-Toni l. c. pag. 357.  
Long. 34, 5  $\mu$ ; lat. 11, 5  $\mu$ ; lat. apic. 3  $\mu$ .  
Staw pod Oczkowcami.
7. *C. gastroides* Kuetz. Bac. Tab. VI, fig. 4, b, De-Toni l. c. pag. 361.  
Stawy: w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.
8. *C. lanceolata* (Ehr.) Kirchn. Alg. Schles. pag. 188, Kuetz. Bac. Tab. VI, fig. 3, De-Toni l. c. pag. 362.  
Razem z *C. gastroides*.
9. *C. cymbiformis* (Kuetz.) Bréb., De-Toni l. c. pag. 363.  
Razem z *C. lanceolata* i *C. gastroides*.  
var. *parva* (W. Sm.) V. Heurck, De-Toni l. c. pag. 364.  
Staw pod Oczkowcami.
10. *C. Cistula* (Hempr.) Kirch. Alg. Schles. pag. 189., De-Toni l. c. 365.  
Podwołoczyska — staw.  
var. *maculata* (Kuetz.) Grun. (= *C. maculata* Kuetz. Bac. pag. 79. Tab. VI. fig. 1), De-Toni l. c. pag. 365.  
Stawy: w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.
11. *C. helvetica* Kuetz. Bac. Tab. VI, fig. 13, De-Toni l. c. p. 366.  
Stawy: w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.

12. *C. stomatophora* Rabenh.  
Staw pod Oczkowcami.

Gen. *Encyonema* Kuetz. [1833].

1. *E. prostratum* (Berk.) Ralfs, De-Toni l. c. pag. 371.  
Podwołoczyski staw i staw pod Oczkowcami.
2. *E. ventricosum* (Ag.) Grun., De-Toni l. c. pag. 373.  
Razem z *E. prostratum*.
3. *E. gracile* Rabenh., De-Toni l. c. pag. 373.  
Razem z *E. ventricosum*.

Gen. *Amphora* Ehrenb. [1831, 1840].

1. *A. coffeaeformis* (Ag.) Kuetz. Bac. Tab. V, fig. 37, De-Toni l. c. pag. 389.  
Rzadki ten gatunek, dotąd niezalezony w Galicyi, znalazłem w stawie pod Oczkowcami.
2. *A. lineolata* Ehrenb. De-Toni l. c. pag. 394.  
Staw w Podwołoczyskach.
3. *A. ovalis* (Bréb.) Kuetz. Bac. pag. 107. Tab. V, fig. 35 et 39. De-Toni l. c. pag. 411.  
Staw pod Oczkowcami.

Fam. **Gomphonemaceae** (Kuetz. [1844]) Grun. [1860].

Gen. *Gomphonema* Ag. [1824].

1. *G. constrictum* Ehr., Kuetz. Bac. Tab. XIII, fig. 1 et fig. 4. De-Toni l. c. pag. 21.
  - a) *typicum* Gutw. Bac. tatr. pag. 8, Nr. 53. (=Kuetz. l. c.).  
Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.
  - b) *truncatum* (Ehrnb.) Gutw. Bac. tatr. pag. 9, Gutw. Flora glonów okolic Lwowa pag. 95, Ehr., Inf. pag. 216. Tab. XVIII, fig. 1.  
Staw w Podwołoczyskach.
2. *G. capitatum* Ehr. De-Toni l. c. pag. 422.  
Podwołoczyska — staw i staw pod Oczkowcami.
3. *G. acuminatum* Ehrb., De-Toni l. c. pag. 423.
  - var. *coronatum* (Ehr.) Rabenh. De-Toni l. c. pag. 424.  
Razem z *G. capitatum*.
  - var. *nasutum* (Ehr.) Schum. Preuss. Diat. fig. 28.  
Staw pod Oczkowcami.
  - var. *Sceptrum* Rabenh. De-Toni l. c. pag. 424.

Long. 110  $\mu$ ; lat. med. 16  $\mu$ ; lat. capit. 14  $\mu$ .

Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.

4. *G. Augur* Ehrb., De-Toni l. c. pag. 424.

Razem z *G. acuminatum* var. *Sceptrum*.

5. *G. parvulum* Kuetz. Bac. Tab. XXX, f. 63 = *G. tenellum* W. Sm., De-Toni l. c. pag. 429.

Podwołoczyska — staw.

6. *G. olivaceum* (Lyngb.) Kuetz. Bac. Tab. VII, fig. 13 et 15, De-Toni l. c. pag. 433.

Staw pod Oczkowcami.

Gen. *Rhoicosphenia* Grun. [1860].

1. *Rh. curvata* (Kuetz.) Grun., De-Toni l. c. pag. 437.

Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.

Fam. **Cocconeidaceae** (Kuetz. [1844]) Grun. [1868].

Gen. *Cocconeis* Ehrenb. [1835].

1. *C. Pediculus* Ehr., De-Toni l. c. pag. 452.

Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.

2. *C. Placentula* Ehrb., De-Toni l. c. pag. 454.

Razem z gatunkiem poprzednim.

3. *C. striolata* Rabenh.

Podwołoczyska — staw.

Fam. **Achnanthaceae** (Kuetz. [1844]) Grun. [1860].

Gen. *Achnanthes* Bory [1822].

1. *A. lanceolata* (Bréb.) Grun., De-Toni l. c. pag. 486.

Podwołoczyska — staw.

Ordo Pseudorhaphideae H. L. Sm. [1872].

Fam. **Nitzschiaceae** Grun. [1860].

Gen. *Nitzschia* Hassall. [1845].

1. *N. Tryblionella* Hantzsch (*Tryblionella Hantzschiana* Grun.) De-Toni Syll. V. II. Sect. II, pag. 498.

Staw pod Oczkowcami.

2. *N. sigmoidea* (Nitzsch.) W. Sm., De-Toni l. c. pag. 528.

Staw pod Oczkowcami.



Fam. **Surirellaceae** (Kuetz. [1844]) Grun. [1860].

Gen. **Suriraya** Turp. [1828].

1. *S. bisseriata* (Ehrb.) Bréb. De-Toni l. c. pag. 567.  
Podwołoczyska — staw.
2. *S. splendida* (Ehr.) Kuetz. Bac. Tab. VII, f. 9, De-Toni l. c. pag. 571.  
Staw pod Oczkowcami.
3. *S. ovalis* Bréb. var. *pinnata* (W. Sm.) V. H., De-Toni l. c. pag. 581.  
Źródło o dnie wapiennem przy drodze przed stawem pod Oczkowcami.

Gen. **Cymatopleura** W. Sm. [1851?].

1. *C. Solea* (Bréb.) W. Sm., De-Toni l. c. pag. 599.  
Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.  
var. *gracilis* Grun., De-Toni l. c. pag. 600.  
Staw pod Oczkowcami.

Fam. **Meridionaceae** Kuetz. [1844].

Gen. **Meridion** Ag.

1. *M. circulare* (Grev.) Ag., De-Toni l. c. pag. 642.  
Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami; źródło o dnie wapiennem przy drodze przed stawem pod Oczkowcami.
2. *M. constrictum* Ralfs, De-Toni l. c. pag. 643.  
Razem z poprzednim gatunkiem w źródle.

Fam. **Fragilariaceae** (Kuetz. [1844]) De-Toni [1890] em.

Gen. **Synedra** Ehr. [1830].

1. *S. Ulna* (Nitzsch.) Ehr., Kuetz. Bac. Tab. XXX, f. 28, De-Toni l. c. pag. 653.  
Podwołoczyska staw i staw pod Oczkowcami.
2. *S. capitata* Ehr. Kuetz. Bac. Tab. XIV, fig. 19 (1—7), De-Toni l. c. pag. 659.  
Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.

Gen. **Fragilaria** Lyngb. [1819].

1. *Fr. virescens* Ralfs, Kuetz. Bac. Tab. XVI, fig. 4., De-Toni l. c. pag. 681.  
Razem z gatunkiem poprzedzającym.

2. *Fr. capucina* Desmaz., Kuetz. Bac. Tab. XVI, fig. 3, De-Toni l. c. pag. 688.  
 β) *mesolepta* Rabenh. (=β) *constricta* Grun. Oest. Diat. Tab. (7) IV, fig. 12). De-Toni l. c. pag. 688.  
 Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.
3. *Fr. construens* (Ehr.) Grun., De-Toni l. c. pag. 688.  
 Podwołoczyska — staw.

Fam. **Eunotiaceae** (Kuetz. [1844]) Rabenh. [1853].

Gen. *Cystopleura* Bréb. [1849].

1. *C. turgida* (Ehr.) Kunze Revis. gen. plantar. II, p. 891, sec. De-Toni l. c. pag. 777. (*Epithemia turgida* (Ehr.) Kuetz. Bac. p. 34. Tab. V, fig. 14).  
 Podwołoczyska — staw.
2. *C. gibba* (Ehr.) Kunze l. c. (*Epith. gibba*) (Ehr.) Kuetz. l. c. pag. 34. Tab. IV, fig. 22). De-Toni l. c. pag. 780.  
 Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.
3. *C. Argus* (Ehr.) Kunze l. c. (*Epith. Argus*) (Ehr.) Kuetz. l. c. Tab. XXIX, fig. 55), De-Toni l. c. pag. 782.  
 Podwołoczyska — staw.  
 var. *alpestris* (W. Sm.) Grun. Verhandl. Wien 1862, pag. 329. Tab. III, fig. 28, De-Toni l. c. pag. 783.  
 Staw pod Oczkowcami.
4. *C. Zebra* (Ehr.) Kunze l. c. (*Epith. Zebra* (Ehr.) Kuetz. l. c. Tab. V, fig. 12-b. et Tab. XXX, fig. 5), De-Toni l. c. pag. 784.  
 var. *saxonica* (Kuetz.) Grun. l. c. pag. 328. Tab. VI, fig. 6.  
 Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.  
 var. *proboscidea* (Kuetz.) Grun. l. c. fig. 5.  
 Staw pod Oczkowcami.  
 var. *Porcellus* (Kuetz.) Grun. l. c. fig. 3.  
 Razem z var. *saxonica*.
5. *C. gibberula* (Ehr.) Kunze l. c. (*Epith. gibberula* Kuetz. l. c. Tab. XXX, f. 3). De-Toni l. c. pag. 786.  
 Staw pod Oczkowcami.  
 var. *producta* Grun. Oest. Diat. Verh. 1862 pag. 331. Tab. III, (6) fig. 9, De-Toni l. c.  
 Staw w Podwołoczyskach.

Gen. *Eunotia* Ehr. [1837].

1. *E. pectinalis* (Dillw.?) Rabenh., Grun. Oest. Diat. Verh. 1862. Tab. (6) III, fig. 19-a, De-Toni l. c. pag. 793.  
 Staw pod Oczkowcami.

## Ordo Cryptorhaphideae.

## Fam. Melosiraceae.

## Gen. Melosira Ag.

1. *M. varians* Ag. Kuetz. Bac. Tab. II, fig. 10.  
      $\alpha$ ) *genuina* Kirch Alg. Schles. pag. 216, Nr. 580-a.  
         Podwołoczyska — staw i staw pod Oczkowcami.
2. *M. subflexilis* Kuetz. Bac. Tab. II, fig. 13.  
         Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.
3. *M. tenuis* Kuetz. Bac. Tab. II, fig. 2.  
         Staw pod Oczkowcami.

## Gen. Orthosira Thwait.

1. *O. Roeseana* (Rabenh.) Kirch. Alg. Schles. 217.  
         Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.

## Gen. Cyclotella Kuetz.

1. *C. operculata* Kuetz. Bac. Tab. I, fig. 1.  
         Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.
2. *C. Kuetzingiana* Thwait., Kirch. Alg. Schles. pag. 217.  
         Razem z *C. operculata*.

## Class. Phycochromophyceae Rab.

## Ordo Oscillarieae Ag.

## Gen. Oscillatoria Vauch. [1803] sec. Gomont\*).

1. *O. natans* Kuetz.  
     crass. filam. 7  $\mu$ .  
         Staw w Podwołoczyskach.
2. *O. Froelichii* Kuetz.  $\alpha$ ) *genuina* Kirch. Alg. Schles. pag. 248.  
     crass. filam. 16  $\mu$ . — 18  $\mu$ .  
         Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.  
      $\gamma$ ) *dubia* Rab., Kirch. l. c.  
         Staw pod Oczkowcami.

\*) *M. Maurice Gomont*. Faut-il dire *Oscillatoria* ou *Oscillaria*? (Extrait du Journal de Botanique. Numéro du 16 Aout 1891).



3. *O. major* Vauch.  
crass. filam 21  $\mu$ .  
Staw pod Oczkowcami.

Gen. Tetrapedia Reinsch [1867].

1. *T. glaucescens* Witttr.  
Staw w Podwołoczyskach i pod Oczkowcami.

W Podgórzu pod Krakowem, dnia 12/XI 1892.

