

27671

6

II ODBITKA

MUZEUM HISTORICZNE

Wydziału lekarskiego Uniw. Jag.

Yanowski W

Z CZASOPISMA »PRZEGLĄD LEKARSKI«
ORGANU TOWARZYSTW LEKARSKICH
KRAKOWSKIEGO I GALICYJSKIEGO WY-
— CHODZĄCEGO W KRAKOWIE. —

REDAKTOR GŁÓWNY:

PROF. D^{R.} STANISŁAW CIECHANOWSKI.

Biblioteka Jagiellońska





MUZ. HIST. TORYC
Wydziału lekarskiego U

Red

Wzmianka o łożu baranim (*sebum ovile*) jako masie pigułkowej.

Podał prof. dr Walery Jaworski.

(Według demonstracji w Tow. lek. krak. z d. 21 marca 1906).

W podręczniku „Nauka o chorobach wewnętrznych“ zwróciłem uwagę na to, że przy podawaniu niektórych leków, np. arsenu, rtęci, jodu i t. p., należy ochraniać chory żołądek od ich działania. W tym celu znane już jest podawanie pigułek keratynowanych, t.j. powleczonych istotą rogową jaka np. znajduje się w tutkach piór ptasich. Pigułki keratynowane, które zresztą trudno otrzymać, nie okazały się praktycznymi, a to z powodu że po większej części są w przewodzie pokarmowym nierozpuszczalne. Dlatego poleciłem (Nauka o chorob. wewn. III. str. 332) podawać leki w pigułkach powleczonych twardym tłuszczem, jakim jest łoż barani (*sebum ovile*), topniejącym w ciepłocie 45—50° C. Nie weszły one, o ile mi wiadomo, dotąd w użycie w praktyce lekarskiej, przeto chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na ich użyteczność po przeprowadzeniu doświadczeń w klinice na 52 osobach. Przekonałem się bowiem, że one swemu celowi, niedrażnienia żołądka zupełnie odpowiadają.

W wodzie i w treści żołądkowej pływają pigułki łożowe na powierzchni, przeto szybko z płynną treścią przechodzą ze żołądka do jelit. Nie topią i nie rozpuszczają się w żołądku, gdyż, jak to w 11 przypadkach mogliśmy się przekonać, wydobyliśmy je niezmienione po 1/2-1 godzinie ze żołądka. Lek w nich zawarty w żołądku się nie rozpuszcza, gdyż pigułki łożowe z domieszką proszku węgla lub karminu treści żołądkowej nie zabarwiają, natomiast pigułki te rozpuszczają się w zupełności w jelitach. Na 10 przypadków, w których podawaliśmy pigułki łożowe i poszukiwali ich potem w kale, znaleziono tylko raz jeden

pigułkę, do $\frac{1}{3}$ pierwotnej wielkości zmniejszoną. Do pigułek domieszane barwiki (węgiel, karmin) zabarwiają stolce jednostajnie i dają się jako pyłki wyśledzić pod mikroskopem.

Leki z pigułek łożowych przechodzą z jelit do ustroju. Podawaliśmy w pigułkach łożowych jodek sodowy (4 przypadki), siarkan atropiny (6 przypadków), kwas salicylowy (4 przypadki), jako też środki przeczyszczające: kalomel, podofilinę, jalapę, socznicę (*scomonium*) i gumożywicę kroplinową (*gummigutti*) (18 przypadków). We wszystkich przypadkach wykryto w moczu jod (po 1—2 godz.). kwas salicylowy (po 1—2 g.), rozszerzenie źrenic po 2—10 godz. Stwierdzono także we wszystkich przypadkach działanie pigułek łożowych ze środkami przeczyszczającymi z tą różnicą, że działają one powolniej, niż same leki w proszku użyte.

Środki, któreby dla ominięcia chorego żołądka należało przepisywać w pigułkach łożowych, są następujące: przetwory arsenu (*ac. arsenicosum, arsenicum sulfuratum, natrium arsenicosum, kalium arsenicosum, arsycodyl*); rtęci (*hydrargyrum bichloratum, hydrargyrum chloratum, hydrargyrum praecipitatum album, hydrargyrum jodatum, hydrargyrum bijodatum, i t.d.*); jodu (*natrium i kalium jodatum, jodoformium, ferrum jodatum, ac. jodatum*); fosfor żółty; przetwory wapniu (*calcium chloratum, calcium salicylicum*), glinu (*alumen ustum, aluminium sulfuricum*); przetwory cynku (*zincum oxydatum, zincum sulfuricum*). Wreszcie wiele przetworów organicznych: (*ac. benzoicum, carbolicum, salicylicum, tannicum, balsamum copaivae, pulvis cubebae, guajacolum*), olejki aromatyczne mające działać dopiero w jelitach, pankreatyna, olejek terpentynowy i t. d. Wogóle we wszystkich przypadkach, w których obawiamy się zadrażnienia żołądka zapisanym lekiem, najbezpieczniej stosować go w pigułkach łożowych.

Przy zapisywaniu pigułek łożowych należy wyraźnie napisać na receptce punkt topliwości łożu 45°C , gdyż w aptekach biorą zwykły tłuszcz, łatwo topny w żołądku, przez co lek rozpuszcza się już w żołądku. W jednej pigułce nie ma być więcej jak 0.1 *sebum ovile*, a leku co najwięcej drugie tyle. Do pigułek, w które wchodzi mało leku np. 0.01, dobrze jest dla lepszego zarobienia dodać proszku obojętnego (*magnesia usta, pulvis liquiritiae*) kilka centygramów. Nie należy zapomnieć dodać proszku do obsypywania (*consperge*): pigułek jak widłaku (*pulvis lycopodis*) lub magnezyi

palonej, aby się nie lepiły. Jako wzór przepisywania niech posłużą:

Rp.		Rp.	
Ac. arsenicosi	0,10	Podophyllini	0,20
Sebi ovilis punc. li-		Sebi ovilis p. lique-	
quef. 45° C	10,0	fat. 45° C	1,0
Pulv. liquir. q. s.		Magnesiae ustae q. s.	
f. pilulae Nro centum.		Div in partes X. f. pilulae	
Consp. c. pulv. lycopodii.		Consp. c. pulv. magn. uste.	
S.		S.	
Rp.		Rp.	
Natrii iodati	10,0	Ac. salicylici	10,0
Sebi ovilis puncti		Sebi ovilis p. lique-	
liquef. 45° C	10,0	fat. 45° C	10,0
M. f. pilulae Nro centum.		M. f. pilulae Nro centum.	
Consp. c. magn. usta.		Consp. c. pulv. lycopodii.	
S.		S.	



~~~~~  
**Osobne odbicie z »Przeglądu lekarskiego« 1906. Nr. 31.**

**Kraków. 1906. — Drukarnia Uniwersytetu Jagiell., pod zarządem Józefa Filipowskiego.**  
~~~~~



