



NOTA

72266

1 | | P

W NARTOWSKI.

#28015/80


DYETA W ŻÓŁTACZCE.



KRAKÓW
Drukarnia W. Korneckiego i K. Wojnara.
1906.

DR MIECZYŚLAW NARTOWSKI.

D Y E T A
W Ż Ó Ł T A C Z C E.



KRAKÓW
Drukarnia W. Korneckiego i K. Wojnara.
1906.

72.266
Ibr.

BIBLIOTHECA
VNIV. IAGELL.

CRACOVENSIS.

Biblioteka Jagiellońska



1002883192



ŻÓŁTACZKA nie jest chorobą, ale objawem zaburzeń w czynnościach komórek wątrobowych i zatrucia produktami przemiany materii organizmu. Ujawnia się wskutek mechanicznych przeszkód w odpływie żółci, przy wadach serca, otruciach zwłaszcza rybami i zepsutem mięsem, jadami drobnoustrojów w chorobach zakaźnych, w chorobach wątroby i przy licznych wzruszeniach psychicznych.

Objawy charakterystyczne dla żółtaczki, stanowią: żółte zabarwienie skóry i błon śluzowych, najwyraźniej na białkowiec oka, swędzenie powłok skórnych, obłożenie języka i uczucie papkowatego a gorzkiego smaku, skłonność do krwotoków, utrudnienie trawienia, stolce zbite, szarawe, gliniaste albo płynne zielonkawe, mocz w zmniejszonej ilości a zabarwienia ciemnego z zielonkawym odcieniem. Ilość tętna zmniejsza się znacznie, niekiedy do 40 uderzeń na minutę, ogólne osłabienie, bredzenie i zapad.

Leczenie w pierwszych dniach pojawienia się żółtaczki, polega na podawaniu środków wymiotnych i przeczyszczających. Z chwilą jednakże stwierdzenia przez lekarza przyczyny, zatem właściwej choroby, którą objawia żółtaczka, do środków leczniczych przyłącza się j a k o lekarstwo

DYETA, która obejmuje pokarmy i napoje lekko strawne, beztłuszczowe.

Pojedyncze porcy powinny być jak najmniejsze, gryzione i żute dostatecznie, powoli.

W pierwszych dniach pojawienia się żółtaczki, zachować należy o ile możliwości dyetę ś c i s ł ą*, ograniczoną do limoniady, zup owocowych, herbatki, kleików jak najmniej złożonych a na wodzie lub mleku przygotowanych. Dopiero w dalszym przebiegu choroby można podawać choremu:

Zupy przygotowane z suchych bułek, białego chleba, kaszki owsianej, ryżu, sago, jagieł, gryssiku, jęczmienia, krupek, kaszy tarczanej, salepu, mąki kukurydzianej; polewki winne, lekkie zupy owcowe, rosoly, bulion, wyciąg mięsny (łyżeczkę wyciągu zagotować z łyżeczką masła w pół litrze wody z dodatkiem nieco soli i korzeni, poczem rozrobić z jajkiem), kleiki owsiane, gryssikowe, mondaminowe, jęczmienne i tapiokę na rosole.

Mąka. Do zup, przypraw i pieczywa używać głównie mąki mondaminowej, ziemniaczanej, Kufkego i Nestla, sago, tapioki,

* Dr M. Nartowski. *Dyeta gorączkowa*. Kraków 1905.

pszennej, razowej, maiscny i kukurydzianej, które odznaczają się znaczną zawartością koniecznego dla organizmu białka, bardzo nieznaczną ilością tłuszczu a obfitą węglowodanów. Z mlekiem, wodą lub wyciągiem mięsnym Liebiga, dają bardzo pożywne zupy.

Mleko, w wypadkach koniecznych dla podniesienia sił, gdy okazuje się niemożliwym zupełne odjęcie choremu tłuszczów, które zwłaszcza w mleku zawarte zdają się być dobrze w kiszkach zużyte. W tych właśnie wypadkach lepiej choremu podawać już mleko niezbiране i kwaśne aniżeli maślankę lub mleko zbierane, podawać go nawet można między poszczególnymi posiłkami w nieznacznych ilościach, co pół godziny bodaj jedną do dwóch łyżek. Równie nie jest szkodliwym świeży ser z mlekiem.

Jarzyny mają w ogóle bardzo małą wartość pożywną. Używane głównie dla dopełnienia sytości lub ułatwienia wydalenia kału, wywołują jedynie u chorych różne ujemne przypadłości. Dlatego najlepiej wyłączyć je zupełnie z pokarmów a w wypadkach koniecznych, purée ziemniaczane, szpinak bez jaja, szparagi, sałata, rzerzucha, pomidory, bez tłustych sosów a jedynie na wodzie z solą zagotowane.

Mięsa nie wiele, najwyżej do 200 gr dziennie i to bez tłuszczu i z zwierząt młodych jak: mięsa siekane, gotowane kurczę, cielęcina, lub cielęce nóżki, gołąbki, piersi z indyka, zając, sarnina, dobrze pokrajana chuda szynka, galaretki z mięsa.

Ryby wyjątkowo za zezwoleniem lekarza i tylko w bardzo małych ilościach, najlepiej dobrze wyflukne sardelki.

Pieczyno nie świeże, suche bułki i biały chleb, sucharki.

Jaj z początku jak najmniej, później na miękko lekko o-mleły.

Leguminy bez tłuszczu, masła, jaj i śmietany.

Owoce suszone lub pieczone a z łupinki obrane, kompoty jako dodatek do potraw mięsnych, galaretki owocowe.

Napoje lekko zakwaszone albo z bardzo lekkim winem, wo-da, woda selterska, szczawnicka (Józefinka), woda ryżana, zbiera-ne mleko i maślanka, słabiutka herbata i kawa, odtłuszczone kakao lub kawa żołądziowa z cukrem mlecznym ale bez śmie-tanki.

Z wód mineralnych, woda selterska a na czczo woda morszyńska (zdrój Bonifacy) lub 1 do 3 łyżeczek soli karls-badzkiej sztucznej, w szklance letniej wody.

Nie wolno jeść tłuszczów jak masła, szmalcu, słoniny, tłustego mięsa zwłaszcza wieprzowiny, żadnych wątróbek, nerek i języka, gęsi, kaczek, baraniny, kielbas, tłustych so-sów i jaj, potraw ziemniaczanych, śmietanki i śmietany, sta-rego sera, mleka niezbiernego, ciężko strawnych potraw mącznych, ciemnego chleba, raków i homarów, prawie wszyst-

kich ryb, owoców, cebuli, migdałów, orzechów, napoi alkoholowych, silnej kawy.

Przy spożywaniu i przygotowywaniu pokarmów, zawsze należy pamiętać, że chorobliwy brak żółci w przewodzie pokarmowym, utrudnia a nawet wprost uniemożliwia trawienie wszelkiego rodzaju tłuszczów, które od 30 do 60% niestrawione odchodzą z kałem. Z chwilą zauważenia, co zdecydować jednak może tylko ścisłe badanie lekarskie, że i trawienie białka zostaje ograniczonym lub prawie zniesionem, należy zastosować kurację mleczną, polegającą na przyjmowaniu do 2 litrów mleka dziennie z dodatkiem cukru mlecznego i tylko kilku sucharków. Gdy choroba utrzymuje się stale, mimo energicznego nawet leczenia a żółtaczka weszła w stan przewlekły, nie należy już dalej stosować ani diety ścisłej ani wyłącznie mlecznej, lecz przejść do lekko strawnych pokarmów mięszanych, by ratować siły chorego i wzmacniać organizm w walce z chorobą.



BIBLIOTHECA
VNIV.  IAGELL.
CRACOVIENSIS.

1. Wykłady neuropatologii i psychiatrii w Berlinie. Przegląd lekarski Nr. 15 i 16. 1897.
 2. Przyczynek do etiologii porażeń mózgowych u dzieci. Przegląd lekarski 1897.
 3. Dwa przypadki Asthma uterinum. Gazeta lekarska 1898.
 4. Ein Beitrag zur Kenntniss der Bernhardtschen Sensibilitätsstörung. Neurolog. Centralblatt-1898.
 5. Ein Fall von Arthronuralgie. Wien. med. Wochenschrift 1899.
 6. Choroba Thomsena. Dilatatio ventriculi cum gastritide acida. Wyleczenie. Pamiętnik jubileuszowy Prof. Dra E. Korczyńskiego 1900.
 7. Gangraena angiosclerotica — na tle kiłowem. Współrzędne zmiany w nerwach. Przypadek kazuistyczny. Z kliniki Prof. Dra E. Korczyńskiego. Przegląd lekarski 1900.
 8. Działanie lecznicze światła elektrycznego w różnych stanach patologicznych a głównie w chorobach układu nerwowego. Przegląd lekarski 1900.
 9. Fizyologiczne i lecznicze działanie promieni światła słonecznego i elektrycznego. Nowiny lekarskie 1900.
 10. Zadura — Melancholia. Kraków 1900.
 11. Promienie Röntgena i ich zastosowanie do celów rozpoznawczych i leczniczych. Kraków 1900.
 12. Wpływ jądów błoniczych na komórki nerwowe, zmiany i regeneracya tychże pod wpływem surowicy przeciwbłoniczej. Gazeta lekarska 1900.
 13. Dr. Nartowski und Dr. Bielschowsky. Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung des Diphteriegiftes auf das Nervensystem. Neurolog. Centralblatt 1900.
 14. Elektrodiagnostyka i Elektroterapia, dla użytku uczniów i lekarzy. Kraków 1901.
 15. Zakłady lecznicze dla umysłowo chorych w oświetleniu najnowszych zdobyczy naukowych. Kraków 1902.
 16. O potrzebie znajomości ważniejszych objawów chorób nerwowych u uczącej się młodzieży. Kraków 1902.
 17. Kąpiele domowe. Kraków 1902.
 18. Światło i jego działanie lecznicze. Kraków 1903.
 19. Nerwowość, jej źródła i następstwa. Kraków 1904.
 20. Stowarzyszenia robotnicze, ich cel, znaczenie i organizacya. Kraków 1905.
 21. Dyeta gorączkowa. Kraków 1905.
 22. Kuracya owocowa i wegeteryańska. Kraków 1905.
 23. Dyeta w moczówce cukrowej. Kraków 1905.
 24. Dyeta przeciwtasiemcowa. Kraków 1905.
 25. Hygiena robotnicza. Kraków 1906.
 26. Dyeta w żółtacze. Kraków 1906.
-