



BIBLIOTHECA
UNIV. JAGELL.
CRACOVENSIS

kat. komp

48213

II



48213

II



SPIS 48213-
II
pluskiew z okolic Przemyśla

(i po części Lwowa).

Podał

B. KOTULA.

Zbierałem przez długie lata owady w okolicy przemyskiej i nad górnym Strwiążem; szczególnie zaś chodziłem za chrząszczami i pluskwiakami. Ponieważ do oznaczenia pluskwiaków nie miałem ani potrzebnej literatury ani też zbyt dużego czasu, przeto prosiłem Dra St. ZARĘCZNEGO o porównanie pluskiew moich ze zbiorem krakowskim; część zbioru oznaczyłem sam za pomocą jedynego dzieła, które posiadam, t. j. podług FIEBERA: „*Die europäischen Hemiptera*“. Następujący opis uporządkowany jest właśnie podług tego dzieła:

- Corisa (Cymatia) coleoptrata* Fab. Koło Starzawy i Poździacza;
Bajki koło Lwowa.
C. Geoffroyi Leach. Koło Starzawy i Poździacza.
C. hieroglyphica Duf. Tamże.
C. Sahlbergi Fieb. Tamże.
C. Linnei Fieb. Tamże.
C. limitata Fieb. Tamże; między innymi także okazy nieco dłuższe, niż zwyczajnie bywają.
C. concinna Fieb. Tamże.
C. nigrolineata Fieb. Wzniesienie.

- Notonecta glauca* L. (= *Fabricii* Fieb. var.). Wszędzie po wodach stojących.
- Plea minutissima* Fab. W wodach stojących, szczególnie wśród wodorostów; stare koryto Sanu pod Hurkiem.
- Nepa cinerea* L. Wszędzie w wodach stojących i płynących, w namule.
- Ranatra linearis* L. Rowy kolejowe obok Bakończyc.
- Naucoris cimicoides* L. Stare koryto Sanu obok Hurka; wody na łąkach obok Starzawy i Poździecza.
- Limnobates stagnorum* L. Stare koryto Sanu obok Hurka.
- Velia currens* Fab. Rzadka w okolicy przemyskiej, tylko nad potoczkami górskimi obok Fredropola.
- Hydrometra rufoscutellata* Latr. Na wodach wielkich łąk na wschód od Przemysła nierzadka, w okolicy podgórskiej tu i owdzie (Prałkowce).
- H. paludum* Fab. Stare koryto Sanu obok Hurka.
- H. thoracica* Schml. Byków, Zasanie.
- H. aspera* Fieb. Wzniesienie.
- H. lacustris* L. Wszędzie pospolita aż po podgórze.
- H. odontogaster* Zett. Byków, Wzniesienie.
- H. argentata* Schml. Prałkowce.
- Phymata crassipes* Fab. Winna Góra, dość licznie.
- Aradus versicolor* HS. Stawny las nad Strwiążem.
- A. cinnamomeus* Pz. Winna Góra, Lipowice; na sosnach.
- A. depressus* Fab. Na podgórzu dość częsty pod korą buków, grabów i szczególnie brzoź.
- A. corticalis* L. Na pniakach dębowych częsty od równin aż po podgórze, zwykle wraz z gatunkiem *annulicornis*.
- A. dilatatus* Duf. Pod korą buków i grabów od podgórza przemyskiego (Łętownia, Prałkowce) aż po Jaworniki obok Bandrowa, Kuszmiń i Kamienna Ławorta okok Ustrzyk dolnych.
- A. annulicornis* Fab. Na pniakach dębowych częsty.
- A. varius* Fab. Na Panińskim Czubie obok Birezy.
- A. Betulae* Lin. wraz z odmianą β) Fieb. (*ellipticus* L. Duf.). Na starych pniach bukowych, grabowych i jodłowych.
- Mesira Tremulae* Bütt. Paniński Czub, Prałkowce, Korytnickie lasy, nie bardzo rzadka w starych spróchniałych pniach jodłowych lub bukowych.
- Aneurus laevis* Fab. Paniński Czub, Stawny las; pod korą bukową lub grabową, rzadki.
- Zosmenus (Pisma) Laportei* Fieb. i
- Z. capitatus* Wlf. obydwaj gatunki a szczególnie pierwszy pospolite pod opadłym liściem lasów liściastych, niekiedy też na kwitnących tarkach.
- Z. Stephensi* Fieb. Rzadko pod liściem opadłym obok Karczmar.

- Z. variabilis* Fieb. Tylko z okolic lwowskich (obok Łyczakowskiej rogatki).
- Agramma (Serenthia) laeta* Fall. W Lipcu bardzo liczna na trawie łąk obok Starzawy i Poździecza.
- Monanthia Cardui* L. Często pod opadłym liściem w zimie i z wiosny, potem na ostach: Buców, Ostrów, Jaxmanice, Prałkowce, Krościenko, Radoszyce obok Łupkowa.
- M. angustata* HS. Pod opadłym liściem w lasach liściastych wśród zimy nierzadka: Buców, Lipowice, Ostrów, Prałkowce.
- M. setulosa* Fieb. var. *capucina*. Na suchych stokach w lecie, pod mchem w zimie: Trzy Krzyże, Wzniesienie, Winna Góra.
- M. ciliata* Fieb. Rzadka pod różnymi roślinami i pod liściem opadłym w Maju. Byków, Karczmary.
- M. pilosa* Fieb. Las prałkowicki, pod liściem opadłym, w Październiku.
- M. costata* Fab. Na łące obok Starzawy w Lipcu.
- M. quadrimaculata* Wolff. Na krzakach w lesie: Korytuiki, Szechynie, Lipowice, w Maju; w zimie pod liściem opadłym.
- M. dumetorum* HS. Jak poprzednia: Buców, Prałkowce.
- M. scapularis* Fieb. Na miejscach piaszczystych, po drobnych roślinach: Winna Góra, Wzniesienie, a także koło Lwowa (Biłohorski las), zwykle w Czerweu, rzadziej w Maju.
- M. Wolfii* Fieb. Na *Cynoglossum officinale* w Kwietniu i Maju: Krzemieniec w Przemyślu i Prałkowce.
- M. Lupuli* Kze. Na podmokłych łąkach: Bakończyce, Buców, Starzawa w Czerweu i Lipcu, w zimie pod liściem opadłym.
- M. versiculifera* Fieb. Na *Cirsium lanceolatum* w Lipcu: Przemyśl, Starzawa i Nakło.
- Dictyonota erythrophthalma* Germ. Wzniesienie, na piaskach, w Październiku.
- Tingis (Galeatus) maculata* HS. i odmiana *subglobosa* HS. Na piaszczystych miejscach pod roślinami w Kwietniu: Wzniesienie. Częściej w okolicy Lwowa wraz z gatunkiem *affinis* HS.
- Orthostira brunnea* Germ. HS. Bardzo pospolita, szczególnie w zimie pod mchem i opadłym liściem od równin aż po Panieński Czub.
- Campylostira verna* Fall. Pod prętami suchymi wierzb na łące Hureckiej w Maju.
- Zygonotus stigma* Fieb. Brzeg lipowickiego lasu; jak się zdaje, rzadki.
- Acanthia lectularia* Lin.
- Anthocoris nemoralis* Fab. Winna Góra na krzakach, w Maju.
- A. limbatus* Fieb. Prałkowce w Kwietniu.
- A. nemorum* L. Na krzakach i drzewach od Kwietnia aż po Czerwiec bardzo pospolity, w zimie w mchu; od równin aż po góry (Oratyk obok Krościenka).

- Lycocoris campestris* Fab. Koło Przemysła.
- Piezostethus rufipennis* Duf. (*cursitans* Fall.)? Pod korami rozmaitych drzew, jak dębów, sosen i t. d.: Szechynie, Ostrów, Prałkowce, w Maju.
- Triphleps niger* Wff. W mchu miejsc suchych, rzadki w Kwietniu: Wzniesienie.
- T. minutus* L. Na krzakach przez całe lato: Buców, Ostrów, Lipowice, Prałkowce.
- Salda saltatoria* L. W lecie wszędzie nad wodami, w zimie pospolita pod mchem i liściem opadłym w lasach.
- S. Calbum* Fieb. W zimie w lasach pod liściem opadłym: Ostrów, Lipowice.
- S. geminata* Costa. W Lipcu na łące obok Starzawy i Nakła.
- Pygolampis bifurcata* L. Jeden okaz pod zgniłą korą pniaka dębowego na Budach, drugi pod suchą trawą grobli kolejowej obok Hureczka, obydwu w Kwietniu.
- Harpactor iracundus* Scop. Na krzakach w Czerwcu i Lipcu: Lipowice, Winna Góra.
- H. annulatus* L. Kilka młodych okazów w sośninie obok Łętowni w Kwietniu i znowu w Październiku; dorosłe okazy w Czerwcu w lasach obok Lwowa.
- Reduvius personatus* L. Po domach w Czerwcu.
- Nabis brevipennis* Hahn. Mościska w Sierpniu przez Nuckowskiego.
- N. lativentris* Boh. Od Maja aż po Październik po krzakach i drzewach, w zimie zaś pod opadłym liściem, pospolity.
- N. rugosus* L. Jak poprzedzający, pospolity, zwykle na drobnych roślinach.
- N. ferus* L. Jak poprzedzające, ale nader pospolity, szczególnie na suchych stokach, łąkach i t. d.
- Pyrrhocoris apterus* L. Koło samego Przemysła rzadki, n. p. na Zamku, pospolitszy koło Szechyń, Bucowa i t. d., zwłaszcza u stóp lip.
- Lygaeus equestris* Lin. Koło Przemysła rzadki.
- Nysius Jacobaeae* Schill. i
- N. Thymi* Wolff. koło Lwowa, szczególnie na suchych stokach; zdaje mi się, że widziałem obydwu gatunki także w okolicy Przemysła.
- Plociomerus luridus* Hahn. Łąki koło Starzawy i Nakła w Kwietniu.
- P. fracticollis* Schill. W mchu, koło Bucowa.
- Ophthalmicus (Geocoris) grylloides* Lin. Na piaszczystych miejscach, n. p. na Wzniesieniu, w jesieni.
- O. ater* Fabr. Tamże, w Kwietniu.
- Drymus silvaticus* Fab. W mchu lasów i stoków suchych pospolity.
- D. notatus* Fieb. (*brunneus* Sahlb.). Tamże, rzadki (Lipowice w Listopadzie).

- Ischnocoris pallidipennis* HS. (*hemipterus* Sahl). W mchu suchych stoków, nierzadki w Marcu i Kwietniu. (Trzy Krzyże, Wzniesienie, Zasanie).
- Megalonotus (Rhyparochromus) antennatus* Schill. W Maju na łąkach (Hurko), w Październiku pod liściem opadłym w lasach (Łętownia, Prałkowce).
- M. hirsutus* Fieb. Pod kamieniami na suchych stokach, w Kwietniu: Winna Góra.
- M. chiragra* Fab. Pospolity na suchych stokach, w zimie zaś w mchu i pod opadłym liściem w lasach.
- Peritrechus nubilis* Fall. Grobla kolejowa pod Hurkiem, na ziemi w Kwietniu.
- P. luniger* Schill. W zimie w lasach, z wiosny na suchych stokach, pod kamieniami i mchami (Ostrów, Prałkowce, Winna Góra, Karczmory).
- Tropistethus ochropterus* Fieb. (*holosericeus* Scholz). Suche stoki, w mchu, szczególnie pod polną różą, w Kwietniu.
- Pionosomus varius* Wlff. Koło Przemysła, w mchu i pod wrzosem w Maju.
- Lasiosomus enervis* HS. Panieński Czub pod Birczą, w Maju.
- Stygnus arenarius* Hln. Pod liściem opadłym w Listopadzie (Lipowice).
- St. rusticus* Fall. Winna Góra.
- St. sabulosus* Schill. Prałkowce i Buców.
- Homalodema (Gastrodes) abietis* L. Wzniesienie pod Lwowem w Kwietniu.
- Ermocoris erraticus* Fabr. Na murach we Lwowie, w Maju.
- E. plebejus* Fall. W lasach, zwłaszcza cetyniastych, pod liściem. Las Stebnik, Łętownia, Kruhel; w Czerwcu i Październiku.
- Scolopostethus contractus* HS. Koło Przemysła, rzadki.
- S. affinis* Schill. W lecie na krzakach, w zimie w mchu i pod liściem opadłym, częsty; Winna Góra, Lipowice, Prałkowce.
- S. pictus* Schill. Koło Lwowa (cementarz na Stryjskiem, Zubrzyce); w Maju i Czerwcu.
- Trapezonotus nebulosus* Fall. Piaski koło Łyczakowskiej rogatki koło Lwowa, w Maju.
- T. nigripes* Fieb. (*anorus* Flor.). Suche stoki, w Kwietniu i Maju; (Wzniesienie, Szechynie).
- T. agrestis* Fall. Jak poprzedzający, ale pospolity (Wzniesienie, Trzy Krzyże, Zamek, Zasanie, Winna Góra, Szechynie, Hurczko, Prałkowce).
- Ischnotarsus (Beosus) luscus* Fab. W Kwietniu i Maju pod różnymi roślinami i opadłym liściem. Winna Góra, Mościska, Ostrów, Byków.
- Microtoma carbonaria* Rossi. Koło Lwowa w Kwietniu i Maju na piaskach nierzadka (Łyczaków, Hołosko).

- Rhyarochromus (Pachymerus) lynceus* Fab. Od zimy począwszy aż po Lipiec pod liściem i w mchu i na ziemi częsty; Mościska, Karczmory, Hureczko, Lipowice, Prałkowce.
- R. Pini* L. Jak poprzedzający, nieco częstszy: Krościenko nad Strwiążem, Ostrów, Prałkowce, Lipowice, Żasanie, Hureczko, Karczmory, Mościska.
- R. vulgaris* Schill. Koło Przemyśla rzadki: także między Łętownią a Karczmarową, w Kwietniu.
- R. pedestris* Pz. Las Jaksmanicki.
- Ischnorhynchus (Kleidocerus) didymus* Zett. Niekiedy pospolity w mchu w późnej jesieni (Buców, Lipowice).
- Phygadicus (Heterogaster) Artemisiae* Schill. Suche stoki, szczególnie pod *Artemisia campestris*, w Kwietniu aż po Czerwiec: Zamek, Winna Góra, Wzniesienie i t. d.
- P. Urticae* Fabr. Winniki pode Lwowem w Kwietniu.
- Cymus glandicolor* Hahn. Na krzakach w Maju: Winna Góra.
- C. clavicolus* Fall. W zimie i z wiosny na ziemi i pod opadłym liściem; pospolity. (Winna Góra, Wzniesienie, Buców, Jaxmanice, Lipowice, Szechynie, Prałkowce).
- Oxycaremus modestus* Fall. Pod liściem opadłym w jesieni; Lipowice.
- Macroplax (Oxycaremus) Preysleri* Fieb. Trzy Krzyże, w mchu, pod różą polną w Kwietniu.
- Neides tipularius* L. Wzniesienie, pod koniec Października, i Lipowice, w Kwietniu, pod liściem suchem.
- Berytus montivagus* Bremi. Na ziemi w Kwietniu: Wzniesienie, Łuczyce.
- B. clavipes* Fab. Najpospolitszy gatunek tego rodzaju, szczególnie na suchych stokach i z brzegu lasów.
- B. crassipes* HS. Prałkowce, w Maju.
- B. minor* HS. Prałkowce, Lipowice, Hureczko.
- Spathocera laticornis* Schill. Hołosko pode Lwowem, w Maju.
- Arenocoris spinipes* Fall. Na krzakach w lesie ostrowskim, w Maju.
- Bathysolen nubilus* Fall. W Kwietniu i w Listopadzie dość częsty w mchu koło róż polnych: Winna Góra, Żasanie, Wzniesienie, Hureczko, Trzy Krzyże.
- Pseudophloeus Falleni* Schill. Na piaskach Kortumowej Góry pode Lwowem, w Kwietniu.
- Coreus scabricornis* Pz. Kulparków pode Lwowem, w Czerwcu.
- Stenocephalus agilis* Scop. W lasach, w Kwietniu, Maju i Czerwcu: Ostrów, Karczmarowa.
- Alydus calcaratus* L. Od Maja aż po jesień, na suchych stokach ponad Zamkiem.
- Syromastes marginatus* L. Częsty z wiosny na różnych drobnych roślinach, w lecie przeważnie młode.
- Verlusia rhombea* L. Koło Przemyśla rzadka.

- Gonocerus Juniperi* Dahl. Łętownia.
- Enoplops Scapha* Fab. W Kwietniu pod opadłym liściem suchych stoków: Łuczyce, Hureczko, Winna Góra.
- Therapha Hyoscyami* Lin. Chyrów w Czerwcu.
- Rhopalus crassicornis* Lin. Pod liściem rośliny *Achillea Millefolium* w Kwietniu, później w Czerwcu na kwitnącej roślinie: Łuczyce, Hureczko.
- Corisus parumpunctatus* Schill. Suche stoki, w zimie pod liściem opadłym i w mchu: Winna Góra, Lipowice.
- C. capitatus* Fab. Koło Lwowa w Czerwcu i Lipcu: Zubrzyce, Żupan.
- Brachycarenum tigrinus* Schill. Koło Mościsk w Sierpniu (od Nucowskiego).
- Miris laevigatus* Lin. W zimie pod liściem, w lecie na krzakach i na kwiatach, częsty, niekiedy jako odmiana *grisescens* Fall. (Mościska).
- Brachytropis calcaratus* Fall. W Maju i Czerwcu na kwiatach: Winna Góra, Mościska.
- Notostira erratica* Lin. W Czerwcu i Lipcu na kwiatach łąk i suchych stoków: Mościska, Starzawa-Nakło, Zamek.
- Megaloceraca longicornis* Fall. W Czerwcu na kwieciu: Zamek.
- Trigonotylus ruficornis* Fall. Przemyśl (Zamek).
- Leptopterna dolabrata* Lin. W Czerwcu i Lipcu na suchych kwiecistych stokach i na łąkach, częsta: Lipowice, Prałkowce, Hurko, Kruhel, Zamek.
- L. ferrugata* Fab. Las lipowicki.
- Oncognathus binotatus* Fab. Bakończyce.
- Camptobrochis punctulata* Fall. Lipowice, na drzewach, w Lipcu.
- Homodenus ferrugatus* Fab. (*Calocoris roseomaculatus* Deg.). Trzy Krzyże i las lipowicki, w Lipcu i Sierpniu.
- Calocoris striatellus* Fab. Las ostrowski i las lipowicki, w Czerwcu.
- C. sexguttatus* Fab. W krainie górskiej na kwiatach, w Lipcu.
- C. fulvomaculatus* Deg. Lipowice, w Czerwcu.
- C. affinis* HS. Mościska, w Sierpniu.
- C. bipunctatus* Fab. i odmiana β . Fieb. Mościska.
- C. Chenopodii* Fall. Zamek, Zasanie, Winna Góra i t. d. Ogrody przemyskie.
- C. quadripunctatus* Fab. Zamek i Trzy Krzyże.
- C. vandalicus* Rossi. Tamże.
- C. Reichelii* Fieb. Ogrody przemyskie i Prałkowce, w Lipcu.
- C. seticornis* Fab. Łąki pod Starzawą i Nakłem, w Lipcu.
- Phytocoris divergens* Mey. (*Ulmi* L.). Kruhel Wielki i Mały, Ostrów.
- Closterotomus bifasciatus* Fab. Lipowice.
- Rhopalotomus ater* L. i *var. tyrannus*, Lipowice i Winna Góra, w Czerwcu.

- Capsus capillaris* Fab. W Lipcu i Sierpniu na kwiatach. Mościska, Kruhel Wielki.
- Liocoris tripustulatus* Fab. Częsty: Wzniesienie, Winna Góra i t. d.
- Lygus pratensis* Fab. W zimie w mchu i pod liściem opadłym, w lecie na krzakach, częsty.
- L. campestris* Fab. Jak poprzedni, ale bardzo pospolity.
- Poeciloscytus unifasciatus* Fab. W Czerwcu i Lipcu na kwiatach częsty.
- Siphrosoma leucocephalum* L. Las ostrowski.
- Halticus apterus* Lin. Na łąkach, w Lipcu częsty: Przemyśl, Bakończyce, Winna Góra; między Starzawą a Nakłem i t. d.
- H. luteicollis* Pz. Zamek i ogródki na Władyczu, w Lipcu.
- Cyllocoris histrionicus* L. Na drzewach w Czerwcu: Lipowice, Ostrów.
- Globiceps spheniformis* Rossi. Kruhel Wielki i Mały, Ostrów.
- G. fulvipes* Scop. (*flavomaculatus* Fab. Fieb.) Na łąkach i na drzewach w Lipcu; Starzawa.
- G. flavomaculatus* Fab. (*selectus* Fieb.). Winna Góra.
- Heterocordylus tumidicornis* HS. W Czerwcu i Lipcu na krzakach: Lipowice.
- H. unicolor* Hahn. Na łąkach i kwiecistych stokach w Czerwcu i Lipcu: Zamek, Starzawa-Nakło.
- Orthocephalus vittipennis* HS. Winna Góra.
- O. saltator* Hahn. Winna Góra, Wzniesienie.
- O. brevis* Pz. (*Panzeri* Fieb.). Prałkowce, las ostrowski; Hołosko koło Lwowa.
- Malthacus caricis* Fall. Fieb. (*Byrsoptera rufifrons* Fall.). Koło Lwowa w Czerwcu (Biłohorski las). Koło Przemyśla w lesie ostrowskim, rzadki.
- Camaronotus (Pilophorus) cinnamopterus* Kb. Kruhel Wielki.
- Phylus Coryli* L. Kruhel, Lipowice.
- Systellonotus triguttatus* L. Winna Góra, Łuczyce.
- Sastragala ferrugata* Fab. Krościenko nad Strwiążem.
- Acanthosoma haemorrhoidale* Lin. W lasach, rzadka; Mościska, Ostrów.
- Cyphostethus tristriatus* Fab. (*lituratus* Fab. Fieb.). Koło Przemyśla bardzo rzadki.
- Elasmostethus dentatus* Deg. Mościska.
- E. interstinctus* Lin. (*griseus* F. Fieb.). Wzniesienie, na brzozach, w Czerwcu.
- Tropicoris rufipes* L. W lecie na drzewach, szczególnie dębach częsty, w późnej jesieni na murach.
- Eusarcoris melanocephalus* Fab. Karczmarowa na *Stachys silvatica*, licznie.
- E. perlatus* Fab. W zimie w mchu, w lecie na łąkach pospolity.
- Mormidea (Carpocoris) baccarum* Lin. Bardzo pospolita na krzakach i na suchych stokach, w zimie w mchu.

- M. n. ricornis* Fabr. Małoco rzadsza od poprzedniej.
- Pentatoma pinicola* Muls. Winna Góra na sosnach, w Czerwcu.
- P. juniperina* L. Na Karczmarowej i pod Łętownią, w mchu lasów, w Kwietniu i w Październiku.
- Cimex (Peribalus) vernalis* Wlff. Na drzewach i krzakach w Maju i Czerwcu: Ostrów, Prałkowce, Winna Góra, Łuczyce.
- C. (Palomena) dissimilis* Fab. Pospolity na drzewach i krzakach, niekiedy całkiem czerwony; od Maja po Lipiec; w zimie pod liściem opadłym.
- C. prasinus* L. (*Palomena viridissima* Poda). Rzadszy: Winna Góra w Czerwcu; las jaxmanicki, w Październiku pod liściem 1 okaz czerwony.
- Strachia decorata* HS. Herburt pod Dobromilem, w Maju.
- S. festiva* L. Karczmarowa w Kwietniu, Paniński Czub i Ostrykowiec nad Strwiążem w Maju.
- S. oleracea* L. Bardzo pospolita, w lecie na ziołach, w zimie w mchu i pod liściem opadłym. Od nizin aż po góry (Ostrykowiec).
- Zicrona coerulea* L. W pojedynczych okazach aż po góry; Szechynie, Stawny las nad Strwiążem, w Maju.
- Falla dumosa* L. W Kwietniu pod mchem suchych stoków: Trzy Krzyże.
- Arma custos* Fab. Na drzewach w Maju: Szechynie.
- Platynopus sanguinipes* Fab. Winniki pode Lwowem, w Czerwcu.
- Podops inuncta* Fab. Na suchych stokach, w Kwietniu: Hureczko.
- Aelia acuminata* L. Suche stoki, w Czerwcu: Winna Góra.
- A. pallida* Küst. Suche stoki, w Kwietniu jeszcze w mchu: Zamek.
- A. rostrata* Boh. Łyczaków obok Lwowa, w Kwietniu.
- Sciocoris basalis* Fieb. Bakończyce, na grobli w Czerwcu. Oznaczenie wątpliwe.
- S. umbrinus* Wlff. Suche stoki i lasy, pod mchem: Winna Góra w Kwietniu, Paniński Czub w Maju.
- S. terreus* Schrk. Bardzo pospolity na suchych stokach, od zimy aż po Czerwiec.
- Brachypelta aterrima* Forst. Suche stoki, w Czerwcu: Zamek.
- Cydnus nigrita* Fab. Koło Przemyśla bardzo rzadki.
- Corimelaena scarabaeoides* L. Bardzo pospolita w mchu i pod drobnymi roślinami, szczególnie na suchych stokach; w zimie i z wiosny aż po Czerwiec.
- Gnathoconus costalis* Fieb. Suche stoki, od Kwietnia aż po Sierpień: Mościska, Wzniesienie.
- Schirus luctuosus* M. et R. (= *morio* Fieb.). W zimie i z wiosny aż po Maj na suchych stokach od równin aż po góry (Paniński Czub) pospolity.
- S. morio* L. Dall. (= *affinis* Fieb.). Łąka pod Hurkiem w Maju.

- S. dubius* Scop. Suche stoki, szczególnie piaszczyste miejsca, od zimy aż po Czerwiec, częsty.
- S. bicolor* Lin. Bardzo pospolity od zimy aż po Czerwiec.
- S. sexmaculatus* Ramb. Lipowice, na krzakach w Czerweu.
- Eurygaster hottentotus* Fab. Suche stoki, przez cały rok częsty; w odmianach *communis* Fieb., *signatus* Fieb. i *niger* Fieb. (Hołosko pode Lwowem).
- E. maurus* Fab. Bardzo pospolity aż po góry (Chyrów) przez cały rok, zwłaszcza w odmianie *communis* Fieb.; rzadziej w odmianie *pictus* Fab.
- Graphosoma lineatum* L. Prałkowce, na baldaszkowych w Czerweu i Lipeu.
- Odontoscelis fuliginosa* Lin. var. *plagiata* Fieb. Na piaszczystym pagórku wśród lasu obok Lackiej Woli, w Maju aż po Lipiec liczna; odmiana *litura* Fabr. koło Lwowa (Łyczaków, Hołosko, Czartowska Skała), częsta.
- Coptosoma globus* Fab. Łuczyce i Winna Góra.





BOOKKEEPER