



Z oddziału chorób wewnętrznych Szpitala św. Łazarza  
pod kierunkiem Prof. Pareńskiego.

### Wartość lecznicza peroniny.

Podał

Dr. Z y g m u n t N o w a k.

I-szy sekundaryusz Oddziału.

46849-  
II

W ostatnich latach pojawiają się tak często nowe środki lecznicze, że czytając jakąś pracę, zawierającą hymny pochwalne na cześć nowego leku, z wielką niechęcią i nieufnością zabieramy się do jego stósowania, obawiając się z góry, że nowa ta gwiazda nie spełni naszych oczekiwań i szybko zniknie z arsenału lekarskiego. Skutkiem licznych zawodów i wynikłego stąd pesymistycznego zapatrywania się na nowe środki lecznicze, zdarzyć się może i zdarza się niewątpliwie, iż nie jeden lek, posiadający rzeczywistą wartość, zostaje nieuwzględnionym i pominiętym.

W ostatnich miesiącach oddała fabryka Mercka do użytku lekarskiego nowy środek przeciw kaszlowi: peroninę.

Peronina jesto chlorowoderek eteru benzylo - morfino-wego, w którym wodór w grupie hydroksylowej morfiny ( $C_{17}H_{18}NO_2(OH)$ ) zastąpiony jest przez rodzeń alkoholowy ( $C_6H_5CH_2$ ). Jest to proszek pulchny, biały, rozpuszczający się łatwo w wodzie, oraz w niebardzo zgęszczonym wysoku

i to łatwiej w cieple, a nierozpuszczalny w chloroformie i w eterze. Smak ma gorzki.

Schroeder w *Therap. Monatsh.* N. 1. 1897 r. stawia ją, pod względem działania między morfiną a kodeiną. Zachęcony przez prof. Pareńskiego do przeprowadzenia doświadczeń z tym nowym środkiem leczniczym, podawałem go chorym na gruźlicę płuc, niezbyt oskrzeli i t. d.

Dla ścisłości obserwacyi, by mieć miarę co do nasilenia i częstości kaszlu, usuwano choremu na trzy dni przed rozpoczęciem doświadczeń wszelkie leki kojące kaszel, następnie podawano dla porównywania działania przez pięć dni wyciąg z konopi indyjskich à 0·02 po trzy proszki dziennie, przez następne pięć dni fosforan kodeinowy (0·30: 20,0 wody wawrzyno-wiszniowej po 15 kropel trzy razy dziennie), a na koniec peroninę w pigułkach à 0·01 po 3 do 6 pigułek dziennie, lub w płynie 0·10: 100·0 wody przekroplonej, po 3 do 6 łyżek dziennie.

W ten sposób spostrzegano działanie peroniny u 18 chorych; z tych było dziesięć przypadków gruźlicy płuc w okresie nacieku i w okresie tworzenia się jam; cztery przypadki przewlekłego niezytu oskrzeli, obok rozedmy płuc, trzy przypadki ostrego niezytu oskrzeli i jeden przypadek zapalenia oskrzelików (*Bronchitis capillaris*).

Historyj chorób, jako nie mających tym razem najmniejszego znaczenia, przytaczać nie będę.

Ostateczny wynik doświadczeń jest następujący:

Prawie we wszystkich badanych przypadkach, bez względu na rodzaj cierpienia, po zażyciu peroniny kaszel stawał się mniej częstym i mniej nasilonym, a przez to sen bywał lepszy; natomiast kaszel stawał się suchy, a odkrztuszanie nieco utrudnione. Przypadów ubocznych, jak bólu głowy, uczucia znużenia, senności, co się tak często zdarza przy używaniu morfiny, nigdy nie zauważono; natomiast często chorzy skarżyli się na pewien rodzaj palenia w okolicy tchawicy i na obfitsze niż poprzednio poty. W jednym tylko przypadku (*phthisis fibrosa*) peronina okazała się zupełnie

bezszyteczną; tu jednakowoż wszelkie inne leki, nawet morfina, pozostały również bezszyteczne. Spostrzeżenia Schrodery, że peronina ma niekiedy wywoływać zatwardzenie, nie mogliśmy stwierdzić.

Można peroninę podawać w różnych postaciach. Oto wzory używanych recept:

- Rp. *Peronini* 0·10.  
*Aqu. destill.* 100·0.  
S. 3—6 łyżek dziennie.
- Rp. *Peronini* 0·30.  
*Alcoholis* 5·00  
*Aq. destill.* 50·00  
*Syrupi simpl.* 100·00  
M. D. S. 3 r. dziennie po łyżeczce od kawy.
- Rp. *Peronini* 0·01—0·03  
*Sacchari albi* 0·30  
*m. f. pulv. Dntr. tal.* N. XV.  
S. 3—6 proszków dziennie.
- Rp. *Peronini* 0·50  
*Extr. et pulv. gentian.*  
*aa q. s.*  
*m. f. pillul.* Nr. 50.  
*Consp. pulv. s. lycopod.*  
S. 3—6 pig. dziennie.

Najlepiej jest podawać w płynie lub pigułkach.

Dawka 0·01 jest często za mała; wobec jednak braku wszelkich działań ubocznych, można, potęgując dawkę, dojść do 0·05 *pro dosi*, a 0·15 *pro die*. Większych dawek nie używaliśmy, mimo, że można podawać po 0·2 na dzień.

Cenną zaletą peroniny jest to, że można ją podawać w różnych postaciach przez czas dłuższy i naprzemian z innymi lekami; w ten sposób lekarz bronić się może długo przed podawaniem innych leków silniejszych, a gorszych,



jak n. p. morfiny, a tem samem chroni chorego od zgubnego, a niestety tak częstego obecnie morfinizmu.

Nie przeceniając wartości peroniny, śmiało polecić ją można, jako lek kojący kaszel; wygórowana jednak jej tańsza cena (gram bowiem kosztuje 70 ct. do 1 złr.), utrudnia wielce jej prędkie rozpowszechnienie się.



Osobne odbicie z „Przeglądu Lekarskiego“ 1897. Nr. 18.