

97885P

Spostrzeżenia fitofenologiczne w okolicy Krakowa w r. 1877

przez JP. IGNACEGO BOEHMA c. k. Komisarza Policji.

Miejscem spostrzeżeń było i w tym roku Podgórze w Galicyi zachodniej, na prawym brzegu Wisły, naprzeciw Krakowa. Co do wyboru roślin trzymano się zasad podanych przy spostrzeżeniach z lat poprzednich (zob. T. VII str. [167]).

W spisie następującym gloska *l.* oznacza listnienie, *k.* kwitnienie, *d.* dojrzewanie nasienia, *o.* opadanie liści, *kk.* powtórne kwitnienie. Przy nazwiskach roślin domyślną jest gloska *L.*

Abies excelsa LAM. k. 5—10 V; *Acer platanoides* l. 5—10 V, k. 15—20 IV, d. 5—10 IX; o. 5—10 X; *Acer pseudo platanus* l. 15—20 IV, k. 5—10 V, d. 5—10 X, o. 5—10 X; *Achillea millefolium* k. 20—25 V, d. 15—20 VI; *Adonis aestivalis* k. 10—15 V, d. 20—25 VI; *Aesculus Hippocast.* k. 10—15 IV, k. 5—10 V, d. 10—15 X, o. 1—5 X; *Aethusa Cynapium* k. 15—20 V, d. 15—20 VII, kk. 10—15 X; *Agrimonia Eupatoria* k. 5—10 VI; *Aira caespitosa* k. 25—30 VI; *Ajuga genevensis* k. 25—30 VI, d. 1—5 VII; *Alisma Plantago* 1—5 VI, 20—25 VII; *Althaea officinalis* ANDRZ. k. 20—25 IV, d. 25—30 V; *Allium fallax* DON. k. 5—10 VI, 25—30 IV; *Alnus glutinosa* GAERTN l. 5—10 IV, k. 25—30 III, d. 25—30 IX, o. 10—15 X; *A. incana* WILLD., l. 5—10 IV, k. 1—5 IV, d. 1—5 X, o. 10—15 X; *Alopecurus pratensis* k. 10—15 V, 15—20 VI; *Alsine media* k. 5—10 III i aż do listop. *Amaranthus retroflexus* k. 15—20 VI, d. 1—5 VIII; *Anagallis arvensis* k. 10—15 V, d. 10—15 VI, kk. 5—10 IX; *Anemone nemorosa* k. 10—15 IV, d. 10—15 V; *A. patens* k. 20—25 IV, d. 15—20 V; *Anemone pratensis* k. 20—25 IV, d. 15—20 V; *A. ranunculoides* k. 15—20 IV; *Anthemis arvensis* k. 25—30 V, d. 15—20 VII; *A. cotula* k. 1—5 VI, d. 20—25 VII; *Anthoxanthum odoratum* k. 5—10 V, d. 15—20 VI; *Anthyllis vulneraria* k. 20—25 V, d. 5—10 VIII; *Arabis hirsuta* Scop. k. 1—5 V, d. 1—5 VI; *Artemisia Absinthium* k. 10—15 VII, d. 5—10 IX; *A. campestris* k. 10—15 VII, d. 1—5 IX; *Arundo Phragmites* k. 10—15 VII; *Asarum europaeum* k. 1—5 V; *Asparagus officinalis* k. 10—15 V, d. 10—15 VIII; *Asperula cynanchica* 25—30 V; *Astragalus glycyphyllos* k. 10—15 VI, d. 5—10 VIII; *Astrantia major* k. 25—30 V, d. 10—15 VII; *Atriplex nitens* REBENT. k. 25—30 VI, d. 25—30 VII; *A. ruderalis* WALLR. 25—30 VI, d. 25—30 VII; *Avena fatua* k. 1—5 VI, d. 10—15 VII; *A. pratensis* k. 5—10 VI, d. 1—5 VIII; *A. sativa* k. 1—5 VI, d. 10—15 VII.

Ballota nigra k. 1—5 VII, d. 1—5 VIII; *Bellis perennis* k. 20—25 III; *Berberis vulgaris* l. 10—15 IV, k. 10—15 V, d. 5—10 IX, o. 20—25 X; *Betula alba* l. 5—10 IV, k. 10—15 IV, d. 20—25 IX, o. *Bidens cernua* k. 20—25 VI, d. 15—20 VIII

Handwritten note: 1464 to

B. tripartita k. 15—20 VI, d. 15—20 VIII; *Briza media* k. 10—15 VI.

Callitriche autumnalis k. 1—5 VII; *Calluna vulgaris* SALISB. k. 25—30 VI; *Caltha palustris* k. 5—10 VI, d. 1—5 VI, kk. 25—30 IX; *Camelina sativa* CRANTZ. k. 10—15 V, d. 15—20 VI; *Campanula persicifolia* k. 15—20 V, d. 25—30 VII; *C. Trachelium* k. 25—30 VI, d. 5—10 VIII; *Cannabis sativa* k. 25—30 VI, d. 15—20 VIII; *Capsella Bursa pastoris* VENT. k. 1—5 IV, d. 10—15 V; *Caragana arborescens* l. 20—25 IV, k. 10—15 V, d. 15—20 VII, o. 15—20 X; *Cardamine amara* k. 15—20 V, 15—20 VI; *C. pratensis* k. 25—30 VI, d. 1—5 VI; *Carduus acanthoides* k. 1—5 VII, d. 5—10 IX; *Carum Carvi* k. 5—10 V, d. 5—10 VI; *Centaurea Cyanus* k. 25—30 V, d. 1—5 VIII; *C. Jacea* k. 5—10, VI, d. 10—15 VIII; *C. paniculata* k. 1—5 VII, d. 10—28 VIII; *C. scabiosa* k. 5—10 VII, d. 20—25 VIII; *Cerastium arvense* k. 10—15 IV, d. 15—20 V; *C. semidecandrum* k. 25—30 III, d. 5—10 V; *Cerithe minor* k. 15—20 V, d. 25—30 VI; *Chelidonium majus* k. 20—25 IV, d. 20—25 V; *Chenopodium olidum* CURT. k. 1—5 VII, d. 5—10 VIII; *Ch. polyspermum* k. 1—5 VII, d. 5—10 VIII; *Ch. viride* k. 25—30 VI, d. 1—5 VIII; *Chrysanthemum Leucanthemum* k. 5—10 VI, d. 10—15 VIII; *Cichorium Intybus* k. 25—30 VI, d. 1—5 IX; *Cnicus arvensis* WILLD. k. 20—25 VI, d. 20—25 VIII; *C. canus* ALL. k. 25—30 VI, d. 5—10 IX; *C. lanceolatus* SCOP. k. 5—10 VII, d. 10—15 IX; *C. oleraceus* SCOP. k. 10—15 VI, d. 20—25 VIII; *Cochlearia Armoracia* k. 20—25 V; *C. Draba* k. 25—30 IV, d. 1—5 VI, kk. 5—10 VI; *Colutea arborescens* l. 5—10 IV, k. 10—15 V, d. 15—20 VII, o. 20—25 X; *Conium maculatum* k. 20—25 VI, d. 1—5 VIII; *Convallaria majalis* 1—5 V, d. 1—5 VIII; *C. Polygonatum* k. 10—15 V, k. 1—5 VIII; *Convolvulus arvensis* k. 5—10 VI, d. 20—25 VII; *C. sepium* k. 15—20 VI, d. 1—5 VIII; *Cornus alba* k. 10—15 V, d. 20—25 VIII, o. 20—25 X; *C. mascula* l. 15—20 IV, k. 20—25 III, d. 15—20 VIII, o. 15—20 X; *C. sanguinea* l. 20—25 IV, k. 10—15 V, d. 20—25 VIII, o. 20—25 X; *Coronilla varia* k. 25—30 V, d. 15—20 VII; *Corydalis bulbosa* PERS. k. 10—15 IV, d. 10—15 V; *C. fabacea* PERS. k. 10—15 IV, d. 10—15 V; *Corylus avellana* l. 1—5 IV, k. 15—20 III, d. 25—30 VIII, o. 20—25 X; *Crataegus Oxycantha* l. 5—10 IV, k. 10—15 V, d. 25—30 VIII, o. 20—25 X; *Cucubalus baccifer* k. 25—30 VI, d. 5—10 VIII, o. 5—10 VIII; *Cynanchum Vincetoxicum* PERS. k. 5—10 VI, d. 15—20 VII; *Cynoglossum officinale* k. 15—20 V, d. 1—5 VII; *Cytisus biflorus* L'HERIT. k. 1—5 V, d. 5—10 VII; *C. Laburnum* l. 5—10 IV, k. 10—15 V, d. 15—20 VIII, o. 20—25 X; *C. nigricans* k. 25—30 V, d. 1—5 VIII.

Dactylis glomerata k. 1—5 VI, d. 10—15 VII; *Daphne Mezereum* l. 5—10 IV, k. 10—15 III, d. 10—15 VII; *Datura Stramonium* k. 25—30 VI, d. 10—15 VIII; *Daucus Carotta* k. 25—30 VI, d. 10—15 VIII; *Delphinium Consolida* k. 10—15 V, d.

1—5 VII; *Dianthus Carthusianorum* k. 5—10 VI, d. 25—30 VII; *D. deltooides* k. 5—10 VI, d. 1—5 VIII; *Dipsacus sylvestris* k. 10—15 VII, d. 20—25 VIII; *Drosera rotundifolia* 1—5 VII.

Echinochloa Crus Galli P. B. k. 20—25 V, d. 25—30 VI; *Echinosperrum Lappula* Sw. k. 25—30 V, d. 25—30 VII; *Echium vulgare* k. 25—30 V, d. 5—10 VII; *Epilobium Dodonaei* VILL. k. 15—20 V, d. 15—20 VI; *E. hirsutum* k. 20—25 V, d. 15—20 VI; *Erigeron acris* k. 25—30 VI, d. 1—5 VIII; *Erodium cicutarium* l'HERIT k. 5—10 IV, d. 10—15 V; *Errum hirsutum* k. 10—15 VI, d. 15—20 VII; *Erysimum Barbarea* k. 20—25 IV, d. 1—5 VI; *E. officinale* k. 5—10 V, d. 10—15 VI; *Erythrea Centaurium* k. 25—30 VI; *Euphorbia Cyparissias* k. 1—5 V, d. 15—20 VII; *E. Esula* k. 10—15 V, d. 25—30 VI; *Euphrasia officinalis* k. 5—10 VII, 10—15 VIII; *Evonymus europaeus* l. 10—15 IV, k. 5—10 V, d. 5—10 IX, o. 10—15 X; *E. verrucosus* JACQ. l. 10—15 IV, k. 5—10 V, d. 1—5 IX, o. 10—15 X.

Falcaria Rivini HOST. k. 5—10 VII; *Ficaria ranunculoides* k. 15—20 IV, kk. 1—5 X; *Fragaria vesca* k. 25—30 IV, d. 25—30 V, kk. 15—20 IX; *Fumaria officinalis* k. 25—30 IV, d. 25—30 V.

Gagea lutea KERR. k. 5—10 IV; *Galeobdolon luteum* SUM. k. 5—10 V, d. 1—5 VII; *Galeopsis Ladanum* k. 5—10 VI, d. 15—20 VII; *G. Tetrahit* k. 1—5 VI, d. 10—15 VII; *Galinsoga parviflora* CAVAN. k. 15—20 VI, d. 1—5 VIII (*aufuga ex hortis, valde molesta*); *Galium Aparine* k. 5—10 VI, d. 5—10 VII; *G. Mollugo* k. 15—20 V; *G. palustre* k. 20—25 V, d. 5—10 VII; *G. verum* k. 5—10 VI; *Genista tinctoria* k. 25—30 VI, d. 10—15 VIII; *Geranium columbinum* k. 5—10 V, d. 5—10 VI, kk. 20—25 IX; *G. pratense* k. 25—30 V, d. 1—5 VII; *G. Robertianum* k. 1—5 V, d. 1—5 VI; *Geum urbanum* k. 25—30 V; *Glechoma hederacea* k. 5—10 IV, d. 20—25 V, kk. 1—5 X.

Helianthemum vulgare k. 25—30 V; *Heracleum Sphondylium* 5—10 VI, 1—5 VIII; *Hieracium Pilosella* k. 1—5 VI, d. 20—25 VII; *Holosteum umbellatum* k. 15—20 III, 20—30 IV; *Humulus Lupulus* k. 15—20 VI; *Hyoscyamus niger* k. 5—10 VI, d. 1—5 VIII; *Hypericum perforatum* k. 15—20 VI.

Impatiens parviflora DECAND. k. 15—20 VI, 15—20 VII (*aufuga ex hortis*); *Inula britannica* k. 5—10 VII, d. 20—25 VIII; *I. germanica* k. 1—5 VII, d. 20—25 VIII; *Iris pseudacorus* k. 20—25 V, d. 5—10 VIII; *Juglans regia* l. 25—30 IV, k. 10—15 V, d. 10—15 IX, o. 15—20 X; *Juncus conglomeratus* k. 5—10 VI; *J. effusus* k. 5—10 VI; *Juniperus communis* k. 10—15 IV.

Lamium album k. 5—10 V, d. 20—25 VI; *L. amplexicaule* k. 1—5 IV, d. 10—15 V, kk. 5—10 IX; *L. purpureum* k. 1—5 IV, d. 15—20 V, kk. 15—20 IX; *Lampsana communis* k. 1—5 VII, d. 10—15 VIII; *Lappa major* GABERN. k. 1—5 VII, d. 1—5 IX; *Lathyrus pratensis* k. 10—15 V, d. 5—10 VII; *L. tuberosus* k.

1—5 VI, d. 1—5 VIII; *Leontodon autumnale* k. 20—25 VII, d. 25—30 VIII; *L. Taraxacum* k. 10—15 IV, d. 15—20 V; *Leonurus Cardiacus* k. 25—30 VI, d. 25—30 VII; *Ligustrum vulgare* l. 15—20 IV, k. 25—30 V, d. 1—5 IX, o. 5—10 XI; *Linaria vulgaris* k. 20—25 V, d. 1—5 VII; *Linum catharticum* k. 5—10 V, d. 10—15 VI; *Lithospermum arvense* k. 10—15 IV, 15—20 V; *Lolium perenne* k. 15—20 VI, d. 20—55 VII; *Lonicera Caprifolium* l. 15—20 IV, k. 15—20 V, d. 1—5 VIII, o. 5—10 XI; *L. tatarica* l. 10—15 IV, k. 25—30 V, d. 1—5 VIII, o. 10—15 X; *L. Xylosteum* l. 10—15 IV, k. 5—10 V, d. 25—30 VII, o. 15—20 X; *Lotus corniculatus* k. 20—25 V, d. 1—5 VII; *Lychnis diurna* SIBTH. k. 10—15 V, 20—30 VII; *L. Flos cuculi* k. 10—15 V, d. 25—30 VI; *L. Githago* Scop. k. 25—30 VI, d. 10—15 VII; *Lycium barbarum* l. 10—15 IV, 1—5 VI, d. 5—10 VIII, o. 20—25 X; *Lycopus europaeus* k. 10—15 VI, d. 15—30 VII; *Lysimachia nummularia* k. 1—5 VI; *L. vulgaris* k. 10—15 VI, d. 1—5 VIII; *Lythrum Sabicaria* k. 15—20 VI.

Malva crispa k. 5—10 VII, d. 20—25 IX; *M. rotundifolia* k. 15—20 V, d. 5—20 VII; *M. sylvestris* k. 1—5 VII, d. 15—20 VIII; *Matricaria Chamomilla* k. 25—30 V, d. 10—15 VII; *Medicago falcata* k. 1—5 VI, d. 1—5 VIII; *M. lupulina* k. 10—15 V, d. 25—30 VI; *Melampyrum arvense* k. 5—10 VI, d. 5—10 VIII; *M. nemorosum* k. 10—15 VI, d. 15—20 VII; *Melilotus officinalis* k. 15—20 VI, d. 1—5 VIII; *Mentha aquatica* k. 10—15 VI, d. 1—5 VIII; *Morus alba* l. 25—30 IV, k. 20—25 V, d. 25—30 VI, o. 5—10 X; *Myosotis arvensis* SIBTH. k. 10—15 IV; *M. palustris* WITH. k. 10—15 V, d. 20—25 VI.

Nasturtium amphibium R. BR. k. 20—25 V, d. 10—15 VII; *Negundo fraxinifolium* MOENCH. l. 15—20 IV, k. 15—20 IV, d. 5—10 IX, o. 5—10 X; *Nepeta Cataria* k. 15—20 VI, d. 5—10 VIII; *Nonnea pulla* DECAND. k. 25—30 IV, d. 1—5 VI; *Nuphar luteum* SM. k. 1—5 VI, d. 1—5 VIII.

Odontites verna REICHB. k. 10—15 V, d. 20—25 VI; *Oenanthe Phellandrium* LAM. k. 25—30 VI, d. 10—15 VIII; *Oenothera biennis* k. 15—20 VI, d. 5—10 VIII; *Ononis hircina* JACQ. k. 20—25 VI, d. 1—8 VIII; *O. spinosa* k. 20—25 VI, d. 5—10 VIII; *Onopordon Acanthium* k. 15—20 VII, d. 10—15 IX; *Orobus niger* k. 10—15 V, d. 15—20 VI; *O. vernus* k. 15—20 IV, d. 20—25 V; *Oxalis acetosella* k. 20—25 IV; *O. stricta* JACQ. k. 10—15 V, d. 10—15 VI.

Papaver Argemone k. 20—25 V, d. 15—20 VII; *P. Rhoas* k. 15—20 VII; *Pastinaca sativa* k. 5—10 VI, d. 25—30 VII; *Peucedanum Cervaria* CUSS. k. 20—25 VI, d. 5—10 VIII; *Philadelphus coronarius* l. 20—25 VI, k. 5—10 VI, o. 10—15 X; *Phleum pratense* k. 25—30 V, d. 1—5 VII; *Pimpinella saxifraga* k. 25—30 V, d. 15—20 VII; *Pinus Larix* l. 5—10 IV, k. 10—15 IV, o. 25—30 X; *P. sylvestris* k. 1—5 V; *Plantago lanceolata* k. 20—25 V,

d. 1—5 VII; *P. major* k. 15—20 V, d. 5—10 VII; *P. media* k. 15—20 V, d. 5—10 VII; *Polygala vulgaris* k. 25—30 IV; *Polygonum amphibium* k. 1—5 VII, d. 1—5 VII; *P. aviculare* k. 1—5 V, d. 5—10 VI; *P. Bistorta* k. 15—20 V; *P. hydropiper* k. 15—20 VI, d. 25—30 VII; *P. Persicaria* k. 15—20 VI, d. 25—30 VII; *Populus alba* l. 10—15 IV, k. 5—10 IV, d. 5—10 V, o. 15—20 X; *P. nigra* l. 5—10 IV, k. 5—10 IV, d. 5—10 V, 20—25 X; *P. tremula* l. 10—15 IV, k. 5—10 IV, d. 5—10 V, o. 15—20 X; *Potamogeton lucens* k. 5—10 VI, d. 5—10 VII; *Potentilla anserina* k. 15—20 V; *P. canescens* BESS. k. 15—20 V; *P. cinerea* CHAIX. k. 20—25 V; *P. recta* k. 15—20 V; *P. Tormentilla* k. 15—20 V; *Poterium Sanguisorba* k. 10—15 V; *Primula officinalis* JACQ. k. 15—20 IV; *Prunella vulgaris* k. 10—15 V, d. 1—5 VII; *Prunus avium* l. 5—10 IV, k. 20—25 IV, o. 10—15 X; *P. cerasus* l. 5—10 IV, k. 20—25 IV, o. 10—15 X; *P. domestica* l. 10—15 IV, k. 25—30 IV, o. 10—15 X; *P. Padus* l. 5—10 IV, k. 15—20 IV, d. 15—20 VIII, o. 20—25 X; *P. spinosa* l. 10—15 IV, k. 15—20 IV, d. 15—20 VIII, o. 20—25 X; *Pulicaria vulgaris* GAERTN. k. 1—5 VII, d. 5—10 VIII; *Pulmonaria officinalis* k. 15—20 IV; *Pyrus communis* l. 1—5 V, k. 5—10 V, o. 10—15 X; *P. Malus* l. 1—5 V, k. 5—10 V, o. 10—15 X.

Ranunculus acris k. 5—10 V, d. 25—30 VI; *R. aquatilis* k. 5—10 V; *R. arvensis* k. 1—5 V, d. 1—5 VI; *R. auricomus* k. 15—20 IV; *R. bulbosus* k. 5—10 V, d. 15—20 VI; *R. lanuginosus* k. 5—10 V, d. 20—25 VI; *R. Lingua* k. 10—15 VI, d. 1—5 VIII; *R. repens* k. 10—15 V; *R. sceleratus* k. 20—25 V, d. 20—25 VII; *Raphanus Raphanistrum* k. 10—15 V, d. 10—15 VI; *Rhamnus Frangula* l. 10—15 IV, k. 1—5 V, d. 25—30 VIII, o. 10—15 X; *Ribes Grossularia* l. 10—15 IV, k. 20—25 IV, d. 10—15 VI, o. 1—5 X; *R. rubrum* l. 15—20 IV, k. 25—30 IV, d. 5—10 VI, o. 25—30 IX; *Robinia Pseudoacacia* l. 25—30 IV, k. 25—30 V, d. 10—15 IX, o. 20—25 X; *Rosa canina* l. 10—15 IV, k. 15—20 V, d. 20—55 VIII, o. 15—20 X; *R. cinnamomea* l. 15—20 IV, k. 5—10 V, o. 15—20 X; *R. rubiginosa* l. 10—15 IV, k. 15—20 V, d. 20—25 VIII, o. 15—20 X; *Rubus fruticosus* k. 15—20 V, d. 10—15 VII; *R. Idacus* k. 15—20 V, d. 10—15 VII; *Rumex acetosa* k. 1—5 VI, d. 5—10 VII; *R. acetosella* k. 1—5 V, d. 1—5 VII; *R. crispus* k. 10—15 VI, d. 25—30 VII; *R. Hydrolapathum* k. 10—15 VI, d. 25—30 VII.

Sagittaria sagittifolia k. 1—5 VI; *Salix capraea* l. 5—10 IV, k. 1—5 IV, d. 5—10 V, o. 15—20 X; *S. fragilis* l. 10—15 IV, k. 10—15 IV, d. 10—15 V, o. 15—20 X; *S. triandra* l. 10—15 IV, k. 10—15 IV, d. 15—20 V, o. 15—20 X; *Salvia pratensis* k. 20—25 V, d. 15—20 VII; *Sambucus nigra* l. 15—20 IV, k. 1—5 VI, d. 1—5 IX, o. 5—10 X; *Scabiosa arvensis* k. 5—10 VI, d. 15—20 VII; *S. ochroleuca* k. 25—30 VI, d. 20—25 VII; *Scirpus lacustris* k. 20—25 V; *Scrophularia aquatica* k. 1—5 VII, d. 10—15

VIII; *S. nodosa* k. 18—20 VI, d. 25—35 VII; *Sedum acre* k. 25—30 V; *Senecio Jacobaea* k. 1—5 VII, d. 10—15 VIII; *S. vernalis* WALDST. k. 5—10 V, d. 5—10 VI; *S. viscosus* k. 1—5 V, d. 5—10 VI, kk. 10—15 IX; *S. vulgaris* k. 5—10 IV, d. 10—15 V; *Silene inflata* k. 10—15 V, d. 25—30 VI; *Sinapis arvensis* k. 20—15 V, d. 25—30 VI; *Sisymbrium Sophia* k. 5—10 V, d. 10—15 VI; *Solanum Dulcamara* k. 25—30 V, d. 20—25 VII; *S. nigrum* k. 1—5 VI, d. 10—15 VII; *Sonchus arvensis* k. 10—15 VI, d. 1—5 VII; *S. oleraceus* k. 15—20 VI, d. 1—5 VIII; *Sorbus aucuparia* l. 15—20 IV, k. 5—10 V, d. 1—5 IX, o. 10—15 X; *Sparganium ramosum* k. 25—30 VI, d. 1—15 VIII; *S. simplex* k. 30—2 VI, d. 1—5 VIII; *Spartium Scoparia* SM. k. 15—20 V, d. 10—15 VII; *Spergula arvensis* k. 15—20 V, d. 15—20 VI; *Spiraea Filipendula* k. 20—25 V, d. 1—5 VII; *S. salicifolia* k. 1—5 VI; *S. Ulmaria* k. 1—5 VI, d. 20—25 VII; *Stachys annua* k. 20—25 VI, d. 1—5 VIII; *S. arvensis* k. 10—15 VI, d. 1—5 VIII; *S. palustris* k. 10—15 VI, d. 10—15 VIII; *S. recta* k. 20—25 VI, d. 1—5 VIII; *Stellaria Holostea* k. 1—5 V, d. 5—10 VI; *Symphytum officinale* k. 15—20 V, d. 15—20 VII; *Syringa vulgaris* l. 5—10 IV, k. 1—5 V, d. 15—20 IX, o. 5—10 X.

Tanaetum vulgare k. 20—25 VI, d. 15—20 VIII; *Thlaspi arvense* k. 20—25 IV, d. 20—25 V; *Thymus Serpyllum* k. 10—15 VI, d. 1—5 VIII; *Tilia grandifolia* EHRH. l. 20—25 IV, k. 5—10 VI, d. 10—15 VIII, o. 10—15 X; *Trifolium arvense* k. 1—5 VII, d. 5—10 VIII; *T. pratense* k. 10—15 VI, d. 10—15 VIII; *T. procumbens* k. 10—15 V, d. 15—20 VI; *T. repens* k. 15—20 IV, d. 10—15 VI; *Tussilago Farfara* k. 25—30 III, d. 20—25 IV; *Typha latifolia* 10—15 VI.

Ulmus campestris l. 10—15 IV, k. 1—5 IV, d. 20—25 V, o. 15—20 X; *Urtica dioica* k. 1—5 VI, d. 1—5 VIII; *U. urens* k. 10—15 V, d. 15—20 VII, kk. 15—20 IX.

Vaccinium Myrtillus k. 20—25 IV, d. 10—15 VI; *Valerianella olitoria* MOENCH. k. 25—30 V, d. 5—10 VII; *Verbascum Lychnitis* k. 5—10 VI, d. 5—10 VIII; *V. nigrum* k. 10—15 VI, d. 25—30 VII; *V. phoenicum* k. 10—15 VI, d. 25—30 VII; *V. Thapsus* k. 25—30 VI, d. 15—20 VIII; *Veronica agrestis* k. 1—5 IV, d. 5—10 V; *V. Anagallis* k. 20—25 V, d. 5—10 VII; *V. arvensis* k. 1—5 IV, d. 1—5 V; *V. Beccabunga* k. 20—25 V, d. 5—10 VII; *V. Chamaedrys* k. 15—20 V, d. 15—20 VI; *V. hederifolia* k. 25—30 III, d. 1—5 V, kk. 10—15 X; *V. officinalis* k. 5—10 V, d. 5—10 VI; *V. serpyllifolia* k. 5—10 V, d. 10—15 VI; *V. triphyllos* k. 25—30 III, d. 25—30 IV, kk. 15—20 X; *Viburnum Opulus* l. 5—10 IV, k. 10—15 V, d. 5—10 IX, o. 10—15 X; *Vicia sativa* k. 25—30 V, d. 10—15 VII; *Viola canina* k. 5—10 IV, d. 10—15 V; *V. odorata* k. 1—5 IV, d. 10—15 V; *V. palustris* k. 25—30 IV; *V. tricolor* k. 10—15 IV, d. 15—20 V.

Xanthium Strumarium k. 25—30 VI, d. 20—25 VII.

k.
r.
1.
5
0
5
5
-
0
-
2

Odbitka z tomu XII Spraw. Kom. fizyjogr. akad.

