

THERAPIA NOVA

MIESIĘCZNIK NAUKOWY POŚWIĘCONY LECZNICTWU

Prenumerata roczna Zł. 10.—

Numer pojedynczy Zł. 1.50

Przy **kaszlu**

Paracodin (Knoll)

skuteczniejszym
środkiem od kodeiny

Rp. Paracodin-tabletki
20 sztuk w oryg. opak. Zł. 3.95.
3 razy dziennie po 1—3 tabletek,
najlepiej połykać nierozżute.

Cardiazol (Knoll)

przy **zapaściach,**
niedomogach serca,
zaburzeniach w krążeniu,
chorobach zakaźnych,
zatruciach.

Ampułki: opak. oryg. po 6 szt. Zł. 6.—
opak. oryg. po 3 szt. Zł. 3.10
Liquidum: opak. oryg. po 10 g Zł. 5.30
Tabletki: opak. oryg. po 10 szt. Zł. 4.50

Podskórnice, dożylnie lub doserco-
wo, dla dorosłych stosownie do po-
trzeby 1 ampulka ewent. w odstępach
1/2—1 godzinnych. Doustnie 3—4 razy
dziennie po 20 kropel lub 1 tabletkę
w razie potrzeby co 2—3 godziny.



Piśmiennictwo oraz próby przesyła
Knoll A.-G.
Dom Handlowy R. Arcichowski, Ludwigshafen/Rh.
Warszawa, Galerja Luxemburga 61/63. Tel. 613-21.

DO MIŁOŚNIKÓW
DZIEŁ LEKARSKICH DAWNYCH.

NAKŁADEM WYDAWNICTWA
NASZEGO UKAZAŁ SIĘ PRZE-

:: :: :: DRUK DZIEŁA :: :: ::

B. LUDWIKA PERZINY

P. T.

„LEKARZ dla WŁOŚCIAN”

DZIEŁO TO ZAZNAJAMIA CZYTELNIKA ZE STANEM MEDYCYNY i JEJ POGLĄDAMI w XVIII WIEKU i STANOWI NIEPRZEBRANY SKARBIEC PRZYCZYNIKÓW OBYCZAJOWO-KULTURALNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA TEGO OKRESU
:: :: :: W POLSCE. :: :: ::

Wydawnictwo nasze wydrukowało dzieło to w niewielkiej ilości
e g z e m p l a r z y .

Cena egzemplarza łącznie z przesyłką Zł.15.—
NA PROWINCJĘ WYSYŁAMY PO WPLACENIU NALEŻNOŚCI BLANKIETEM NADAWCZYM P. K. O. Nr. 19.175 „THERAPIA NOVA”.

Intraits (Intrakty)

(wysuszki roślin stabilizowanych w stanie świeżym)

przyrządzone podług metody **profesorów**
PERROT i GORIS w LABORATORJUM
DAUSSE w Paryżu

(4, 6, 8, Rue Aubriot)

zawierają wszystkie naturalne składniki i posiadają **wszystkie własności lecznicze** świeżej rośliny.

INTRAKTY DAUSSE

wywołują działanie stałe i równomierne!

Intrait DIGITALIS Dausse:

we wszystkich przypadkach, gdzie stosowane są preparaty naparstnicy, szczególnie **w niedomodze serca w okresie dyskompensacji**

Dawkowanie: Od 5 do 25 kropeł dziennie.

Intrait VALERIANA Dausse:

(dobrze znoszony - pozbawiony zapachu)

Sedativum i Antispasmodicum

Dawkowanie: 2 — 3 razy dziennie po łyżeczce od kawy.

Intrait MARRON d'INDE Dausse

(z Kasztana Indyjskiego) lek specyficzny:
w guzach krwawnicowych (hemoroidach)

żylakach i zapaleniu żył.

Dawkowanie: po 5 kropli rano i wieczorem,

Literaturę i próby wysyła przedstawicielstwo na Polskę.

Firma „ERGOS” Warszawa,

Ulica MARSZAŁKOWSKA Nr. 62.

Balsam Thiocolan

i


Balsam Thiocolan

c. phitino

są stosowane przez powagi lekarskie całego kraju
W CIERPIENIACH DRÓG ODDECHOWYCH

Jesteśmy w posiadaniu kilkuset orzeczeń PP. Lekarzy
podkreślających dodatnie działanie tych środków,

**CO JEST NAJLEPSZYM ŚWIADECTWEM ICH WARTOŚCI
LECZNICZEJ.**



UŻYCIE: 3 do 4 razy dziennie po łyżce deserowej, dzieciom stosunkowo mniej

Dla PP. Lekarzy próby i literatura bezpłatnie.

Gruźlica, grypa, bronchit, rozedma płuc, przewlekły kaszel, dychawica, wszelkiego rodzaju nieżyty płuc i t. p.

**MOKOTOWSKA FABRYKA
CHEMICZNO - FARMACEUTYCZNA**

Adolf Gąsecki i S-owie

**W WARSZAWIE
KANTOR UL. LESZNO Nr. 41**

W przewlekłym gościcu stawowym, nerwobólach,
przewlekłym zapaleniu nerwów, rwie kulszowej

usuwa bóle i leczy

pełnowartościowy środek

No-Rheumatic

w płynie — do wcierania

nie drażni, nie brudzi i nie zatłuszcza skóry.

Wyrób i skład główny

Dr. Farm. K. Wenda

Apteka i Laboratorium

Warszawa, Wronia 80



Nuclearsitol Robin

(połączenie kwasów nukleinowych z me-
thylarsenianem sodu)

w ampułkach

Pobudza leukocytozę i fagocytozę.

Zwiększa odporność organizmu.

Wyborny lek: w schorzeniach

skrofulicznych i limfatycznych.

W STANACH UPOŚLEDZONEGO ODŻYWIANIA.

Zwiększa odporność organizmu.

Literaturę i próby na żądanie WPP. Lekarzy wy-
sła wyłączne przedstawicielstwo na Polskę

Spółka Akc. WŁADYSŁAW HOFFMAN i S-ka

PRZEMYSŁ I HANDEL APTECZNY

Warszawa, ul. Leszno 17.



T YLKO ORYGINALNA
ZNANA OD 25 LAT

CZEKOLADA PRZECZYSZCZAJĄCA
DRASTIN-LUBELSKI

działa skutecznie reguluje żołądek

*Wystrzegać się
bezwartościowych
naśladownictw.*



*Zwracać uwagę
na napis
Drastin-Lubelski*

i znak fabryczny
n/każdym ułamku

WYTWÓRCA:
APTEKARZ

J. Lubelski

WARSZAWA UL. DEUGA 16

DO NABYCIA WSZĘDZIE!

Literaturę i próby wysyłam W. P. P. lekarzom bezpłatnie.

Uricedin

STROSCHER

Najsukieczniejszy środek w leczeniu skazy moczanej i jej następstw.

Opakowanie: granulki musujące po 50 i 100 gr.

Wskazania: Przewlekła i dziedziczna dna, rwa kulszowa (ischias), kolka nerkowa, miażdżycza tętnic, zapalenie nerek, kamica nerkowa, kamica pęcherzowa, piasek, zaburzenia krwioobiegu, zaburzenia w trawieniu i wydzielnicze, nerwobóle, angina pectoris.

Piśmiennictwo i próby przesyła bezpłatnie skład główny na Polskę:
„PROTON” Warszawa, ul. Ś-go Stanisława 9 11.

CZOPKI HEMOROIDALNE „VARICOL”

REG. M. Z. P. N^o 354.

z KOGUTKIEM

PUDEŁKO 12 SZT.

USUWAJĄ STAN ZAPALNY,
BÓL, SWĘDZENIE I PIECZENIE.
GOJĄ RANKI, SUSZĄ I DEZYN-
FEKUJĄ. ZMNIĘJSZAJĄ KRWA-
WIENIE I GUZY W ODBYTNICY
POWODUJĄ SZYBKIE I PRZY-
JEMNE WYPRÓŻNIENIE, NIE
ZAWIERAJĄ NARKOTYKÓW.



PROSPEKTY I PRÓBKI GRATIS.

ADOLF GĄSECKI i S^{WIE}

MOKOTOWSKA FABRYKA CHEM.
FARMACEUT. W WARSZAWIE.

KANTOR UL. LESZNO 41, TEL. 5628.



KILKA DUŻYCH NOWYCH MIKROSKOPÓW DO BADAŃ NAUKOWYCH.

Pierwszorzędny niemiecki fabrykat Wetzlar, odpowiadający najwyższemu wymaganiom. Największy uniwersalny statyw z szerokim tubusem do mikrofotografii z poczwórnym rewolwerem. Immersja olejowa 1/12. 4 obiektywy, 5 okularów. Powiększenie 2700 — krotne. Duży stolik przedmiotowy i, cnie z dużym aparatem do oświetlania — komp et sprzed a się zał 5 zł. Zapytania pod: „F. B. 622” kierować do Tow. Rekl. Międz. j. r. RUL. LF MOSSE, Warszawa, Marszałkwska 124.

Yohimbina Dra Spiegel'a

zwalora szybko i niezawodnie niemoc płciową, neurastenję i stany przygnębienia

Próby i literaturę wysyła na żądanie

ODDZIAŁ NAUKOWY NA POLSKĘ „ERGOS”, WARSZAWA · MARSZAŁKOWSKA 62

ZIOŁA MOCZOPĘDNE „DIUROL”

GĄSECKIEGO

CHOROBY:

N E R E K,
PĘCZERZA,
WĄTROBY
RZERŻĄCZKA itp.



PRZEPIS:

Odwar z łyżki ziół
„ Diurol” w 1/2 — 1
szklanki wody 1 — 3
razy dziennie.

POLECA

MOKOTOWSKA FABRYKA CHEMICZNO - FARMACEUTYCZNA
ADOLF GĄSECKI i S-wie, WARSZAWA.

Glicerofosfat Robin

W GRANULKACH

Przyrządzony w Laboratorjach

M-C E R O B I N W P A R Y Ż U

daje komórkom potrzebny pokarm fosforowy i wnosi niezbędne dla rozwoju systemu kostnego i zachowania równowagi nerwowej wapno.

Wyłączne przedstawicielstwo na Rzeczpospolitą Polską:

SPÓŁKA AKCYJNA

WŁADYSŁAW HOFFMAN I S-ka

PRZEMYSŁ I HANDEL APTECZNY

Warszawa, ul. Leszno Nr. 17.

Na żądanie wysyłamy PP. Lekarzom literaturę i próbne flakony.

NATURALNA WODA MINERALNA

KROŚCIENKO

ZDRÓJ STEFANA

NAJZASOBNIEJSZA W SKŁADNIKI STAŁE,
PRZEDEWSZYSTKIEM W CHLOREK SODU,
DWUWĘGLAN SODU i DWUWĘGLAN WAPNIA
NIEZRÓWNAJ WARTOŚCI LECZNICZEJ

Używa się jej z nader dobrym skutkiem przy wszelkiego rodzaju ostrych i przewlekłych **chorobach płuc, oskrzeli, tchawicy, gardła i krtani.**

Służy do zwalczania skazy moczanowej i kamicy wątrobowej.

Nadto jest znakomitą napojem djetetycznym, działającym zapobiegawczo przy obecnym sposobie odżywiania się.

Liczne uznania i najwyższe odznaczenia stwierdzają niezbicie jej wysoką wartość leczniczą.

PP. Lekarze otrzymują na
żądanie wodę Krościenko
do wypróbowania
b e z p ł a t n i e.

Zarząd Źródeł Mineralnych
Krościenko nad Dunajcem.

Preparat krajowy

KREOZAL „EGE”

Nr. Reg. 1301.

POCHODNY KREOZOTU
(KOLOIDALNY PROSZEK),
POZBAWIONY SMAKU,
ZAPACHU i UBOCZNYCH
DZIAŁAŃ!



W S K A Z A N I A:
**CHOROBY PŁUC,
GRUŻLICA,
OSTRE I PRZEWLEKŁE
NIEŻYTY OSKRZELI.**



Hydropiperol „EGE”

Nr. Reg. 21.

W S K A Z A N I A:

Krwawienia maciczne, poronienie, nieregularne miesiączkowanie—zbyt obfite lub bolesne. Krwotoki płucne, żołądkowe, nerkowe, nosa i hemoroidalne, oraz krwawe moczenie.

Jodopepton „EGE”

Org. zw. jodu z peptonem o stałej zaw. 5% J.

W S K A Z A N I A:

Stosuje się we wszystkich schorzeniach, gdzie wskazana jest kuracja jodowa.

LITERATURĘ i PRÓBY WYSYŁA WPP. LEKARZOM:
DZIAŁ NAUKOWY

Fabryki Chemicznej „EGE”

WARSZAWA, ULICA BURAKOWSKA NR. 15.
TELEFON 11.22-03.

THERAPIA NOVA

MIESIĘCZNIK NAUKOWY POŚWIĘCONY LECZNICTWU

Dr. med. H. ZALCMAN, (Warszawa).

O ROPNIACH PŁUC I ICH LECZENIU.

Ropień płucny jest schorzeniem, występującem prawie wyłącznie wtórnie, do rzadkości bowiem należą przypadki ropni płucnych pierwotnych, najczęściej na tle pełzakowem. W etiologii tego cierpienia dominującą rolę odgrywa flora bakteryjna tlenowa a mianowicie łańcuszkowce, gronkowce i dwójniki zapalenia płuc. Poglądy różnych autorów na patogenezę ropni płucnych dotąd jeszcze nie są ustalone. Sokołowski wymienia 3 rodzaje mechanizmu powstawania ropni: 1) zakażenie drogą odoskrzelową, 2) zator drogą naczyń krwionośnych i 3) ropnie pourazowe. Sergent na pierwszym miejscu stawia ropne zakażenie drogą krwionośną, dalej zakażenie drogami chłonnymi wskutek ropienia w sąsiedztwie, wreszcie wtórne ropienie po zapaleniu płuc płatowem lub odoskrzelowem, nie uwzględniając zupełnie ropni pourazowych. Co do przebiegu klinicznego odróżniać należy ropnie ostre i przewlekłe, różniące się nasileniem sprawy chorobowej i jej długotrwałością. Obraz kliniczny ropnia płucnego nie jest jednolity; bardzo często jest on maskowany przez objawy schorzenia zasadniczego. Skargi chorych na duszność, suchy męczący kaszel względnie z odpluwaniem śluzoworopnej płwociny, bóle klatki piersiowej są objawami zbyt wieloznacznymi, by mogły skierować rozpoznanie na właściwe tory, również objawy ogólne, jak np. przebieg ciepłoty, nie mają w sobie nic charakterystycznego. Dane badania fizykalnego zależą od umiejscowienia i wielkości ogniska ropnego. Gdy jest ono położone obwodowo, niedaleko opłucnej, stwierdzić możemy objawy nacieczenia, względnie rozpadu tkanki płucnej, a więc przytłumienie względnie stłumienie, osłabienie lub zaostrenie od-

dechu, oddech oskrzelowy, rzęzenia dźwięczne rozmaitego kalibru, drżenie głosowe wzmożone; jeżeli zaś ognisko leży centralnie, otoczone zdrową tkanką płucną, wówczas wynik badania fizykalnego będzie całkowicie ujemny i dopiero rentgenoskopja wzgl. rentgenografja przyczynić się może do ustalenia rozpoznania. W rozpoznaniu różnicowem uwzględnić należy zgorzel płucną; wprawdzie brak tu bezwzględnie pewnych kryterjów rozpoznawczych, naogół jednak decyduje o rozpoznaniu badanie płwociny. Przenikliwy, cuchnący jej zapach, brak włókien sprężystych z powodu działania zaczynów, obecność w płwocinie krętków i pałeczek wrzecionowatych — oto dane przemawiające za zgorzelą płucną. Rokowanie w ropniu płucnym zależy w znacznej mierze od czasu trwania sprawy chorobowej i stanu ogólnego chorego; w rokowaniu uwzględnić również należy, że wielokrotnie opisywano przypadki samoistnego wyleczenia ropni przez opróżnienie się ich po uprzednim przebieciu się do oskrzeli. Sprawa leczenia ropni płuc była do niedawna terenem zażartych walk między chirurgami i internistami; obecnie coraz bardziej ujawnia się tendencja do kompromisu i utrwała się pogląd, że tylko zgodna współpraca chirurga i internisty pozwoli osiągnąć pomyślne wyniki w leczeniu. Dawniej leczenie ropni płuc było domeną, którą niepodzielnie władali chirurdzy. Zgodnie z poglądami Quinke'go, Garré'go i Lenharz'a każdy przypadek ropnia płuc podlegał zabiegowi chirurgicznemu. Ale i wśród chirurgów zaznacza się rozbieżność zdań co do metody operacyjnej. Podczas gdy jedni jak Brauer są zwolennikami pneumotomji, inni jak Mitteldorf, a ostatnio i Sauerbruch poprzedzają pneumotomję plombą parafinową, którą do lecznictwa wprowadził Baer, a niekiedy nawet na plombie tej poprzestają, inni wreszcie polecają wykonanie zabiegu tak ciężkiego jakim jest pneumektomja. Brak jedności wśród chirurgów z jednej strony, przedewszystkiem zaś zatrwajające dane statystyczne — tak wg. Mitteldorf'a śmiertelność po operacjach ropni wynosiła 59%, ostatnio zmalała do 30% — wywołały reakcję i zmusiły do szukania dróg terapeutycznych, opartych na leczeniu zachowawczem. Zaczęto stosować leczenie ogólne, djetetyczno-hygjeniczne, a więc werandowanie chorych, ułożenie Quinke'go z wysoko uniesionemi kończynami dolnemi, celem ułatwienia odksztuszania płwociny, djetę z ograniczeniem płynów według Singer'a, do wewnątrz podawano przetwory guajakolu, olejki terpentynowy i eukaliptusowy, nalewkę czosnkową i t. d. Tą drogą wprawdzie w niektórych przypadkach stwierdzono poprawę, wyniki jednak naogół były nikłe. Duży postęp datuje się od chwili wprowadzenia do terapii ropni płuc odmy sztucznej. Zabieg ten zalecił w 1919 r. Bergmann. Próba zastąpienia ciężkiego zabiegu operacyjnego odumą została przyjęta entuzjastycznie i zdobyła sobie wielu zwolenników. Mnożyć się zaczęły liczne spostrzeżenia autorów jak Brednow'a, Neumann'a z polskich zaś Held'a i Heyman'a, Fliderbaum'a, którzy po

Hemoroidy

Czopki

Anusol

Goedecke



Działa przeciwzapalnie, ściągająco i dezynfekująco; łagodzi swędzenie i bóle; nie wywołuje podrażnień i działa nietrująco, nie zawiera narkotyków; działanie jest pewne i długotrwałe;

Rp. Suppos. Anusol-Goedecke Nr. XII
S. rano i wieczorem po jednym czopku.

Skład na Polskę:
Ed. Koch & W. Bormann, Warszawa
ul. Boduena No. 1.

Goedecke & Co.
Chem. Fabrik u. Export-Aktien-Ges.
Berlin

Targesin

środek
przeciwrzedzątkowy,
przeciwzapalny i przeciwtropny.

Kolloidalny kompleks połączenia
białczanu srebra z diacetyltannina.

Wenerologia. Urologja. Okulistyka.
Choroby nosa i krtani. Chirurgja. Choroby skóry.

Goedecke & Co.
Chem. Fabrik u. Export-Aktien-Ges.
Berlin

Skład na Polskę:
Ed. Koch & W. Bormann, Warszawa
ul. Boduena No. 1.

odmie stwierdzali wybitną poprawę, a nawet wyleczenie. Ciepłota opadała, ilość płwociny zmniejszała się, rentgenologicznie obserwowano znikanie cienia, odpowiadającego ropniowi. Wkrótce jednak zaczęto opisywać przypadki, w których pod wpływem odmy dochodziło do pękania ognisk ropnych i powstawania groźnych powikłań w postaci ropnego zapalenia opłucnej. Przekonano się więc, że stosowanie odmy kryje w sobie znaczne niebezpieczeństwo; obecnie autorzy francuscy są bardzo ostrożni w jej stosowaniu a nawet Kindbergh jest zdania, że odma w ropniu płuc jest środkiem niebezpiecznym, prawie zawsze skazanym na niepowodzenie. Większość autorów obecnie nie żywi wprawdzie tak znacznego sceptycyzmu, ujawnia się jednak tendencja do ograniczenia wskazań do stosowania odmy sztucznej, do przypadków ropni płucnych położonych centralnie, niektórzy zaś jak Held i Heyman uzależniają jej stosowanie od tego, w jakim płacie jest umiejscowiony ropień i polecają ją w ropniach górnopłatowych. Fałta w ropniach dolnopłatowych poleca phrenicoexheirezę. Z innych zabiegów stosowanych w ropniu płuc wymienić należy bronchoskopję. Gorącym jej zwolennikiem w Ameryce jest Chevalier-Jackson, który jest zdania, że bronchoskopja stanowi postępowanie paljatywne w przypadkach ropni przewlekłych. Lumierre, Kindbergh i Soulos osiągnęli przy pomocy tej metody całkowite wyleczenie w kilku przypadkach ropni płuc: Do środków farmakologicznych, przy pomocy których osiągnięto b. dobre wyniki w leczeniu ropni, przede wszystkim zaliczyć należy neosalvarsan, emetynę i alkohol. Neosalvarsan zawdzięcza stosowanie spostrzeżeniu Plauta, który w niektórych przypadkach ropni stwierdzał w płwocinie obecność pałeczek wrzecionowatych. Liczni autorzy po Plaut'cie stosowali z b. dobrym wynikiem neosalvarsan, że wymienimy tylko Becker'a, Stähelina, Perrin, Fliederbauma i Lewina i twierdzą zgodnie, że wpływ pomyślny ujawnia się dość często po pierwszym już zastrzyku; ciepłota opada, zmniejsza się kaszel znikają poczęści objawy fizykalne. Niektórzy jak Lewin i Fliederbaum kombinują neosalwarsan z odmą sztuczną, inni jak Neuman polecają rozpoczęcie terapii od neosalwarsanu i gdy po 10—14 dniach nie widzą poprawy, stosują odmę sztuczną. Leczenie neosalwarsanem rozpoczyna się zwykle od dawki 0,15, zwykle potem w odstępach 3 — 5 dniowych powtarza się wstrzykiwanie dożylnie w dawce 0,3 — 0,45, ogólna ilość wlewań do uzyskania poprawy lub wyleczenia waha się od kilku do kilkunastu. Pomyślnego wpływu neosalwarsanu nie należy wiązać z działaniem swoistem na krętki, jak przypuszczał Plaut, gdyż zawodził on często tam, gdzie stwierdzono krętki w płwocinie, a działał w przypadkach, gdzie krętków się nie stwierdzało.

Emetynę, która jest alkaloidem czynnym wymiotnicy, wprowadzili do lecznictwa czerwonej pełzakowej na początku XIX wieku Pelletier i Magendie. Od owego czasu opisano b. wiele przypadków skutecznego

działania emetyny w czerwonce pełzakowej i jej powikłaniach ropnych ze strony płuc i oskrzeli. To dało asumpt autorom francuskim (Jagnow, Ragu) do stosowania emetyny w ropniach płuc pochodzenia nie pełzakowego, zwłaszcza gdy Jagnow na zasadzie licznych prac doświadczalnych doszedł do wniosku, że emetyna nie ma działania specyficznego, lecz że przyczynia się do wytworzenia aglutynin, wzmagających siły obronne ustroju. Liczni autorzy (Brulé, Lemierre i Kourilsky, Labbé, Fliderbaum) podają dobre wyniki tej metody leczniczej, objawiające się spadkiem ciepłoty, zmniejszeniem się ilości płwociny, i znikaniem objawów fizykalnych. Autorzy ci stosują emetynę w postaci chlorowodoru, domięśniowo, przestrzegają przed stosowaniem dożylnem, które niejednokrotnie powoduje ciężką zapaść, rozpoczynają zwykle od dawki 0,02, zwiększają co drugi dzień o 0,01 dochodząc do dawki jednorazowej 0,06, a nawet 0,08. Ogólna ilość iniekcji waha się od 8 — 12 w zależności od stopnia występującej poprawy, naogół, ze względu na własności kumulacyjne emetyny, nie należy wprowadzać w sumie więcej niż 0,5 — 0,8 gr., w razie potrzeby następną serję zastrzyków poprzedzić należy 4 — 6 tygodniową przerwą. Istota działania emetyny w ropniu płuc nie jest dotąd całkowicie wyjaśniona; wbrew zdaniu Jagnow'a, Sergent i Labbé twierdzą, że skuteczność emetyny nawet w tych przypadkach, w których nie udało się wykryć w płwocinie pełzaków, może być dowodem pochodzenia pełzakowego tych ropni.

Alkohol w postaci wlewań dożylnych wprowadzili do leczenia ropni płuc Landau, Fejgin i Bauer. Oparli się oni na spostrzeżeniu, że dożylnie wlewania alkoholu 33% w przebiegu sepsis wpływały dodatnio na powikłania ropne ze strony płuc; w kilku wypadkach ropni osiągnęli przy pomocy alkoholu b. dobre wyniki.

Stosują oni wlewania dożylnie 33% alkoholu w płynie fizjologicznym w ilości 20 — 30 cm³ na dawkę co dzień wzgl. co 2 dzień, jednocześnie podają 5 — 10 j. insuliny dziennie celem uniknięcia ewentualn. uszkodzenia wątroby przez alkohol. Zwykle już po 3 — 4 wlewaniach ilość płwociny się zmniejsza, ciepłota się obniża i stan ogólny ulega znacznej poprawie.

W sprawie mechanizmu działania alkoholu, autorzy tej metody leczniczej wyrażają luźne przypuszczenia, że być może układ siateczko-wośródbłonkowy płuc, obdarzony dużymi własnościami żernymi wylapuje alkohol, umożliwiając mu działanie na dotknięty narząd, a więc podstawą działania byłby pneumotropizm alkoholu podanego dożylnie. Z innych środków leczniczych, stosowanych z mniejszem lub większem powodzeniem, wymienić jeszcze należy autowakcyne uzyskaną z hodowli płwociny (Jaquelin, Bezangon) i surowicę przeciwpaciorkowcową (Woroschilsky). Z tego zestawienia wynika, że obecnie w leczeniu ropni płuc dysponujemy całym szeregiem środków pierwszorzędnej wartości,


dzięki którym leczenie operacyjne zostało zredukowane do nielicznych przypadków. Dziś, uzgodniły się już poglądy internistów i chirurgów w sprawie zabiegu operacyjnego. Podstawą porozumienia, jest dewiza: nie operować za wcześnie, lecz nie operować i za późno. Zarówno Sauerbruch jak i Sergent stoją na stanowisku, że jeżeli po 6 — 8 tygodniach leczenia zachowawczego brak jest poprawy, należy przystąpić do operacji; pneumotomji bądź częściowej pneumektomji. O ile przeto do niedawna leczenie ropni płuc było zadaniem niewdzięcznym ze względu i na ubóstwo środków i na panujący chaos w poglądach, o tyle dziś różnaitość metod leczniczych i wyraźne wytyczne postępowania lekarskiego pozwalają na dużą dozę optymizmu.

ŚRODEK ODKAŻAJĄCY PRZEWÓD POKARMOWY.

STOSUJE SIĘ: przy nieżytach jelit cienkich i grubych, bieguncce, zakażeniach i samozatruciach jelitowych, tak u dorosłych jak i u dzieci.



— *Ferments lactiques* —



Literaturę i próby dla PP. Lekarzy wysyła

Firma Ed. Koch i W. Bormann Warszawa, Boduena 1.

PRZYCZYNEK DO POWSTAWANIA ANOKSEMJI.

W zamkniętych pomieszczeniach, w których znajdują się palniki gazowe, obok niebezpieczeństwa zatrucia gazem świetlnym wskutek nie szczelności przewodów lub t. p., istnieje jeszcze inne niebezpieczeństwo, na które należy zwrócić uwagę.

Podczas pracy w ciemni w jednym z Zakładów Uniwersytetu Warszawskiego zwróciłem uwagę na fakt, że palniki gazowe, ogrzewające termostat, pomimo starannego nastawienia termoregulatora i skontrolowania przewodów, często gasły, co powodowało ulatnianie się gazu. Początkowo kładłem to na karb zmiennego ciśnienia gazu zwłaszcza w nocy. Obok tego przy dłuższej (parogodzinnej) pracy w ciemni, podczas dokonywania pomiarów nefelometrycznych, występowało bardzo wyraźne zmęczenie, silne zawroty głowy, nudności oraz osłabienie i drżenie mięśni kończyn, co zmuszało mnie do przerywania pracy i opuszczenia ciemni. Objawy te ustępowały dosyć szybko, natomiast występował ból głowy, który trwał długo. Sądziłem, że objawy te występują wskutek przemęczenia, teraz jednak uważam, że dadzą się one wytłumaczyć głównie anoksemją.

W pomieszczeniu bowiem zamkniętym, w którym brak wentylacji lub jest ona niedostateczna, palnik gazowy zabiera tlen; gdy trwa to dostatecznie długo, zapas tlenu wyczerpuje się — palnik gaśnie. Gdy w pomieszczeniu takim znajduje się człowiek, w miarę zużywania przez niego tlenu, występują objawy anoksemji. Wiemy, że objawy te występują gdy zawartość tlenu w powietrzu spada z 20% do około 12%. Anoksemja występuje tu powoli, nie powodując duszności.

Drugi przypadek o bardziej ostrym przebiegu obserwowałem w roku 1930. Wezwano mnie do przypadku, jak podano zatrucia gazem świetlnym. Przypadek ten dotyczył chłopca 14-letniego, który kąpał się w łazience. W pewnym momencie domownicy usłyszeli krzyki chłopca, pośpieszyli na pomoc, ale drzwi od łazienki były od wewnątrz zamknięte. Wyważono drzwi, chłopiec leżał nieprzytomny na podłodze. Po otwarczeniu okien i przeniesieniu chłopca do sąsiedniego pokoju, powrócił on szybko do przytomności. Kiedy przybyłem, stwierdziłem jedynie przyspieszoną akcję serca, pozatem chłopiec skarżył się na ból głowy i silne osłabienie. Podał on, że, siedząc, czekał na napełnienie się wanny; po pewnym czasie uczył osłabienie, wstał, zamknął dopływ gazu i w tej

chwili doznał zawrotu głowy oraz uczucie silnego lęku, zaczął krzyczeć i stracił przytomność.

I w tym przypadku objawy należy odnieść do anoksemji, która wzrastała powoli, doprowadzając do burzliwych objawów z chwilą wykonania nawet nieznacznego wysiłku (chłopiec wstał, aby przerwać dopływ gazu). Z badań Haldana wiemy, że nawet nieznaczny wysiłek może wywołać w tych warunkach śmierć.

Przypadki takie mogą się zdarzać zwłaszcza w nowoczesnych mieszkaniach, gdzie łazienki zajmują bardzo niewiele miejsca i są wadliwie wentylowane. Niebezpieczeństwo jest tem większe, że brak tlenu może spowodować zgaśnięcie palników i jednocześnie zatrucie tlenkiem węgla.

Podał: Dr. med. ALFRED GALEWSKI, (Warszawa).

LECZENIE CHOROBY WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA.

(dokończenie).

W ostatnich czasach próbowano leczyć chorobę wrzodową żołądka przy pomocy proteinoaterapii. Najprostszy sposób polega na podawaniu mleka w ilości 3 — 5 cm³ na drodze podskórnej.

MEMENTO TERAPEUTYCZNE

POLECAMY UWADZE PANÓW LEKARZY ZNANE OD WIELU LAT ZE SWEJ SKUTECZNOŚCI NASTĘPUJĄCE PREPARATY:

NAZWA ŚRODKA	WSKAZANIA LECZNICZE
PASTYLKI D-RA BELLOC'A (PASTILLES du Dr. BELLOC) PREPARAT WĘGLA ROŚLINNEGO LEKARSKIEGO	Nerwica żołądkowa, zgaga, przypadki dyspepsji, nawykowe zaparcie stolca, krwawa biegunka.
KAPSUŁKI DZIEGCIOWE GUYOT'A (CAPSULES de GOUDRON-GUYOT) PREPARAT CZYSTEGO DZIEGCIU NORWESKIEGO	Nieżyt górnych dróg oddechowych (nosa, oskrzeli, płuc), gruźlica płuc.
PRZYPARKA GORCZYCZNA VAILLANT'A (AUTOPLASME SINAPISÉ de E. VAILLANT)	Nieżyty błon śluzowych. Gościec, dna, nerwobóle i rwa kulszowa.
PERELKI TERPENTYNOWE D-RA CLERTAN'A (PERLES D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE du Dr. CLERTAN)	Stosowane z powodzeniem w rozmaitego rodzaju nerwobólach (newralgjach), migrenie, rwie kulszowej, lumbago.

Literaturę i próby wysyła bezpłatnie na żądanie Panów Lekarzy

LABORATORJUM E. VAILLANT & Cie w PARYŻU

Oddział dla Polski w Warszawie

ul. MOKOTOWSKA Nr. 57 m. 6.

Perutz i Pribram zaczęli stosować na szeroką skalę nowoprotynę. Nowoprotyna jest to białko roślinne, łatwo rozpuszczalne, jest najbardziej swoistym ciałem białkowym, stosowanym w najrozmaitszych sprawach zapalnych, stosuje się 10 — 15 wlewań dożylnych, poczynając od 0,2 g. do 1,0 g. w odstępach 2 — 3 dniowych, leczenie to wypróbował Kalk.

Harris zaleca w przewlekłej chorobie wrzodowej spożywanie wielkiej ilości jarzyn, owoców purée, tłuszczu, pieczywa, mleka, gdyż pokarmy te zawierają witaminy, które wzmagają odporność tkankową. Ostatnio niektórzy autorzy jak Einhorn, Rehder są zwolennikami innej metody leczenia wrzodu żołądka, mianowicie metoda polega na zupełnym oszczędzaniu żołądka. Wprowadza się zgłębnik do jelita czczego, pozostawia w nim 30 dni i odżywia się tym zgłębnikiem chorego. Autor stosował tę metodę u 120 chorych; najlepsze wyniki osiągnął u chorych z owrzodzeniem na małej krzywiznie z ryzą. Największe powikłanie stanowi podrażnienie nerwu błędnego, które pobudza zgłębnik do ruchów wstecznych; wlewanie $\frac{1}{4}$ litra płynu winno trwać 1 — $1\frac{1}{2}$ godziny.

Henning zaleca wprowadzanie pokarmów następujących—1200 cm³ mleka ciepłego, do którego dodaje się 2 pastylki acidol-pepsyny. Mleko przez noc pozostawić w cieplarni, następnie dodać 6 jaj, oraz sok wyciśnięty z połowy cytryny. Oddzielnie gotować w $\frac{1}{4}$ litrze wody 30 g. mąki, 50,0 cukru gronowego, oraz 50,0 masła. Po ostygnięciu tej mieszaniny dodać ją do pierwszej przecedzić i przy pomocy irygatora wlewać w ciągu dnia 250 — 500 cm³ każdorazowo.

Glaessner i inni próbują leczenie wrzodu żołądka, podając chorym 1% roztwór pepsyny absolutnej. Autor wstrzykiwał 70-u chorym podskórnie co drugi dzień; udało mu się po 15-tu — 30-u zastrzykach doprowadzić chorych do zupełnego braku dolegliwości, do zmniejszenia kwasoty i wzmożenia wagi ciała. Simici, Murtak i Petrowic zaobserwowali ciekawe zjawisko, mianowicie, że po papce barytowej chorzy na wrzód żołądka lepiej się czuli, autorzy wprowadzają 15 g. siarczanu barytu cztery razy dziennie, trzy razy dziennie na godzinę przed jedzeniem, a raz dziennie przed snem w szklance wody, leczenie siarczanem barytu trwa kilka tygodni z przerwą 10-dniową.

Inni znowuż (Montier i Camus) wstrzykują gruczoly przytarczyczne Collip; na 9 przypadków, 4 dały wynik dodatni. Niektórzy autorzy są zwolennikami leczenia wrzodu żołądka przy pomocy naświetlań Roentgenem. Pierwszy Kodon rozpoczął leczenie w roku 1913, po nim Wachter w r. 1917, Menzer w r. 1919 otrzymał dobre wyniki po naświetlaniach, bóle ustępowały, wydzielanie żołądkowe zmniejszało się, również miało się zmniejszać stężenie wolnego i zwią-



VACCINEURIN

w ręku lekarza

PYOCYANAZA

Biologiczny środek
odkażający przeciw-
ko chorobom zakaź-
nym skóry i błon
śluzowych.

1. znakomity środek przeciw-ko chorobom układu nerwowego, wypróbowany od przeszło 17 lat we wszystkich cywilizowanych państwach;
2. niezawodne działanie wywołujące gorączkę.

Generalne
Przedstawicielstwo na Polskę:

BRESZEL i BRUZDA

Spółka Komandytowa
dawn. JÓZEF BRESZEL i S-ka

**SÄCHSISCHES
SERUMWERK**
AKTIENGESELLSCHAFT
DRESDEN

Warszawa, Świętokrzyska 35.

Początek nowej epoki w dziejach lecznictwa, to utrwalone preparaty roślinne. Hemoroidol-Rawski środek roślinny leczy hemoroidy i żylaki. Hemoroidol-Rawski jest to utrwalony wyciąg z kasztanowca indyjskiego, w postaci kropeł do użytku wewnętrznego i czopków. Skład główny: Apteka Magistra J. Rawskiego. Warszawa, Marjańska 12 (róg Twardej).



zanego kwasu solnego. Schulze-Berger na 79 przypadków ze wrzodem żołądka, miał wyleczonych 52 przypadki.

O wiele wyraźniejszy dawał się zauważyć wpływ szeregu naświetlań na jakość i ilość soku żołądkowego.

Rensaude i Solomon twierdzą, iż promienie X mają działanie spasmolityczne.

Działanie promieni X jest przeciwbólowe. z punktu widzenia teoretycznego działanie promienia X wywiera wybitny wpływ na żywe komórki, mechanizm działania polega na przemieszczaniu elektronów, krążących w atomach na inne drogi (Mayer).

Zwolennicy zupełnie nowoczesnego lecznictwa leczą sposobem kombinowanym, naświetlaniem promieniami Roentgena, alkalizacją soków ustrojowych i atropinizacją ustroju. (Cytronberg).

Chory ma leżeć w łóżku.

Pożywienie otrzymuje półpłynne. Co 3 — 4 dni dostaje naświetlenia w dawce, wynoszącej $\frac{3}{4}$ — $\frac{1}{2}$ dawki skórnej.

Przed naświetlaniem należy płukać żołądek ciepłą wodą w ilości 2-ch litrów.

Chory winien otrzymywać 3 — 4 razy dziennie na wysokości trawienia po jednej łyżeczce mieszaniny alkalicznej, zawierającej dwuwęglan, cytrynjan sodu, węglan magnezu, lub wapnia, nieco bizmutu i atropinę w ilości 0,0005 — 0,001. Naświetlań zrobić od 4 — 6.

Leczenie wodami mineralnemi.

W ciągu roku po wyleczeniu chory winien unikać wysiłków fizycznych; zaleca się pobyt w zdrojowiskach ze szczawami alkaliczno-słonecznymi jak Szczawnica; posiada klimat podgórski około 500 m., zwłaszcza źródło Magdaleny, którego woda obniża kwaśność treści żołądkowej, gdyż skład jej jest następujący:

Natrii bicarb. 6⁰/₀₀

Natrii chlorati 4,7⁰/₀₀

lub źródło Józefiny, które zawiera:

Natrii bicarb. 6⁰/₀₀

Natrii chlorati 3⁰/₀₀

Dr. A. Wander

S. A.

K R A K Ó W

CENTRALA BERNO (SZWAJCARJA)

podaje niniejszem do wiadomości, że rozpoczęła
własną produkcję w swoich budynkach fabrycznych
PRZY ULICY MOGILSKIEJ L. 80.

Uruchomienie fabryki w Krakowie pozwoliło przez
uniezależnienie jej od zagranicy **obniżyć ceny pre-**
paratów Ovomaltine i Alucol w następujący
sposób:

OVOMALTINE

puszka 500 gr.	Zł. 7 80
„ 250 gr.	„ 4 30
„ 125 gr. (nowe opakowanie)	„ 2 50

A L U C O L

1 pudełko à 36 past.	Zł. 3—
1 rurka alum. à 12 past. (nowe opakowanie) „	1 20
50 gr. pulv.	„ 3—
150 gr. pulv.	„ 8—

Początek nowej epoki w dziejach lecznictwa — to utrwalone preparaty roślinne. Środek przeciwko uporczywym kaszłom, nieżytowi dróg oddechowych i kokluszowi Danutol-Rawski idealnie leczy. Przyrządzony z odpowiednich świeżych roślin, przez utrwalenie w stanie świeżym utrzymanych, jest preparatem roślinnym i jako taki niczem niezastąpiony. Skład główny: Apteka Magistra J. Rawskiego. Warszawa, Marjańska 12 (róg Twardej).

Krościenko, źródło Stefana zawiera:

Natrii bicarb. 4,6⁰/₀₀

Natrii chlor. 2,5⁰/₀₀

Truskawiec, źródło Nastusia, szczególnie z zaparciem stolca.

Natrii bicarb. 0,15⁰/₀₀

Calcii carb. 0,25⁰/₀₀

Magnesii sulf. 0,12⁰/₀₀

Krynica, źródło Zuber:

Natrii bicarb. 18,77⁰/₀₀

Natrii chlor. 1,015⁰/₀₀

Magnesii carb. 2,91⁰/₀₀

powyższą wodę należy rozcieńczyć 2 — 3 krotnie, gdyż bez rozcieńczenia powoduje uczucie ciężkości w dołku podsercowym.

Te szczawy podaje się naczczo na ½ godz. przed jedzeniem 2—3 szklanek dziennie.

Następnie można stosować szczawy alkaliczne — Vichy Celestine, l'Hopital, Grande-Grille, Bilin.

Vichy zawiera 5% Na HCO₃. Źródło Grande-Grille 44°C, l'Hopital—32°C, Celestine jest to zimne źródło, wreszcie Bilin zimne, zawiera 4,5% Na HCO₃.

Nakoniec stosują wody alkaliczno - glauberskie, Karlsbad (źródło Mühlbrunn), zawiera:

Natrii sulfur. 2,5⁰/₀₀

Natrii bicarb. 2,25⁰/₀₀

Natrii chlorati 1⁰/₀₀

Podajemy pół szklanki wody Karlsbadzkiej 2 — 3 razy dziennie. Można także przepisać składowe części wody karlsbadzkiej:

Natr. sulf. 0,6

Natr. bicarb. 0,45

Natr. chlorati 0,25

M. t. p. d. t. d. № XXX.

S. po 1 proszku w pół godziny przed jedzeniem w pół szklance gorącej wody, 3 razy dziennie.

Źródła te mają różny skład i ciepłotę, jak Mühlbrunn 49°, Sprudel 73°.

CAMPHYDRYL



R O B I N

poходny kamfory — rozpuszczalny w wodzie.

(w ampułkach)

wchłania się szybko, wywołuje absolutnie niebolesne i szybkie efekty

W działaniu czynniejszy
o d k a m f o r y

WZMAGA TONUS
mięśnia sercowego
ośrodków nerwowych
i o d d e c h o w y c h

Postacie: 1 pud. zawiera 10 amp. po 1,2i5 cm³.

Laboratoires Robin,
13, Rue de Poissy—Paris

LITERATURĘ i PRÓBY WYSYŁA W.P. LEKARZOM
PRZEDSTAWICIELSTWO NA POLSKĘ

WŁ. HOFFMAN i S-ka S.A. Warszawa, Leszno 17.

Do kuracji następowej specjalnie u niedokrwistych nadają się źródła żelaziste; Iwonicz (zdrój Józefa), Nałęczów, Żegiestów.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka nierzadko bywa uciążliwe, wówczas stosuje się leczenie okresowe, 6 tygodni podaje się alkalja, następnie na zmianę 6 tygodni przetwory atropiny, a w ciągu dalszych 6-u tygodni lekkostrawne tłuszcze.

Pozatem należy dbać o to, aby chory zaprzestał palenia papierosów, które wzmaga kwaśność żołądka. Chory winien prowadzić prawidłowy tryb życia, unikać przemęczenia fizycznego i moralnego, zwłaszcza na wiosnę i jesień, kiedy to sprawa chorobowa ulega okresowemu pogarszaniu się.

Należy dążyć do usunięcia niedokrewności, który to stan pogarsza sprawę chorobową.

Chory winien mieć wypoczynek przynajmniej raz do roku w okolicy podgórskiej.

Kiedy chorego można uważać za zupełnie wyleczonego?

Za wyleczonego zupełnie można uważać chorego wówczas, o ile w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia leczenia nie będzie miał żadnych dolegliwości podmiotowych ze strony żołądka, cechujących chorobę wrzodową; to znaczy nie będzie miał żadnych punktów bolesnych, nie będzie krwi utajonej w stolcach, a obraz rentgenologiczny będzie wykazywał dno prawidłowe. W tym czasie chorego można zwolnić od do tychczas przestrzeganej diety.

Jeżeli wrzód żołądka, z jakiegokolwiek bądź powodu, czy wskutek błędnego poprzedniego leczenia, lub innych nieznanych powodów nie daje się wyleczyć na drodze leczenia wewnętrznego, konserwatywnego, wówczas pozostaje jedynie droga operacyjna.


Wskazania do zabiegu operacyjnego są następujące:

1. uporczywie przebiegające wrzody żołądka, nie dające się wyleczyć pod wpływem powtarzanych kuracji, z ciągłymi bólami, wymiotami, jawnym i utajonym krwawieniem,
2. przedziurawienie wrzodu (perforatio), oraz przy ulcus penetrans, pozostający w zrostach z sąsiednimi narządami,
3. w zaburzeniach ruchomości, wielkiego stopnia, powstałego wskutek tworzenia się blizn, zwłaszcza jeśli stan taki prowadzi do tężyczki (stenosis pylori).
4. W obawie przed zwyrodnieniem złośliwym wrzodu.

Początek nowej epoki w dziejach lecznictwa — to utrwalone preparaty roślinne. Takim utrwalonym preparatem jest Mutabcr-Rawski złożony wyciąg w postaci kropeł. Leczy radykalnie: biegunkę, uporczywe rozwolnienia, katar kiszek oraz nerwicę narządów trawienia. Skład główny: Apteka Magistra J. Rawskiego. Warszawa, Marjańska 12 (róg Twardej).

**W PRZEWLEKLYCH ZAPALENIACH OSKRZELI LUB Z OSTRYM PRZEBIEGIEM,
SLUZOTOKU, ROZSZERZENIU OSKRZELI, BRONCHO-PNEUMONII,
KAPSULKI COGNET**

z czystym EUCALYPTOLEM JODOFORMO-KREOZOTOWYM
zmniejszają wydzielenie i sprwadzają szybkie wyleczenie

W GRUŹLICY 
Kapsulki powyższe powstrzymują rozwój choroby, wzmacniają odżywianie, leczą gorączkę i
mogą spowodować zagojenie uszkodzeń wewnętrznych.

PARYŻ, Rue de Saintonge, 43 i we wszystkich aptekach.

REFERATY Z CZASOPISM OBCYCH.

P E R C A I N A.

UŚMIERZENIE BÓLU W GINEKOLOGJI.

(Towarzystwo lekarskie we Wiedniu, posiedzenie z dnia 16 października 1931. Wiedeński Tygodnik Medyczny, rocz. 81, Nr. 43, str. 1408—09, 24 października 1931.).

Prof. Dr. W. *Latzko* podaje na wstępie krótki przegląd rozwoju sposobów na uśmierzanie bólów. Specjalnie w ginekologii trudno jest uzyskać dostateczną głębokość narkozy w połączeniu z delikatnem uspianiem eterowem. Wielki postęp w tym kierunku stanowi maska Ombredanna. Referent powrócił jednak do anestezji lędźwiowej, gdyż eter zbyt widocznie niszczy komórki. Anestezja lędźwiowa powoduje osłabienie mięśni brzusznych i nie działa szkodliwie na narządy mięszzowe. Podczas gdy bezbolesność ograniczała się przedtem do 45 minut, to teraz umożliwia Percaina 3—4 godzinne znieczulenie, które przechodzi w przytępienie czucia bólu, trwające kilka godzin. Objawom zapaści zapobiega się w ten sposób, że iniekcję wykonuje się na stole operacyjnym, między 2 a 3 kręgiem lędźwiowym, przyczem unika się wszelkich niepotrzebnych ruchów pacjentki, aby preparat dostał się tylko do tylnych części najniższych odcinków rdzenia. Nie należy wyłączać rami communicantes, aby nie powstał spadek ciśnienia krwi; z tego samego powodu trzeba uważać, aby roztwór znieczulający nie dostał się do wyższych odcinków rdzenia. Ewentualne objawy wstrząsu usuwa śródżylna infuzja adrenaliny i soli kuchennej, lub też podskórna iniekcja efetoniny. Przez użycie całkiem cienkich igieł, zapobiega się bólom głowy, które przeważnie są następstwem ubytku płynu rdzeniowo mózgowego. O ile jednak wypadek taki zachodzi, należy pokój chorej przyciemnić, postarać

się aby leżała w pozycji poziomej, robić iniekcje z hipertonicznego roztworu cukru, wkraplać efetoninę, wstrzykiwać śródżylnie urotropinę. Dawka Percainy do zastrzyków wynosi przeciętnie 0,009, w formie roztworu od 0,5% do 1% (odpowiada 1,8—0,9 ccm. ref.). Iniekcję należy wykonywać powoli, aby nie dopuścić do silniejszego strumienia, któryby doprowadził lekarstwo w wyższe części. Obok narkozy inahalacyjnej i znieczulenia lędźwiowego, ważnem jest jeszcze znieczulenie za pomocą 0,5%-go roztworu novocainy. Metoda ta spotrzebowująca 200 ccm dla uzyskania rezultatu, nie zawsze jest nieszkodliwa; zachodzi często wypadek martwicy, który może się skończyć śmiercią.

Referent reasumuje swe doświadczenia następująco: przy operacjach pochwy, najstosowniejszą metodą znieczulenia jest stosowanie 0,5%-go roztworu novocainy z dodaniem adrenaliny, przy krótkotrwałych otwieraniach jamy brzusznej, narkoza eterowa z zastosowaniem aparatu Ombredanna, przy skomplikowanych laparotomiach, a szczególnie przy radykalnych operacjach raka macicy, znieczulenie lędźwiowe Percainą.

—:0:—

(Niemieckie czasopismo dla chirurgji tom 233, zeszyt 1, 1931, str. 88).


Józef Fischmann, asystent 1-go oddziału chirurgicznego w szpitalu miejskim Berlin-Neuköln, zachęcony odczytem Killiana, stosował Coraminę jako środek ocucający po narkozie awertyną. W 41 wypadkach wstrzykiwał 3 ccm. 50%-go roztworu Coraminy śródmięśniowo; w niektórych tylko wypadkach wstrzyknięto dodatkowo 1 i pół do 3 ccm. roztworu Coraminy (25%-go). Coramina nie jest w stanie przerwać silnej narkozy awertynowej, wystarczy jednak jeśli ją zamienia w powierzchowny stan uśpienia; tak samo przerywa długotrwały, nie pożądany sen po narkozie. Fischmann określa Coraminę, jako najskuteczniejszy środek w leczeniu zaburzeń oddechowych, powstałych po narkozie awertynowej.



ORYGINALNY

LIKIER BÉNÉDICTINE

wpływa dodatnio na trawienie



Doświadczenia z Eufilliną przy Cheyne-Stokes'ie i innych postaciach ośrodkowych zaburzeń oddychania. (A. Vogl. Med. Kl. 1932, I. wg. referatu W. kl. Woch. 1932. 5).

Autor zestawia następujący schemat postępowania leczniczego:

1^o w śpiączce (zatrucie narkotykami, żółcica, mocznica i t. p.) należy natychmiast zastrzyknąć dożylnie eufillinę 0,48 w 2 ccm. Aquae dest.

2^o przy zatrzymaniu oddechu (porażenie ośrodka odd. w narkozie) postępowanie jak powyżej (1^o).

3^o przy oddechu Cheyne Stokes'a, (nieznomoga krążenia, mocznica, wzmożenie ciśnienia wewnątrz-czaszkowego) przed okresem bezdechu zastrzyknąć ½ ccm. wymienionego roztworu eufilliny i zabieg ten powtarzać z przerwami.

4^o w duszności pochodzenia ośrodkowego (bez objawów zastój krążeniowego) należy powoli wprowadzić dożylnie eufillinę 0,24 — 0,48 w 10 ccm. Aquae dest. lub 20% roztworu cukru gronowego.

5^o w duszności pochodzenia ośrodkowego, kombinowanej zastojem sercowym (dla szybkiego usunięcia duszności, jeszcze przed nastąpieniem odwodnienia i dla uniknięcia podania morfiny) zastrzyknąć dożylnie eufillinę 0,24 — 0,48 z salyrganem w jednej strzykawce.

6^o w dychawicy sercowej (przy braku efektu po morfinie i pituitrynie) postępowanie jak przy 4^o.

OBRZĘKI SERCOWE — LECZENIE.

(A. Schott. Klin. Wschr. 1927, Nr. 29).

Obrzęki sercowe nie zależą tylko od stopnia niedomogi serca. Odgrywają tu rolę również czynniki fizyko-chemiczne, konstytucjonalne, wewnątrz-wydzielnicze, stan włóśniczek i inne nieznanne jeszcze momenty. Chorzy z ciężką niedomogą serca, z wątrobą zastoinową, dusznością i sinicą często są wolni od obrzęków. U innych chorych sercowych, właśnie obrzęki stanowią wczesny objaw rozpoczynającej się niedomogi krążenia. Autor w początkowych okresach niedomogi, gdzie objawy niewydolności serca zaznaczają się w postaci obrzęków nóg, przy chodzeniu, zaleca zmianę warunków pracy chorego ew. wypoczynek w łóżku, ograniczenie ilości płynów do 1—1,5 litra pro die i soli kuchennej. Nierzadko jednak trzeba się uciec do diety Karella polegającej, jak wiadomo, na częstym podawaniu małych porcji mleka, przegotowanego i zimnego, początkowo na ogólną ilość 800 cm³ w ciągu doby, potem do 2500 cm³ ew. z paroma sucharkami. W początkowym okresie niedomogi można zalecić kąpiele kwaso-węglowe, masaże ogólne i miejscowe (t. j. miejsc obrzękowych). Przeciwwskazaniem tego rodzaju zabiegów są ostre choro-

by zakaźne, miażdżyca naczyń wieńcowych i ogólna, zatory i cięższa niedomoga serca. Dla oceny wyników leczenia ważne jest zmniejszenie się pragnienia, zwiększenie ilości dobowej moczu, ustąpienie obrzęków, a przede wszystkim zachowanie się krzywej wagi ciała.

Jeżeli powyższe postępowanie zawodzi, należy przystąpić do leczenia naparstnicą. Dla wyrobienia sobie własnego doświadczenia, autor radzi z arsenału przetworów naparstnicowych wybrać i stosować kilka, z których osobiście poleca verodigen, digipurat i pulv. fol. digitalis titr. Leczenie naparstnicą należy rozpocząć od 0,1 pulv. fol. digitalis titr. trzy razy dziennie. Dalsze dawkowanie i długość czasu podawania leku, uzależnia się od indywidualnej reakcji układu krążenia. Należy pamiętać o objawach przedawkowania: nudności, wymioty, wolne tętno (poniżej 60), zaburzenia przewodnictwa, skurcze dodatkowe (extrasystolia innego pochodzenia nie stanowi przeciwwskazania). W razie zaburzeń żołądkowych na początku leczenia, wskazane jest podawanie naparstnicy drogą odbytniczą.

W przypadkach opornych na naparstnicę, oraz w nagłych ciężkich postaciach niedomogi serca należy zastosować leczenie strofantynowe. W ciągu trzech dni poprzedzających zastrzyk strofantyny nie wolno podawać naparstnicy. Zwykła dawka wynosi $\frac{1}{4}$ mlgr. pro dosi. Fahrerkampf radzi zastrzykiwać jednocześnie ze strofantyną (w jednej strzykawce) kardiazol lub koraminę.

Lekiem podobnym w działaniu do naparstnicy jest *Bulbus Scillae*. Podany doustnie, w dawce 0,3 pro die, własności kumulacyjnych prawie nie posiada. Z dożylnem podawaniem scillarenu należy być ostrożnym i nie wstrzykiwać więcej niż 1 cm³ pro dosi.

Utrzymujące się obrzęki, mimo naparstnicowania, są wskazaniem do leczenia skojarzonego. Oprócz naparstnicy podaje się leki moczopędne, głównie grupy purynowej (*Theobromin. natrio salicyl. s. Diuretinum. Theobromin acetylosalicyl. seu theacylon*).

Oryginalny Vermouth Martini Rossi
doskonale wzbudza łaknienie

Skutecznym działaniem wyróżnia się eufillina (w czopkach, domięśniowo i dożylnie) i teocyna (0,1 w czopkach 3 razy dziennie).

Potężnymi środkami moczopędnymi są nowasurol i salyrgan. Punkt zaczepu ich działania leży w głównej mierze w tkankach. Drogą uruchomienia wody i chlorku sodu w tkankach przy jednoczesnym pobudzeniu nerek wydalą się nierzadko 4—6 litrów moczu na dobę. Ciężka niedomoga serca wymaga uprzedniego zastosowania naparstnicy. W przypadkach choroby gorączkowej, ogólnego wyniszczenia, ostrego zapalenia kłębkowego nerek i nieżytu jelitowego, leczenie tymi środkami rțęciowymi jest przeciwwskazane. Przewlekłe zapalenie i marskość nerek nakazują ostrożność w stosowaniu tych leków. Należy zwracać uwagę na wczesne objawy zatrucia rțęciowego (zapalenie dziąseł, nieżyt jelit grubych, uszkodzenie nerek).

Przy myodegeneratio cordis zdumiewające wyniki daje nieraz tyreooidyna, działająca jako tkankowy lek moczopędny (Eppinger). Podaje się ją w dawce 0,1—0,3, trzy razy dziennie. Niezbędna jest tu ostrożność obowiązująca przy stosowaniu preparatów tarczycy wogóle.

Jako diureticum stosowany jest również mocznik (urea) w masywnych dawkach 30—50 gr. dziennie, oraz liq. kalii acetici.

W rozpaczliwych wypadkach, gdy obrzęki zachowują się opornie na powyższe leczenie, zmuszeni jesteśmy uciec się do usunięcia puchliny na drodze mechanicznej. (Nacięcie skóry — scarificatio, nakłucie trójgrańcem Curschmanna oraz wypuszczenie przesięków z jam surowicznych).

PIERWSZA POMOC PRZY CHOROBAH I URAZACH OCZU.

(Prof. K. D. Lindner W. Kl. W. 1932, Nr. 42).

Autor omawia w sposób zwięzły te sprawy chorobowe i urazy oczu, które ze strony lekarza praktyka wymagają natychmiastowej pierwszej pomocy.

Na pierwszym miejscu wymienione są ciała obce rogówki i jej nadżerki. Koniecznym warunkiem, przy usunięciu ciała obcego z rogówki, jest dobre znieczulenie, zapobiegające odruchom obronnym ze strony chorego.

Przy urazie rogówki i jej nadżerce trzeba się liczyć z możliwością zakażenia rogówki. Jako skuteczne postępowanie zapobiegawcze, autor zaleca stosowanie 1% maści optochinowej lub kollargolowej. Przy nadżerce wskazana jest opaska na oko, aż do całkowitego ustąpienia nadżerki.

Przy uszkodzeniu oczu z podejrzeniem na przebicie (perforatio)

należy, znowu mając na uwadze możliwość zakażenia, zastrzyknać zapobiegawczo mleko domięśniowo i chorego skierować niezwłocznie do specjalisty.

Uszkodzenie powiek z naruszeniem tarczki (tarsus) powinien leczyć okulista.

Podobnie należy postępować z urazami gałki ocznej, które niezadko doprowadzają do wzmożenia ciśnienia śródocznego lub odklejenia się siatkówki.

Z chemicznych urazów oka, najczęstsze jest oparzenie wapnem. Worek spojówkowy należy bezwzględnie przemyć. Dalsze postępowanie należy do specjalisty.

Przy leczeniu jęczmyka (hordeolum) powinno się zapobiegać na wrotom przez codzienne kilkakrotne oczyszczenie brzegów powiek płynami antyseptycznymi.

Wybroczyny podspojówkowe u starszych osobników można doprowadzić do szybszego wchłonięcia przez wkraplanie 3—5% roztworu dioniny.

W każdym ostrem zapaleniu spojówek trzeba się liczyć z możliwością rzeźączkowego zakażenia. W przypadkach tej właśnie etiologii, oko zdrowe musi być zabezpieczone opaską ochronną. Błędem sztuki jest bandażowanie oka chorego (rozpad rogówki).

W przewlekłych zapaleniach spojówek zwrócić uwagę na możliwość jaglicy.

Zapalenie woreczka łzowego (dacryocystitis) leczy się okładami gojącymi, co zwykle doprowadza do samoistnego przebicia się ropnia woreczka łzowego. Należy baczyć na swobodny odpływ ropy.

Owrzodzenia rogówki w przebiegu herpes corneae przyżęgiwać wacikiem zmoczonym 20% roztworem siarczanu cynku.

Zakażenie rogówki objawia się naciekiem wokoło wrót zakażenia z wysiękiem ropnym na dnie przedniej komory (hypopyon). Zaleca się przyżęgiwanie powyższym roztworem siarczanu cynku ew. elektrokauterem.

Ważne jest rozpoznanie różnicowe między ostrem zapaleniem tęczówki, a ostrym napadem jaskry. Niezawodnym objawem jest zachowanie się źrenicy. W ostrem zapaleniu tęczówki mamy węższą źrenicę w oku chorym, a ostrym napadzie jaskry rozszerzoną, przyczem gałka oczna jest twarda. Ostra jaskra leczona atropiną, doprowadza zwykle do ślepoty. Ostre zapalenie tęczówki zaś wymaga wkraplania atropiny.

Przy porażeniu mięśni ocznych doraźną pomoc stanowi opaska założona na stronę porażoną. Wyklucza to możliwość niebezpiecznych następstw podwójnego widzenia.

Przy niedomykalności powieki (logophtalmus) z powodu porażenia nerwu twarzowego zaleca się zaklejenie oka doraźnie plastrem.

Schorzenia dna oka stanowią już domenę okulisty.

W przypadkach urazów oka należy przeprowadzić badanie ostrości wzroku, gdyż, jak autor podkreśla, późniejsza ocena stanu czynnościowego oka, wskutek agrawacji lub symulacji, może nastęrczyć wielkie trudności.

NOTATKA TERAPEUTYCZNA.

G. Klemperer zaleca w przypadkach gotowości astmatycznej (Asthmabereitschaft) stosowanie jodu i arsenu.

Należy podawać 5% roztwór jodku potasu łyżkami i sol. Fowleri w kroplach. Leczenie powyższe daje dobre wyniki. (Therap. d. Gegenwart).

Aufrecht gorąco poleca u niegorączkujących gruźlików chininę z żelazem w następującej postaci:

Recepta:

Chinin. sulfur. 1,0

Ferri sulfur. 3,0

P. rad. Gent. 4,0

Extr. Gent. q. s. ut f. pill. Nr. LX.

DS. 2 razy dziennie po 2 pigułki (rano i wieczorem). Dtto.

U osobników cierpiących na migrenę, a nie znoszących antipyrinę per os, można ją zastosować per rectum:

Rp.

Antipyrin. 1,0

Kalii bromat. 0,5

Trae opii gtt II

Aquae dest. ad 150,0

Mfsol. DS. na 1 — 2 ławatywki

(Jour. de méd. de Paris VIII 1909).



Panflavin

w pastylkach

Pastylki wyróżniają się silnym działaniem odkażającym, zdolnością doskonałej dyfuzji i znacznym przenikaniem działania w głąb tkanek.

Dzięki tym własnościom pastylki Panflavin odkażają dokładnie jamę ustną i gardło i chronią w sposób niezawodny przed grypą, błonicą i innymi chorobami zakaźnymi.

OPAKOWANIE ORYGINALNE:

Pudełko po 30 pastylek zł. 4.30
 " " 100 " " 8.—

»Bayer-Meister-Lucius«

LEVERKUSEN n. R.

Wyłączna Reprezentacja na Rzeczp. Polską:
 Dom Agenturowy „REMEDIA” Warszawa,
 Hipoteczna Nr. 5 — skrzynka pocztowa 748.

Bébé Szofmana

PUDER, MYDŁO i KREM DLA DZIECI

stosowane od 30 lat przez pedjatrów całej Rzeczypospolitej.

Puder „BÉBÉ”

Szofmana jest z dotychczasowych najlepszą przysypką dla dzieci, **usuwa niezwłocznie** oprzałość, odparzenia, zaczerwienienia ciała, odleżyny, swędzenia i t. p.

Mydło „BÉBÉ”

Szofmana służy do kąpieli i mycia główki dzieciom.

Krem „BÉBÉ”

Szofmana **stosuje się w przewlekłych dolegliwościach skóry** i w tych wypadkach, gdy działanie samego pudru jest niedostateczne.

Laboratorjum WU-EL-KA,
 WARSZAWA, KROCHMALNA Nr. 87.

NA ŻĄDANIE W. PP. LEKARZY WYSYŁAMY PRÓBY BEZPŁATNIE.

T R E Ś Ć:

	str.
1. Dr. med. H. Zalcman, (Warszawa). O ropniach płuc i ich leczeniu	49
2. Dr. med. E. M. Mystkowski, (Warszawa). Przyczynek do powstawania anoksemji	56
3. Dr. med. Alfred Galewski, (Warszawa). Leczenie choroby wrzodowej żołądka, (dokończenie)	57
4. Referaty z czasopism obcych.	66
5. Notatka terapeutyczna	72



REDAKTOR:
w/z Dr. Med. Aleksander Kiciński

ADRES REDAKCJI:
Długa 46 m. 25 tel. 11.67-77.

WYDAWCA:
Mr. Farm. Zygmunt Sander

ADRES ADMINISTRACJI:
Złota 49 m. 2, tel. 711-55

Konto P. K. O. 19.175

Przedrukowywanie wszelkich zamieszczanych w „Therapia Nova” artykułów w całości, lub części bez porozumienia się z Redakcją — wzbronione.

Druk „Antiqua” St. Szulc i S-ka ul. Kacza 7, tel. 504-91.

Znakomity środek w leczeniu
miażdżycy tętnic ogólnej
lub zlokalizowanej.

SKLEROLSYROP

D-RA WŁAD. MŁADEJOWSKY'EGO

— PROF. UNIW. W PRADZE CZESKIEJ —

(Rozczyn krzemianu sodu w extr. droserae
przygotowany pod postacią smacznego syropu).

Winien być stosowany
we wszystkich przy-
padkach, gdzie wska-
zana jest kuracja
jodowa.

Daje
doskonałe wyniki
w schorzeniach dróg
oddechowych na tle
M I A Ź D Ź Y C Y

ORYGINALNY

SKLEROLSYROP

JEST DO NABYCIA WE WSZYSTKICH APTEKACH.
PRÓBY I LITERATURĘ WYSYŁA NA ŻĄDANIE WPP. LEKARZY FIRMA

Breszel i Bruzda

SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

WARSZAWA

Ś-to Krzyska 35

FABRYKA CHEMICZNA

GEDEON RICHTER TOW. AKC.

BUDAPESZT X.

PREPARATY JAJNIKOWE

„RICHTER”

**Inj. et Tabl. Glandofolin
„RICHTER“**

**BIOLOGICZNIE STANDARYZOWANY KO-
BIECY HORMON PŁCIOWY.**

1 ccm. = 40 jednostk. mysim. (Pudełka zawiera-
ją 6 lub 12 amp.).

1 tabl. = 100 jednostk. mysim. (Rurki zawiera-
ją 10 tabletek).

Inj. Glanduovin „RICHTER“

**ODBIAŁCZONY WODNY WYCIĄG Z CAŁKO-
WITEGO JAJNIKA O 2 KONCENTRACJACH.**

1 ccm. = 1 gr. subst. recent. (Pudełka zawiera-
ją 6 amp.).

Koncentr. 1 ccm. = 12 gr. subst. recent. (Pudełka
zawierają 12 amp.).

Tabl. OVARII „RICHTER“

1 tabl. = 1 gr. subst. recent. (Flakony zawiera-
ją 40 tabl.).

**Preparaty wprowadzone do leko-
spisów Kas Chorych.**

PRZEDSTAWICIELSTWO NA POLSKĘ:

B-cia Czyż WARSZAWA, MYLNA 11a,
TELEFON Nr. 233-72.