



DUBLAŃSKI /
KALENDARZ ROLNICZY

2
NA ROK 1909.



WYDANY

przy współdziale: Prof: Stanisława Chaniewskiego,
St. Królikowskiego, Dr. St. Pawlika, K. Szulca, Dr.
K. Miczyńskiego, Dr. T. Rylskiego, T. Chrząszcza,
□ □ Z. Moczarskiego i K. Ajdukiewicza □ □

PRZEZ

PROF. J. MIKUŁOWSKIEGO-POMORSKIEGO

DYREKTORA AKADEMJI ROLNICZEJ W DUBLANACH

ROČNIK SIODMY.

WSZELKIE PRAWA ZAŠTRZEŻONE

LWOW.

NAKŁADEM KSIĘGARNI H. ALTENBERGA

Druk W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie

BIBLIOTHECA

UNIV.



MAGELL

CRACOVENSIS

SPIS RZECZY CZĘŚCI I.

	Str.
Zakłady naukowo-rolnicze w Galicyi	III—V
Strefy klimatyczne w Galicyi	VI
Kalendarz	VII—XXXI
Terminarz na r. 1909	XXXII
Kategoriey papieru stempłowego	XXXIII
Kalendarz myśliwski dla Galicyi wraz z W. Ks. Kra- kowskim	XXXIV
Wyciąg z przepisów pocztowych i telegraficznych	XXXV
Taryfy kolejowe towarowe	XXXIX
Notatnik kalendarzowy	47—230
Rachunkowość. Tabelka pomocnicza do wypłat	231
Kontrola najmu	232
Dzienniczek kasowy	244
Zaslugi i ordynarya	252
Powierzchnia niw, pól i t. p.	258
Zmianowania	264
Preliminarz szczegółowy obsiewów	266
Zasiewy, nawożenie, zbiory	272
Nawożenie pól	278
Omloty próbne	280
Preliminarz ziarna	282
Omloty zboża	284
Kontrola mlewa	288
Zbiór siana	290
Stan inwentarza żywego	294
Próbne ważenie inwentarza	296
Udoje próbne	302
Ogólny udój mleka	318
Stanowienie i cielenie się krów. Udój za ostatnie 2 lata	322
Przybytek inwentarza żywego	326
Ubytek	330
Dawki paszy dzienne. Preliminarz paszy	334
Inwentarz martwy	338
Bilans roczny	344
Splaty i pożyczki	346
Adresy	348

Biblioteka Jagiellońska



1002042399

Tabliczka do zamlany miar austriackich na miary Królestwa i rosyjskie
znajduje się w drugiej części.

85.0031

ZAKŁADY NAUKOWE ROLNICZE W GALICJI

według stanu z roku 1906/7.

Dźwignią postępu rolniczego są zakłady naukowe, zasila-
jące społeczeństwo, pracujące na roli, w jednostki zdolne do
teższej pracy. Obok zakładów, kształcących młodych adeptów
rolnictwa, leśnictwa i t. d. — wielkie zadanie — w tej pracy.
przypada wszelkiego rodzaju stacyom doświadczalnym, wresz-
cie Towarzystwom zawodowym, skupiającym zastępy ludzi wie-
dzy teoretycznej z praktykami. Tylko w łącznym działaniu tych
wszystkich czynników tkwi siła, stwarzająca postęp w całym
tego słowa znaczeniu. Tej łączności w pracy — na ziemi, dla
ziemi — zawdzięczamy, zaznaczający się w ostatnich latach po-
stęp w gospodarstwach naszych.

Zestawienie poniżej podane, daje liczbowy obraz zakładów
naukowych rolniczych w naszym kraju. Obok tego wyliczamy
wszelkie inne Zakłady i Towarzystwa; niepodobna na tem miej-
scu bawić się w szczegóły, odnoszące się już do liczby człon-
ków, już do bliższego określenia ich sfery działania. O ile
jednakże frekwencya w szkołach zawodowych od lat kilku stałe
się podnosi, o tyle niestety, nie możemy tego samego powiedzieć
o wzroście liczby członków w wielu bardzo Towarzystwach, które
poniżej wymieniamy. Duch assocjacji nie przeniknął u nas je-
szcze sfer rolniczych w tej mierze, jak na Zachodzie...

	Rok założenia	Okres nauki trwa (lat)	Początek i koniec nauki	Siły nauczy- cielskie		Frekwencya z końcem r. sz. 1906/7		Ukończyło za- kład w r. 1906/7
				Stale	Pomo- cnicze	Ogółem	Synowie własc. ziem.	
Kraków. Studium rol- nicze przy Wsz. Jag. .	1890	3	10/10—31/7	6	19	211	88	16
Dublany. Akademia rol- nicza	1855	3	1/10—16/7	11	7	80	63	21
Czernichów. Kraj. śred- nia szkoła rolnicza	1860	3	15/9—14/7	10	2	60	42	22
Lwów. Krajowa średnia szkoła gosp. lasow.	1874	3	1/10—31/7	5	9	24	15	—
Rzeszów. ¹⁾ Kraj. Szkoła mleczarska i serkar.	1903	¹ / ₃ ¹ / ₂	1/11—28.2 1/3—31/10	3	2	24	14	24
Dublany. Kraj. Szkoła gorzelnicza	1881	¹ / ₂	1/10—31.3	3	5	30	14	40*)

¹⁾ Nadto jednomiesięczny kurs dla abiturjentów rolniczych
zakładów od 15/7 do 15/8.

*) W tej liczbie 10 słuchaczy Akademii rolniczej.

	Rok założenia	Okres nauki trwa (lat)	Początek i koniec nauki	Siły nauczycielskie		Frekwencja z końcem r. sz. 1906/7		Ukończyło za- kład w r. 1906/7
				Stale	Pomo- cnicze	Ogółem	Synowie włas. ziem.	
Tarnów. ²⁾ Kraj. Szkoła ogrodnicza	1889	1	1/4—31/3	3	1	24	10	8
Zaleszczyki. ³⁾ Kraj. Za- kład pomologiczny	1900	—	—	2	—	—	—	—
KRAJOWE NIŻSZE SZKOŁY ROLNI- CZE:								
Bereźnia p. Stryj	1896	3	1/7—30/6	3	2	44	32	13
Dublany	1873	3	» »	3	3	47	38	11
Horodenka	1885	3	» »	3	2	41	20	14
Jagielnica	1884	3	» »	3	3	36	26	10
Koblernice p. Kenty	1886	3	» »	3	1	33	27	10
Mitocin p. Rzeszów	1906	3	» »	3	1	24	19	—
Suchodół p. Krosno	1898	3	» »	4	2	43	26	14
SZKOŁY ZIMOWE:								
Lubcza obok Pilzna	1905	1	1/11—31/3	1	2	9	9	?
Niewiarów koło Bochni	1898	2	» »	1	2	29	29	11
C.K. SZKOŁA LEŚNICZYCH:								
Bolechów	1883	1	1/9—31/7	3	3	18	8	13

Prócz powyżej wymienionych zakładów, z rolnictwem związek mają:

C. k. Akademia weterynaryi we Lwowie.

Wydział hydrotechniczny przy c. k. Politechnice we Lwowie.

Szkoła gospodyń wiejskich w Albigowej.

Zakład hodowli drobiu w Zielonej.

Szkoła Tow. pszczelnico-ogrodniczego we Lwowie.

Szkoła chmielarska w Staremsiole.

Oraz dopełniające kursa rolnicze przy trzydziestu kilku szkołach ludowych.

²⁾ Prócz tego kurs sadowniczo-warzywniczy dla dwunastu nauczycieli.

³⁾ Następujące kursa: a) sadowniczo-warzywniczy dla praktykantów zakładu 22/1 do 24/2; b) sadowniczy dla nauczycieli wiejskich; c) kurs przeróbki owoców 20/11 do 20/12; d) kurs pielęgnacji drzew 20/11 do 30/11; e) kurs uprawy wina 10/12 do 20/12.

STREFY KLIMATYCZNE W GALICJI

przez prof. K. Szulca.

I. Strefa zachodnia (Chrzanowskie, Krakowskie, Powiśle) przeciętna temperatura roczna dochodzi do $+8^{\circ}\text{C}$, lata do $+18^{\circ}\text{C}$, zimy do -3.3° przeciętne maximum temperatury w lipcu $+31.7$ (Kraków), w roku $+32.8$ (Kraków), przeciętne minimum temperatury w styczniu -18.9° (Kraków), w roku -22% (Kraków). Prawdopodobieństwo przymrozków majowych $\frac{1}{6}$ (t. j. co 5 lat). Roczny opad 600–700 mm. Najwięcej dni z opadem wykazują maj i czerwiec; największą ilość opadu czerwiec i lipiec.

II. Strefa północno-wschodnia (na wschód od poprzedniej, sięga na południe prawie do działu wód Sanu, Buga, Styru a Dniestru) latem cieplejsza, zimą zimniejsza od poprzedniej. Prawdopodobieństwo przymrozków w kwietniu $\frac{4}{5}$, w maju $\frac{1}{5}$. Roczny opad w ogóle nie przechodzi 700 mm. Najwięcej dni z opadem wykazuje czerwiec; największą ilość opadu — czerwiec (w zachodniej części strefy) i lipiec.

III. Strefa środkowo-wschodnia (zajmująca środek wschodniej Galicji od Sambora ku wyżynie Tarnopolskiej) wykazuje w wyższym stopniu cechy klimatu śródładowego, zwłaszcza we wschodniej części strefy, gdzie zima jest znacznie ostrzejszą, wahania temperatury większe, a i roczne temperatury niższe, niż w strefach poprzednich. Prawdopodobieństwo przymrozków w maju więcej niż $\frac{1}{5}$, w kwietniu $\frac{9}{10}$. Roczna ilość opadu jest większą w północnej części tej strefy (wyżej 700 mm.), a mniejszą w południowej części (600–700 mm.). Najwięcej dni z opadem okazuje czerwiec, największą ilość opadu lipiec.

IV. Strefa południowo-wschodnia (na południe od poprzedniej, opierająca się od zachodu o okolice podgórskie) odznacza się wyższą temperaturą lata przy ostrej zimie. Roczna ilość opadu 600–700 mm. Najwięcej dni z opadem przypada na czerwiec i lipiec; najwięcej opadu na lipiec i czerwiec.

V. Strefa górską (obejmująca najwyższą część kraju) wykazuje niższe roczne temperatury, chłodniejsze lato i ostrzejszą zimę, niż inne części kraju. Roczna ilość opadu tej strefy jest największą w całym kraju, przekraczając w oddzielnych miejscach nawet 1100 lub 1200 mm. Najwięcej dni z opadem wykazuje czerwiec i lipiec, największą ilość również czerwiec i lipiec.

Niektóre dane meteorologiczne dublańskie za ostatnie lata:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1901 Opad rok	590	17	15	38	32	25	167	72	71	41	37	39	36
Temp. średn. $^{\circ}\text{C}$	7.5	-6.9	-5.8	2.8	7.9	13.8	18.5	18.4	17.6	12.6	9.2	1.4	0.9
1902 Opad rok	557	21	34	38	22	85	71	106	55	33	72	30	17
Temp. średn. $^{\circ}\text{C}$	6.1	0.6	-1.9	1.1	5.5	9.9	16.3	16.5	17.0	12.1	6.3	-2.6	-7.3
1903 Opad rok	592	17	26	2	59	53	129	121	56	10	68	40	11
Temp. średn. $^{\circ}\text{C}$	8.0	-4.0	0.7	4.9	6.6	13.6	16.6	18.4	16.7	14.3	7.9	3.0	-2.6
1904 Opad rok	468	13	18	14	35	36	45	30	93	76	55	26	27
Temp. średn. $^{\circ}\text{C}$	6.8	-5.7	0.2	0.3	6.9	11.4	15.8	17.9	17.1	11.1	7.7	0.2	-0.4
1905 opad.	575	9.0	13.6	6.2	41.6	80.0	118.6	51.9	44.9	28.8	93.9	59.5	26.6
Temp. średn. $^{\circ}\text{C}$	7.5	-6.7	-2.3	+1.5	5.8	13.9	18.8	18.7	18.6	14.4	4.7	4.2	1.6
1906 opad.	6.92	14.7	17.2	51.6	17.9	59.0	113.7	127.6	46.4	82.0	20.2	71.9	70.0
Temp. średn. $^{\circ}\text{C}$	7.7	-3.0	-2.1	1.6	9.5	15.3	16.8	18.3	16.5	12.1	6.7	5.5	-4.9
1907 opad.	614.3	23.9	19.4	30.1	50.9	37.5	196.0	146.7	76.4	35.6	0.4	28.6	29.1
Temp. średn. $^{\circ}\text{C}$	6.3	-6.1	-6.7	-2.1	4.4	15.9	16.1	16.5	16.4	12.3	11.4	0.0	-2.6

CZĘŚĆ KALENDARZOWA.

Rok 1909 jest:

- rokiem 6622 peryodu juliańskiego.
- » 7417—7418 ery bizantyjskiej.
 - » 1926—1927 » mahometańskiej.
 - » 5669—5670 kalendarza żydowskiego.

Zaćmienia słońca i księżyca w r. 1909.

W r. 1909 widzialne u nas jest tylko jedno zaćmienie księżyca 4. czerwca. Zaczyna się o 12 g. 43 m. po północy, kończy o 4 g. 15 m. tak, że księżyc zachodzi przed końcem zaćmienia.

Ferye sądowe.

Wszystkie Niedziele i Święta uroczyste; od Bożego Narodzenia do Trzech Króli; od Niedzieli Kwietnej do Poniedziałku Wielkanocnego; Dnie Krzyżowe; 10 ostatnich dni w lipcu i 10 pierwszych w październiku.

Żydów dni wolne od stawania w Sądach przypadają w następujące ich święta:

- 1) Nowy rok 2 dni; 2) Święto pojednania 1 dzień; 3) Święto Knezek 2 pierwsze i 2 ostatnie dni;
- 4) Wielkanoc 3 pierwsze i 2 ostatnie dni;
- 5) Zielone święta 2 dni.

W Niedzielę Wielkanocną, Zielonych Świątek i w dzień Bożego Narodzenia 25. grudnia przedstawienia teatralne i inne widowiska mogą być dawane tylko na cele dobroczynne i za zezwoleniem Zwierzchności. W dnie te bałe publiczne i tańce są zabronione.

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

Rok 5669. 3. Post, Onigianu Jerolimauy.

Styczeń.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

Styczeń.

DNIE	Ś W I Ę T A			
	rzymsko-katolickie		grecko-katolickie	
1	P.	Nowy Rok	19	Wonyfatya
2	S.	Makarego op.	20	Ilnatyja
3	N.	Genowefy p.	21	Jułyanny mucz.
4	P.	Tytusa bisk.	22	Anastazyi
5	W.	Telesfora m.	23	10 m. w Kriti
6	S.	Trzech Króli ☿ ¹⁾	24	Iewhenyi
7	C.	Walentego b. Luc.	25	Roźdest. Chryst.
8	P.	Seweryna op.	26	Sobor P. Boh.
9	S.	Marcyanny p.	27	Stefana Mucz.
10	N.	Pawła pust.	28	2000 Mucz.
11	P.	Higina m.	29	SS. Mładańciw
12	W.	Honoraty	30	Anysyi
13	Ś.	Hilarego bisk.	31	Mełanyi
14	C.	Feliksa z Noli ☿ ²⁾	1	Henvar 1909
15	P.	Maura op.	2	Sylwestra
16	S.	Marcelego I. pap.	3	Małahia
17	N.	Antoniego p.	4	Sobor 70 Ap.
18	P.	Pryski panny	5	Fteopempta
19	W.	Ferdynanda	6	Bohojawl. Hospod
20	Ś.	Fabiana i Seb.	7	Sobor S. Ioana
21	C.	Agnieszki p. m.	8	Hryhora pr.
22	P.	Wincentego m. ☿ ³⁾	9	Patyjewkta
23	S.	Zaślubiny NPM.	10	Hryhorya J.
24	N.	Tymoteusza	11	Fteodozja
25	P.	N. św. Pawła Ap.	12	Tatiany M.
26	W.	Polikarpa	13	Ermyła m.
27	Ś.	Jana Chryzostoma	14	SS. Otec. w S.
28	C.	Karola W. ☿ ⁴⁾	15	Pawła Ftyw.
29	P.	Franciszka Salez.	16	Pokłon ok. Petr.
30	S.	Martyny p. i Saw. p.	17	Antonia Weł.
31	N.	Piotra Nol.	18	Aftanazja

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

Rok 5669. 3. Post, Oblężenie Jerozolimy.

1) 3 w. pełnia. 2) 7 w. ost. kw. 3) 1 r. nów. 4) 4 w. 1 kw.

Luty.

SWIĘTA		DZIEŃ	
1	2	3	4
1	Wojtatyr	Nowy Rok	P.
2	Janalajr	Makarogo op.	S.
3	Juljanny macz	Unowoly g.	H.
4	Annałajr	Tymał inak.	L.
5	10 na w Kall	Tobolajr m.	W.
6	lowbanajr	Tyrach Krali (w d.)	S.
7	Rozbest Chyrt	Wasntego h. lac.	C.
8	Socor h. Bob.	Sowaryna op.	P.
9	Stożana Macz.	Wacaryna g.	S.
10	200 Macz.	Wacaryna g.	H.
11	22 Młodocim	Wacaryna g.	P.
12	Arzyzi	Hylaj m.	P.
13	Melajzi	Honorajzi	W.
14	Honorajzi	Hilarego dysk.	S.
15	2 Elywka	Wacaryna g.	L.
16	Melajzi	Makarogo I. op.	L.
17	Bobo 20 g.	Wacaryna g.	H.
18	Wacaryna g.	Wacaryna g.	P.
19	Wacaryna g.	Wacaryna g.	W.
20	Wacaryna g.	Wacaryna g.	S.
21	Wacaryna g.	Wacaryna g.	C.
22	Wacaryna g.	Wacaryna g.	P.
23	Wacaryna g.	Wacaryna g.	S.
24	Wacaryna g.	Wacaryna g.	C.
25	Wacaryna g.	Wacaryna g.	P.
26	Wacaryna g.	Wacaryna g.	S.
27	Wacaryna g.	Wacaryna g.	C.
28	Wacaryna g.	Wacaryna g.	P.

SWIĘTA ŚYDOWE

Rok 2008. 3. Post, Obiecenie Jerolimy.

Luty.

DNIE		Ś W I Ę T A	
		rzymsko-katolickie	grecko-katolickie
1	P.	Ignacego b.	19 Makarya
2	W.	NMP. Gromnicznej	20 Eufemija
3	Ś.	Błażeja bisk.	21 Maksyma
4	C.	Weroniki p.	22 Tymofteja ap.
5	P.	Agaty p. (☉ ¹)	23 Kłymentya m.
6	S.	Doroty p.	24 Ilenyi prep.
7	N.	Romualda op.	25 Hryhorya
8	P.	Jana z Malty	26 Ksenofonta
9	W.	Apolonii p.	27 Joana Chrys.
10	Ś.	Scholastyki	28 Jefrema
11	C.	Eufrozyny p.	29 Ilnatyja m.
12	P.	Eulalii p. m.	30 Trech Świat.
13	S.	Katarzyny Ricci. (☾ ²)	31 Kyra i Joana
14	N.	Walentego b.	1 Fewr. Tryf.
15	P.	Faustyna m.	2 Stritenie Hosp.
16	W.	Julianny	3 Symeon i Anny
17	S.	Konstancyi p.	4 Isydora
18	C.	Flawiana	5 Ahaftyi mucz.
19	P.	Konrada pust.	6 Wukoła pr.
20	S.	Nicefora m. (☉ ³)	7 Paftenya
21	N.	Eleonory kr.	8 Fteodora
22	P.	Piotra katedry	9 Nykofora m.
23	W.	Romany w.	10 Charłampyja
24	S.	Macieja ap. <i>Popiel.</i>	11 Własya <i>Popielec</i>
25	C.	Anastazyi p.	12 Meletya arch.
26	P.	Wiktora z A.	13 Martyniana
27	S.	Aleksandra b. (☾ ⁴)	14 Kiryła
28	N.	Romana w.	15 Onysyma

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

3 1 Adar., 14 mały Purim.

1) 9 w. pełnia. 2) 2 w. ost. kw. 3) 12 połd. nów. 4) 4 r. 1 kw.

Marzec.

1	ŚWIĘTA		DATA
2	tytułowo-kalendryczne	tytułowo-kalendryczne	
3	Marsja	krasocjo p.	1 P.
4	Kalunja	W. Wm. (Gromicznia)	2 W.
5	Maksyma	świątka św.	3 Ś.
6	Tryfonia	Marcja p.	4 C.
7	Krymowicza m.	Amaz p. (1)	5 P.
8	Henryk p.	Horody p.	6 Ś.
9	Hydyra	Romula p.	7 W.
10	Kennolda	Jana z Mally	8 P.
11	Jana Gury	Apollon p.	9 W.
12	Łucja	Świętobł.	10 Ś.
13	Łucja m.	Huboway p.	11 C.
14	Troch Świat.	Balaia p. m.	12 P.
15	Łucja i Joanna	Katarzyna Mł. (2)	13 Ś.
16	Łucja i Joanna	Walentego p.	14 W.
17	Święta Kł.	Łucja m.	15 P.
18	Święta Kł.	Łucja	16 W.
19	Łucja	Konstanty p.	17 Ś.
20	Abaty m.	Ławana	18 C.
21	Wakola p.	Konrada p.	19 P.
22	Łucja	Łucja m. (3)	20 Ś.
23	Łucja	Łucja m.	21 W.
24	Łucja	Łucja	22 P.
25	Łucja	Romany w.	23 W.
26	Łucja	Marcja p. Popiel	24 Ś.
27	Łucja	Łucja	25 C.
28	Łucja	Łucja z K.	26 P.
29	Łucja	Łucja m. (4)	27 Ś.
30	Łucja	Łucja m.	28 W.
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

Marzec.

DNIE		Ś W I Ę T A		
		rzymsko-katolickie	grecko-katolickie	
1	P.	Albina bisk.	16	Pamfyłyja
2	W.	Symplicyusza	17	Fteodora m.
3	Ś.	Kunegundy	18	Lwa pap. m.
4	C.	Kazimierza król.	19	Archypa Apost.
5	P.	Fryderyka op.	20	Łeona Jep.
6	S.	Kolety p.	21	Tymofteja pr.
7	N.	Tomasza z Akw. ☉ ¹⁾	22	SS. Mucz.
8	P.	Jana Bożego	23	Połykarpa
9	W.	Franciszki p.	24	Ob. hoł. św. Joana
10	Ś.	40 Męczenników	25	Izaria arch.
11	C.	Konstantyna	26	Porfiryra arch.
12	P.	Grzegorza W.	27	Prokopia
13	S.	Rozyny i Fryd.	28	Wasyłja
14	N.	Matyldy p.	1	Mart. Jewdokii
15	P.	Longina m. ☾ ²⁾	2	Fteodora m.
16	W.	Lubina m.	3	Ewtropia
17	Ś.	Gertrudy p.	4	Harasyrna
18	C.	Edwarda II kr.	5	Konona
19	P.	Józefa Obl.	6	42 Mucz. w S.
20	S.	Eufemii	7	Wasyłja m.
21	N.	Benedykta op. ☉ ³⁾	8	Fteofyłakta
22	P.	Oktawiana	9	SS. 40 Mucz.
23	W.	Wiktora m.	10	Kondrata
24	Ś.	Gabryela arch.	11	Sofronya
25	C.	Zwiast. NMP.	12	Fteofana
26	P.	Emanuela	13	Nykyfora
27	S.	Ruperta	14	Wenedykta
28	N.	Sykstusa ☾ ⁴⁾	15	Ahapia mucz.
29	P.	Cyryla dyak.	16	Sawyna
30	W.	Kwiryna	17	Aleksia pr.
31	Ś.	Balbiny	18	Kiryłła mucz.

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

4 Post Estery; 7 Purim; 8 Szusan Purim.

1) 4 r. pełnia. 2) 5 r. ost. kw. 3) 9 w. nów. 4) 6 w. 1 kw.

Kwiecień

S W I E T A		Kwiecień	
1	2	3	4
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	

Kwiecień.

DNIE		Ś W I Ę T A		
		rzymsko-katolickie	grecko-katolickie	
1	C.	Hugona	19	Chrysanfita
2	P.	Franciszka	20	Prep. Otec.
3	S.	Ryszarda	21	Jakowa
4	N.	Izydora	22	Wasyłya
5	P.	Wincentego F. ☉ ¹⁾	23	Nykona
6	W.	7 bol. N. M. P.	24	Zacharyi pre.
7	Ś.	Hermana wyzn.	25	Błach. P. Bohor.
8	C.	W. C. Dyonizego	26	Sobor Hawr.
9	P.	W. P. Maryi Egip.	27	Piatok wełyki
10	S.	W. S. Ezechiela pr.	28	Ilaryona pr.
11	N.	Wielkanoc. Leona p.	29	Woskr. Hospod.
12	P.	Pon. Wielk. Juliusza	30	Poned. Woskres.
13	W.	Justyna ☾ ²⁾	31	Wtorok Woskres.
14	Ś.	Waleryana m.	1	Aprif Mar.
15	C.	Kasyldy i L.	2	Tyta
16	P.	Lamberta	3	Nikity Fteod.
17	S.	Rudolfa b.	4	Josyła
18	N.	Apoloniusza m.	5	Fteodyła m.
19	P.	Emmy wd.	6	Jewtyhia
20	W.	Agnieszki ☉ ³⁾	7	Hrehorya Meł.
21	Ś.	Anzelma bisk.	8	Irydiona
22	C.	Sotera i Kaja	9	Jewpsychia
23	P.	Wojciecha b.	10	Terentya
24	S.	Jerzego	11	Antypy m.
25	N.	Marka ewang.	12	Wasyłya
26	P.	Kłeta i Marc.	13	Artemona
27	W.	Peregryna ☾ ⁴⁾	14	Mortyna
28	S.	Witalisa	15	Arystarcha
29	C.	Piotra męcz.	16	Ahapii
30	P.	Katarzyny S.	17	Symeona

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

6, 7, 12, 13 Passah.

1) 9 w. pełnia. 2) 4 w. ost. kw. 3) 6 r. nów. 4) 10 r. 1 kw.

1	DATA	
2	12	12
3	13	13
4	14	14
5	15	15
6	16	16
7	17	17
8	18	18
9	19	19
10	20	20
11	21	21
12	22	22
13	23	23
14	24	24
15	25	25
16	26	26
17	27	27
18	28	28
19	29	29
20	30	30
21	31	31
22	1	1
23	2	2
24	3	3
25	4	4
26	5	5
27	6	6
28	7	7
29	8	8
30	9	9
31	10	10

Maj.

DNIE		Ś W I Ę T A		
		rzymsko-katolickie		grecko-katolickie
1	S.	Filipa i Jak.	18	Joana
2	N.	Zygmunta króla	19	Joana Weł.
3	P.	Znalez. Krzyża ś.	20	Fteodora
4	W.	Floryana m.	21	Januaria
5	Ś.	Piusa V (☿ ¹⁾)	22	Fteodora Syk.
6	C.	Jana w Ol.	23	Heorhya m.
7	P.	Domiceli p.	24	Sawwy m.
8	S.	Stanisława b.	25	Marka Jew.
9	N.	Grzegorza	26	Wasyłya
10	P.	Izydora Oracza	27	Symeona
11	W.	Beatryksy p.	28	Jasona arch.
12	Ś.	Pankracego (☾ ²⁾)	29	Dewiat mucz.
13	C.	Serwacego	30	Jakowa
14	P.	Bonifacego	1	Maja. Jeremyi
15	S.	Zofii i 3 cór.	2	Aftanazyi
16	N.	Jana Nepomucena	3	Tymofteja
17	P.	Paschalisa W.	4	Petahyi m.
18	W.	Feliksa spow.	5	Iryny mucz.
19	S.	Piotra C. (☿ ¹⁾)	6	Jowa mnoh.
20	C	Wniebowst. P.	7	Woznosienie Hosp.
21	P.	Heleny kr.	8	Joana Boh.
22	S.	Julii p.	9	Isaji prep.
23	N.	Gezyderego	10	Symeona ap.
24	P.	Joanny p.	11	Mokija m.
25	W.	Urbana 1 p.	12	Jepyfanya
26	Ś.	Filipa Ner.	13	Hłyheryi mucz.
27	C.	Jana pap.	14	Izydora m.
28	P.	Filipa Ner. (☾ ⁴⁾)	15	Pachemyja
29	S.	Maksyma W.	16	Fteodora O
30	N.	Zesł. D. Ś. Feliksa	17	Sosz. ś. Ducha. Andr.
31	P	P. Z. S. Petroneli p.	18	Pon. Sosz. Fteodota

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

9 Lag Beomer; 26, 27 Zielone święta.

1) 1 w. pełnia. 2) 11 w. ost. kw. 3) 3 w. nów. 4) 2 r. 1 kw.

Czerwiec.

DNIE		Ś W I Ę T A		
		rzymsko-katolickie	grecko-katolickie	
1	W.	Nikodema	19	Patryki Jep.
2	Ś.	Erazma b.	20	Ftataleja
3	C.	Klotyldy	21	Konstantyna
4	P.	Roberta ☉ ¹⁾	22	Wasyłyja
5	S.	Florentyny	23	Mychaila
6	N.	Trójcy S. Norberta	24	Symeona
7	P.	Roberta b. m.	25	Obr. Hł. ś. Joana
8	W.	Medarda	26	Karpa ap.
9	Ś.	Felicyana pr.	27	Ftearoponta
10	C.	Małgorzaty	28	Nykity
11	P.	Barnaby ☾ ²⁾	29	Fteodoryi
12	S.	Onufrego	30	Issakija
13	N.	Antoniego z Padwy	31	Jeremy A.
14	P.	Bazylego	1	Justyna
15	W.	Wita i Modesta	2	Nykifora
16	Ś.	Franciszka reg.	3	Łukilyana
17	C.	Adolfa bisk. ☉ ³⁾	4	Mytrofana
18	P.	Marka	5	Dorofteja
19	S.	Gerwaz. i Prot.	6	Wys.
20	N.	Sylwezyusza	7	Fteodota świaszcz.
21	P.	Alojzego Gonzagi	8	Fteodora m.
22	W.	Paulina bisk.	9	Kiryła arch.
23	Ś.	Zenona bisk.	10	TymoŃteja
24	C.	Jana Chrzciela	11	Warftołomeja
25	P.	Prospera b. ☾ ⁴⁾	12	Onufr. prep.
26	S.	Jana i Pawła	13	Akiłyny
27	N.	Władysława kr.	14	Etyseja
28	P.	Leona pap.	15	Amosa pror.
29	W.	Piotra i Pawła	16	Tychona
30	S.	Lucyny i Emilii	17	Manuila

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

5, 6. Zielone Święta; 30 1 Tamuz.

1) 2 r. pełnia. 2) 4 r. ost. kw. 3) półn. nów. 4) 8 w. 1 kw.

Lipiec.

1	Dzień	
2	czwartek	czwartek
3	piątek	piątek
4	sobota	sobota
5	niedziela	niedziela
6	poniedziałek	poniedziałek
7	wtorek	wtorek
8	środa	środa
9	czwartek	czwartek
10	piątek	piątek
11	sobota	sobota
12	niedziela	niedziela
13	poniedziałek	poniedziałek
14	wtorek	wtorek
15	środa	środa
16	czwartek	czwartek
17	piątek	piątek
18	sobota	sobota
19	niedziela	niedziela
20	poniedziałek	poniedziałek
21	wtorek	wtorek
22	środa	środa
23	czwartek	czwartek
24	piątek	piątek
25	sobota	sobota
26	niedziela	niedziela
27	poniedziałek	poniedziałek
28	wtorek	wtorek
29	środa	środa
30	czwartek	czwartek

Lipiec.

DNIE		Ś W I Ę T A		
		rzymsko-katolickie	grecko-katolickie	
1	C.	Teobalda op.	18	Łeontya
2	P.	Nawiedzenie NMP.	19	Judy ap.
3	S.	Heliodora ☿ ¹⁾	20	Meftodyja
4	N.	Józefa Kalas.	21	Jułyana mucz.
5	P.	Filomeny	22	Jewsewyja
6	W.	Izajasza pror.	23	Ahrypiny
7	Ś.	Pulcheryi	24	Rezd. S. Joana
8	C.	Elżbiety król.	25	Fewronyi pr.
9	P.	Cyryła b.	26	Dawyda Ft.
10	S.	Amalii p. ☾ ²⁾	27	Samsona pr.
11	N.	Pelagii p.	28	Kyra i Joana
12	P.	Henryka Jana Gw.	29	Petra i Pawła
13	W.	Małg. p. J. z D.	30	Sobor 12 Ap.
14	Ś.	Bonawentury	1	Juł. Kosmy i Dam
15	C.	Rozesł. Apost.	2	Poł. Ryzy Boh.
16	P.	NMP. Szkapł.	3	Jakynfta
17	S.	Aleksego ☿ ³⁾	4	Andreja
18	N.	Szymona z L.	5	Aftynazya Air.
19	P.	Wincentego z P.	6	Syzona pr.
20	W.	Czesława	7	Fłomy pr.
21	Ś.	Praksedy	8	Prokopya
22	C.	Maryi i Magdal.	9	Pankratya ep.
23	P.	Apolinarego b. m.	10	SS. 44 Mucz.
24	S.	Krvstyny	11	Jewtimija
25	N.	Jakóba ap. ☾⁴⁾	12	Prokla
26	P.	Anny	13	Sabor s. Hawł.
27	W.	Natalii p. Kun. p.	14	Akyły ap.
28	S.	Inocentego	15	Kyraka m.
29	C.	Marty	16	Aftynokema
30	P.	Abdona i Sen.	17	Martyny
31	Ś.	Ignacego Loj.	18	Jemyłana

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

6 Post. Zdobycie świątyni. 27 Spalenie świątyni.

1) 1 w. pełnia. 2) 8 r. ost. kw. 3) 12 pld. nów. 4) 1 w. 1 kw.

Sierpień.

1	S W I E T A		2
2	czarna Katalin	czarna Katalin	3
4	18	19	4
5	20	20	5
6	21	21	6
7	22	22	7
8	23	23	8
9	24	24	9
10	25	25	10
11	26	26	11
12	27	27	12
13	28	28	13
14	29	29	14
15	30	30	15
16	1	1	16
17	2	2	17
18	3	3	18
19	4	4	19
20	5	5	20
21	6	6	21
22	7	7	22
23	8	8	23
24	9	9	24
25	10	10	25
26	11	11	26
27	12	12	27
28	13	13	28
29	14	14	29
30	15	15	30
31	16	16	31

Sierpień.

DNI	Ś W I Ę T A	
	rzymsko-katolickie	grecko-katolickie
1	N. Piotra w okow. ☉ ¹⁾	19 Makryny
2	P. N. M. P. Anielskiej	20 Ilyi pror.
3	W. Znaleź. św. Szczep.	21 Symeona
4	S. Dominika W.	22 Maryi Mahdal.
5	C. NMP. Snież.	23 Trofyma m.
6	P. Przemienienie P.	24 Chrystyny m.
7	S. Kajetana W.	25 Uспен. ś. Anny
8	N. Cyryaka męcz ☾ ²⁾	26 Jermołaja
9	P. Romana i Sek.	27 Pantalejmona
10	W. Wawrzyńca m.	28 Prohora i Nik
11	S. Zuzanny p.	29 Kallynyka
12	C. Klary p.	30 Syły ap.
13	P. Hipolita m.	31 Jewdokima
14	S. Euzebiusza	1 Awł. Prois
15	N. Wniebowzięcie NMP.	2 Stefana m.
16	P. Rocha wyzn. ☉ ³⁾	3 Izaakija
17	W. Liberata op. Jacka w.	4 7 Otrok. w Et.
18	Ś. Heleny	5 Jewsychnia
19	C. Benigny	6 Preobr. Hospod.
20	P. Stefana kr.	7 Dometrya
21	S. Joanny Frem	8 Jemylyana
22	N. Filiberta	9 Maftea ap.
23	P. Filipa bisk.	10 Lawrentya m
24	W. Barłomieja ☽ ⁴⁾	11 Jewpła arch.
25	Ś. Ludwika kr.	12 Fotya Mucz.
26	C. Zefiryńy	13 Maksyma p.
27	P. Przen. św. Kaz.	14 Mycheja pr.
28	S. Augustyna	15 Uспен Bohor.
29	N. Ścięcie ś. Jana	16 Nerukoł Obr.
30	P. Róży z Limy	17 Myrona
31	W. Rajn. w. Joach. ☉ ⁵⁾	18 Flora z Ławra

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

6 Post. Spalenie Świątyni. 28 1 Elul.

¹⁾ 10 w. pełnia. ²⁾ 1 w. ost. kw. ³⁾ 1 r. nów. ⁴⁾ 5 r. 1 kw. ⁵⁾ 6 r. pełnia.

Wrzesień.

1	S W I E T A		2
3	10	11	12
4	20	21	22
5	30	31	
1	10	11	12
2	20	21	22
3	30	31	
4	10	11	12
5	20	21	22
6	30	31	
7	10	11	12
8	20	21	22
9	30	31	
10	10	11	12
11	20	21	22
12	30	31	
13	10	11	12
14	20	21	22
15	30	31	
16	10	11	12
17	20	21	22
18	30	31	
19	10	11	12
20	20	21	22
21	30	31	
22	10	11	12
23	20	21	22
24	30	31	
25	10	11	12
26	20	21	22
27	30	31	
28	10	11	12
29	20	21	22
30	30	31	

Wszystkie dni miesiąca są wolne. W dniach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 września.

Wrzesień.

DNIE		Ś W I Ę T A		
		rzymsko-katolickie	grecko-katolickie	
1	S.	Idziego op.	19	Andreja str.
2	C.	Justa b.	20	Samuła pr.
3	P.	Izabeli i Bron.	21	Ftadeja
4	S.	Rozalii p.	22	Ahaftonika
5	N.	Wawrzyńca b.	23	Luppa mucz.
6	P.	Zacharyasza ☾ ¹⁾	24	Ewtychia
7	W.	Reginy	25	Wartolomeja
8	Ś.	Narodz. NMP.	26	Adriana
9	C.	Gorgonjusza	27	Pymona pr.
10	P.	Mikołaja z Tol.	28	Mojseja
11	S.	Jacka i Prota	29	Usł. hr. ś. Joan.
12	N.	Gwidona w. Waler.	30	Aleksandra
13	P.	Tobiasza Filipa	31	Poł. poj. p. Boch.
14	W.	Podw. ś. Krz. ☽ ²⁾	1	Septem. Symeona
15	Ś.	Nikodema	2	Mamanta
16	C.	Ludmili p.	3	Anfityma
17	P.	Lamberta	4	Wawyły
18	S.	Tomasza z W.	5	Zacharya
19	N.	Januaryusza	6	Wosp. cz. Mich.
20	P.	Eustachiusza	7	Sozanta
21	W.	Mateusza ew.	8	Roz. pr. Bohor.
22	Ś.	Maurycego b. ☽ ³⁾	9	Joakima i Anny
23	C.	Tekli p.	10	Mynodory m.
24	P.	Gerarda	11	Fteodory pr.
25	S.	Kleofasa m.	12	Awlemona
26	N.	Cypryana	13	Kornyła Pol.
27	P.	Kosmy i Damiana	14	Woz. cz. kr.
28	W.	Wacława kr.	15	Nikity
29	S.	Michała arch. ☽ ⁴⁾	16	Jewfimy
30	C.	Hieronima w.	17	Sofii mucz.

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

16 Nowy rok 5670; 17 Drugie Święto Nowego roku. 19 Post Gedalija. 25 Święto pojedn (Sądny dzień). 30 Święto Kuczek.

1) 9 w. ost. kw. 2) 4 w. nów. 3) 8 w. 1 kw. 4) 2 w. pełnia

Październik.

S W I E T A		LITWA	
1	2	3	4
1	greko-katolickie	rymsko-katolickie	1
2	Andrzej sż.	Łazareo op.	2
3	Zmowa pr.	Józef B.	3
4	Pradzi	Jan i Piotr	4
5	Andrzej	Wojciech	5
6			6
7	Łazarz m.	Wawrzyn B.	7
8	Wawrzyn	Zacharyasz (B.)	8
9	Wawrzyn	Reiny	9
10	Adrian	Karol NMP.	10
11	Zymon pr.	Grzegorz	11
12	Melchj	Wojciech i Tel.	12
13	Jan i Jan.	Józef i Piotr	13
14	Aleksander	Wojciech i Wł.	14
15	Pol. poj. g. Boż.	Tobiasz i Filip	15
16	Sezem, Symon	Łow. i Kł. (B.)	16
17	Sezem	Włodzisław	17
18	Antan	Jan i Piotr	18
19	Wawrzyn	Jan i Piotr	19
20	Zacharyasz	Tomasz i W.	20
21	Woj. cz. Mich.	Janusz	21
22	Sezem	Zacharyasz	22
23	Pol. m. Boż.	Wojciech i W.	23
24	Łazareo i Anny	Janusz (B.)	24
25	Włodzisław	Tobiasz	25
26	Włodzisław	Grzegorz	26
27	Karol NMP.	Cyryl m.	27
28	Woj. cz. Kł.	Cyryl	28
29	Włodzisław	Reiny i Włodzisław	29
30	Włodzisław	Włodzisław	30
31	Włodzisław	Włodzisław	31
32	Włodzisław	Włodzisław	32
33	Włodzisław	Włodzisław	33
34	Włodzisław	Włodzisław	34
35	Włodzisław	Włodzisław	35
36	Włodzisław	Włodzisław	36
37	Włodzisław	Włodzisław	37
38	Włodzisław	Włodzisław	38
39	Włodzisław	Włodzisław	39
40	Włodzisław	Włodzisław	40
41	Włodzisław	Włodzisław	41
42	Włodzisław	Włodzisław	42
43	Włodzisław	Włodzisław	43
44	Włodzisław	Włodzisław	44
45	Włodzisław	Włodzisław	45
46	Włodzisław	Włodzisław	46
47	Włodzisław	Włodzisław	47
48	Włodzisław	Włodzisław	48
49	Włodzisław	Włodzisław	49
50	Włodzisław	Włodzisław	50
51	Włodzisław	Włodzisław	51

Woj. cz. Kł. (B.) 4 w. now. (B.) 5 w. 1 kw. (B.) 6 w. 2 kw.

Październik.

DNIE		Ś W I Ę T A	
		rzymsko-katolickie	grecko-katolickie
1	P.	Remigiusza	18 Ewemenya
2	S.	Leodgara	19 Trofyma m.
3	N.	Kandyda męcz.	20 Eustafia
4	P.	Franciszka Ser.	21 Kodrata
5	W.	Placydy	22 Foky mucz.
6	Ś.	Brunona ☾ ¹⁾	23 Zacz. Joan.
7	C.	Justyny p.	24 Ftekły m.
8	P.	Brygidy w.	25 Eufrozyny
9	S.	Wincentego K.	26 Joana Boh.
10	N.	Franciszka Borg	27 Kałystrata
11	P.	Placydy męcz.	28 Charytona
12	W.	Maksymiliana	29 Kyriaka
13	Ś.	Edwarda k.	30 Hrehorya
14	C.	Kaliksta pap. ☽ ²⁾	1 Okt. Pokr. P. B
15	P.	Jadwigi i Teres.	2 Kyprijana
16	S.	Gawła ap.	3 Dyonisia
17	N.	Lucyny, Wiktora	4 Jerofteja
18	P.	Łukasza ew.	5 Charytyny
19	W.	Piotra z A. Jana K.	6 Ftomy ap.
20	Ś.	Felicyana	7 Serhya
21	C.	Urszuli p.	8 Pełahyi
22	P.	Korduli p. ☽ ³⁾	9 Jakowa ap.
23	S.	Jana Kapistr.	10 Jewłampia
24	N.	Rafała arch.	11 Fytypa ap.
25	P.	Kryspiny	12 Prowa mucz.
26	W.	Ewarysta	13 Karpa
27	S.	Sabmy	14 Nazarya i Par.
28	C.	Szym. i Tad. ☽ ⁴⁾	15 Jewfymija
29	P.	Narcyza b.	16 Łonhyna m.
30	S.	Klaudyusza	17 Osvi pr.
31	N.	Wołfganga	18 Lukii Ew.

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

1 Drugie święto Kuczak; 6 Święto palm.; 7 Koniec Kuczek;
8 Radość z prawa.

¹⁾ 8 r. ost. kw. ²⁾ 9 r. nów. ³⁾ 8 r. 1 kw. ⁴⁾ 11 w. pełnia.

Listopad.

1	S W I E T A		2
3	18	19	20
4	21	22	23
5	24	25	26
6	27	28	29
7	30	31	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

Listopad.

DNIE		Ś W I Ę T A		
		rzymsko-katolickie	grecko-katolickie	
1	P.	Wszystkich Sw.	19	Joita pror.
2	W.	Dzień zaduszny	20	Artemija
3	S.	Huberta	21	Irałyona pror.
4	C.	Karola Bor. ☾ ¹⁾	22	Awerkyja
5	P.	Elżbiety	23	Jakowa
6	S.	Leonarda W.	24	Arefty
7	N.	Herkulana	25	Makaryona
8	P.	4 Koronałów	26	Demetrya
9	W.	Teodora męcz.	27	Nestora m.
10	S.	Andrzeja z Awel.	28	Terentya m.
11	C.	Marcina bisk.	29	Anastazyi m.
12	P.	Marcina p.	30	Pawła arch.
13	S.	Eugeniusza ☿ ²⁾	31	Stachya
14	N.	Serafina wyzn.	1	Noj. Kos. i Dam.
15	P.	Leop., Stanisł. K.	2	Akindyna m.
16	W.	Edmunda	3	Akepsyma m.
17	S.	Salomei p.	4	Joannyka Prep.
18	C.	Otona	5	Halaktyona
19	P.	Elżbiety kr.	6	Zenowia m.
20	S.	Feliksa ☾ ³⁾	7	Jerona
21	N.	Ofiarow NPMaryi	8	Mychaita Arch.
22	P.	Cecylii p.	9	Onysifora
23	W.	Klemensa pap.	10	Erasta ap.
24	S.	Jana od Krzyża	11	Myny Mucz.
25	C.	Katarzyny p.	12	Joana Myt.
26	P.	Konrada m.	13	Joana Złot.
27	S.	Wirgiliusza ☿ ⁴⁾	14	Fylypa ap.
28	N.	Krescentego	15	Hurya i Sams.
29	P.	Saturnina m.	16	Mafteja ap.
30	W.	Andrzeja ap.	17	Hryhorya Neok.

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE

25 1 Kislev.

1) 11 w. ost. kw. 2) 3 r. nów. 3) 6 w. 1 kw. 4) 10 r. pełnia.

Grudzień

1	S W I E T A		2
2	rymsko-katolickie	rymsko-katolickie	3
3	12 Jola pror.	Wszystkich Św.	4
4	20 Anthonis	Dzień zaduszny	5
5	21 Anthonis pror.	Anthonis	6
6	22 Awentyn	23 Awentyn	7
7	24 Awentyn	25 Awentyn	8
8	Makarjona	Herkulan	9
9	Dometyj	4 Kolumbów	10
10	27 Kolumbów	28 Kolumbów	11
11	29 Kolumbów	30 Kolumbów	12
12	30 Pawła apł.	Marcina bisk.	13
13	31 Szymon	1 Kuznietz	14
14	1 Nowy Kor i Dan	Szwajcyr	15
15	2 Anthonis m.	3 Anthonis m.	16
16	3 Anthonis m.	4 Anthonis m.	17
17	4 Anthonis m.	5 Anthonis m.	18
18	5 Anthonis m.	6 Anthonis m.	19
19	6 Anthonis m.	7 Anthonis m.	20
20	Wszystkich Św.	Wszystkich Św.	21
21	8 Anthonis m.	9 Anthonis m.	22
22	9 Anthonis m.	10 Anthonis m.	23
23	10 Anthonis m.	11 Anthonis m.	24
24	11 Anthonis m.	12 Anthonis m.	25
25	12 Anthonis m.	13 Anthonis m.	26
26	13 Anthonis m.	14 Anthonis m.	27
27	14 Anthonis m.	15 Anthonis m.	28
28	15 Anthonis m.	16 Anthonis m.	29
29	16 Anthonis m.	17 Anthonis m.	30
30	17 Anthonis m.	18 Anthonis m.	31

Grudzień.

DNIE	S W I E T A			
	rzymsko-katolickie		grecko-katolickie	
1	S.	Eligiusza bisk.	18	Platona
2	C.	Bibianny p.	19	Awdyja
3	P.	Francisz. Ksaw.	20	Hryhora Dek.
4	S.	Barbary p. ☾ ¹⁾	21	Wgh. pr. Bohared.
5	K.	Sabby opata	22	Fwlymona
6	P.	Mikołaja bisk.	23	Amiylotyja
7	W.	Ambrożego	24	Ekateryny
8	S.	Niep. pocz. NMP.	25	Klymenta
9	C.	Leokadyi p.	26	Atyppa prep.
10	P.	N. M. P. Loretańs.	27	Jakowa m.
11	S.	Damazego	28	Stefana m.
12	N.	Aleks. żołn. ☽²⁾	29	Paramona
13	P.	Łucyi i Ottylii	30	Andreja
14	W.	Spiryd. bisk.	1	Dekr. Nauma
15	S.	Fortunata	2	Awakuma
16	C.	Adelajdy Ces.	3	Sofonia prep.
17	P.	Łazarza b.	4	Warwary m.
18	S.	Gracyana m.	5	Sawwy
19	N.	Nemezyusza	6	Nykołaja Ep.
20	P.	Teofila m. ☾ ³⁾	7	Amwrozya
21	W.	Tomasza apost.	8	Patapia
22	S.	Zenona m.	9	Zaczat. Bohor
23	C.	Wiktoryi p.	10	Myny i Ermob.
24	P.	Adama i Ewy. Wig	11	Danyiła
25	S.	Boże Narodzenie	12	Spirydyona
26	N.	Śzczep. p. m. ☽⁴⁾	13	Ewastratyja
27	P.	Jana ew.	14	Ftyrsa
28	W.	Młodzianków	15	Jefewteryja
29	S.	Tomasza bisk.	16	Ahhea
30	C.	Dawida Kr.	17	Sewastyona
31	P.	Sylwestra	18	Wonyfatya.

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE.

8 Poświęcenie Świątyni; 22 Obleżenie Jerozolimy.

1) 5 w. ost. kw. 2) 9 w. nów. 3) 3 r. 1 kw. 4) 10 w. pełnia.

Atrament: znaczny:

Czerwonny
 Niebieski
 Zielony
 Czarny

Terminarz na rok 1909.

Tabelka ta służy do oznaczenia wszelkich terminów: płatności czynszu, weksli, stałych zgromadzeń, zebrań towarzystw i t. p. Wystrzeżenia podkreślił Hezbe dnia odpowiednią barwą, atramentem lub ołówkiem, ustalwszy wyzród którą barwą, co oznacza, co należy uwidocznić w górnych bocznych tabliczkach.


Ołówek znaczny:

Czerwonny
 Niebieski
 Zielony
 Czarny

	Styczeń	Łuty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
Niedziela	3 10 17 24 31	7 14 21 28	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27
Poniedziałek	4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28
Wtorek	5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29
Środa	6 13 20 27	3 10 17 24	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30
Czwartek	7 14 21 28	4 11 18 25	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24
Piątek	8 15 22 29	5 12 19 26	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25
Sobota	9 16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26
Lipiec						
Niedziela	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
Poniedziałek	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
Wtorek	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
Środa	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
Czwartek	8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
Piątek	9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
Sobota	10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
Sierpień						
Niedziela	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
Poniedziałek	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
Wtorek	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
Środa	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
Czwartek	8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
Piątek	9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
Sobota	10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
Wrzesień						
Niedziela	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
Poniedziałek	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
Wtorek	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
Środa	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
Czwartek	8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
Piątek	9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
Sobota	10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
Październik						
Niedziela	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
Poniedziałek	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
Wtorek	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
Środa	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
Czwartek	8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
Piątek	9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
Sobota	10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
Listopad						
Niedziela	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
Poniedziałek	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
Wtorek	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
Środa	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
Czwartek	8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
Piątek	9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
Sobota	10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
Grudzień						
Niedziela	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
Poniedziałek	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
Wtorek	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
Środa	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
Czwartek	8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
Piątek	9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
Sobota	10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25

NALEŻYTOŚCI STEMPLOWE

Skala I.			Skala II.			Skala III.		
Weksle i assygnaty			Kwity i dokumenty w sprawach prawnych.			Ugody pożyczkowe kontrakty służbowe i kwity za wygrane loteryjne.		
	do K.	K. h.		do K.	K. h.		do K.	K. h.
nad	150	—'10	nad	40	—'14	nad	20	—'26
150	300	—'20	40	80	—'26	20	40	—'26
300	600	—'40	80	120	—'38	40	60	—'38
600	900	—'60	120	200	—'64	60	100	—'64
900	1.200	—'80	200	400	1'26	100	200	1'26
1.200	1.500	1'00	400	600	1'88	200	300	1'88
1.500	1.800	1'20	600	800	2'50	300	400	2'50
1.800	2.100	1'40	800	1.600	5'—	400	800	5'—
2.100	2.400	1'60	1.600	2.400	7'50	800	1.200	7'50
2.400	2.700	1'80	2.400	3.200	10'—	1.200	1.600	10'—
2.700	3.000	2'—	3.200	4.000	12'50	1.600	2.000	12'50
3.000	6.000	4'—	4.000	4.800	15'—	2.000	2.400	15'—
6.000	9.000	6'—	4.800	6.400	20'—	2.400	3.200	20'—
9.000	12.000	8'—	6.400	8.000	25'—	3.200	4.000	25'—
12.000	15.000	10'—	8.000	9.600	30'—	4.000	4.800	30'—
15.000	18.000	12'—	9.600	11.200	35'—	4.800	5.600	35'—
18.000	21.000	14'—	11.200	12.800	40'—	5.600	6.400	40'—
21.000	24.000	16'—	12.800	14.400	45'—	6.400	7.200	45'—
24.000	27.000	18'—	14.400	16.000	50'—	7.200	8.000	50'—
i t. d., za każde nastę- pne 3.000 K o 2 K wię- cej, licząc kwoty niżej 3.000 za pełne.			Nad 16.000 K każde 800 K o 2 K 50 h. więcej, licząc kwoty niżej 800 K za pełne.			Nad 8.000 K każde dal- sze 400 K o 2 K 50 h. więcej, licząc kwoty ni- żej 400 K za pełne.		



Kalendarz myśliwski dla Galicji wraz z W. Ks. Krakowskiem.

według §. 33 ust. łowieckiej z 5 marca 1897, Dz. ust. kr. Nr. 71.

Rodzaj zwierzyny	Pole <input type="checkbox"/> oznacza czas polowania. Pole <input checked="" type="checkbox"/> czas ochrony.											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Jelenie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kozły (rogacze)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zające	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jarzabki	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Głuszcze i cietrzewie (koguty)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kuropatwy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bażanty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Przepiórki i dzikie gołębie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dropie, pardwy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Płactwo błotne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Płactwo wodne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zając, sarny, cielęta, spiczaki, kury głuszców i cietrzewi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kalendarz rybacki dla Galicji wraz z W. Ks. Krakowskiem.

(rozporz. c. k. Namiestnictwa z d. 21 sierpnia 1890 L. 55183. D. u. k. Nr. 38, z d. 31 sierpnia 1896 L. 65655. D. u. k. Nr. 56 i z d. 5 maja 1902 L. 7079. D. u. k. Nr. 43, wydane do §§ 54 i 64 ustawy o rybołówstwie z dnia 31 października 1897. D. u. k. Nr. 39 z r. 1890).

Minimalna miara ryb, mierzy się od początku głowy do końca ogona. Ryb nie mających minimalnej miary, jakoteż ryb w czasie ochrony łapać, sprzedawać lub w domach gościnnych podawać nie wolno.

Rodzaj ryby	Stycz.	Luty	Marzec	Kwiec.	Maj	Czerw.	Lipiec	Sierp.	Wrzes.	Paźdz.	Listop.	Grudz.	Minimalna miara w em.	<input checked="" type="checkbox"/> oznacza czas ochrony.
Brzana . . .					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							25	
Brzanka . .													16	
Cyrta													20	
Czczuga . .													30	
Czop				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								16	
Głowacia . .			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								40	
Jaź			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									25	
Kłonek . . .													20	
Leszcz . . .						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						25	
Lipień			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								20	
Łosoś										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30	
Pstrąg									<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20	
Sandacz . . .				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								40	
Swinka . . .				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								20	
Węgorz . . .													40	
Wyrozub . .				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								40	
Rak samiec .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	
Rak samica .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	

Gatunki ryb obok nie wymienione nie mają prawa ochrony (nie wyznaczono dla nich ani czasu ochrony ani minimalnej miary).

Wyciąg z przepisów pocztowych i telegraficznych.

Listy zwyczajne. Oplata w monarchii austriacko-węgierskiej do Niemiec (do 20 gr.) 10 h., nad 20 gr. do 250 gr. 20 h. (najwyżej 250 gr.)

Za granicę, do innych państw 25 h. za 15 gr. bez ograniczenia wagi.

Za listy nieopłacone podwójna opłata. Za listy urzędowe uiszcza adresat pojedynczą opłatę t. j. 10 h. a względnie 20 h.

Akta urzędowe (w Austrii i Niemczech jak listy) za 50 gr. = 5 h., najmniej 25 h.

Listy poste restante są przechowywane w urzędach pocztowych przez 2 miesiące.

Karty korespondencyjne po 5 h. do wszystkich krajów monarchii austriackiej i do Niemiec, 10 h. do wszystkich innych krajów. Można używać kart korespondencyjnych własnego wyrobu, jednakże muszą być tej samej wielkości i na takiej samej grubości papierze jak urzędowe i muszą mieć napis w języku niemieckim: »Correspondenzkarte«, obok którego może być napis w języku krajowym.

Listy polecane. Listy zwyczajne i karty korespondencyjne mogą być polecane za opłatą 25 h., — nadawca otrzymuje receptę. Jeżeli list zaginął, nadawca ma prawo żądać wynagrodzenia 50 kor. Listy polecane wysyłane w kraju można reklamować w przeciągu 6 miesięcy. Na listy przesyłane za granicę służy prawo reklamowania rok cały od dnia nadania listu.

Listy polecane z pobraniem pocztowem można wysyłać do całej austro-węgierskiej monarchii, do Belgii, Francji, Luxemburgu, Niemiec, Szwajcaryi, Tunisu i Włoch do 1000 kor. = 800 marek = 1000 franków, Szwecyi i Norwegi 720 koron, Holandyi 1000 koron. Oplata jak zwykle listy polecane; na stronie adresowej w górze wyraźnie napisać »za pobraniem« (*Nachnahme* lub *Remboursement*) a pobrać się mająca kwota winna być podana w walucie kraju przeznaczenia (oddawczego) tak w liczbach jak i w słowach, a poniżej tego dokładny adres nadawcy. Pobrana należność zostanie przesłana nadawcy przekazem pocztowym, po odtrąceniu należności za przekaz, odpowiednio do wysokości kwoty i należności za pobranie w kwocie 10 h. Za receptę zwrotną opłaca się 25 hal.

Druki. Należność wynosi do wszystkich miejscowości państwa austriackiego i do Niemiec do 50 gr. 3 h., do 100 gr. 5 h., do 250 gr. 10 h., do 500 gr. 20 h., do 1000 gr. 30 h. Pod opaską nie wolno posyłać listów. Do innych krajów za każde 50 gr. 5 h. (do 2 kg.). Wymiar największy 45×45 cm, lub rolka 75×10 cm.

Próby towarów muszą być opłacone i nie mogą więcej ważyć jak 350 gramów. Oplata wynosi do wszystkich krajów monarchii austriackiej i do Niemiec do: 250 gramów 10 h., do 350 gramów 20 hal. Do innych krajów za każde 50 gr. 5 h. Wymiar największy 30×20×10 cm, lub rolka 30×15 cm.

Oplata za pakiety bez podanej wartości, w Austrii i do Niemiec (odszkodowanie do 3 kg. najwyżej 15 kor., 3—5 kg. — 25 kor., dalszy kg. 5 kor.).

I. do wagi 5 kg.: a) na odległość 75 klm. 30 h. b) na dalszą odległość 60 h.

II. nad 5 kg.: a) za pierwsze 5 kg. jak powyżej pod I. b), za każdy dalszy kilogram lub część tegoż do 75 klm. strefa 1. 6 h., od 75—150 klm. strefa 2. 12 h., od 150—375 klm. strefa 3. 24 h., od 375—750 klm. strefa 4. 36 h., od 750—1125 klm. strefa 5. 48 h. od 1125 klm. strefa 6. 60 h.

Za przesyłki w stosunku do swej wagi przestrzenne lub niekształtne (Sperrgut) dużo miejsca zajmujące, trudne do upakowania (króliki, drób, szkło i t. p.) śluga się opłatę o połowę wyższą.

Do Rosyi europejskiej pakiety pocztowe (*Postpakete, colis postaux*) do wagi 5 klgr. i do wartości 50.000 franków. Opakowanie takie same jak w kraju, a oplata 1 kor. 75 h. bez różnicy oddalenia, zaś od wartości oplata asekuracyjna za każde 300 franków 10 h. Pakiety te muszą być przy nadaniu opłacone, a co do rozmiarów nie mogą w zasadzie przekraczać 60 cm. w którymkolwiek kierunku. Do innych krajów oplata za pakiety według specjalnych taryf.

Oplata od wartości deklarowanej wynosi w Austro-Węgrzech: do 100 kor. 6 h., do Niemiec ta sama oplata, lecz najmniej 12 h. zaś nad 100 do 600 kor. 12 h., a za każde dalsze 300 kor. 6 h. więcej. Do innych krajów według specjalnych taryf; wartość podaną być winna we frankach: 100 kor. = 104.17 fr.

Opakowanie przesyłek, powinno być mocne i trwałe. Przedmioty mniejszej wartości, którym przyciśnięcie nie szkodzi i ani tłuszczu, ani wilgoci z siebie nie wydzielają, mogą być zawinięte w mocny i gruby papier i obwiązane sznurkiem. Przedmioty większej wartości, a szczególnie takie, które mogą być uszkodzone przez wilgoć, tarcie lub przyciśnięcie (n. p. jedwabie), winny być zapakowane w ceratę, pudełka kartonowe lub skrzyneczki, stosownie do wartości i odległości, jaką mają przebyć. Dziczyznę, jeżeli już nie krwawi, można pojedynczo posyłać (n. p. jedna sarna, zając) także bez opakowania. Flaszki z płynami należy opakować w skrzynkach. Beczulki z płynami powinny być mocne i dobrze obite obręczkami. Owoce można także posyłać w mocnych koszykach. Pieczętki na przesyłkach winny być dokładnie odbite i tak umieszczone, aby bez popsucia pieczętki wewnątrz dostać się nie było można. Skrzynki zabite gwoździami, kufry zamknięte, jeżeli wartość nie jest podana, mogą być bez opieczętowania nadane. Niedostatecznie opakowane przesyłki mogą być przez urząd pocztowy tylko wtedy przyjęte, jeżeli nadawca na adresie napisze: «na własną odpowiedzialność» (auf eigene Gefahr), co także na receptysie nadawczym urząd pocztowy uwidocznia. Jeżeli przesyłka taka uszkodzoną zostanie, nadawca nie może się o odszkodowanie upominać. Adres na przesyłce jako też na liście pocztowym winien być dokładnym.

Jeżeli przesyłka zawiera pieniądze papierowe, banknoty lub monetę brzęczącą, ma być na adresie rzeczywista wartość podana tak w ogólnej sumie jakoteż pojedyncze rodzaje pieniędzy, n. p.: wartość: 5.450 K. 5 h., t. j. $\frac{5}{1000}$ $\frac{4}{100}$ $\frac{6}{10}$ i 5 h. Przy posyłce pa-

pierów wartościowych n. p. obligacyi, ma być wymieniona na adresie ilość sztuk i wartość tychże. Jeżeli przesyłka zawiera pieniądze obce, n. p. ruble, to należy wyszczególnić i rodzaj i ilość tychże, i wartość ogólną podać w monecie austriackiej, jeżeli przesyłka zawiera oprócz podanych jeszcze inne pieniądze, pocztą za nie nie bierze odpowiedzialności.

Do każdej przesyłki musi być dołączony adres przesyłkowy, opatrzony marką stemplową na 10 h., który nabywa się po 12 h. za sztukę. Do przesyłek za granicę mają być dołączone deklaracye cłowe i deklaracye statystyczne.

Przesyłki można także posyłać jako pilne (per expres): w takim razie ma to być na adresie przesyłkowym uwidocznione.

Listy pieniężne i listy z podaną wartością do wagi 250 gramów. Listy pieniężne wysyłać można w Austro-Węgrzech i do Niemiec. Oplata (ponad 75 km.) do 600 kor. 60 h., dalej za każde 300 kor. lub część tychże 6 hal. — Muszą być zapieczętowane pięcioma, a jeżeli się używa urzędowej koperty, dwoma pieczęciami. Listy pieniężne wysyłać można żądając przeliczenia pieniędzy na pocztę. Oplata od takiej wysyłki wyższa.

Listy z podaną wartością (Wertbrief — lettre de valeur) do innych krajów. Oplata jak za list polecony od każdych 15 gr. a asekuracja według specjalnej taryfy. Winny mieć napis: *«lettre de valeur»* oraz wartość podaną w koronach i frankach: 100 kor. = 104 1/7 fr.

Przekazy pieniężne krajowe (Postanweisungen). Przekaz kosztuje 3 h. Oplata wynosi: do 20 kor. 10 h., nad 20 kor. do 100 kor. 20 h., nad 100 kor. do 300 kor. 40 h., nad 300 kor. do 600 kor. 60 h., nad 600 kor. do 1000 kor. 1 kor.

Przekazy pieniężne za granicę przesyłane, mają być wystawiane w pieniądzech tych krajów, do których idą, według stałego kursu ustanowionego przez pocztę.

Do Niemiec (800 M.) do 40 kor. — 20 hal.; każde dalsze 20 kor. — 10 h., Anglii, Stanów Zjednocz. (500 kor.) Za każde 25 kor. — 25 h. Do Rosyi (100 rub.) za każde 25 kor. — 25 h.

Do wszystkich innych państw konwencji przekazowej od 25 do 100 kor. po 25 h. za 25 kor.; od 100 — 1000 po 25 h. za 50 kor.

Przekazy pieniężne telegraficzne. Oplata jest ta sama co przy przekazach zwykłych, z dodatkiem opłaty za telegram i w kraju za doręczenie telegramu adresatowi w miejscu 30 h.

Za pobraniem należitości wolno wysyłać przesyłki do wszystkich poczt w monarchii austriacko-węgierskiej aż do wysokości 1000 kor.

Należitość za przesyłki pilne (per expres), (listy pieniężne, listy wartościowe, pakiety i przesyłki za pobraniem pocztowym) uiszcza się przez przyklepienie marek listowych w kwocie 30 h., a 50 h. za pakiety, jeśli adresat mieszka w tem samym miejscu, paczka, nie cięższa nad 5 kg i wartość nie przenosi 1000 kor.

Telegramy.

Blankiet telegraficzny Kosztuje 2 h.

D. = Pilno. Depesza tak oznaczona ma pierwszeństwo przed

innemi prywatnemi; należytość takiej depeszy wynosi potrójną takse zwykłej depeszy.

Rp (x). Odpowiedź zapłacona. Należytość zapłaconej odpowiedzi za x. słów. Przekaz na zapłaconą odpowiedź jest ważny na sześć tygodni, i może być użyty do dowolnej miejscowości (stacyi telegraficznej). **RpD (x).** Odpowiedź pełna zapłacona. Należytość taka, jak przy depeszy pilnej. **TC.** Depesza kolacyonowana. Należytość wynosi czwartą część taksy nadanej depeszy. **PC.** Potwierdzenie wrócenia telegraficzne. Należytość równa jest taksie za depeszę z 10 wyrazów. **PR.** Dalsze przesłanie depeszy pocztą jako list polecony. Nadawca depeszy, prócz należytości za depeszę, ma zapłacić 35 h. jako należytość za list polecony. **XPP.** Należytość za posłańca zapłacona, podać ją pocztą. **FS.** Do przesłania. Adresat płaci za posłańca. **RO.** Doręczyć otwartą. **MP.** Do rąk własnych. **TR.** Do odebrania na stacyi telegraficznej. I Doręczyć za dnia. **GPR.** Do przechowania na poczcie polecione. **TM (x adresów).** Depesze tej samej treści z więcej adresami, a te mogą być:

a) do więcej adresatów w tej samej miejscowości;

b) do jednego adresata w tej samej miejscowości, lecz w różnych mieszkaniach.

W jednym i w drugim razie — prócz należytości za ilość wszystkich słów — dopłaca się o jeden raz mniej po 50 h., jak jest adresów, n. p. jeżeli depesza ma cztery adresy, to prócz należytości za ilość słów, dopłaca się trzy razy po 50 h. Po takim oznaczeniu następuje adres, treść depeszy i podpis.

Oddający depeszę ma prawo żądać legalizacji swego podpisu ze strony urzędu telegraficznego; jeżeli takowemu nie jest znany, to musi się wprzód wylegitymować.

Umieszczenie podpisów jest dowolnem, może być depesza i bez podpisu.

Depesza bez treści jest dozwoloną. Taka depesza musi mieć najmniej dwa słowa w adresie.

Na żądanie nadawcy depeszy, można otrzymać receptis za opłatą 10 h.

W depeszach europejskich piętnaście, a w pozaeuropejskich dziesięć liter stanowi jedno słowo. Pięć cyfr = jedno słowo.

Posłańca opłaca adresat lub nadawca. Ten ostatni przez złożenie odpowiedniej sumy przy nadaniu depeszy.

Zarejestrowanie skróconego adresu telegraficznego opłaca się na stacyi 40 kor. rocznie.

Taryfa opłaty za telegramy zagraniczne.

W Austrii i do Niemiec za każde słowo 6 h., nie mniej jak 60 hal. Ze stacyi kolejowych 8 h.

Do innych krajów taksa ogólna 60 h. i od słowa: do Belgii 19 h.; do Danii 21 h.; do Francji, Korsyki i Monaco 16 h.; do Anglii 26 h.; Włoch 16 h.; Czarnogóry 8 h.; Niderlandów (Holandyi) 19 h.; Norwegii 32 h.; Portugalii 33 h.; Rumunii 8 h.; Rosyi europejskiej 24 h. azjatyckiej 15 h.; Szwecyi 24 h.; Szwajcaryi 8 h.; Serbii 8 h.; Hiszpanii 28 h.; Turcyi europ. 28 h.; Turcyi azjatyckiej i do wysp 40 h.

Taryfy kolejowe towarowe.

Taryfa kolejowa towarowa austriacka, tak jak i osobowa ułożona jest strefowo, t. j. że im dalszą drogę odhyla towar, tem niższą opłaca stawkę od kilometra i kilograma. Podstawy jej są następujące: towar opłaca stawkę od kilograma i za każdy przebyty kilometr. Im towar jest mniejszej wartości tem niższą stawkę opłaca, przyczem znowu zwraca się uwagę, na miejsce, przestrzeń zajmowane przez niego. Towary, które przy niewielkiej wadze objętościowo zajmują dużo miejsca, opłacają specjalną, wyższą taryfę, n. p. siano, słoma, żywe zwierzęta i t. p. Szybkość dostawy towaru gra tu rolę w wysokości stawki przewozowej. Według szybkości dostawy towary dzielą się na: bagaż, przesyłki pospieszne tak zwane ekspresowe, towar pospieszny zwyczajny, towar zwykły.

Ilość nadawanego towaru za jednym listem nadawczym, czyli tak zwanym frachtem, wpływa też na wysokość stawki przewozowej. Taryfa rozróżnia całowagonowe ilości 10000 kilo, pół wagonowe, 5000 kilogr. i mniejsze ilości niż pół wagonu.

Nadawca ma prawo ubezpieczyć, wysyłany przezeń towar co do terminowej dostawy, za co pobiera kolej oddzielną opłatę (25 halerzy od 100 koron deklarowanej wartości towaru).

Terminy dostawy są stale naznaczone zależnie od odległości.

Pospieszny towar i żywe zwierzęta licząc od północy po nadaniu frachtu, od 1—300 klm. 2 dni, od 300—600 klm. 3 dni, od 600—900 klm. 4 dni,

Towar zwykły od 1—100 klm. 3 dni, od 100—300 klm. 4 dni, od 300—500 klm. 5 dni, od 500—700 klm. 6 dni, od 700—900 klm. 7 dni. — W razie przechodzenia z linii na linię, na oclenie i t. p. dodatkowy czas. Za nadzwyczajne wypadki żywiołowe i t. p. kolej nie odpowiada.

Za przetrzymanie tych terminów dostawy kolej odpowiada:

- A.** 1) W razie nieubezpieczonego towaru bez udowodnienia uszkodzenia towaru, za każdy dzień opóźnienia $\frac{1}{10}$ stawki przewozowej aż do połowy opłaty przewozowej najwyżej.
- 2) Za niezabezpieczony towar, a przy udowodnionem uszkodzeniu towaru do wysokości całej stawki przewozowej.
- B.** 1) Za ubezpieczony towar, a bez udowodnienia uszkodzenia towaru, $\frac{2}{10}$ stawki przewozowej za każdy dzień opóźnienia, aż do pełnej opłaty przewozowej.
- 2) Za ubezpieczony towar i przy udowodnionem uszkodzeniu towaru, do wysokości zabezpieczenia.

Żądanie przez nadawcę większej pewności dostawy przez umieszczenie w krytych wagonie towarów, które taryfa uważa, jako zwykle przewożone w okrytych wagonach, pociąga za sobą oddzielną opłatę, przez procentowe podniesienie wysokości stawki o 10 %.

Wiele taryf obowiązujących początkowo zostało następnie znizonych z ogólnie państwowych interesów, dla umożliwienia

rozprzestrzenienia większego danego towaru, dla podtrzymania przemysłu i rolnictwa danej okolicy lub też w specjalnych razach, jak nieurodzaje, wystawy, itp. Zboże, mleko, nawozy sztuczne, buraki cukrowe, artykuły spożywcze, wogóle prawie wszystkie towary produkcji rolniczej, lub przemysłu rolnego i zapotrzebowania gospodarstw, korzystają z takich specjalnie niższych taryf. Taryfy te obejmują albo całą linię kolejową, albo są ważne tylko w pewnych kierunkach i z pewnych miejscowości. Stąd powstały klasy taryf, tak, że poszczególne towary płać różne stawki przewozowe.

Koleje państwowe mają specjalne taryfy, koleje prywatne swoje, przeważnie wyższe.

Niżej przytaczamy taryfy kolei państwowych z wyszczególnieniem niektórych towarów dla rolnictwa ważniejszych.

Koleje państwowe rozróżniają 19 klas taryfy.

Klasy I, II, A, B, C, specjalnie 1, 2, 3, i niższe wyjątkowe I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. Klasy te służą dla ruchu towarowego zwykłego. Towar pospieszny zwyczajny ma klasę jedną zwykłą i dwie niższe.

Posyłki pospieszne opłacają stawkę bagażu pasażerskiego.

Najniższa stawka taryfowa dla towarów wszystkich prawem określona jest 0,2 halerzy za 100 kg. i 1 kilometr przebytej drogi, przy najmniejszej opłacie łącznej za 100 kg. 8 halerzy.

Wagę towaru zaokrągla się: przy pospiesznym towarze do 5 kg., przy bagażu, posyłkach pospiesznych, zwykłym towarze do 10 kg.

Najmniejsza odległość 8 km., najmniejsza opłata 20 hal. od bagażu, 40 hal. od towaru zwykłego i pospiesznego 60 hal. od posyłek pospiesznych.

Oprócz stawek taryfowych koleje pobierają jeszcze następujące opłaty: za frachty i kwity nadawcze 8 hal. za sztukę; opłata stemplowa nadawcza 10 hl.

Koszta przy ekspedycyi. Od 100 kg. za wyładowanie lub naładowanie z fur do magazynów kolejowych 2 hl.; w razie ciężkich i trudnych do przeniesienia towarów opłata ta zwiększa się aż do 14 hal.; za naładowanie z fur prosto do wagonu 3 hal.; duże ciężary aż do 12 hal.; za użytkowanie wind 4 hal.; za wazenie: pospieszny towar 4 hal.; zwyczajny do 500 kg. 2 hal.; wazenie pełnego wagonu 120 hal. za przeliczenie sztuk w wagonie 10 hal. od 10 sztuk, lub części tej liczby, za wagon 100 hal. up. deski.

Składowe: do wysyłki ma wysyłający 24 godzin czasu. Za przetrzymanie tego czasu opłaca za pospieszny towar 3 hal. od dnia i 100 kg., za zwyczajny od 100 kg. 0,4 hal. dziennie, oleje, wena i włókna 20 hal. Przy odbiorze towaru darmo: a) pospieszny pierwsze 48 godzin b) kosztowności: złoto, srebro itp. drogie towary, pierwsze 3 godziny. Za przetrzymanie tego terminu opłaca się a) od dnia i 100 kg. 3 hal. od b) 80 h. za godzinę. Towar zwyczajny: nie płaci się nic za pierwsze 24 godzin dla łatwo zapalnych i psujących się towarów; 48 godzin olei mineralnych; 4 doby reszty towarów.

Na niektórych stacyach termin wyładowywania krótszy.

Za następny czas płaci się składowe od dnia i 100 kg. za otwarty wagon 0,4 hal.; łatwo zapalne 20 hal. oleje 20 hal. wa-

runkowo przyjmowane 4 hal., wszystkie pozostałe 3 hal. Przerwa ruchu 0,4 hal. od dnia i 100 kg. od wagonu przy przewożeniu umarłych 6 godzin bezpłatnie, żywych zwierząt 6 godzin bezpłatnie, później 40 hal. od wagonu i godziny. W razie przetrzymania wagonu z rozporządzeń lekarskich lub weterynaryjnych 360 hal. dziennie.

Opłaty ołowe, które zalicza kolej i pobiera je.

Prowizya, za wydatki kolejowe zrobione gotówką: do 4 koron 4 hal. za wyższe sumy 2 %. Prowizya za pobrania kolejowe: $\frac{1}{2}$ % minim. 4 hal. Za uwiadomienie odbiorcy o nadejściu towaru 6 hal. od listu; za zabezpieczenie towaru od uszkodzenia 25 hal. od 100 koron; za przetrzymanie zwierząt w pomieszczeniach stacyjnych, ich żywienie, pojenie w drodze 20 hal. od sztuki lub 50 hal. od wagonu; żywienie i pojenie drobiu 50 hal. od 100 kg.; koszt wypożyczenia opon do nakrycia wagonów.

W razie niedokładnego obliczenia stawki przewozowej przez stację wysyłającą, ściągają się brakującą sumę przy odbiorze.

Przy nadawaniu towaru powinno się dokładnie i wyraźnie wypełnić kupon frachtowy w odpowiednich rubrykach. (Części kuponu w obwódkach 2 grubych linii są przeznaczone do wypełnienia przez urzędy kolejowe). Listy przewozowe dla towaru pospiesznego mają czerwoną obwódkę. Wypisać należy naprzód imię i nazwisko i adres odbiorcy. Stację odbiorczą z wymienieniem linii kolejowej. Rodzaj towaru, ilość sztuk, opakowanie, waga brutto, numer, oznaki. Wysokość ubezpieczenia towaru, względnie wartość takowego. Wysokość pobrania. Można wymagać wypłaty pobrania przed odebraniem przez odbiorcę w części lub całości, lub też po odebraniu towaru. Opłata frachtu może nastąpić z góry przez wysyłającego, lub można ją przekazać na odbierającego. W razie, jeśli towar wychodzi za granicę, trzeba to wypisać, że ulega on ocenie na tej i tej stacji. W końcu podać miejsce skąd wysyła się towar, dzień wystawienia kuponu, imię i nazwisko wysyłającego.

Wysyłający ma prawo również żądania wydania przez urząd kolejowy duplikatu kuponu frachtowego lub pokwitowania, które służy jako dowód wysłania towaru.

Przy odbiorze towaru powinno się zwracać uwagę na całość takowego, w razie przeciwnym powinno się reklamować u kolei.

Reklamacje kolejowe mają na celu poszukiwanie na zarządzie kolejowym strat poniesionych przez uszkodzenie towaru, brak takowego, lub też zwrot nadebranych pieniędzy za nieśluszenie, za wysoko porachowane należności przewozowe. Reklamację podaje się do zarządu tej kolei, która pobrała tę opłatę, piśmiennie z doręczeniem kuponu frachtowego, nie później niż w rok po odebraniu towaru. Różnice taryfowe wykrywają niekiedy również same zarządy kolejowe i ogłaszają o zwrotach należnych poszczególnym interesantom.

Taryfy lokalnych kolei są podstawowo te same, co kolei państwowych z niektórymi zmianami w poszczególnych wypadkach.

Podstawowe taryfy kolei państwowych w Austrii.

JEDNOSTKI	Towar pospieszny		Towar zwyczajny																				
	zwyczajny	ulgowy i więcej ulgowy	Klasa		Klasy towarowe			Specjalne taryfy			Wyjątkowe zniżone taryfy												
			I	II	A	B	C	1	2	3	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		
Halery za 100 kg. i 1 km.	Halery 1 sztuka	Halery 2 sztuki	Halery za 100 kg. i przebieg kilometr																				
Od 1—50 klm	3.30	1.22	24.0	34.0	14.0	1.22	1.04	0.74	0.56	0.48	0.56	0.48	0.44	0.44	0.24								
„ 51—150 „	3.20	1.20	23.0	33.0	13.0	1.20	1.00	0.68	0.52	0.30	0.48	0.30	0.26	0.26	0.20								
„ 151—300 „	3.16	1.18	22.0	32.0	12.0	1.18	0.96	0.60	0.42	0.22	0.40	0.22	0.16	0.16	0.18								
wyżej 300 „	3.12	1.16	20.0	30.0	10.0	1.16	0.64	0.42	0.28	0.20	0.32	0.20	0.16	0.16	0.16								
Koszta manipulacyjne za 100 kg.	16	8	14	14	14	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6								
Należność stacyja obojętna od 1/III 1906 r.	12	8	12	24	12	8	8	4	4	2	4	2	2	2	2								

III, IV, V, oddzielnie podane

małe zastosowanie w rolnictwie przy 5000 kg. klasa A., przy 10,000 kg. A minus 15% przy eksporcie za granicę C minus 5%

materyały pocztowo-telegraficzne objaśniona przy poszczególnych towarach

8

0.28

Przy nawozach sztucznych, węglu kamiennym, burakach cukrowych i tychże odpadkach pozostałych z produkcji cukru, opłaca się należność stacyjną po 1 h. od 100 kg.

Klasyfikacja towarów.

Numer	Wyszczególnienie	Ilości nadane			Warunki specjalne
		niżej 5000 kg.	najmniej		
			5000 kg.	10000 kg.	
1	Używane materiały budowl. i przyrządy	II	A	C	
2	Masło i smalec . . .	II	W. IIIa	W. IIIb	
3	Cement	II	A	C	
4	Papa dachowa	II	A	B	
5	Smołowiec	II	A	W. IIIc	
6	Nawozy sztuczne . . .	II	A	Sp. 3.	
7	Wapno defekacyjne	II	A	W. I	
8	Jaja	II	A	W. IIIc	
	„ na eksport		A	W. IIIc	
9	Ryby żywe	II	100% op. W. IIIa	10% op. W. IIIb	
10	Zboże kłos. i strącz.	A	A	Sp. 1.	
11	Gips	II	A	W. I	
12	Sloma, siano	II+50% Obj. H.	A	W. I	
13	Mater drzew obrob.	II	A	W. IVc	
	„ na eksport			Sp. 2.	
14	Drzewo nie obrob.	II	A	W. II	
	na eksport			C-5%	
15	Chiniel	I	A	W. 3. e	naład. koszt. wysyłaj.
16	Wapno niegaszone . .	II	A	W. I	nał. i wyl. wł. koszt.
17	Kartofle	A	A	W. I	jeśli bez opak. nał. i wyl. własn. koszt.
18	Zielona koniczyna . .	II	A	C	wyład. na własn. kosz.
19	Węgiel kamienny . . .	II	A	W. I	
20	Mąka	A	A	Sp. I	
21	Narz. i maszyny rol.	II	A	B	
22	Mleko	II	W. IIIa	W. IIIb	
23	Owoce św. w opak.	II	A	W. IIIc	
	„ bez opakow.		A	B	wył. i nał. wł. koszt.
	„ na eksport		A-10%	B-15%	
24	Warzywa św. i susz.	II	A	B	jeśli nie opak. to nał. i wyl. na własn. koszt.
	„ na eksport		A-10%	B-15%	
25	Zboża oleiste	A	A	Sp. 1.	
26	Makuchy	A	A	Sp. 1.	jeśli bez opak. to wyład. na własn. koszt.
27	Bite zwierzęta i drób	II	A	W. IIIc	
	Żywe zwierzęta . . .	W. V	W. V	W. V	według żąd. nadawcy.
		II	II	II	
28	Rurki drenarskie . . .	II	A	W. II	wyład. na wł. koszt.
29	Torf	II	A	W. II	
30	Włna	I	W. IIIa	W. IIIc	
31	Cegła palona i ogn.	II	A	C	
	surowa	II	A	W. II	
32	Buraki cukrowe	II	A	W. I	
	Wytłoczyny	II	A	C	

-10%; B-15% oznacza 10 wzgl. 15% opust. W=taryfa wyjątk

Taryfa wyjątkowa III.

Odległości	a	b	c
	przy nadaniu, względnie zapłacie za najmniej		
	5000 kg.	10000 kg.	
na wagon			
Od 1— 50 klm. za 100 kg. i 1 klm.	1'00	0'94	0'70
„ 51—151 „ „ „ „	0'96	0'90	0'64
„ 151—300 „ „ „ „	0'92	0'86	0'56
Wyżej 300 „ „ „ „	0'60	0'54	0'38
Koszta manipulacyjne	8	8	8

Taryfa wyjątkowa IV.

Odległości	a	b	c
	Halerzy za klm. i 1 metr kwadrat. podłogi wagonu		
Od 1— 50 klm	3'4	3'0	2'6
„ 51—150 „	3'2	1'8	1'6
„ 151—300 „	2'6	1'2	1'0
Wyżej 300 klm.	1'6	1'2	1'0
Koszta manipulacyjne od kwadrato- wego metra podłogi wagonu . . .	50	50	50

Taryfa wyjątkowa V.

Odległości	1	2	3		4
	Konie zrebięta muły	Bydło	Trzoda, owce, kozy		Ziadowe bydło, owce i trzoda
			a za wagon zwycz.	b za wagon piętr.	
Halerzy za klm i metr kwadr. podłogi wagonu zajętego					
Od 1— 50 klm. . .	3'2	1'8	2'0	3'0	20
„ 51—150 „ . .	2'4	1'7	1'9	2'8	
„ 151—300 „ . .	2'0	1'6	1'8	2'6	
Wyżej 300 klm. . . .	1'6	1'5	1'2	1'8	

łącznie z kosztami manipulacyjnymi.

Drobń oplaca taryfę V. 3-a, jeśli jest przewożony piętrowym wagonem.

W razie przewożenia drobiu pospiesznym towarem, taryfa V. 3-a o 50 procent podwyższona.

Przewóz żywych zwierząt wogóle oblicza się według wagi zwierząt, podług stawek klasy II, lub też na wyraźne żądanie nadawcy według wyjątkowej taryfy V od kwadratowego metra podłogi zajętego wagonu. Na każde trzy wagony zwierząt dopuszcza kolej jednego dozorcę do darmowego przejazdu. Każdy nadliczbowy dozorca, lub przy mniejszej ilości niż 3 wagony opłaca 2 hal. od 1 klm.

Konie, źrebięta, muły, przy pospiesznym frachcie oblicza się należność według ogólnej taryfy, jako zwyczajny towar przyjmuje się wagę średnią, opłaca stawkę od tej wagi 1 sztuki na 1400 kg.: 2 lub więcej sztuk po 700 kg. przy użyciu stawek taryfy klasy II.

Konie zarodowe i wyscigowe zaopatrzone odpowiedniami świadectwami opłacają;

jako towar pospieszny

1 sztuka 15 1 hal. za klm.

2 sztuki 21 2 hal. „

więcej niż 2 sztuki 9 1 hal. za klm. i sztukę

Przy przewozie pospiesznymi pociągami zwyżka tej taksy o 5 %.

jako towar zwyczajny

za 1 sztukę 10 h. od klm.

za 2 sztuki 12 h. „

3 sztuki i wyżej 5 6 hal. od sztuki i klm.

Za użycie wagonu stajennego zwyżka 50 %

Za uszkodzenie lub zniszczenie zarodowego lub wyścigowego konia maksymalne odszkodowanie 600 koron.

Bydło i cielęta

Wagę średnią, od której opłaca się stawkę przewozową, przyjmuje się: 1 ciele 60 kg.; roczne ciele 170 kg.; byk, wół, krowa 840 kg.

2 dorosłe sztuki na jednym frachcie 1400 kg.

3 „ „ „ „ 1680 kg.

4—5 sztuk 1960 kg.

6 sztuk lub wyżej sztuka 340 kg.

jako pospieszny towar taryfa zwyczajnego pospiesz. towaru;
jako zwyczajny towar klasa II.

Trzoda, owce, kozy, psy, osły.

Przy nadawaniu mniej niż 20 sztuk, bez opakowania, za każdą brakującą do 20 sztuk dolicza kolej 20 kg. lub gdyby ta waga mniejsza była, to podwójną wagę normalną nadanych sztuk.

Wagi normalne rachowane przez kolej są:

prosięta sysaki sztuka 20 kg.

„ starsze 30 kg.

świnie chudźce 60 kg.

„ opasy 170 kg.

jagnię, kozłą, 30 kg.

owce, barany, kozy, kozły, psy, . 40 kg.

osły 170 kg.

Stawka zwykłego pospiesznego towaru. Stawka II klasy przy wysyłce zwyczajnym towarem.

Za sztuki w opakowaniu (klatkach i t. p.) od wagi brutto zaołączonych według stawek zwykłego pospiesznego towaru, a przy powolnym frachcie według klasy I.

Drób.

W klatkach, jako towar pospieszny oplaca stawkę ulgową jako towar zwyczajny klasa I od wagi brutto z opakowaniem o ile ulgowa pospieszna nie wypada mniej.

Bez opakowania w wagonach specjalnych dla drobiu lub klatkach kolejowych (250 kg. wag.) klasa I za wagę drobiu i urządzeń wagonowych, lub klatek.

Gęsi i indyki w zwykłych wagonach obliczając wagę sztuki na 6 kg. a najmniej 2400 kg. w wagonie, oplacają II klasę stawki przewozowej.

Bydło zarodowe i drób zarodowy, za odpowiedniami rodowodami i świadectwami.

Cieleta i jałowizna	od sztuki i klm.	1.58 hal.
Byki i krowy	»	3.16 hal.
Jagnięta, owce, barany, trzoda, prosięta	»	0.52 hal.
Drób w klatkach	od 100 kg.	0.52 hal.

Odszkodowanie za uszkodzenie lub wypadek kolej płaci najwyżej:

Za cielę lub sztukę jałowizny	25 koron
Za byka lub krowę	200 »
Za owcę	20 »
Za świnie	35 »
Drób, za 100 kg,	100 »


Towarzyszący dozorczy zwierząt w malej liczbie nadawanych oplacają bilet III kl.

Od taryf tu podanych dużo jest jeszcze zniżek dla specjalnych okolic lub gatunków towarów idących w pełnych wagonowych ładunkach. Zboże idące z Galicyi do portów niemieckich do południowych Niemiec, Szwajcaryi i Francyi. Buraki cukrowe do cukrowni galicyjskich, odpadki z buraków, kartofli itp.

Większość nawozów sztucznych dla bezpośredniego użytku, wapno z galicyjskich pieców do stacji w Galicyi, mleko w ilościach nie mniej 100 litrów i próżne naczynia z mleka powracające do i ze Lwowa, Krakowa, Chabówki, Rzeszowa, Przemyśla, Tarnowa (oplacają zwyczajną taryfę przy wysyłce pospiesznym frachtem) i. t. p.

Prawie wszystkie rolne produkta i przedmioty rolnych potrzeb, cieszą się zniżkową taryfą pospiesznych towarów.

Zwracamy uwagę na następujące publikacye gdzie kosztą taryfowe galicyjskie są obszerniej omówione: «Ulgi taryfowe dla gospodarstw rolnych» Z. Taszycki. — «Wydawnictwo Tow. rol. Kraków». — «Taryfa towar. c. k. kolei państwowych» cz. II. zeszyt 2. — «Die Eisenbahnfrachttarife für landw. u. forstw. Artikel». Wien. 1905. Ackerbauministerium.



Notatnik kalendarzowy.

TERMINA WAŻNIEJSZE.

1. Rozpoczęcie robót w polu . . .
2. » siewu wiosennego .
3. » zbioru siana . . .
4. » żniwa
5. Koniec żniwa
6. Rozpoczęcie siewu ozimin . . .
7. Skończenie
8. Koniec kopania okopowych . .
9. Ostatni dzień orki
10. Bydło wyszło na pasze
11. » skończyło się pasać . . .

Skrócenia: W = Wschód.
 Z = Zachód.
 ☉ = Słońce.
 ☾ = Księżyc.

Liczba ułankowa oznacza, ile dni od początku, a ile do końca roku.

Wschód i zachód słońca i księżyca obliczone są dla Lwowa (równol. 49° 50' 47").

Styczeń 1909.

365/1. W 8.01 © Z 4.07 PIĄTEK 1. W 1.01 w. 3 Z 2.10 r.

Notatnik-kalendarzowy.

TERMINA WAŻNIEJSZE

364/2. W 8.01 © Z 4.08 SOBOTA 2. W 1.25 w. 3 Z 3.26 r.

Wzrost u zwierząt...
Wzrost u zwierząt...
Wzrost u zwierząt...

Styczeń 1909.

363/3. W 8.01 ☉ Z 4.09 NIEDZIELA 8. W 1.53 w. ☽ Z 4.43 r.

362/4. W 8.01 ☉ Z 4.10 PONIEDZIAŁEK 4. W 2.27 w. ☽ Z 5.54 r.

Styczeń 1909.

361,5. W 8.01 ☉ Z 4.11 WTOREK 5. W 3.10 w. ☽ Z 7.01 r.

360 6. W 8.0 ☉ Z 4.12 ŚRODA 6. W 4.03 w. ☽ Z 7.58 r.

Styczeń 1909.

350 7. W 8.0 ☉ Z 4.14 CZWARTEK 7. W 5.2 w. ☾ Z 8.46 r.

358 8. W 8.0 ☉ Z 4.15 PIĄTEK 8. W 6.06 w. ☾ Z 9.23 r.

Styczeń 1909.

857/9. W 7.59 ☉ Z 4.16 SOBOTA 9. W 7.12 w. ☾ Z 9.54 r.

858/10. W 7.59 ☉ Z 4.17 NIEDZIELA 10. W 8.19 w. ☾ Z 10.19 r.

Styczeń 1909.

355/11. W 7.58 ☉ Z 4.19 PONIEDZIAŁEK 11. W 9.25 w. ☽ Z 10.39

354 12. W 7.58 ☉ Z 4.20 WTOREK 12. W 10.31 w. ☽ Z 10.56 r.

Styczeń 1909.

353/13. W 7.57 ☉ Z 4.22 ŚRODA 13. W 11.36 w. ☾ Z 11.13 r.

352 14. W 7.56 ☉ Z 4.23 CZWARTEK 14. W — — ☾ Z 11.29 r.

Styczeń 1909.

351 15. W 7.56 ☉ Z 4.24 PIĄTEK 15. W 12.42 r. ☽ Z 11.46 r.

350 16. W 7.55 ☉ Z 4.26 SOBOTA 16. W 1.52 r. ☽ Z 12.7 w

Syczeń 1909.

319/17. W 7.54 ☉ Z 4.27 NIEDZIELA 17. W 3.04 r. ☾ Z 12.30 w.

348/18. W 7.53 ☉ Z 4.29 PONIEDZIAŁEK 16. W 4.18 r. ☾ Z 1.01 w.

Styczeń 1909.

347/19. W 7.52 © Z 4.90 WTOREK 19. W 5.31 r. ☾ Z 1.41 w. 218

346/20. W 7.51 © Z 4.32 ŚRODA 20. W 6.42 r. ☾ Z 2.35 w. 218

Styczeń 1909.

845/21. W 7.50 Ⓞ Z 4.33 CZWARTEK 21. W 7.42 r. 3 Z 3.43 w.

844/22. W 7.49 Ⓞ Z 4.35 PIĄTEK 22. W 8.31 r. 3 Z 5.02 w.

Styczeń 1909.

343/23. W 7.48 ☉ Z 4.37 SOBOTA 23. W 9.08 r. ☾ Z 6.28 w.

Luty 1909.

342/24. W 7.47 ☉ Z 4.38 NIEDZIELA 24. W 9.39 r. ☾ Z 7.53 w.

Styczeń 1909.

341/25. W 7.46 © Z 4.40 **PONIEDZIAŁEK 25.** W 10.03 r. 3 Z 9.17 w.

340/26. W 7.45 © Z 4.42 **WTOREK 26.** W 10.25 r. 3 Z 10.10 w.

Styczeń 1909.

330/27. W 7.44 © Z 4.43 ŚRODA 27. W 10.46 r. 3 Z 11.59 w.

Luty 1909.

338/28. W 7.42 © Z 4.44 CZWARTEK 28. W 11.6 r. 3 Z — —

Styczeń 1909.

387 29. W 7.41 ☉ Z 4.47 PIĄTEK 29. W 11.29 r. ☾ Z 1.17 r.

388 30. W 7.40 ☉ Z 4.48 SOBOTA 30. W 11.56 r. ☾ Z 2.32

Styczeń 1909.

335/31. W 7.38 © Z 4.50 NIEDZIELA 31. W 12.28 w. 3 Z 3.45 r.

Luty 1909.

334/32. W 7.36 © Z 4.51 PONIEDZIAŁEK 1. W 1.07 w. 3 Z 4.53 r.

Luty 1909.

329 37. W 7.29 ☉ Z 5.00 **SOBOTA 6.** W 6.07 w. ☽ Z 8.22 r.

328 38. W 7.28 ☉ Z 5.02 **NIEDZIELA 7.** W 7.14 w. ☽ Z 8.43 r.

Luty 1909.

827/89. W 7.26 ☉ Z 5.04 PONIEDZIAŁEK 8. W 8.19 w. ☾ Z 9.02 r.

826/40. W 7.24 ☉ Z 5.05 WTOREK 9. W 9.25 w. ☾ Z 9.18 r.

Luty 1909.

325 41. W 7.23 ☉ Z 5.07 ŚRODA 10. W 10.31 w. ☾ Z 9.34 r.

324 42. W 7.21 ☉ Z 5.09 CZWARTEK 11. W 11.38 w. ☾ Z 9.51 r.

Luty 1909.

828,48. W 7.19 ☉ Z 5.10 PIĄTEK 12. W — — ☾ Z 10.09 r.

322,44. W 7.17 ☉ Z 5.12 SOBOTA 13. W 12.47 r. ☾ Z 10.31 r.

Luty 1909.

821 45. W 7.16 ☉ Z 5.14 NIEDZIELA 14. W 1.58 r. ☾ Z 10.57 r.

820 46. W 7.14 ☉ Z 5.16 PONIEDZIAŁEK 15. W 8.10 r. ☾ Z 11.32 r.

Luty 1909.

310 47. W 7.12 ☉ Z 5.17 WTOREK 16. W 4.30 r. ☽ Z 12.17 w. 16

318 48. W 7.10 ☉ Z 5.19 ŚRODA 17. W 5.25 r. ☽ Z 1.16 w. 18

Luty 1909.

317 49. W 7.09 ☉ Z 5.21 CZWARTEK 18. W 6.19 r. ☽ Z 2.30 w.

316 50. W 7.07 ☉ Z 5.22 PIĄTEK 19. W 7.01 r. ☽ Z 3.53 w.

Luty 1909.

315 51. W 7.05 ☉ Z 5.24 SOBOTA 20. W 7.36 r. ☾ Z 5.20 w.

314 52. W 7.03 ☉ Z 5.26 NIEDZIELA 21. W 8.03 r. ☾ Z 6.49 w.

Luty 1909.

313 53. W 7.01 © Z 5.27 PONIEDZIAŁEK 22. W 8.26 r. 3 Z 8.15 w. 11

312 54. W 6.59 © Z 5.29 WTOREK 23. W 8.46 r. 3 Z 9.39 w. 11

Luty 1909.

311/55. W 6.57 ☉ Z 5.31 ŚRODA 24. W 9.08 r. ☽ Z 11.01 w.

Marzec 1909.

310/56. W 6.55 ☉ Z 5.32 CZWARTEK 25. W 9.31 r. ☽ Z —

Luty 1909.

801/57. W 6.53 © Z 5.84 PIĄTEK 26. W 9.57 r. 3 Z 12.20 r. 11

804 58. W 6.51 © Z 5.86 SOBOTA 27. W 10.28 r. 3 Z 1.36 r. 11

Luty 1909.

307/59. W 6.49 ☉ Z 5.37 NIEDZIELA 28. W 11.06 r. ☾ Z 2.46 r.

Marzec 1909.

308/60. W 6.47 ☉ Z 5.39 PONIEDZIAŁEK 1. W 11.52 r. ☾ Z 3.49 r.

Marzec 1909.

305/61. W 6.45 ☉ Z 5.41 WTOREK 2. W 12.46 w. ☾ Z 4.02 r. 1909

Marzec 1909.

304/62. W 6.43 ☉ Z 5.42 ŚRODA 3. W 1.46 w. ☾ Z 5.25 r. 1909

Marzec 1909.

303/03. W 6.40 ☉ Z 5.44 CZWARTEK 4. W 2.51 w. ☽ Z 5.50 r.

302/04. W 6.39 ☉ Z 5.46 PIĄTEK 5. W 3.57 w. ☽ Z 6.27 r.

Marzec 1909.

801/65. W 6.37. ☉ Z 5.47 SOBOTA 6. W 5 01 w. ☾ Z 6.48 r.

Marzec 1909.

860/66. W 6.04 ☉ Z 5.49 NIEDZIELA 7. W 6.10 w. ☾ Z 7.08

Marzec 1909.

200/67. W 6.32 ☉ Z 5.51 / **PONIEDZIAŁEK 8.** W 7.16 w ☽ Z 7.25 r.

201/68. W 6.30 ☉ Z 5.52 / **WTOREK 9.** W 8.22 w. ☽ Z 7.40 r.

Marzec 1909.

297 69. W 6.28 ☉ Z 5 54 ŚRODA 10. W 9.28 w. ☽ Z 7.56 r

596 70. W 6.26 ☉ Z 5.56 CZWARTEK 11. W 10.37 w. ☽ Z 8.14 v.

Marzec 1009.

285/71. W 6.24 ☉ Z 5.57 PIĄTEK 12. W 11.47 w. ☾ Z 8.33 r.

284 72. W 6.22 ☉ Z 5.59 SOBOTA 13. W — — ☾ Z 8.57 r.

Marzec 1909.

293/78. W 6.20 ☉ Z 6.00 NIEDZIELA 14. W 12.57 r. ☽ Z 9.27 r.

292/74. W 6.17 ☉ Z 6.02 PONIEDZIAŁEK 15. W 2.07 r. ☽ Z 10.07 r.

Marzec 1909.

291/75. W 6.15 ☉ Z 6.04 WTOREK 16. W 3.11 r. 3 Z 10.58 r.

290 76. W 6.13 ☉ Z 6.05 SRODA 17. W 4.00 r. 3 Z 12.03 w.

Marzec 1909.

289/77. W 6.11 © Z 6.07 CZWARTEK 18. W 4.51 r. ① Z 1.21 w.

288/78. W 6.09 © Z 6.08 PIĄTEK 19. W 5.31 r. ② Z 2.45 w.

Marzec 1909.

287/79. W 6.07 ☉ Z 6.10 SOBOTA 20. W 6.01 r. ☽ Z 4.18 w.

286/80. W 6.04 ☉ Z 6.11 NIEDZIELA 21. W 6.25 r. ☽ Z 5.40 w.

Marzec 1909.

285/81. W 6.02 ☉ Z 6.13 PONIEDZIAŁEK 22. W 6.47 r. ☽ Z 7.07 w.

284/82. W 6.00 ☉ Z 6.15 WTOREK 23. W 7.09 r. ☽ Z 8.33 w.

Marzec 1909.

22/84. W 5.58 ☉ Z 6.16 ŚRODA 24. W 7.31 r. ☾ Z 9.57 w.

22/84. W 5.55 ☉ Z 6.17 CZWARTEK 25. W 7.55 r. ☾ Z 11.18 w.

Marzec 1909.

281 85. W 5.53 © Z 6.19 PIĄTEK 26. W 8.25 r. Z — —

280/86. W 5.51 © Z 6.21 SOBOTA 27. W 11.01 r. Z 12.34 r

Marzec 1909.

279/87. W 5.49 © Z 6.23 NIEDZIELA 28. W 9.45 r. 3 Z 1.42 r.

278/88. W 5.47 © Z 6.24 PONIEDZIALEK 29. W 10.37 r. 3 Z 2.40 r.

Marzec 1909.

277/80. W 5.45 ☉ Z 6.26 WTOREK 30. W 11.37 r. ☾ Z 8.27 r.

278/80. W 5.42 ☉ Z 6.27 ŚRODA 31. W 12.42 w. ☾ Z 4.03 r.

Kwiecień 1909.

275/91. W 5.40 ☉ Z 6.29 CZWARTEK 1. W 1.48 w. ☽ Z 4.32 r.

274/92. W 5.38 ☉ Z 6.30 PIĄTEK 2. W 2.54 w. ☽ Z 4.56 r.

Kwiecień 1909.

273 98. W 5.36 ☉ Z 6.32 SOBOTA 3. W 4.01 w. ☽ Z 5.15 r.

272 91. W 5.34 ☺ Z 6.34 NIEDZIELA 4. W 5.07 w. ☽ Z 5.32 r.

Kwiecień 1909.

271/05. W 5.32 Ⓞ Z 6.32 PONIEDZIAŁEK 5. W 6.13 w. 3 Z 5.48 r.

276/06. W 5.29 Ⓞ Z 6.36 WTOREK 6. W 7.20 w. 3 Z 6.04 r.

Kwiecień 1909.

269/97. W 5.27 ☉ Z 6.38 ŚRODA 7. W 8.28 w. ☽ Z 6.20 r.

268/93. W 5.25 ☉ Z 6.40 CZWARTEK 8. W 9.39 w. ☽ Z 6.39 r.

Kwiecień 1909.

267/100. W 5.23 ☉ Z 6.41 PIĄTEK 9. W 10.48 w. ♃ Z 7.01 r.

268/100. W 5.21 ☉ Z 6.43 SOBOTA 10. W 11.59 w. ♃ Z 7.28 r.

Kwiecień 1909.

265/101. W 5.19 Ⓞ Z 6.44 NIEDZIELA 11. W —.— 3 Z 8.03 r.

264/102. W 5.17 Ⓞ Z 6.46 PONIEDZIAŁEK 12. W 1.05 r. 3 Z 8.50 r.

Kwiecień 1909.

283/103. W 5.15 ☉ Z 6.47 WTOREK 13. W 2.03 r. ☽ Z 9.49 r. ☾

282/104. W 5.13 ☉ Z 6.49 ŚRODA 14. W 2.51 r. ☽ Z 10.59 r. ☾

Kwiecień 1909.

261/105. W 5.11 ☉ Z 6.51 CZWARTEK 15. W 3.30 r. ☽ Z 12.19 w.

260/106. W 5.09. ☉ Z 6.52 PIĄTEK 16. W 4.01 r. ☽ Z 1.42 w.

Kwiecień 1909.

259/107. W 5.07 ☉ Z 6.54 SOBOTA 17. W 4.27 r. ☾ Z 3.08 w.

258/108. W 5.05 ☉ Z 6.55 NIEDZIELA 18. W 4.49 r. ☾ Z 4.34 w.

Kwiecień 1909.

257/100. W 5.03 ☉ Z 6.57 **PONIEDZIAŁEK 19.** W 5.09 r. ☽ Z 6.00 w.

256/110. W 5.01 ☉ Z 6.58 **WTOREK 20.** W 5.30 r. ☽ Z 7.26 w.

Kwiecień 1909.

265. 111. W 4.59 ☉ Z 7.00 ŚRODA 21. W 5.53 r. ☽ Z 8.50 w.

264. 112. W 4.57 ☉ Z 7.01 CZWARTEK 22. W 6.21 r. ☽ Z 10.11 w.

Kwiecień 1909.

253 113. W 4.55. ☉ Z 7.03 PIĄTEK 23. W 6.54 r. ☽ Z 11.26 w.

252 114. W 4.53 ☉ Z 7.05 SOBOTA 24. W 7.35 r. ☽ Z —

Kwiecień 1909.

251/116. W 4.51 ☉ Z 7.06 NIEDZIELA 25. W 8.25 r. ☽ Z 12.30 r.

250/116. W 4.49 ☉ Z 7.07 PONIEDZIAŁEK 26. W 9.21 r. ☽ Z 1.24 r.

Kwiecień 1909.

249/117. W 4.47 ☉ Z 7.09 WTOREK 27. W 10.28 r. ☽ Z 2.04 r.

349/118. W 4.45 ☉ Z 7.11 ŚRODA 28. W 11.35 r. ☽ Z 2.36

Kwiecień 1909.

247/119. W 4.43 © Z 7.12 CZWARTEK 29. W 12.42 w. 3 Z 3.02 r.

246/120. W 4.42 © Z 7.14 PIĄTEK 30. W 1.49 w. 3 Z 3.22 r.

244/121. W 4.40 © Z 7.15 **SOBOTA 1.** W 2.55 w. 3 Z 3.99 r.

244/122. W 4.38 © Z 7.17 **NIEDZIELA 2** W 4.02 w. 3 Z 3.56 r.

Maj 1909.

213 123. W 4.36 ⊙ Z 7.18 PONIEDZIAŁEK 3. W 5.09 w. 3 Z 4.11 r.

242 124. W 4.36 ⊙ Z 7.20 WTOREK 4. W 6.17 w. 3 Z 4.26 r.

Maj 1909.

241/125. W 4.33 ☉ Z 7.21 ŚRODA 5. W 7.28 w. ☽ Z 4.44 r.

240/126. W 4.31 ☉ Z 7.23 CZWARTEK 6. W 8.38 w. ☽ Z 5.05 r.

Maj 1909.

239/127. W 4.30 © Z 7.24 PIĄTEK 7. W 9.51 w. 3 Z 5.31 r.

238/128. W 4.28 © Z 7.25 SOBOTA 8. W 11.00 w. 3 Z 6.03 r.

Maj 1909.

887/129. W 4.27 © Z 7.27 NIEDZIELA 9. W — — 3 Z 6.46 r.

236/130. W 4.25 © Z 7.28 PONIEDZIAŁEK 10. W 12.01 r. 3 Z 7.41 r.

Maj 1909.

235 131. W 4.23 ☉ Z 7.30 WTOREK 11. W 12.52 r. ☾ Z 8.47 r.

234 132. W 4.22 ☉ Z 7.31 ŚRODA 12. W 1.32 r. ☽ Z 10.01 r.

Maj 1909.

233 183. W 4.21 © Z 7.83 CZWARTEK 18. W 2.04 r. 3 Z 11.24 r.

232 134. W 4.18 © Z 7.94 PIĄTEK 14. W 2.30 r. 3 Z 12.46 w.

Maj 1909.

281/185. W 4.18 ☉ Z 7.35 SOBOTA 15. W 2.52 r. ☾ Z 2.09 w.

280/186. W 4.17 ☉ Z 7.37 NIEDZIELA 16. W 3.13 r. ☾ Z 3.32 w.

Maj 1909.

229/187. W 4.15 ☉ Z 7.38 **PONIEDZIAŁEK 17.** W 9.39 r. ☾ Z 4.56 w.

228/188. W 4.14 ☉ Z 7.40 **WTOREK 18.** W 9.54 r. ☾ Z 6.20 w.

Maj 1909.

227/139. W 4.13 ☉ Z 7.41 ŚRODA 19. W 4.18 r. ☾ Z 7.44 w.

226/140. W 4.12 ☉ Z 7.42 CZWARTEK 20. W 4.49 r. ☾ Z 9.03 w.

Maj 1909.

225/141. W 4.10 ☉ Z 7.43 PIĄTEK 21. W 5.26 r. ☾ Z 10.14 w.

224/142. W 4.09 ☉ Z 7.45 SOBOTA 22. W 6.12 r. ☾ Z 11.18 w.

Maj 1909.

223 143. W 4.08 ☉ Z 7.46 NIEDZIELA 23. W 7.09 r. ☾ Z 11.10

Czerwiec 1909

222 144 W 4.07 ☉ Z 7.47 PONIEDZIAŁEK 24. W 8.12 r. ☾ Z 12.01 r.

Maj 1909.

221/145. W 4.06 ☉ Z 7.48 WTOREK 25. W 9.20 r. ☽ Z 12.37 r. ☾

220/146. W 4.05 ☉ Z 7.49 ŚRODA 26. W 10.28 r. ☽ Z 1.05 r. ☾

Maj 1909.

219/147. W 4.04 © Z 7.51 **CZWARTEK 27.** W 11.36 r. 3 Z 1.27 r.

Czerwiec 1909.

218/148. W 4.08 © Z 7.52 **PIĄTEK 28.** W 12.43 w. 3 Z 1.45 r.

Maj 1909.

217/149. W 4.02 ☉ Z 7.53 SOBOTA 29. W 1.28 w. ☿ Z 2.02 r.

216/150. W 4.01 ☉ Z 7.54 NIEDZIELA 30. W 2.55 w. ☿ Z 2.17 r.

Maj 1909.

215/151. W 4.00 ☉ Z 7.55 **PONIEDZIAŁEK 31.** W 4.02 w. ☿ Z 2.33 r.

Czerwiec 1909.

214/152. W 3.59 ☉ Z 7.56 **WTOREK 1.** W 5.13 w. ☿ Z 2.50 r.

Czerwiec 1909.

213/153. W 3.59 © Z 7.57 ŚRODA 9. W 0.24 w. 3 Z 3.08 r.

Czerwiec 1909.

212/154. W 3.58 © Z 7.58 CZWARTEK 8. W 7.36 w. 3 Z 3.32 r.

Czerwiec 1909.

211/155. W 8.57 ☉ Z 7.59 PIĄTEK 4. W 8.48 w. ☽ Z 4.02 r.

210/156. W 8.57 ☉ Z 8.00 SOBOTA 5. W 9.54 w. ☽ Z 4.42 r.

Czerwiec 1909.

209 157. W 3.56 ☉ Z 8.01 NIEDZIELA 6. W 10.49 w. ☾ Z 5.34 r. 119

Czerwiec 1909.

208 158. W 3.56 ☉ Z 8.02 PONIEDZIAŁEK 7. W 11.34 w. ☾ Z 6.38 r. 118

Czerwiec 1909.

207/159. W 3.55 © Z 8.03 WTOREK 8. W — 3 Z 7.52 r.

208/160. W 3.55 © Z 8.03 ŚRODA 9. W 12.19 r. 3 Z 9.12 r.

Czerwiec 1909.

205/161. W 3.54 ☉ Z 8.04 CZWARTEK 10. W 12.36 r. ☽ Z 10.34 r. ☾

204/162. W 3.54 ☉ Z 8.05 PIĄTEK 11. W 12.58 r. ☽ Z 11.55 r. ☾

Czerwiec 1909.

208/163. W 3.54 ☉ Z 8.05 SOBOTA 12. W 1.19 r. ☽ Z 1.16 w.

202/164. W 3.54 ☉ Z 8.06 NIEDZIELA 13. W 1.38 r. ☽ Z 2.28 w.

Czerwiec 1909.

201/165. W 3.54 © Z 8.07 PONIEDZIAŁEK 14. W 1.58 r. 3) Z 3.59 w.

200/166. W 3.53 © Z 8.07 WTOREK 15. W 2.20 r. 3) Z 5.20 w.

Czerwiec 1909.

199 167. W 3.53 ☉ Z 8.08 ŚRODA 16. W 2.47 r. ☽ Z 6.40 w.

198 168. W 3.53 ☉ Z 8.08 CZWARTEK 17. W 3.20 r. ☽ Z 7.54 w.

Czerwiec 1909.

197/169. W 8.53 ☉ Z 8.08 PIĄTEK 18. W 4.01 r. ☾ Z 8.59 w.

198/170. W 8.53 ☉ Z 8.09 SOBOTA 19. W 4.53 r. ☾ Z 9.53 w.

Czerwiec 1909.

105/171. W 9.53 ☉ Z 8.09 NIEDZIELA 20. W 5.54 r. ☾ Z 10.34 w.

104/172. W 8.53 ☉ Z 8.09 PONIEDZIAŁEK 21. W 7 02 r. ☾ Z 11.06 w.

Czerwiec 1909.

198/178. W 3.53 ☉ Z 8.09 WTOREK 22. W 8.11 r. ☾ Z 11.31 w.

192/174. W 8.54 ☉ Z 8.10 ŚRODA 23. W 9.20 r. ☾ Z 11.50 w.

Czerwiec 1909.

191/175. W 3.54 © Z 8.10 CZWARTEK 24. W 10.28 r. 3 Z — —

Lipiec 1909.

190/176. W 3.54 © Z 8.10 PIĄTEK 25. W 11.34 r. 3 Z 12.08 r.

Czerwiec 1909.

189/177. W 8.55 ☉ Z 8.10 SOBOTA 26. W 12.40 w. ☽ Z 12.23 r.

188/178. W 8.55 ☉ Z 8.10 NIEDZIELA 27. W 1.46 w. ☽ Z 12.38 r.

Czerwiec 1909.

187/179. W 3.56 Ⓞ Z 8.10 PONIEDZIAŁEK 28. W 2.55 w. Ⓞ Z 12 55 r.

.0091 99191

186 180. W 2.58 Ⓞ Z 8.10 WTORNEK 29. W 4.65 w. Ⓞ Z 1.12 r.

Czerwiec 1909.

185/181. W 3.57 ☉ Z 8.09 ŚRODA 30. W 5.18 r. ☾ Z 1.34 r.

Lipiec 1909.

184/182. W 3.57 ☉ Z 8.09 CZWARTEK 1. W 6.30 r. ☾ Z 2.01 r.

Lipiec 1909.

183.188. W 8.58 © Z 8.09 PIĄTEK 2. W 7.89 w. 3 Z 2.36 r.

184.184 W 8.59 © Z 8.09 SOBOTA 3. W 8.41 w. 3 Z 2.23 r.

Lipiec 1909.

181/185. W 9.59 © Z 8.08 NIEDZIELA 4. W 9.31 w. 3 Z 4.24 r.

Lipiec 1909.

180/186. W 4.00 © Z 8.08 PONIEDZIAŁEK 5. W 10.11 w. 3 Z 5.87 r.

Lipiec 1909.

179/182. W 4.01 ☉ Z 8.07 WYŹREK 6. W 10.40 w. ☾ Z 6.58 r.

178/189. W 4.01 ☉ Z 8.07 ŚRODA 7. W 11.05 w. ☾ Z 8.20 r.

Lipiec 1909.

177/188. W 4.02 ☉ Z 8.07 CZWARTEK 8. W 11.25 w. ☽ Z 9.48 r.

Lipiec 1909.

176/190. W 4.03 ☉ Z 8.06 PIĄTEK 9. W 11.40 w. ☽ Z 11.05 r.

Lipiec 1909.

175/191. W 4.04 ☉ Z 8.05 SOBOTA 10. W — — ☾ Z 12.25 w.

174/192. W 4.05 ☉ Z 8.05 NIEDZIELA 11. W 12.04 r. ☾ Z 1.45 w.

Lipiec 1909.

178/193. W 4.06 ☉ Z 8.04 PONIEDZIAŁEK 12. W 12.25 r. ☽ Z 3.06 w.

172/194. W 4.07 ☉ Z 8.03 WTOREK 13. W 12.49 r. ☽ Z 4.25 w.

Lipiec 1909.

171/195. W 4.08 © Z 8.03 ŚRODA 14. W 1.19 r. 3 Z 5.40 w.

170/196. W 4.09 © Z 8.01 CZWARTEK 15. W 1.56 r. 2 Z 6.48 w.

Lipiec 1909.

169 197. W 4.10 ☉ Z 8.01 PIĄTEK 16. W 2.44 r. ☽ Z 7.46 w. ☽

168 198. W 4.12 ☉ Z 8.00 SOBOTA 17. W 3.40 r. ☽ Z 8.31 w. ☽

Lipiec 1909.

167/199. W 4.13 ☉ Z 7.59 NIEDZIELA 18. W 4.46 r. ☾ Z 9.05 w.

168/200. W 4.14 ☉ Z 7.58 PONIEDZIAŁEK 19. W 5.55 r. ☾ Z 9.83 w.

Lipiec 1909.

165/201. W 4.15 © Z 7.56 WTOREK 20. W 7.04 r. 3 Z 9.55 w.

164/202. W 4.16 © Z 7.55 ŚRODA 21. W 8.12 r. 3 Z 10.13 w.

Lipiec 1909.

168/208. W 4.17 ☉ Z 7.54 CZWARTEK 22. W 9.20 r. ☾ Z 10.28 w. 182

169/209. W 4.19 ☉ Z 7.53 PIĄTEK 23. W 10.26 r. ☾ Z 10.44 w. 183

Lipiec 1909.

161/205. W 4.20 ☉ Z 7.52 SOBOTA 24. W 11.32 r. ☾ Z 10.59 w.

160/206. W 4.20 ☉ Z 7.50 NIEDZIELA 25. W 12.39 w. ☾ Z 11.15 w.

Lipiec 1909.

159/207. W 4.21 ☉ Z 7.49 PONIEDZIAŁEK 26. W 1.47 w. ☽ Z 11.35 w.

158/208. W 4.24 ☉ Z 7.48 WTOREK 27. W 2.58 w. ☽ Z 11.59 w.

Lipiec 1909.

157/200. W 4.25 ☉ Z 7.46 ŚRODA 28. W 4.10 w. ☾ Z —

156 210. W 4.26 ☉ Z 7.45 CZWARTEK 29. W 5.21 w. ☾ Z 12.30 r.

Lipiec 1909.

155/211. W 4.28 ☉ Z 7.44 PIĄTEK 80. W 6.26 w. ☿ Z 1.11 r.

154/212. W 4.29 ☉ Z 7.42 SOBOTA 81. W 7.21 w. ☿ Z 2.06 r.

Sierpień 1909

151/213. W 4.31 ☉ Z 7.41 NIEDZIELA 1. W 8.06 w. ☽ Z 3.15 r.

152/214. W 4.32 ☉ Z 7.39 PONIEDZIAŁEK 2. W 8.40 w. ☽ Z 4.34 r.

Sierpień 1909.

151/215. W 4.38 ☉ Z 7.38 WTOREK 3. W 9.07 w. ☽ Z 5.59 r.

150/216. W 4.34 ☉ Z 7.36 ŚRODA 4. W 9.29 w. ☽ 7.7.24 r.

Sierpień 1099.

149/217. W 4.36 © Z 7.34 CZWARTEK 5. W 9.49 w. ☾ Z 8.49 r. 121

148/218. W 4.38 © Z 7.33 PIĄTEK 6. W 10.09 w. ☾ Z 10.12 r. 121

Sierpień 1909.

147/219. W 4.39 © Z 7.31 SOBOTA 7. W 10.29 w. 3 Z 11.84 r.

140/220. W 4.40 © Z 7.30 NIEDZIELA 8. W 10.52 w. 3 Z 12.55 w.

Sierpień 1909.

145/221. W 4.41 ☉ Z 7.28 PONIEDZIAŁEK 9. W 11.20 w. ☿ Z 2.15 w.

144/222. W 4.42 ☉ Z 7.26 WTOREK 10. W 11.55 w. ☿ Z 3.31 w.

Sierpień 1909.

148/223. W 4.44 ☉ Z 7.24 ŚRODA 11. W — ☽ Z 4.40 w.

142/224. W 4.45 ☉ Z 7.28 CZWARTEK 12. W 12.38 r. ☽ Z 5.40 w.

Sierpień 1909.

141/225. W 4.47 ☉ Z 7.21 PIĄTEK 13. W 1.33 r. ☾ Z 6.28 w.

140/226. W 4.49 ☉ Z 7.19 SOBOTA 14. W 2.34 r. ☾ Z 7.06 w.

Sierpień 1909.

139 227. W 4.50 ☉ Z 7.17 NIEDZIELA 15. W 9.42 r. ☽ Z 7.36 w.

138 228. W 4.51 ☉ Z 7.16 PONIEDZIAŁEK 16. W 4.51 w. ☽ Z 5.59 w.

Sierpień 1909.

137/229. W 4.53 ☉ Z 7.14 WTOREK 17. W 5.59 r. ☽ Z 8 18 w.

136/230. W 4.54 ☉ Z 7.12 ŚRODA 18. W 7.08 r. ☽ Z 8.35 w.

Sierpień 1909.

135 231. W 4.56 ☉ Z 7.10 CZWARTEK 19. W 8.14 r. ☽ Z 8.50 w.

134 232. W 4.57 ☉ Z 7.08 PIĄTEK 20. W 9.20 r. ☽ Z 9.04 w.

Sierpień 1909.

188, 188. W 4.59 © Z 7.06 SOBOTA 21. W 10.26 r. 3 Z 9.30 w.

192, 184. W 5.00 © Z 7.04 NIEDZIELA 22 W 11.33 r. 3 Z 9.38 w.

Sierpień 1909.

131/235. W 5.08 ☉ Z 7.02 **PONIEDZIAŁEK 23.** W 12.42 w. ☽ Z 10.00 w.

130/236. W 5.08 ☉ Z 7.00 **WTOREK 24.** W 1.52 w. ☽ Z 10.27 w.

Sierpień 1909.

120/237. W 5.05 ☉ Z 6.58 ŚRODA 25. W 3.03 w. ☿ Z 11.00 w.

128/238. W 5.06 ☉ Z 6.57 CZWARTEK 26. W 4.09 w. ☿ Z 11.48 w.

Sierpień 1909.

127 239. W 5.08 © Z 6.54 PIĄTEK 27. W 5.09 w. Z — 127 239

Wrzesień 1909.

126 240. W 5.09 © Z 6.52 SOBOTA 28. W 5.57 w. Z 12.50 126 240

Sierpień 1909.

125/241. W 5.11 © Z 6.50 NIEDZIELA 29. W 6.35 w. 3 Z 2.00 r.

124/242. W 5.12 © Z 6.48 PONIEDZIAŁEK 30. W 7.05 w. 3 Z 3.28 r.

Sierpień 1909.

123/248. W 5.14 ☉ Z 6.46 Wtorek 31. W 7.31 w. ☽ Z 4.55 r.

Wrzesień 1909.

122/244. W 5.15 ☉ Z 6.44 ŚRODA 1. W 7.52 w. ☽ Z 6.23 r.

Wrzesień 1909.

121/245. W 5.17 ☉ Z 6.42 CZWARTEK 2. W 8.12 w. ☽ Z 7.49 r.

Wrzesień 1909.

120/246. W 5.18 ☉ Z 6.40 PIĄTEK 3. W 8.32 w. ☽ Z 9.15 r.

Wrzesień 1909.

119/247. W 5.19 Ⓢ Z 6.38 SOBOTA 4. W 8.55 w. 3 Z 10.39 r. 11

118/248. W 5.31 Ⓢ Z 6.86 NIEDZIELA 5. W 9.22 w. 3 Z 12.02 w. 11

Wrzesień 1909.

117/249. W 5.92 Ⓞ Z 6.34 **PONIEDZIAŁEK 6.** W 9.54 w. 3 Z 1.81 w.

Wrzesień 1909.

116/250. W 5.24 Ⓞ Z 6.31 **WTOREK 7.** W 10.85 w. 3 Z 2.84 w.

Wrzesień 1909.

115/951. W 5.25 Ⓞ Z 6.29 ŚRODA 8. W 11.26 w. 9 Z 3.97 r.

114/952. W 5.27 Ⓞ Z 6.27 CZWARTEK 9. W — — 9 Z 4.28 r.

Wrzesień 1909.

113/253. W 5.28 ☉ Z 6.25 PIĄTEK 10. W 12.26 r. ☽ Z 5.09 r. III

112/254. W 5.20 ☉ Z 6.23 SOBOTA 11. W 1.32 r. ☽ Z 5.39 r. III

Wrzesień 1909.

111 255. W 5.31 ☉ Z 6.20 NIEDZIELA 12. W 2.40 r. ☽ Z 6.05 w.

110/256. W 5.33 ☉ Z 6.18 PONIEDZIAŁEK 13. W 3.49 r. ☽ Z 6.24 w.

Wrzesień 1909.

109/257. W 5.34 ☉ Z 6.16 WTOREK 14. W 4.58 r. ☿ Z 6.41 w.

108/258. W 5.36 ☉ Z 6.14 ŚRODA 15. W 6.04 r. ☿ Z 6.56 w.

Wrzesień 1909.

107/259. W 5.37 © Z 6.12 CZWARTEK 16. W 7.11 r. 3 Z 7.11 w.

108/260. W 5.39 © Z 6.09 PIĄTEK 17. W 8.16 r. 3 Z 7.26 w.

Wrzesień 1909.

105/261. W 5.40 ☉ Z 6.07 SOBOTA 18. W 9.23 r. ☽ Z 7.42 w.

104/262. W 5.42 ☉ Z 6.05 NIEDZIELA 19. W 10.31 r. ☽ Z 8.03 w.

Wrzesień 1909.

103/263. W 5.43 ☉ Z 6.03 **PONIEDZIAŁEK 20.** W 11.40 r. ☽ Z 8.26 w.

102/264. W 5.45 ☉ Z 6.00 **WTOREK 21.** W 12.50 w. ☽ Z 8.56 w.

Wrzesień 1909.

101/265. W 5.47 ☉ Z 5.58 ŚRODA 22. W 1.57 w. ☽ Z 9.38 w.

100/266. W 5.48 ☉ Z 5.56 CZWARTEK 23. W 2.58 w. ☽ Z 10.31 w.

Wrzesień 1909.

99/267. W 5.50 ☉ Z 5.54 PIĄTEK 24. W 3.49 w. ☽ Z 11.38 w. ☽

98/268. W 5.51 ☉ Z 5.52 SOBOTA 25. W 4.30 w. ☽ Z — w. ☽

Wrzesień 1909.

97/269. W 5.53 ☉ Z 5.49 NIEDZIELA 26. W 5.04 w. ☽ Z 12.56 r.

98/270. W 6.54 ☉ Z 5.47 PONIEDZIAŁEK 27. W 5.30 w. ☽ Z 2.20 r.

Wrzesień 1909.

95/271. W 5.56 ☉ Z 5.45 WTOREK 28. W 5.52 w. ☽ Z 3.47 r.

Październik 1909.

94/272. W 5.57 ☉ Z 5.43 ŚRODA 29. W 6.13 w. ☽ Z 5.16 r.

Wrzesień 1909.

98/273. W 5.59 ☉ Z 5.41 CZWARTEK 30. W 6.33 w. ☽ Z 6.44 r.

Październik 1909.

99/274. W 6.00 ☉ Z 5.38 PIĄTEK 1. W 6.55 w. ☽ Z 8.12 r.

Październik 1909.

91/275. W 6.02 ☉ Z 5.36 SOBOTA 2. W 7.20 w. ☾ Z 9.39 r.

90/276. W 6.03 ☉ Z 5.34 NIEDZIELA 3. W 7.52 w. ☽ Z 11.03 r.

Październik 1909.

89/277. W 6.05 ☉ Z 5.52 **PONIEDZIAŁEK 4.** W 8.30 w. ☾ Z 12.25 w.

Październik 1909.

88/278. W 6.06 ☉ Z 5.30 **WTOREK 5.** W 9.18 w. ☽ Z 1.31 w.

Październik 1909.

87/279. W 6.08 ☉ Z 5.28 ŚRODA 6. W 10.17 w. ☿ Z 2.28 w.

88/280. W 6.10 ☉ Z 5.28 CZWARTEK 7. W 11.22 w. ☿ Z 3.12 w.

Październik 1909.

85/281. W 6.11 © Z 5.24 PIĄTEK 8. W —.— 3 Z 3.45 w.

84/282. W 6.13 © Z 5.21 SOBOTA 9. W 12.30 r. 3 Z 4.10 w.

Październik 1909.

88/288. W 6.14 ☉ Z 5.19 NIEDZIELA 10. W 1.39 r. ☽ Z 4.31 w.

82/284. W 6.16 ☉ Z 5.17 PONIEDZIAŁEK 11. W 2.48 r. ☽ Z 4.49 w.

Październik 1909.

81/285 . W 6.17 ☉ Z 5.15 Wtorek 12. W 3.55 r. ☽ Z 5.04 w.

80/286. W 6.19 ☉ Z 5.13 ŚRODA 13. W 5.02 r. ☽ Z 5.19 w.

Październik 1909.

79/287. W 6.21 ☉ Z 5.11 CZWARTEK 14. W 6.08 r. ☽ Z 5.33 w.

78/288. W 6.22 ☉ Z 5.09 PIĄTEK 15. W 7.15 r. ☽ Z 5.48 w.

Październik 1909.

77/289. W 8.24 © Z 5.07 SOBOTA 16. W 8.23 r. 3 Z 6.07 w.

78/290. W 6.25 © Z 5.05 NIEDZIELA 17. W 9.32 r. 3 Z 6.29 w.

Październik 1909.

75/201. W 6.27 © Z 5.03 PONIEDZIAŁEK 18. W 10.41 r. 3 Z 6.57 w.

74/202. W 6.29 © Z 5.01 WTOREK 19. W 11.49 r. 3 Z 7.34 w.

Październik 1909.

78/203. W 6.30 ☉ Z 4.59 ŚRODA 20. W 12.51 w. ☽ Z 8.22 w.

72/204. W 6.32 ☉ Z 4.57 CZWARTEK 21. W 1.46 w. ☽ Z 9.22 w.

Październik 1909.

71/206. W 6.34 © Z 4.55 PIĄTEK 22. W 2.29 w. 3 Z 10.30 w.

70/206. W 6.35 © Z 4.53 SOBOTA 23. W 9.04 w. 3 Z 11.53 w.

Październik 1909.

69/297. W 6.37 © Z 4.51 NIEDZIELA 24. W 3.31 w. 3) Z —.—

68/298. W 6.39 © Z 4.49 PONIEDZIAŁEK 25. W 3.54 w. 3) Z 1.16 w.

Październik 1909.

67/299. W 6.10 ☉ Z 4.47 WTOREK 26. W 4.15 w. ☽ Z 2.42 r.

68/300. W 6.42 ☉ Z 4.46 ŚRODA 27. W 4.34 w. ☽ Z 4.09 r.

Październik 1909.

65/301. W 6.43 ☉ Z 4.44 CZWARTEK 28. W 4.56 w. ☾ Z 5.37 r.

64/302. W 6.45 ☉ Z 4.42 PIĄTEK 29. W 5.17 w. ☾ Z 7.06 r.

Październik 1909.

68/808. W 6.47 ☉ Z 4.40 SOBOTA 30. W 5.46 w. ☾ Z 8.34 r.

62/304. W 6.48 ☉ Z 4.38 NIEDZIELA 31. W 6.22 w. ☾ Z 9.58 r.

Listopad 1909.

61/305. W 6.50 ☉ Z 4.37 **PONIEDZIAŁEK 1.** W 7.07 w. ☽ Z 11.15 r.

60/304. W 6.52 ☉ Z 4.35 **WTOREK 2** W 8.03 w. ☽ Z 12.10 w.

Listopad 1909.

59/307. W 6.54 ☉ Z 4.33 ŚRODA 8. W 9.08 w. ☽ Z 1.10 w. ☽

58/308. W 6.55 ☉ Z 4.32 CZWARTEK 4. W 10.18 w. ☽ Z 1.48 w. ☽

Listopad 1909.

57/309. W 6.57 ☉ Z 4.30 PIĄTEK 5. W 11.28 w. ☾ Z 2.16 w.

58/310. W 6.59 ☉ Z 4.28 SOBOTA 6. W —, — ☾ Z 2.38 w.

Listopad 1909.

55/811. W 7.00 ☉ Z 4.27 NIEDZIELA 7. W 12.37 r. ☾ Z 2.57 w.

54/812. W 7.02 ☉ Z 4.26 PONIEDZIAŁEK 8. W 1.45 r. ☾ Z 3.13 w.

Listopad 1909.

58/818. W 7.04 ☉ Z 4.24 WTOREK 9. W 2.51 r. ☾ Z 3.27 w.

52/314. W 7.05 ☉ Z 4.22 ŚRODA 10. W 3.58 r. ☾ Z 3.41 w.

Listopad 1909.

51/815. W 7.07 ☉ Z 4.21 CZWARTEK 11. W 5.05 r. ☽ Z 3.56 w. ☽

50/816. W 7.09 ☉ Z 4.20 PIĄTEK 12. W 6.13 r. ☽ Z 4.14 w. ☽

Lisiopad 1909.

49/317. W 7.10 ☉ Z 4.18 SOBOTA 18. W 7.22 r. ☽ Z 4.34 w.

48/318. W 7.12 ☉ Z 4.17 NIEDZIELA 14. W 8.32 r. ☽ Z 5.00 w.

Listopad 1909.

47/810. W 7.13 ☉ Z 4.16 PONIEDZIAŁEK 15. W 9.41 r. ☾ Z 5.32 w.

48/820. W 7.14 ☉ Z 4.14 WTOREK 16. W 10.46 r. ☾ Z 6.18 w.

Listopad 1909.

45/321. W 7.16 ☉ Z 4.13 ŚRODA 17. W 11.43 r. ☾ Z 7.13 w.

44 322. W 7.18 ☉ Z 4.13 CZWARTEK 18. W 12.29 w. ☾ Z 8.21 w.

Listopad 1909.

43/323. W 7.20 ☉ Z 4.11 PIĄTEK 19. W 1.06 w. ☾ Z 9.37 w.

42/324. W 7.21 ☉ Z 4.10 SOBOTA 20. W 1.35 w. ☾ Z 10.57 w.

Listopad 1909.

41/825. W 7.23 ☉ Z 4.09 NIEDZIELA 21. W 1.58 w. ☽ Z —.—

40/826. W 7.25 ☉ Z 4.08 PONIEDZIAŁEK 22. W 2.19 w. ☽ Z 12.18 r.

Listopad 1909.

88/827. W 7.26 ☉ Z 4.07 WTOREK 23. W 2.37 w. ☾ Z 1.41 r.

88/828. W 7.27 ☉ Z 4.06 ŚRODA 24. W 2.56 w. ☾ Z 3.05 r.

Listopad 1909.

87/829. W 7.49 ☉ Z 4.05 CZWARTEK 25. W 3.16 w. ☿ Z 4.31 r.

80/830. W 7.30 ☉ Z 4.04 PIĄTEK 26. W 3.42 w. ☿ Z 5.57 r.

Listopad 1909.

85/881. W 7.32 ☉ Z 4.03 SOBOTA 27. W 4.14 w. ☾ Z 7.24 r.

84/882. W 7.33 ☉ Z 4.03 NIEDZIELA 28. W 4.53 w. ☾ Z 8.48 r.

Listopad 1909.

88/888. W 7.34. ☉ Z 4.02 PONIEDZIAŁEK 29. W 5.45 w. ☽ Z 10.01 r.

82/884. W 7.36 ☉ Z 4.01 WTOREK 30. W 6.48 w. ☽ Z 11.00 r.

Grudzień 1909.

81/835. W 7.37 ☉ Z 4.01 ŚRODA 1. W 7.59 w. ☽ Z 11.45 r.

80/836. W 7.38 ☉ Z 4.00 CZWARTEK 2. W 9.11 w. ☽ Z 12.17 w.

Grudzień 1909.

28/887. W 7.40 ☉ Z 3.59 PIĄTEK 3. W 10.22 w. ☾ Z 12.48 w.

28/888. W 7.41 ☉ Z 3.59 SOBOTA 4. W 11.31 w. ☾ Z 1.03 w.

Grudzień 1909.

27/339. W 7.42 ☉ Z 3.58 NIEDZIELA 5. W —.— ☾ Z 1.20 w.

26/340. W 7.43 ☉ Z 3.58 PONIEDZIAŁEK 6. W 12.38 r. ☾ Z 1.34 w.

Grudzień 1909.

25/841 W 7.46 ☉ Z 3.58 WTOREK 7. W 1.45 r. ☾ Z 1.48 w.

24/842. W 7.46 ☉ Z 3.58 ŚRODA 8. W 2.51 r. ☾ Z 2.09 w.

Grudzień 1909.

28/848. W 7.47 © Z 3.57 CZWARTEK 9. W 3.59 r. 3 Z 2.18 w.

22/844. W 7.48 © Z 3.57 PIĄTEK 10. W 5.08 r. 3 Z 2.38 w.

Grudzień 1909.

21/845. W 7.49 © Z 3.57 SOBOTA 11. W 6.18 r. 3 Z 3.02 w.

20/846. W 7.50 © Z 3.57 NIEDZIELA 12. W 7.29 r. 3 Z 3.33 w.

Grudzień 1909.

19/847. W 7.51 © Z 3.57 **PONIEDZIAŁEK 13.** W 8.38 r. 3 Z 4.18 w.

18/848. W 7.52 © Z 3.57 **WTOREK 14.** W 9.38 r. 3 Z 5.07 w.

Grudzień 1909.

17/849. W 7.53 ☉ Z 8.57 ŚRODA 15. W 10.29 r. ☾ Z 6.11 w.

16/850. W 7.54 ☉ Z 8.57 CZWARTEK 16. W 11.09 r. ☾ Z 7.26 w.

Grudzień 1909.

15/851. W 7.54 ☉ Z 9.57 PIĄTEK 17. W 11.39 r. ☾ Z 8.46. w.

14/852. W 7.55 ☉ Z 3.58 SOBOTA 18. W 12.05 w. ☾ Z 10.05 w.

Grudzień 1909

18/353. W 7.56 ☉ Z 3.58 NIEDZIELA 19. W 12.25 w. ☾ Z 11.26 w.

12/354. W 7.57 ☉ Z 3.58 PONIEDZIAŁEK 20. W 12.43 w. ☾ Z — — —

Grudzień 1909.

11 355. W 7.57 ☉ Z 3.59 WTOREK 21. W 1.01 w. ☽ Z 12.47 r.

10 356. W 7.58 ☉ Z 3.59 ŚRODA 22. W 1.20 w. ☽ Z 2.09 r.

Grudzień 1909.

9/357. W 7.58 ☉ Z 4.00 CZWARTEK 23. W 1.42 w. ♃ Z 3.32 r. ||

8 358. W 7.59 ☉ Z 4.00 PIĄTEK 24. W 2.09 ♃ Z 4.57 r. ||

Grudzień 1909.

7.350. W 7.59 ☉ Z 4.01 SOBOTA 25. W 2.44 w. ☾ Z 6.20 r.

6.340. W 7.59 ☉ Z 4.02 NIEDZIELA 26. W 3.30 w. ☾ Z 7.37 r.

Grudzień 1909.

5/361. W 8.00 ☉ Z 4.03 **PONIEDZIAŁEK 27.** W 4.27 w. ☾ Z 8.44 r.

4/362. W 8.00 ☉ Z 4.03 **WTOREK 28.** W 5.35 w. ☾ Z 9.36 r.

Grudzień 1909.

3/368.

W 8.00 ☉ Z 4.04

ŚRODA 29.

W 6.48 w. ☽ Z 10.15 r.

2/364.

W 8.00 ☉ Z 4.05

CZWARTEK 30.

W 8.02 w. ☽ Z 10.44 r.

TABELKA POŁOWICZA DO WYPŁAT.

Lp.	1909		1910	
	W.	Z.	W.	Z.
1.	1.00	1.00	1.00	1.00
2.	1.00	1.00	1.00	1.00
3.	1.00	1.00	1.00	1.00
4.	1.00	1.00	1.00	1.00
5.	1.00	1.00	1.00	1.00
6.	1.00	1.00	1.00	1.00
7.	1.00	1.00	1.00	1.00
8.	1.00	1.00	1.00	1.00
9.	1.00	1.00	1.00	1.00
10.	1.00	1.00	1.00	1.00
11.	1.00	1.00	1.00	1.00
12.	1.00	1.00	1.00	1.00
13.	1.00	1.00	1.00	1.00
14.	1.00	1.00	1.00	1.00
15.	1.00	1.00	1.00	1.00
16.	1.00	1.00	1.00	1.00
17.	1.00	1.00	1.00	1.00
18.	1.00	1.00	1.00	1.00
19.	1.00	1.00	1.00	1.00
20.	1.00	1.00	1.00	1.00
21.	1.00	1.00	1.00	1.00
22.	1.00	1.00	1.00	1.00
23.	1.00	1.00	1.00	1.00
24.	1.00	1.00	1.00	1.00
25.	1.00	1.00	1.00	1.00
26.	1.00	1.00	1.00	1.00
27.	1.00	1.00	1.00	1.00
28.	1.00	1.00	1.00	1.00
29.	1.00	1.00	1.00	1.00
30.	1.00	1.00	1.00	1.00
31.	1.00	1.00	1.00	1.00
32.	1.00	1.00	1.00	1.00
33.	1.00	1.00	1.00	1.00
34.	1.00	1.00	1.00	1.00
35.	1.00	1.00	1.00	1.00
36.	1.00	1.00	1.00	1.00
37.	1.00	1.00	1.00	1.00
38.	1.00	1.00	1.00	1.00
39.	1.00	1.00	1.00	1.00
40.	1.00	1.00	1.00	1.00
41.	1.00	1.00	1.00	1.00
42.	1.00	1.00	1.00	1.00
43.	1.00	1.00	1.00	1.00
44.	1.00	1.00	1.00	1.00
45.	1.00	1.00	1.00	1.00
46.	1.00	1.00	1.00	1.00
47.	1.00	1.00	1.00	1.00
48.	1.00	1.00	1.00	1.00
49.	1.00	1.00	1.00	1.00
50.	1.00	1.00	1.00	1.00
51.	1.00	1.00	1.00	1.00
52.	1.00	1.00	1.00	1.00
53.	1.00	1.00	1.00	1.00
54.	1.00	1.00	1.00	1.00
55.	1.00	1.00	1.00	1.00
56.	1.00	1.00	1.00	1.00
57.	1.00	1.00	1.00	1.00
58.	1.00	1.00	1.00	1.00
59.	1.00	1.00	1.00	1.00
60.	1.00	1.00	1.00	1.00

Wydruk z ...
 Drukarnia ...
 Warszawa 1909

Grudzień 1909.

1/365. W 8.00 Ⓞ Z 4.06 PIĄTEK 31. W 9.14 w. 3 Z 11.06 r.

W 8.00 Ⓞ Z 4.06 PIĄTEK 31. W 9.14 w. 3 Z 11.06 r.

TABELKA POMOCNICZA DO WYPŁAT.

Dzi	P L A C A					P L A C A					P L A C A											
	E					E					E											
	0,24	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,75	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,25	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,75	1,80	1,90	
1	0,24	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,75	0,80	0,90	1	1,10	1,20	1,25	1,30	1,40	1,50	1	1,60	1,70	1,75	1,80	1,90
2	0,48	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,50	1,60	1,80	2	2,20	2,40	2,50	2,60	2,80	3,00	2	3,20	3,40	3,50	3,60	3,80
3	0,72	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,25	2,40	2,70	3	3,30	3,60	3,75	3,90	4,20	4,50	3	4,80	5,10	5,25	5,40	5,70
4	0,96	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,00	3,20	3,60	4	4,40	4,80	5,00	5,20	5,60	6,00	4	6,40	6,80	7,00	7,20	7,60
5	1,20	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	3,75	4,00	4,50	5	5,50	6,00	6,25	6,50	7,00	7,50	5	8,00	8,50	8,75	9,00	9,50
6	1,44	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,50	4,80	5,40	6	6,60	7,20	7,50	7,80	8,40	9,00	6	9,60	10,20	10,50	10,80	11,40
7	1,68	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,25	5,60	6,30	7	7,70	8,40	8,75	9,10	9,80	10,50	7	11,20	11,90	12,25	12,60	13,30
8	1,92	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,00	6,40	7,20	8	8,80	9,60	10,00	10,40	11,20	12,00	8	12,80	13,60	14,00	14,40	15,20
9	2,16	2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	6,75	7,20	8,10	9	9,90	10,80	11,25	11,70	12,60	13,50	9	14,40	15,30	15,75	16,20	17,10
10	2,40	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	7,50	8,00	9,00	10	11,00	12,00	12,50	13,00	14,00	15,00	10	16,00	17,00	17,50	18,00	19,00
11	2,64	3,30	4,40	5,50	6,60	7,70	8,25	8,80	9,90	11	12,10	13,20	13,75	14,30	15,40	16,50	11	17,60	18,70	19,25	19,80	20,90
12	2,88	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,00	9,60	10,80	12	13,20	14,40	15,00	15,60	16,80	18,00	12	19,20	20,40	21,00	21,60	22,80
13	3,12	3,90	5,20	6,50	7,80	9,10	9,75	10,40	11,70	13	14,30	15,60	16,25	16,90	18,20	19,50	13	20,80	22,10	22,75	23,40	24,70
14	3,36	4,20	5,60	7,00	8,40	9,80	10,50	11,20	12,60	14	15,40	16,80	17,50	18,20	19,60	21,00	14	22,40	23,80	24,50	25,20	26,60
1/2	0,12	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,38	0,40	0,45	1/2	0,55	0,60	0,62	0,65	0,70	0,75	1/2	0,80	0,85	0,88	0,90	0,95
3/4	0,18	0,22	0,30	0,38	0,45	0,52	0,56	0,60	0,68	3/4	0,82	0,90	0,94	0,98	1,05	1,12	3/4	1,20	1,28	1,31	1,35	1,42

Obliczenie dla płacy po 12, 15, 20 gr. przeprowadza się według rubryk 24, 30, 40, dzieląc odpowiednie liczby przez 2.

majątku

głównego

Stawy
wodyDrogi
i pod
zabu-
dowa-
niamiOgro-
dy,
sadyNieu-
żytki

Ogółem

Uwagi

m o r g i i s a ż n i e

Zmianowania

01/19/18

Data	Opis	Lp.	Wzrost	Ciężar ciała	Ciężar serca
18.02.18	Pierwsza kontrola	1	120	15	5
22.03.18	Drugie badania	2	122	16	5
20.04.18	Trzecie pomiary	3	125	17	5
21.05.18	Czwarte badania	4	127	18	5
21.06.18	Piąte pomiary	5	130	19	5
21.07.18	Szóstymi badaniami	6	133	20	5
21.08.18	Siódme badania	7	135	21	5
21.09.18	Ósmymi badaniami	8	138	22	5
21.10.18	Dziesiątymi badaniami	9	140	23	5
21.11.18	Jedenaste badania	10	143	24	5
21.12.18	Dwadzieścia badaniami	11	145	25	5
21.01.19	Trzydziestu badaniami	12	148	26	5
21.02.19	Czterdziestu badaniami	13	150	27	5
21.03.19	Pięćdziesiętu badaniami	14	153	28	5
21.04.19	Szóśćdziesiętu badaniami	15	155	29	5
21.05.19	Siódmdziesiętu badaniami	16	158	30	5
21.06.19	Osiemdziesiętu badaniami	17	160	31	5
21.07.19	Dziewięćdziesiętu badaniami	18	163	32	5
21.08.19	Sto badaniami	19	165	33	5
21.09.19	Sto pięćdziesiętu badaniami	20	168	34	5
21.10.19	Sto osiemdziesiętu badaniami	21	170	35	5
21.11.19	Sto trzydziestu badaniami	22	173	36	5
21.12.19	Sto pięćdziesięciu badaniami	23	175	37	5
21.01.20	Sto siedemdziesiętu badaniami	24	178	38	5
21.02.20	Sto osiemdziesiętu badaniami	25	180	39	5

Gatunek zwierząt		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj
		S z t u k				
B y d ł o	Buhaje					
	Krowy					
	Jalówki cielne					
	Jalownik					
	Cielęta					
	Woly opasowe					
	Woly robocze					
	Razem					
K o n i e	Robocze					
	Wierzchowe					
	Wyjazdowe					
	Żrebięta					
	Ogiery					
	Razem					
O w c e	Tryki					
	Maciory					
	Skopy					
	Roczniaki					
	Jagnięta					
	Razem					
S w i n i e	Knury					
	Maciory					
	Wieprzki					
	Prosięta knur.					
	Loszki					
	Karmniki					
	Razem					

inwentarza.

Ważono dnia

Waży w kilogramach

inwentarza.

Ważono dnia

Waży w kilogramach

Dzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
dzienny udój całej obory w litrach						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
Do przen.						

Dzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
	dzienny udój całej obory w litrach					
Z prz.						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
Razem						

Stanowienie i cielenie się krów.

Liczba krowy	1-y raz	2-i raz	3-i raz	4-y raz	Powinna się ocieścić dnia	Nie doi się od dnia	Przybyła: Ja- łówka=J, By- czek=B, dnia	Uwagi
	stanowiona buhajem L. d n i a							

Stanowienie i cielenie się krów.

Liczba krowy	1-y raz	2-i raz	3-i raz	4-y raz	Powinna się ocieścić dnia	Nie doi się od nią	Przybyła: Jałówka = J, Byczek = B, dnia	Uwagi
	stanowiona buhajem L. d n i a							

dzienne.

Preliminarz paszy na rok 190.....

potrzeba na cały rok.

paszy

Gatunek paszy

gramach

w q.

Inwentarz marylwy.

Wyszczególnienie	Było na	Jest	Wartość		Wartość	
	początku	w	sztuki		ogółem	
	roku	końcu	K.	gr.	K.	gr.
	sztuk					
Arfy do przesiew. piasku						
Barcze do wozów . . .						
Beczki » . . .						
» do kapusty . . .						
Bryczki parokonne . . .						
» jednokonne . . .						
Brony łąkowe						
» żelazne						
» drewniane						
Cebry do mleka						
Cecha do znaczenia . . .						
Cecha do wypalania . . .						
Chomonta fornalskie . . .						
» wyjazdowe						
Czapraiki						
Dery						
Drabiny na wozy						
» zwykłe						
Drapacze						
Dragi żelazne						
Ekstyrpatory						
Gniotowniki						
Grabie konne						
» ręczne						
Gwichty						

Inwentarz martwy.

Wyszczególnienie	Było na początku roku	Jest w końcu roku	Wartość sztuki		Wartość ogółem	
			K.	gr.	K.	gr.
Haki do gnoju						
Jarzma na woły						
Kłódki						
Klucze do muter						
Kosy ręczne						
Kosiarki						
Kowadła						
Kubelki do wody						
Kultywatory						
Latarnie						
Lewary						
Linki do siana						
Luśnie z nalustkami						
Łańcuszki na konie						
Łańcuchy do drzewa						
Mażnice do smoly						
Miary do zboża						
Miechy kowalskie						
Mlocarnie						
Młoty do kamieni						
Młynki do czyszczenia do mielenia						
Motyki						
Mundsztuki						
Narzędzia kowalskie						

Inwentarz martwy.

Wyszczególnienie	Było na początku roku	Jest w końcu roku	Wartość sztuki		Wartość ogółem	
			K.	gr.	K.	gr.
Narzędzia stolarskie						
» tokarskie						
Nosidla do gnoju						
Obsypywacze						
Oskardy						
Pilniki						
Piły trackie						
» ręczne						
Płachty do zboża						
Pługi drewniane						
» żelazne						
» przegonowe						
» różne						
Pogłębiacze						
Popręgi						
Pólszorki						
Przetaki						
Przetrząsacze						
Radła						
Sanki wyjazdowe						
Saneczki do pługów						
Sanie robocze						
Sieczkarnie						
Siekiery						
Siewniki						

Inwentarz martwy.

Wyszczególnienie	Było na początku roku	Jest w końcu roku	Wartość sztuki		Wartość ogółem	
			K.	gr.	K.	gr.
Sikawki						
Siodła						
Sita						
Skopki do doju						
Skrzynie do kartofli						
Spychacze do siana						
Śrubsztaki (imadła)						
Stolki do doju						
Szatkwonice do kapusty						
Szle parciane						
Szpadle i łopaty						
Szufle do zboża						
Taczki » »						
» grabarskie						
Uzdzienice						
Wagi dziesiętne						
» belkowe						
Walce żelazne						
» drewniane						
Wialnie						
Widły do siana						
» do gnoju						
Włóki						
Worki do zboża						
Wozy na żelazn. osiach						

L.	P R Z Y C H Ó D	K.	gr.
	Z czynszów, dzierżaw		
	Z ziemiopłodów: zboże		
	nasiona, koniczyna		
	okopowe		
	Za sprzedane zwierzęta: konie		
	bydło		
	owce		
	świnie		
	Za nabiał		
	Za drób		
	Z ogrodu		
	Za drzewo		
	Za ściółkę		
	Z		
	Z		
	Z		
	Z		
	Z		
	Z		
	Nadzwyczajne		
	Wartość budynków z końc. roku		
	» inwent. żyw. » »		
	» » martw. » »		
	» zapasów w produktach		
	Przychód ogółem		
	Rozchód		
	Zysk		

ROZCHÓD

L.	R O Z C H Ó D	K.	gr. %
	Podatki		
	Melioracje		
	Zarząd		
	Pensye i najem		
	Kupno inwentarza żywego		
	Kupno nasion		
	Kupno nawozów		
	Kupno machin i narzędzi		
	Kupno materiałów rzemieśl.		
	Zapłata rzemieślników		
	Utrzymanie ogrodów		
	» drobiu		
	» mleczarni		
		
		
		
	Nadzwyczajne		
	Wartość budowli w pocz. roku		
	» inwent. żyw. » »		
	» » martw. » »		
	» zapasów w produktach		
	Rozchód ogółem		

CZEŚĆ II.

Uwagi i wskazówki co do uprawy gleby i roślin

przez

prof. J. M. Pomorskiego i prof. Dr. K. Miczyńskiego.

Chcąc podnieść swe gospodarstwo polowe i łąkowe rolnik winien przede wszystkim rozważyć następujące punkty:

1. *Jak uregulowane są stosunki wilgotności gleby?* Czy nie jest ona za wilgotną? a więc czy poziom wody gruntowej nie jest za wysokim? Czy woda gruntowa i powierzchniowa mają należyty odpływ? Czy wreszcie tam gdzie potrzeba ni da się zastosować nawodnienia? Uregulowanie wilgotności gleby jest podstawą racjonalnego rolnictwa i, gdzie mamy jakieś nieprawidłowości pod tym względem, działalność naszą zaczynać musimy od melioracyi.

Odwodnienie skutecznie możemy za pomocą: 1. drenowania, 2. rowów otwartych, 3. uprawy i systemu rowów według metody Korzybskiego.

Drenowanie jest najlepszym sposobem odwodnienia, najdroższym w założeniu, lecz najtańszym w utrzymaniu. Rowy otwarte mniej kosztują na razie, lecz utrzymanie ich jest drogiem. Powodują stratę znacznej części powierzchni użytkowej pola i przyczyniają się do zachwaszczania pola. Metoda Korzybskiego orki w kierunku długiego spadku pola i rowów rozorywanych posiada wyższość nad rowami otwartymi i doskonale odprowadza wodę powierzchniową. Wymaga podobnie jak inne sposoby odwodnienia — przeprowadzenia niwelacyi pól.

Przy drenowaniu, rurki ssące zakłada się w liniach: odległych od siebie na 10—35 m. zależnie od zwięzłości gleby, nie dłuższych nad 200 m. Muszą mieć spad 0.2—0.3 m. na 100 m. bieżących. Głębokość drenów 1.2—1.5 m. Wyloty drenów zbierających powinny być zabezpieczone od zanieczyszczania się i włączenia zab. Drenowanie nie powinno przechodzić blisko drzew. Na polu drenowaniem nie powinno się uprawiać w 1-ym roku buraków i rzepaku, celem uniknięcia zatkania drenów przez korzenie.

Zależnie od gęstości potrzebnej sączków, drenowanie kosztuje 30—140 koron (30—56 rubli) morg.

Rowy mogą mieć mniejszy spadek niż dreny. Łąki i torfowiska odwadnia się zwykle rowami, dając je w odległości 20—50 m. Spód rowu powinien mieć przynajmniej 30 cm. szerokości. Rowy nie powinny się stykać jedne z drugimi pod ostrym kątem. Rowy do głębokości 15 cm. kopie się o prostopadłych ścianach. Nachylenie ścian rowu zależy od gatunku gleby i szybkości prądu. Daje się szerokość wierzchu rowu równą:

przy glebach torfowych, murszach	2	do 7	szerok. dna rowu
• • • piaszczystych	4	• 7	• • •
• • • glinkowatych	3	• 5	• • •
• • • ciężkich gliniastych	1½	• 3	• • •

Głębokość rowu zależy od tego, do jakiego stopnia chcemy obniżyć poziom wody gruntowej.

Poziom wody gruntowej wynosić powinien:

dla łąk	0.50—0.75	od naziomu
dla pól uprawnych	0.75—1.25	»
w ogrodach	1.00—2.30	»

2. *Czy dba dostatecznie o utrzymanie i podniesienie żyzności gleby?* Żyzność gleby zależy od tego, jak wielkie są w niej zasoby pokarmów roślinnych, a następnie, o ile te pokarmy są dostępne dla roślin. Ten drugi wzgląd jest bardzo ważnym, i z tego powodu, **ogólna analiza chemiczna gleby**, nie będąca w stanie odpowiedzieć na pytanie, jaka część składników gleby może być łatwo przez rośliny pobrana, daje nam tylko ogólnikowy obraz zasobów gleby, ale nie może być miarą żyzności gleby. Tylko w wyjątkowych wypadkach dostarcza nam jakichś wskazówek, czem ziemię nawozić trzeba. Jeśli weźmiemy pod uwagę warstwę roli głęboką tylko na 20 cm., to znajdujemy na naszych glinkach, na morgu masę ziemi ważącą około 15.000 q. i zawierającą przy przeciętnym składzie ziemi 1.500 kg. kwasu fosforowego, 1.500 kg. azotu, a do 15.000 kg. potasu. Wobec tych liczb, niezmiernie małemi wydadzą się nam te, które wyciąga z ziemi największy chociażby plon. N. p. plon pszenicy z 16 q. ziarna i 40 q. słomy, zabiera przeciętnie 54 kg. azotu, 22 kg. kwasu fosforowego i 26 kg. potasu z morga ziemi. Na ileżby to plonów wystarczyło, gdyby cały zasób gleby był łatwo pobieralnym! A że tak nie jest przekonywa nas praktyka — musimy ziemię nawozić, wzmagać jej zasoby przez obornik, nawozy kupne i t. p. Jest to środek łatwiejszy do zastosowania, prędzej działający, ale rolnik powinien obok niego nie zapominać o środkach innych, mających na celu **uruchomienie skarbów gleby**. Do nich należą: przede wszystkim uprawa, wszelkie melioracye polegające głównie na uregulowaniu stosunków wilgotności i przewiewności gleby, pośrednie oddziaływanie rozkładających się resztek organicznych. Jeśli potrafimy udostępnić większą ilość martwych zasobów gleby, tem samem ograniczamy potrzebę nawożenia.

Żyzność gleb.

To, co mienimy dobrocią, żyznością gleby, polega na dostarczaniu roślinom obfitości pokarmów i odpowiednich warunków fizykalnych. Żyzność gleby może być naturalną albo też nabytą. Nabywa żyzności gleba przez uprawę — nawożenie — uprawę roślin wzbogacających glebę. Nabyć żyzności trwałej gleba odrazu nie może. Nagromadza się ona powoli, można ją utrzymywać, można ją i zniszczyć przez brak starania. Wpływ uprawy na żyzność gleby polega na uruchomieniu zasobów istniejących już w roli. Im rola jest z natury żźniejszą, tem więcej możemy osiągnąć odpowiednią uprawą, ale tylko do pewnego stopnia, na ile bogactwo ziemi pozwala.

Mechaniczna uprawa gleby.

Cel: Wytworzenie możliwie małą pracą gleby równomiernie i odpowiednio do potrzeb danej rośliny zgruzłonej (posiadającej odpowiedni stopień pulchności), uregulowanie wilgotności gleby; niszczenie chwastów.

Plug, oprócz wymieszania gleby, ułatwia dostęp powietrza do gleby, ułatwia wsiąkanie wody, ułatwia rozwój korzeni roślin. Ale plug wzmaga parowanie, suszy więc rolę silniej, niż radło, ekstyrapator, kultywator i t. p. *Zasadą powinno być uzyskanie odpowiedniego stanu roli możliwie najmniejszą liczbą orok.* W letniej porze za plugiem powinna iść zaraz brona.

Głębokość orki zależy od rodzaju gleby, siły nawozowej gleby i t. p. W większości wypadków, lecz nie wszędzie, dążenie do pogłębienia orki będzie racjonalnem. Pogłębienie orki jest kosztownem, bo wymaga liczniejszego sprzężaju, droższych narzędzi — pogłębienie orki powinno być przedsięwzięciem powoli i pod zimę. Orkę do 10 cm. nazywamy płytką; 10—20 cm. jest głębokość normalna; powyżej 20 cm. nazywamy orkę głęboką. W glebie średnio zwięzłej z wykluczeniem bardzo spoistych glin zarówno jak i skrajnych piaszczystych gleb potrzebna siła pociągowa na 100 cm.² przekroju skiby wynosi:

Głębokość orki:	0.15—0.20	0.21—0.30	0.31—0.35 cm.
-----------------	-----------	-----------	---------------

Potrzebna siła pociągowa	30—35	40—45	50—55
kilogramometrów			

(75 kilogramometrów = 1 koń parowy).

Jeden plug zorze średnio:

przy podorywce ścierni	6—10 cm.	—	0.30—0.70 ha
	15—18 »	—	0.20—0.30 »
» zwykłej orce	15—18 »	—	0.20—0.50 »
» głębokiej orce	20—30 »	—	0.30—0.50 »
» orce z kopaniem bruzdy			
(4 konie, 8 ludzi z łopatami)	30—40 »	—	0.25—0.50 »

Przy zaprzęgu wołami wydajność roboty do 25% mniejsza.

Plugpar. dwumas. przy 11—15 g. rob. dz.	30—40 cm.	—	6—8 ha
	przy orce na 15—21 »	—	8—12 »
	bronowaniu		16—20 »

Do orki miejsc górzystych nadają się specjalnie plugi z odkładnicą odwracaną.

Kultywatory, ekstyrapatory, grubery, drapacze i t. p. narzędzia robią na 1 m. szerokości narzędzia 1.5 do 2 ha na 10 godzin pracy.

Zjawiskiem niemal powszechnem jest to, że plugi wychodzące z fabryki orzą zrazu doskonale, a potem coraz gorzej, szczególnie po poprawkach robionych przez nieumiejętnych kowali. Dzieje się to wskutek wadliwego ustawienia korpusów, lemieszów plugów, a też często wskutek skrzywienia ramy do której korpusy są przymocowywane.

Aby móżdż plug wieloskibowy skutecznie poprawić należy wtedy, kiedy jeszcze jest nowy:

1. Zbić sobie z lat mocną formę ramy.

2. Na desce wyheblowanej naznaczyć przybitemi listewkami położenie lemieszów i oznaczyć na niej pionem punkty, które mają przypadać pod kąty ramy.

3. Do deski przymocować słupki odpowiednio wysokie, na punktach przypadających pod końce ramy, kiedy lemiesz są prawidłowo ustawione na desce.

Posiadając taki szablon należy sprawdzać kształty pluga i doprowadzać do pierwotnego stanu. Samo przez się się rozumie, że dla dobrej orki potrzeba, aby lemiesz był odpowiedniego kształtu (wyklepywanie na specjalnych kowadełkach)

dobrze i gładko połączony z odkładnicą i dobrze ustawiony t. j. nie nadto zagłębiony i nie nadto wysunięty w pole.

Brona powstrzymuje utratę wilgoci, choć wysusza wierzchnią warstwę roli. Bronowanie orki na zimę jest nieracjonalnym — gdyż przez to zatrzymuje się mniej śniegu na powierzchni roli, a zarazem mróz nie wywiera na zrównane skiby tak silnego działania. Bronowanie zbyttnio rolę rozpylające jest niebezpiecznym ze względu na wytwarzanie skorupy, wskutek każdego, nieco większego deszczu. Z tego względu, jak również i dla bardzo ważnego dla ozimin przykrycia śniegiem, korzystniejszym jest umiarkowanie zbrylona powierzchnia.

Na uwagę zasługują brony talerzowe, krające powierzchnię roli i brony sprężynowe i kultywatory. Mogą one zastępować wieloskibowe pługi przy uprawie ściernisk.

Brony talerzowe i szpadlowe krają, a po części i odwracają ziemię. Służą do przygotowania roli, szczególnie zadarnionej pod orkę (odpowiednie dla tego celu na grunta torfowe) do powierzchniowego wzruszenia roli na wiosnę, wreszcie służyć mogą do podkładania ściernisk (na glebach lżejszych).

Włóczka. Każde gospodarstwo powinno mieć brony lżejsze i cięższe, do rozmaitych celów służące.

Para koni w bronach robi w 10 godzinach 1.7 do 2.3 ha

Przy lekkim gruncie > > > 2.3 > 3.0 >

Włóką zrobić można > > > 4.0 >

Włóka. Działanie brony odwróconej. Włóka nie ma zębów, lecz połączone łańcuszkami poprzeczne beleczki żelazne lub drewniane. Włóka rozbija bryły lepiej niż brona. Wyrównuje lepiej powierzchnię, wzrusza doskonale wytworzoną skorupę i wymaga mniej siły pociągowej, niż brona. Jest szczególnie przydatną na wiosnę dla wzruszenia roli oraz wyrównania jej pod siewnik, dla niszczenia wytworzonej skorupy.

Walec. Działanie ciężkiego jest wręcz przeciwne bronie. Zwiększa utratę wilgoci — przez wzmoczenie parowania, lecz czasowo, wierzchnie warstwy mogą być wilgotniejsze kosztem warstw spodnich. Walec powoduje ugniecenie warstw ziemi; używamy go więc tam, gdzie nam chodzi o przyspieszenie uleżenia się ziemi. Ze względu na wysuszenie ziemi, dobrze jest po zwalcowaniu wzruszyć wierzchnią warstewkę roli za pomocą włóki lub lekkiej brony. Działanie walca lekkiego kruszącego i wyrównywającego powierzchnię jest pośredni pomiędzy działaniem walca i brony.

Działanie walca na 1 m. szerokości w 10 godzinach około 2 ha.

Narzędzia służące do upraw posiewnych. Przy używanych u nas narzędziach do upraw posiewnych, szczególnie buraków, popełnianym bywa często ten błąd, że się zbyt szybko roślinę wysoko obsypuje, a przez to następne roboty nie mogą być odpowiednio skutecznymi.

Pielniki i radełka jednorzędowe robią dziennie 1—1.2 ha.

Nawożenie.

Powszechny system nawożenia, oparty na oborniku bez dopkna pasz i ściółki, jest co do swej treści wzbogacaniem ziemi w części organiczne i azot w miarę uprawy roślin motylkowych. Co do składników popiołowych jest on tylko skupianiem pokarmów roślinnych na pewien punkt, lecz to, co ziemia dostanie jednego roku, oddaje roślinom przez szereg

lat. Każdy system nawożenia jest do pewnego stopnia uruchamiającym zasoby naturalne gleby, a więc n. p. wapnowanie, gipsowanie, a też saletrowanie, kałnitowanie i t. p. Wszystkie te ciała dodane ziemi uruchamiają inne związki. Każde nawożenie środkami zakupywanymi z zewnątrz gospodarstwa, czy to w formie karmy dla bydła, czy ściółki, czy też wreszcie w postaci nawozów kupnych jest wzbogacaniem gleby, podniesieniem naturalnych warunków jej żyzności. Tego rodzaju nawożenie pomnaża zawsze kapitały ziemi, ale błędnym byłby rachunek, w którym byśmy obliczali wartość wzmocnienia żyzności ziemi ilością pieniędzy wydanych na zakupno środków nawozowych. Trzeba bowiem rozróżniać w zasobach pokarmów roślinnych w glebie zapas i kapitał obrotowy. Nawozami dążymy do wzbogacenia owej cenniejszej części mianowicie kapitału obrotowego, tylko niezużyty, większy ich zapas przechodzi w formę zapasową — mniej wartościową, trudniej roślinom dostępną.

Każde nawożenie jest zbytelnem, jeśli bez niego da się osiągnąć równie wysoki plon. *Nawożenie jest uzupełnieniem braków roli.* Zawsze więc musi być brane pod uwagę to, co roślina znaleźć w glebie może. Brak gleby pod względem jakiegoś pokarmu roślinnego może być stały (trwały) tj. ziemia nie może dać dostatecznej ilości pokarmu roślinie, i czasowy, przejściowy, roślinie brakuje pokarmu tylko w pewnym okresie życia i przechodzi później, czy to wskutek tego, że roślina potrzebuje tylko w tym pierwszym okresie większych ilości pewnego pokarmu, czy też, że w glebie, może w innej porze roku, odbywają się procesy, uruchamiające znacznie większą część kapitału zapasowego.

Nawożenie działać może korzystnie pośrednio przez pobudzenie rośliny do obfitszego wytworzenia korzeni lub głębszego ich zapuszczenia. Przez to potęgują się zdolności pobierania pokarmów przez roślinę i tem tłumaczyć sobie należy często korzystne oddziaływanie małych dawek pewnego, jednostronnego nawozu, danego w pierwszym okresie rozwoju rośliny, nawet na glebach, nie cierpiących na brak danego pokarmu. Takim n. p. jest często działanie superfosfatu na buraki cukrowe.

Przeciętny skład chemiczny nawozów (według E. Wolffa).

Rodzaj nawozu	Wody	Mat. organicz.	Azotu ogółem	Azotu amonjak.	Kw. fosfor. ogółem	Kw. fosfor. rozp. w wodzie	Tlenku potas.	Tlenku wapniowego	Tlenku magnezowego	Kwasu siarkowego	Chloru i fluoru
I. Odchody zwierzęce.	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00	0/00
Świeży obornik											
koński	713	254	5.8	2.0	2.8	—	5.3	2.5	1.4	0.7	0.4
bydły	775	200	4.2	1.5	2.5	—	5.0	4.5	1.0	0.8	1.0
owczy	646	318	3.3	2.2	2.3	—	6.7	3.3	1.8	1.5	1.7
świński	724	250	4.5	0.8	1.9	—	6.0	0.8	0.9	0.8	1.7
Obornik											
przeżniły przecięt.	750	210	5.0	2.0	2.0	—	6.0	5.0	1.2	1.0	1.3

Rodzaj nawozu	Wody	Mat. organicz.	Azotu ogółem	Azotu Amonjak.	Kw. fosfor. ogółem	Kw. fosfor. rozp. w wodzie	Tlenku potas.	Tlenku wapniowego	Tlenku magnezowego	Kwasu siarkowego	Chloru i fluoru
	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰
Obornik leżący 3-5 miesięcy na gnojowni	770	170	5.5	1.3	2.5	—	7.0	7.0	1.8	1.5	1.9
Obornik pod bydłem przechowywany	750	200	7.5	2.7	4.0	—	8.0	8.5	2.1	1.8	2.0
Gnojówka (z gnojowni)	982	7	1.5	1.3	0.1	—	4.9	0.3	0.4	0.7	1.2
Ludzkie odchody stale świeże	772	196	13.0	0.0	11.6	0.0	4.0	6.2	3.6	0.8	0.4
Ludzkie moczu świeży	965	33	8.0	0.0	1.6	1.6	1.9	0.2	0.2	0.4	5.0
Mieszanka obydwu w stanie świeżym	937	49	8.5	0.0	2.6	1.4	2.1	0.8	0.6	0.5	4.0
Ludzkie odchody z dołów kloacznych	964	27.7	3.7	1.1	1.6	—	1.5	1.0	0.6	0.4	4.5
Ludzkie odchody z klozetów	923	55.4	7.5	4.3	2.7	1.2	2.9	1.8	0.9	0.5	—
Ludzkie odchody wymieszane ze śmieciami	523	151	5.6	2.7	5.5	1.3	4.3	17.9	3.2	6.1	3.0
Ludzkie odchody wymieszane z proszkiem torfow.	824	144	8.3	2.4	3.7	1.3	3.4	0.6	0.8	—	3.1
Świeże odchody kałek	566	262	10.0	—	11.0	—	6.2	17.0	3.5	3.5	—
Świeże odchody gęsi	771	134	5.5	—	5.4	—	9.5	8.4	2.0	1.4	—
Świeże odchody kur	560	255	16.3	—	15.4	—	8.5	24.0	7.4	4.5	—
Świeże odchody gólibi	519	308	17.6	—	17.8	—	10.0	16.0	5.0	3.3	—
2. Sztuczne nawozy i sole.	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰
Superfosfat z fosforytów	10.0	—	—	—	19.0	18.0	—	23.0	—	26.0	—
Superfosfat z kości	13.0	23.8	0.5	—	20.0	19.0	0.1	24.4	0.7	17.5	—
Żużle Thomasa (*rozp. w kw. cytr.)	—	—	—	—	17.5	16.0*	—	48.3	4.9	0.3	—
Mąka kostna	6.0	30.3	4.0	—	21.0	—	0.2	31.3	1.0	0.1	—
" " parzona	—	—	3.5	—	20	—	—	—	—	—	—
" " preparowana	—	—	1.5-2	—	16	10-14	—	—	—	—	—
Węgiel kostny	8.0	8.0	0.7	—	25.0	—	0.1	40.0	1.1	0.4	—
Popiół kostny	6.0	3.0	—	—	35.4	—	0.3	46.0	1.2	0.4	—

Rodzaj nawozu	Wody	Mat. organicz.	Azotu ogółem	Azotu Amonjak.	Kw. fosfor. ogółem	Kw. fosfor. rozp. w wodzie	Tlenku potas.	Tlenku wapniowego	Tlenku magnezowego	Kwasu siarkowego	Chloru i fluoru
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Mączka rogowa	8.5	68.5	10.2	—	5.5	—	—	6.6	0.3	0.9	—
Saletra chilijska	2.6	—	15.5	—	—	—	—	0.4	—	0.7	1.7
Siarkan amonowy	4.0	—	20.5	—	—	—	—	0.5	—	58.0	1.4
Kainit kaluski	16.5	—	—	—	—	—	9-12	0.5	11.5	23.5	25.5
• stassfurecki	12.8	—	—	—	—	—	12-14	1.3	8.6	19.8	30.6
40% sól potasowa Skoncentrowany	3.6	—	—	—	—	—	40.4	1.0	2.3	5.0	36.3
nawóz bydłocy (t. zw. guano bydłocy)	12.5	53.9	3.3	—	4.5	—	1.5	1.9	1.8	—	—
Fosforan potasowy	—	—	—	—	43	—	26	—	—	—	—
Gips	20.0	—	—	—	—	—	—	31.0	0.1	44.0	—
• fosfatowy	18.6	—	—	—	5.7	—	—	18.4	0.3	25.4	2.5
3. Odpadki, popioły itp.											
Wapno satur. z cukrowni	43.3	15.3	0.4	—	1.2	—	0.2	21.6	0.3	0.3	—
Błoto osadowe z kanalizacyi	8.0	29.0	3.0	—	1.3	1.0	0.6	20.0	—	—	—
Odpadki z garbarni	63.3	17.9	1.4	—	1.3	—	—	13.2	0.3	—	—
Pyli odpadkiwełny	10.0	56.0	5.2	—	1.3	—	0.3	1.4	0.3	0.5	—
Mączka ze krwi	13.4	78.4	11.8	—	1.2	—	0.7	0.8	0.2	0.6	—
Pudretta	86.0	—	7.4	—	2.7	—	2.7	—	—	18.0	—
Popiół z drzew liściastych	5.0	5.0	—	—	3.5	—	10.0	30.0	5.0	1.6	0.3
Popiół z drzew iglastych	5.0	5.0	—	—	2.5	—	6.0	35.0	6.0	1.6	0.3
Popiół z węgla brunatnego	—	—	—	—	0.6	—	0.7	16.0	1.9	10.4	—
Popiół z węgla kamiennego	—	—	—	—	0.2	—	0.2	3.5	0.8	1.0	—
Popiół z torfu	5.0	—	—	—	1.2	—	0.5	45.7	0.5	4.4	0.6
Sadze z drzewa	5.0	71.8	1.3	—	0.4	—	2.4	10.0	1.5	0.3	—
• z węgla kamiennych	5.0	66.9	2.4	—	0.4	—	0.1	4.0	1.5	1.7	—
Proszek z padliny	5.7	56.9	6.5	—	13.9	—	0.3	18.2	0.4	1.0	—
Chrabąszcze świeże	70.6	24.6	3.5	—	0.6	—	0.5	0.1	0.1	—	—
Guano rybnie	9.8	56.2	8.5	—	13.8	—	0.3	16.0	0.9	0.5	—
• mięsne	8.0	49.1	5.8	—	17.4	—	0.3	22.3	—	0.2	—

Gospodarstwo obornikowe.

Za podstawę do oceny systemu nawożenia obornikowego — należy brać w rachubę ilość utrzymywanego inwentarza w stosunku do przestrzeni nawożonej, a lepiej jeszcze ilość paszy z uwzględnieniem paszy zużytej na produkcję zwierzęcą: mięso, mleko i t. p. i ściółki używanej w stosunku do przestrzeni, re-

dukując odpowiednio użytki pastwiskowe. Licząc wagę żywą bydła rogatego sztuki dorosłej na 500 kg., jałownika na 250 kg., cielęcia na 125kg., owcy na 50 kg. i redukując ze względu na stratę nawozu liczbę bydła pociągowych do połowy, uważać możemy, że w naszych warunkach:

produkcya obornika jest:	jeśli 1 sztuka bydła przypada na:
kardzo słaba	8 i mniej morgów
słaba	6 — 8
normalna	4 — 6
silna	mniej niż 4 morgi.

Obliczenia ilości obornika: Przyjmując przeciętną wagę zwierząt i dobre żywienie, ilość wyprodukowanego, średnio rozłożonego obornika w roku wynosi:

Krowa utrzymywana na stajni przez rok cały daje około	120 q — czyli około	20 fur obornika
Krowa utrzymywana w lecie na pastwisku daje około	75 q —	12 „
Wół opasowy	160 q —	28 „
„ roboczy z odliczeniem strat	80—100 q —	13—17 „
Koń roboczy z odliczeniem strat	50— 80 q —	15 „
Owca (latem żywiona na pastwisku)	6 q —	1—1.5 „
Świnia	12— 18 q —	2—3 „

Dokładniejsze obliczenie ilości obornika jest na podstawie skarmionej paszy i użytej ściółki. Połowa mniej więcej organicznej substancji karmy przechodzi do nawozu, a ponieważ przyjmując możemy, że przeciętnie obornik zawiera 75% wody, więc ilość obornika otrzymujemy przez pomnożenie połowy suchej substancji skarmionej paszy i całej zużytej ściółki przez 4, np.: skarmiono 150 q koniczyny z 88% suchej substancji, czyli 132 q suchej substancji, i użyto na podściół 60 q słomy z 90% suchej substancji, czyli 54 q suchej substancji: więc ilość obornika przedstawia się: $60+54=120 \times 4=480$ q.

Jakość obornika zależy od jakości paszy i spożycia jej przez zwierzęta i sposobu przechowania. W organizmie zwierzęcym przez oddychanie i trawienie spala się przeciętnie około 54% organicznych części, 46% przechodzi do kału i moczu. Odchody zwierząt zawierają całkowitą ilość pobranego azotu, o ile nie osadzają go w swym ciele w postaci mięsa, (młode zwierzęta i opasy) lub wydzielają w postaci mleka, wełny. Obornik tem bogatszy jest w azot, im treściwsza karma zwierząt. Krowy dojne wydzielają w przybliżeniu 12% azotu mniej, niż go pobierają. Przeciętnie połowa azotu odchodów zawartą jest w moczu. Potas, sód, wydzielane są prawie wyłącznie moczem u krów i owiec, a przytem nic wapna. U koni mocz zawiera 67% potasu i 60% wapna wydzielonego wogóle przez odchody. Bardzo niewielka część związków mineralnych zostaje osadzoną w ciele zwierzęcia.

W 1000 cz. kg. mle-	azotu	kwasu fosfor.	potasu	wapna	magneu
ka znajduje się	5.4	2.0	1.7	1.7	0.2
W 1000 cz. kg. przy-					
rostu wagi bydła o-					
pasowego	11.6	1.3	1.2	0.1	0.1

W 1000 cz. kg. przy- azotu kwasu forfor. potasu wapnr magnu
 rostu bydła młodego 25.8 16.2 2.1 18.6 0.6

Wskutek tej, tak wielkiej zależności składu chemicznego obornika od żywienia, liczby przeciętne podane powyżej mają małe tylko znaczenie i służyć mogą jako orientacya.

Zbieranie obornika. Słomy daje się na ściółkę $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ wagi suchej substancyi karmy. Ilość słomy na ściółkę wynosi dziennie:

na bydle wagi 500 kg.	$2\frac{1}{2}$ — 5 kg.
> konia	2 — 3 >
> owcę	0.1 —0.2 >

Przy stosowaniu ziemi, na sztukę bydła daje się dziennie około 50 kg. ziemi; ściółki torfowej daje się 3 kg. na sztukę bydła; na konia 2— $2\frac{1}{2}$ kg.; na owcę 0.2 — a na świnię 0.5—0.75 kg.

Przechowywanie pod bydlętem jest stanowczo najlepszym, najtańszym i najłatwiejszym do przeprowadzenia sposobem przechowywania obornika, o ile mamy odpowiednie ku temu budynki. Przy odpowiedniej wysokości budynku, dobrej wentylacyi, sposób ten nie jest bynajmniej niehygienicznym dla zwierząt, ani też nie wpływa ujemnie na smak mleka. Koniecznym warunkiem oprócz odpowiedniej wysokości budynku — są żłoby przestawiane tak, aby cały obornik był równomiernie wymieszany i udeptany. Obornik pod bydlętem może leżeć w warstwie grubej na 1— $1\frac{1}{2}$ metra. Spód obory powinien być nieprzepuszczalnym, tak jak na gnojowniku. Obornik z pod bydła jest mniej rozłożonym, jak obornik z gnojowni. Utrzymywanie koni na gnoju w lecie nie zaleca się ze względów higienicznych. W owczarniach zaleca się gnoj zlewać wodą.

Przechowywanie na gnojowni. Gnojownia powinna leżeć w pobliżu budynków inwentarskich; być ochronioną od zalewu wodą z dachów i miejsc wyższych; być zabezpieczoną od działania silnych promieni słonecznych (obsadzenie drzewami) i wiatrów. Tło gnojowni powinno być nieprzepuszczalne: najlepsze z betonu (40 cm.), lub kamieni na zaprawie cementowej. Ze względów oszczędności dawać można tło z łu na 30 cm. ubitego, tak jak na klepisku. Tło winno mieć spad w jednym lub w dwóch kierunkach (5⁰ o). Na najniższych punktach winny być pozakładane zbiorniki do gnojówki, których dwa należy zrobić niżej od podłogi stajni na 0.5 do 1 m. dla dobrego spływu gnojówki. Gnojownia p. b. wgłębiona na 0.5 do 1 m.; p. b. otoczoną murem, wznoszącym się naokoło na wysokości 50 cm. Gnojownia p. b. ogrodzoną, aby można było na nią wypuszczać bydło dla tratowania nawozu.

Przy grubości warstwy nawozu na gnojowni $1\frac{1}{2}$ m. potrzeba by było około 16 do 20 m.³ powierzchni gnojownika, gdybyśmy chcieli obornik wywozić tylko raz w rok w pole; przy częstszej wywoźce wystarczy odpowiednio mniejsza powierzchnia. U nas wywozi się zwykle 3 do 4 razy obornik, więc wystarczy średnio powierzchnia gnojowni 4—5—6 m² na sztukę dorosłą bydła.

1 m.³ obornika waży około 850 kg.

Wielkość zbiornika na gnojówkę wynosić powinna na jedną wielką sztukę bydła 0.4—0.5 m.³ czyli przy głębokości zbiornika na 1.5 m. powierzchnia zbiornika wynosić powinna około $\frac{1}{20}$ powierzchni gnojownika. Liczby te zależą od opadów atmosferycznych, czasu, przez jaki obornik leży na gnojowni i t. p.

Racyonalnem jest, jeśli gnojówka ściekająca ze stajni i obór ma osobne zbiorniki, nie łączy się z gnojówką wypływającą z gnojowni, i używa się ją wprost na pole przy burakach zastąpić nią można saletrę.

Obchodzenie się z obornikiem na gnojowni. 1. Obornik wywożony na gnojownię nie powinien być rozrzucony na zbyt wielkiej powierzchni, przez co wysycha. Układać go należy warstwami, nie pozostawiając pustych zagłębień.

2. Nawóz rozmaitych zwierząt należy wymieszywać z sobą.

3. Główny nacisk kłaść należy, na silne udeptywanie nawozu przez wypuszczanie bydła na gnojownię lub też przez walcowanie ciężkim, żelaznym walcem.

4. Obornik powinien być utrzymany w stanie umiarkowanej wilgotności przez zwilżanie gnojówką. Jeśli gnojówki zbyt mało, należy zlewać go wodą. Gnojówki ze stajni nie używać dla zlewania obornika.

5. Wysokość warstwy nawozu na gnojowniku wynosić powinna pomiędzy 1½ a 2½ m. Według nowszych badań, obornik w wysokich a prawidłowo wilgotnie utrzymywanych kupach, przechowywuje się lepiej.

Używanie środków konserwujących: 1. Torf jako dodatek do podściółki jest doskonałym środkiem konserwującym. W połączeniu ze słomą zapewnia czyste utrzymanie inwentarza. Praktycznym jest podsypywanie torfem pod zady zwierząt i wypełnianie rynien ściekowych dla gnojówki torfem, który codziennie wymiatać należy. W tym celu wystarczy ⅓ do ½ podanych wyżej ilości. (Str. 9).

1. Na gnojowni przesypywać nawóz warstwami torfu na 10—15 cm.

2. Używanie superfosfatu, kainitu nie zaleca się.

3. Ziemia w celu przesypania i pokrywania obornika, lekka, próchnicza jest najlepszą; przesypywać warstewkami ziemi grubemi na 5—10 cm.

4. Gips racyonalnie zastosowywać w stajniach z częstą wywózką gnoju. Na konia ½ do 1 kg. dziennie.

5. Przy przechowywaniu obornika pod bydlętem używanie wszelkich środków konserwujących jest zbytecznym.

6. Przy przechowywaniu gnojówki w nieprzepuszczalnych studniach dbać tylko należy o możliwe ograniczenie przewietrności. Używanie środków konserwujących jest zbyteczne.

Wywozić obornik w pole winno się w stanie wilgotnym. Najlepiej przyorac go zaraz, lub złożyć w wielkie i wysokie stopy i przykryć ziemią grubo w celu utrzymania wilgotności i tak się z nim obchodzić jak z obornikiem na gnojowni, trawować, ubijać, a w razie potrzeby zlewać wodą lub gnojówką.

Przy przechowywaniu obornik traci średnio w ciągu 2—3 miesięcy 20% swej wagi.

Dawki obornika: Nawożenie słabe niżej 100 q. na morg, nawożenie normalne około 180 q. — czyli 30 fur; silne powyżej tej liczby.

Przez normalne nawożenie obornikiem umiarkowanie wilgotnym dajemy na morg:

3460 kg.	organicznej substancji,
90	» azotu
47	» kwasu fosforowego
113	» potasu
88	» wapna.

Kompost. Przygotowanie kompostu trwa, zależnie od materiałów użytych, od kilku miesięcy do dwóch lat. Z tego powodu kompostować materiały rozmaicie szybko rozkładające się — osobno. Kompost składa się z odpadków roślinnych, zwierzęcych i t. p. i ziemi. Jako ziemię na kompost najodpowiedniejsze: próchnicza, obfitująca w wapno, marglowa. Każda kupa kompostowa p. b. przykrytą dobrze grubą warstwą ziemi. Kształt kupy komp. podłużny, nie szeroki, wysokości na $1\frac{1}{2}$ —2 m. Przerabianie kupy kompostowej ma na celu wymięszanie całej masy, względnie, umieszczenie warstw wierzchnich, nierozkładających się w środku kupy, gdzie warunki rozkładu lepsze. Dojrzałym kompost jest wtedy, kiedy całość przedstawia jednolitą masę, materiał użyty utracił swoją strukturę. Nie przerabiać kompostu za często. Rośliny kompostować w stanie możliwie świeżym, przesypując je warstwami ziemi. Słoma i materiały suche, muszą być zlewane gnojówką, wodą i t. p. dla pobudzenia rozkładu dobrze jest dodawać warstwami małą ilość obornika, zlewac wodą z wychodczynami, z rozpuszczonymi makuchami i t. p.

Padlinę (kompostować, porąbawszy ją na małe kawałki) przesypaniem 5—8% świeżo zgaszonego na proszek wapna i przykrywając grubo ziemią. **Krew:** dodaje się 4—5% świeżo zgaszonego wapna i suszy w płaskich naczyniach, lub zlewa nią kupę kompostową. **Kości** metodą Engelhardta: 100 kg. kości, warstwami 30 kg. wapna niegaszonego, 200 kg. popiołu drzewnego i wody 180 kg. w dole wyłożonym deskami, kadzi i t. p. Kiedy kości staną się krucho, wyrzuci się je, przerabia i suszy na powietrzu masę miłąką, łatwą do rozsiewu.

Nawozy zielone.

Na nawóz zielony nadają się wszelkie rośliny motylkowe, przyswajające wolny azot z powietrza (azotobiorcze). Siał je należy gęsto, przyorywać jak najpóźniej się da, to jest kiedy ziarno już wykształcone, ale roślina jeszcze zielona.

Nawozy zielone zasiewa się na wiosnę zamiast przedplonu, na ziemiach lekkich piaszczystych lubin żółty, seradela, nostryk i t. p., na glinkach i cięższych lössowych lubin niebieski, groch, wyka, bobik i t. p. Jako wsiewki, które zasiane w zboże na wiosnę, dają pognój zielony na jesieni: seradela w życie, lubin dla gleb lżejszych, lucerna chmielowa (konicz. szwedzka?) dla gleb cięższych. Bezpieczniejsze są międzyplony po spręćcie zboża (im wcześniej dojrzewające, tem lepsze). Po zżęciu zboża zestawie snopy w rzędy; natychmiast podorać i rozsiać nasienie i przywalać lub rozsiać na ścierni i przyorać. Każda godzina opóźnienia — mniej pewny wynik. Na międzyplony nadają się wyka, groch, bobik w mieszance, na Podolu groch. N. z. podorywać przed zimą lub na wiosnę dopiero. N. z. dają u nas 35—120 kg azotu na mórg w cenie 20—40 gr. za kg. N. z. są jedną z ważniejszych dźwigni naszych gospodarstw. N. z. mogą być stosowane pod zboża, rośliny okopowe. N. z. mogą powodować zachwaszczenie pola. Równocześnie z n. z. nawozić rolę nawozami potasowymi i fosforowymi. Na czarnoziemiu n. z. nie okazały się skutecznymi.

Wapnowanie i marglowanie.

Przez wapnowanie i marglowanie 1) poprawiamy fizykalne własności, szczególnie gleb zwięzłych (łatwiejsza uprawa; więk-

sza przepuszczalność i przewodność itp.); 2) dostarczamy glebie zasady, zubożeniącej powstające kwasy i wpływającej dodatnio na rozwój ważnych dla żyzności gleby bakterii, oraz na prawidłowy rozkład materii organicznej; 3) dostarczamy roślinom niezbędnego pokarmu.

Na glebach gliniastych wapnowanie bywa zwykle niepotrzebnem kiedy one zawierają więcej niż 0.5% wapna, jako węglanu wapniowego. Na glebach piaszczystych wapnowanie bywa często niepotrzebne, kiedy gleba zawiera więcej, niż 0.2% wapna. Margliste podłoże, nie głębiej niż 1—1¼ metr., może przez podsiąkanie dostarczać glebie pewnych ilości wapi. Głębiej znajdujące się przedstawia, tylko wartość jako materiał, którym można glebę marglować.

Skutki wymienione w punkcie 1 i 2 osiąga się za pomocą marglu, lub wapna palonego zmielonego lub zgaszonego na proszek. Zgaszenie dokonywa się: 1) na polu w małych kupkach przykrytych ziemią (kupki 20—50 kg. na polu, które się ma wapnować, przykrywać ziemią i zarównywać ziemią szpary, które powstają), w kilkanaście dni zgaszone wapno rozsypane się; 2) w większych kupach na polu przez zlewanie umiarkowanemi ilościami wody podczas układania (20—50 q. wapna palonego, na 100 kg. wapna około 35—40 litr. wody). Po zgaszeniu, jeśli nie rozsiewamy, przykryć należy starannie ziemią na 15—20 cm.; 3) przez szybkie zanurzenie w kadzi z wodą koszyków napełnionych wapnem i wyrzucanie zwilgniętego wapna na kupe.

Ilość wapna, którą się stosuje, zależy od zwięzłości gleby. Na zwięzlejszych glebach dają od razu większe dawki 10—20 q. na morg i więcej. Na ziemię lżejsze 5—10 q. Według nowszych spostrzeżeń lepiej dawać mniejsze dawki częściej, jak wielkie na raz.

Wapnować: 1) pod jarzyną, w które bywają zasiewane koniczyń; 2) ugory nawożone obornikiem pod rzepak lub oziminy; 3) pola nawożone obornikiem pod buraki; 4) koniczyń pod oziminy. Jeśli dajemy równocześnie obornik i wapno gaszone, należy jeden z tych nawozów przyorać, a dopiero dać drugi. Przy marglowaniu można je dawać i razem, lecz natychmiast przyorać.

Wapno rozsypane na ziemię nie nadmierne wilgotne, przed przyoraniem wymieszać dobrze z glebą gruberami lub bronami itp. Wapno nawozowe (odpadki z wapienników) zawiera głównie węglan wapniowy. Należy go dawać około 2 razy tyle co wapna palonego, świeżo zgaszonego.

Szlam saturacyjny z cukrowni zawiera oprócz węglanu wapniowego azot, kwas fosforowy, potas i materje organiczne.

Margiel jest mieszaniną węglanu wapniowego z gliną, z piaskiem itp., zawiera 10—50% węglanu wapniowego.

Margluje się bądź marglem przewożonym z dalszych miejsc, bądź marglem z podglebia przez kopanie dolów na polu, które się ma marglować. Ilość marglu zależną jest od zawartości węglanu wapniowego w marglu. Daje się tyle, by wypadło czystego węglanu wapniowego na morg 30—60 q. (Przeciętnego składu marglu wypada 60—100 fur na morg).

Margle dolomitowe zawierające oprócz węglanu wapniowego węglan magnezowy, posiadają dla pewnych gleb większą wartość niż zwykłe margle.

Nawozy pomocnicze.

Użycie nawozów pomocniczych opierać się winno na uprzedniej próbie wykonanej na małą skalę. Wystarczy może do pe-

wnych celów doświadczenie wykonane na niewielkiej liczbie poletek, nawożąc niektóre z nich nawozem, którego działanie chcemy wypróbować; lecz, chcąc poznać dokładnie braki ziemi, należy przeprowadzić systematyczne doświadczenie według pewnej metody, którą podają stacye doświadczałne.

Jakie kombinacye nawozowe są odpowiednie dla każdego gruntu, wykazać może jedynie próba i doświadczenie, dla tego też rolnik, używający nawozów pomocniczych powinien zawsze pozostawiać pewne pasy pola nienawożone a inne nawozić znów odmiennie, aby się przekonywać o tem, czy użyte nawożenie było racjonalnem.

Podajemy poniżej wskazówki co do ilości stosować się mających nawozów pomocniczych, odpowiednie dla naszych warunków:

Oziminny: a) na oborniku w ugorze, kończyni, hobiku i innych roślinach azotobiorezych — dodatek 100—200 kg. superfosfatu mineralnego (18—36 kg. kwasu fosforowego), lub 150—300 kg. tomasyny (27—54 kg. kwasu fosforowego). Na płaskach, powszechnie ale też i na wielu glinkach — 200—300 kg. kainitu na morg.

b) po kłosowych lub czystym ugorze: superfosfatu 200 kg., tomasyny 200—300 kg., oprócz tego szczególnie jeśli gleba słabsza na jesieni 30—50 kg. siarkanu amonowego, lub lepiej 50—100 kg. mąki rogowej. Kainit tak jak w a. Na wiosnę saletry 50—100 kg. Tomasynę zastąpić można do pewnego stopnia mąką kostną parzoną na glebach ubogich w wapno.

Okopowe. Kartofle: Najodpowiedniejszym nawozem jest obornik. Z nawozów pomocniczych: mąka kostna preparowana 150—200 kg. na morg, superfosfat amoniakalny, mąka rogowa 100—150 kg.

Z nawozów potasowych. Do bezpośredniego użycia nadaje się 40% sól potasowa (80—100 kg.) nie kainit. Nawożąc tym ostatnim należy go dawać pod przedplon.

Buraki: są najwzdržeczniejszą rośliną na nawozy pomocnicze. Obok, lub bez nawożenia obornikiem na jesieni 300—400 kg. kainitu, lub tylko 200, a resztę na wiosnę razem z saletrą — pogłównie w kilku dawkach. Na wiosnę 100—150 kg. superfosfatu płytko podorać. Po wzejściu buraków saletry 25 kg. Po przerwaniu 25—50 kg. Następnie w miarę siły rozwoju buraka i siły pola, jeszcze jedna lub dwie dawki po 25 kg.

Dobrem jest przy nawożeniu obornikiem i odpowiedniemi ubóstwie ziemi dać 5—10 q. wapna na jesieni i podorać przed zimą.

Jarzyny. Owies. Oplaca dobrze saletrę oraz wszelkie nawozy azotowe 50—100 kg. w jednej lub kilku dawkach, po zasiewie pogłównie.

Jęczmień. 100 kg. superfosfatu amoniakalnego lub 150 kg. mąki kostnej preparowanej, 200 kg. kainitu.

Konieczyny wieloletnie same lub z trawami — 300—500 kg. kainitu, 150—300 kg. tomasyny, lub 100—200 kg. superfosfatu.

Flancowniki. Rozsadniki buraczane: Oprócz dobrego nawożenia obornikiem dać na wiosnę 200 kg. superfosfatu lub mąki kostnej preparowanej, 50—100 kg. mąki rogowej — i w miarę siły rozwoju potrzebując z saletry 25 kg. na raz.

Łubin na zieloną pognój na lżejszych gruntach 200—300 kg. kainitu, a przy podoraniu pod oziminę nawożenie fosforowe jak wyżej.

Chmiel najodpowiedniejszy obornik i kompost. Na krzak:

100 gr. superfosfatu mineralnego 18%; 100 gr. 40 soli potasowej (lub 200—300 gr. kainitu); 160 gr. saletry, z czego 80 gr. w kwietniu, a po 40 w czerwcu i pierwszej połowie lipca.

Drzewa owocowe (krzewy owocowe). Doradzają dawać na duże drzewo, 25 m², 2 kg. kainitu 1½ kg. superfosfatu ¼ kg. saletry chilijskiej w zimie, a na wiosnę w maju oprócz tego jeszcze ¼ do ½ kg. saletry, lub 2 kg. mąki rogowej.

Z krzewów owocowych:

Róże, kwiaty, truskawki; mąka rogowa; mąka kostna ferment.; makuchy ferment. obok zwykłej dobrej dawki obornika.

Agrest jest bardziej wrażliwym na nawozy potasowe (kainit) niż porzeczka.

Oprócz nawozów sztucznych drzewa owocowe należy nawozić co roku kompostem, gnojówką, krzewy co 3 lata obornikiem.

Charakterystyka głównych nawozów pomocniczych.

Wszelkie nawozy powinny być suche i możliwie miałkie. Dla rozsiewu należy je zmieszać z 4—5 krotną ilością piasku lub ziemi suchej i rozsiewać możliwie równomiernie. Nawozy trudno rozpuszczające się i zawierające związki wpływające szkodliwie na glebę lub rośliny, należy rozsiewać na kilka tygodni (miesiący) przed wysiewem ziarna.

Saletra chilijska zawiera ÷ 15.5 % azotu. Pochłania chciwie wodę z powietrza, łatwo się rozpuszcza. Przechowywać w suchym miejscu. Przed użyciem rozbijać tworzące się bryły drążkami w pakach, lub młec na specjalnym młynku. Rozsypywanie ręcznie (uważać by ręce robotników nie były porażone) lub specjalnymi siewnikami. Rozsypywać na suche liście, nie po rosie lub po deszczu. Mięsząc nie można z superfosfatami. Saletra zawiera niekiedy nadchloran (perchlorat). Żądać gwarancji, że saletra nie zawiera więcej, jak 1% nadchloranu, (perchloratu), gdyż większe ilości są szkodliwe. Bydło przez spożycie większej ilości saletry może się zatruci.

Saletra jest prędko pobieraną przez rośliny, prędko też zostaje wypłukana. Całkowita dawka na morg 50—200 kg. Nawozi się najczęściej pogłównie t. j. rozsypuje na rośliny już rozwinięte i to kilkakrotnie dawkami mniejszemi. Na raz lepiej nie dawać więcej jak 25 do 50 kg. na morg.

Siarkan amonowy zawiera ÷ 20.5% azotu; jest mniej rozpuszczalny niż saletra. Daje się go rzadziej pogłównie, a zazwyczaj przed siewem, przykrywając płytko w ilości 40—100 kg. na morg. Zwracać uwagę, by nie zawierał rodanku amonowego. Siarkan amonowy działa powolniej niż saletra. Nie mieszać z wapnem, tomasyną.

Nawóz azotowo-wapniowy zawartość azotu 20% otrzymywany z azotu atmosferycznego. Nie odpowiedni dla ziem kwaśnych, próchnicowych i piaszczystych. Nawozić nim glebę na kilka dni przed siewem 2—14 gdyż przy bezpośrednim pod siew daniu i potasowem rozsiewie, szkodzi roślinom.

Mąka rogowa. Zawiera ÷ 10.5% azotu, 5.5% kwasu fosforowego; na morg 100—200 kg. Daje się ją przed siewem, przykrywając płytko. Na glebach jałowych pod oziminę; z pożytkiem zastąpić może saletrę pod zboże na glebach lekkich.

Mąka z krwi ÷ 11.8% azotu, 1.2% kwasu fosforowego. Używać tak jak mąkę rogową. Azot w formie czynnej; 70—200 kg. na morg przed siewem, płytko przykrywać; przechowywać sucho.

Mąka kostna parzona ÷ 4% azotu i 20—21% kwasu fosforowego nierozpuszczalnego w wodzie. Jako nawóz fosforowy może być używaną pod oziminy i okopowe na glebach lekkich, piaszczystych i ubogich w wapno. Przykrywać głębiej. Dawka na morg 100—200 kg. Żądać gwarancyi, że mąka kostna parzona nie jest odklejona.

Mąka kostna odklejona ÷ 1% azotu i 30% kwasu fosforowego. — Jako nawóz fosforowy tam i tak jak mąka kostna parzona w ilości 70—200 kg. Oprócz tego przy niskiej cenie mąka kostna odklejona nadaje się jako nawóz na łąki, (zamiast droższych żużli 100—150 kg. wraz z 400—600 kg. kainitu).

Tomasyna zawiera 13—22% kwasu fosforowego. Nadaje się na wszelkie grunta. Na gleby piaszczyste i torfiaste tomasyna jest lepszą od superfosfatu. Zastępować ją można na nich mąką kostną, odklejoną. Kupować według zawartości kwasu fosforowego rozpuszczalnego w 2% kwasie cytrynowym. Dawka na morg 100—300 kg; przyorywać do średniej głębokości. Mięsząc można z kainitem, lecz nie na długo przed rozsiewem, gdyż mieszanina twardnieje.

Superfosfat 10—22% kwasu fosforowego w wodzie rozpuszczalnego. Superfosfaty mineralne nie są gorsze od superfosfatów kostnych. Dawka 80—200 kg. na morg — płytko przykrywać. Superfosfat nie powinien być wilgotny. Przy przechowywaniu niszczy worki; lepiej wysypywać na kupę w suchym miejscu i przykrywać. Pod buraki cukrowe superfosfat lepszym jest od tomasyny. Nie mięsząc superfosfatów z saletrą, tomasyną i wapnem. Superfosfaty amoniakalne i mąka kostna preparowana zawierają obok kwasu fosforowego — azot 2—10%. Używać ich pod oziminy na słabszych gruntach (szczególniej superfosfaty z dużą zawartością azotu amoniakalnego (6—10%) w ilości 80—150 kg. Nie mięsząc z wapnem, tomasyną!

Kainit: kaluski zawiera 10% potasu; stassfurcki 12%. Na łąki na jesieni 400—600 kg. na morg. Pod zboże 200—300 kg. wcześniej przed siewem. Najlepiej na jesieni. Pod buraki 200—600 kg. przed siewem lub pogłównie. Kainit pochłania wilgoć z powietrza. Zbija się w bryły. Rozdrabniać przed wysiewem.

40% sól potasowa zawiera potas (jako chlorek pod kartofle na lekkich gruntach 50—100 kg. Na 40 kg. potasu jakie dajemy w 100 kg., jest mniej chloru jak w odpowiedniej ilości kainitu.

Siarkan potasowy zawiera 48% potasu. Nadaje się tam, gdzie nie chcemy używać nawozów zawierających chlor, a więc n. p. pod tytoń, kartofle na wiosnę.

Porównanie ceny nawozów odbywa się na podstawie obliczenia, ile kosztuje 1 kg. wartościowego składnika. Tak n. p. jeśli mamy superfosfat 18% kosztujący za 100 kg. 10 k. 38 gr., a drugi 16% kosztujący 9 k. 60 gr. to ten pierwszy jest w gruncie rzeczy tańszym, gdyż 1 kg. kwasu kosztuje w nim 56 gr. a w drugim 60 gr. Zwracać jeszcze należy uwagę na to, że transport nawozów niskoprocentowych kosztuje to samo co i wysokoprocentowych, a więc wskutek tego przy większych odległościach od fabryk oplaci się nam sprowadzać tylko nawozy wysokoprocentowe, bo te wypadają taniej.

Przy nawozach zawierających dwa pokarmy roślinne n. p. superfosfacie amoniakalnym, obliczenie w celu porównania cen odbywa się jak następuje: Jeśli mamy n. p. do obliczenia ceny superfosfatu amoniakalnego, postępujemy w ten sposób: super-

fosfat amoniakalny z zawartością 12⁰/₁₀₀ kwasu fosforowego i 4⁰/₁₀₀ azotu kosztuje 13 k. 84 gr. 1 kg. azotu w siarkanie amonowym, a więc w tej postaci jak w amoniakalnym superfosfacie kosztuje 1.80 k.; (13.84—7.20) = 6.64 k. stanowi zapłatę za 12 kg. kwasu fosforowego, czyli 1 kg. wypada wówczas po 56 groszy. Jeśli mamy, jak n. p. w mące kostnej azot w postaci związków klejowych, które osobno nie stanowią produktu nawozowego handlowego w takim razie musimy wartość azotu obliczyć na podstawie ceny azotu n. p. saletry, której 1 kg. azotu kosztuje 151 g. i danych z doświadczeń, które nas pouczają, że azot kości ma wartość 60—70⁰/₁₀₀ azotu saletry.

Na tej podstawie 1 kg. azotu w kościach będzie miał cenę 117 gr.

Wszystkie te ceny są zmienne:

Dla ułatwienia obliczania ceny nawozów, zawierających kwas fosforowy i azot, podajemy tabliczkę względnej wartości azotu w rozmaitych nawozach, podaną przez Wagnera:

	Względna wartość:	Cena, która powinna być:*)
1 kg. azotu w saetrze chilijskiej	100	186 gr.
„ „ „ siarczanie amonowym	90	167 „
„ „ „ mączce z krwi, m. rogowej, w zielonej masie roślinnej	70	130 „
„ „ „ mączce kost. mączce z mięsa	60	111 „
„ „ „ pyle z wełny	30	56 „
„ „ „ skórce mielonej	20	37 „

w stosunku do saletry

Cena obecna 1 kg. azotu w saetrze wynosi 186; w siarczanie amonowym 170; w mące kostnej 100—110.

Cena 1 kg. kwasu fosforowego rozpuszczalnego w wodzie około 58—64 gr.; 1 kg. kwasu fosfor. wogóle w żuźlach 41—47; 1 kg. kwasu fosfor. w tomasynie rozpuszczalnego w kwasie cytrynowym 45—51; 1 kg. kwasu fosfor. w mące kostnej odklejonej 22—47; 1 kg. potasu w kainicie 20—30. Zależnie od odległości. Sól potasowa 40⁰/₁₀₀ 26—33 gr.

Nawozy powinno się kupować tylko u najpewniejszych firm i to z gwarancją tj. żądać należy piśmiennego zobowiązania, że w razie, jeśli towar nie będzie zawierał tych ilości i w tej formie pokarmów co podane — kupiec zobowiązuje się do odszkodowania. Za podstawę do obliczenia przyjmuje się wynik rozbioru stacyi doświadczalnej.

Próbka winna być brana według przepisów z każdego 5go, lub 10go worka, nie z wierzchu, lecz ze środka, wobec dwóch bezstronnych świadków, którzy powinni podpisać poświadczenie co do pobrania próby. Próbka większa wymięszywuje się dobrze i z niej zapakowuje się po 500 gr. do 3ch flaszek, zapieczętowuje i jedną wysyła do stacyi doświadczalnej, wraz z poświadczeniem pobrania próby.

*) Przyjmując obecna, targową cenę saletry 27.80 h. loco Lwów w ładunku wagonowym.

Przeciętny skład chemiczny popiołów i zawartość azotu produktów, mających związek z gospodarstwem wiejskim, według E. Wolffa, na 1000 części substancji w stanie naturalnym.

Wyszczególnienie	Wody	Azotu	Popiołu	Tlenku potas.	Tlenku sodow.	Tlenku wapniowego	Tlenku magnezowego	Kwasu fosfor.	Kwasu siark.	Krzemionki	Chloru
I. Nasiona i owoce.	o/oo	o/oo	o/oo	o/oo	o/oo	o/oo	o/oo	o/oo	o/oo	o/oo	o/oo
<i>a) Zboża.</i>											
Pszenica ozima	144	20.8	16.8	5.2	0.3	0.5	2.0	7.9	0.1	0.3	0.1
" jara	143	20.5	18.3	5.6	0.3	0.5	2.2	9.0	0.2	0.3	0.1
Zyto ozime	143	17.6	17.9	5.8	0.3	0.5	2.0	8.5	0.2	0.3	0.1
" jare	143	—	18.0	6.2	0.3	—	2.2	9.2	—	0.2	—
Jęczmień jary	143	16.0	22.3	4.7	0.5	0.6	2.0	7.8	0.4	5.8	0.2
" ozimy	145	16.0	19.0	2.8	0.7	0.1	2.1	5.6	0.5	4.9	—
Owies	143	17.6	26.7	4.8	0.4	1.0	1.9	6.8	0.5	10.5	0.3
Kukurydza	144	16.0	12.4	3.7	0.1	0.3	1.9	5.7	0.1	0.3	0.2
Proso	140	20.3	29.5	3.3	0.4	0.2	2.8	6.5	0.1	15.6	0.1
Sorgo	140	—	16.0	3.3	0.5	0.2	2.4	8.1	—	1.2	—
Hreczka	140	14.4	11.8	2.7	0.7	0.5	1.5	5.7	0.2	—	0.2
<i>b) Rośliny groszkowe.</i>											
Koniczyna czerwona	150	30.5	38.3	13.5	0.4	2.5	4.9	14.5	0.9	0.5	0.5
Koniczyna biała	150	—	33.8	12.3	0.2	2.5	3.9	11.6	1.6	0.8	0.5
Esparceta	160	—	38.4	11.0	1.1	12.3	2.6	9.2	1.2	0.3	0.5
Seradela	120	34.9	28.4	8.2	2.2	5.5	2.7	7.8	—	0.6	1.7
Bobik	145	40.8	31.0	12.9	0.3	1.5	2.2	12.1	1.1	0.2	0.5
Bób	150	39.0	27.4	12.1	0.4	1.5	2.1	9.7	1.1	0.2	0.3
Groch	143	35.8	23.4	10.1	0.2	1.1	1.9	8.4	0.8	0.2	0.4
Wyka	143	41.0	26.6	8.0	2.1	2.2	2.4	9.9	1.0	0.3	0.7
Łubin	130	56.6	37.0	11.4	0.3	2.8	4.5	14.2	3.2	0.1	0.3
Soja	100	53.4	28.3	12.6	0.3	1.7	2.5	10.4	0.8	—	0.1
<i>c) Rośliny oleiste.</i>											
Rzepak	118	31.1	39.2	9.6	0.6	5.5	4.6	16.6	0.9	0.5	0.1
Rzepak letni	120	36.8	34.9	7.7	—	5.2	4.7	14.9	2.3	—	—
Gorczyca biała	130	—	36.5	5.9	2.0	7.0	3.7	14.6	1.8	0.9	0.2
Mak	147	28.0	51.5	7.0	0.5	18.2	4.9	16.2	1.0	1.7	2.4
<i>d) Przemysłowe i okopowe.</i>											
Len	118	32.8	32.6	10.0	0.7	2.6	4.7	13.5	0.8	0.4	—
Konopie	122	26.1	46.3	9.4	0.4	10.9	2.6	16.9	0.1	5.5	—

Wyszczególnienie	Wody	Azotu	Popiołu	Tlenku potas.	Tlenku sodow.	Tlenku wapiowego	Tlenku magnewego	Kwasu fosfor.	Kwasu siark.	Krzemionki	Chloru
Koper	134	—	61.4	19.6	1.5	12.1	8.6	10.1	0.5	0.2	2.1
Kminek	130	—	46.4	12.2	3.0	8.4	3.8	11.3	2.5	2.3	1.4
Koriander	135	—	41.2	14.5	0.5	9.1	5.0	7.6	2.8	0.4	1.0
Zołędzie świeże	553	4.0	9.8	6.3	0.1	0.7	0.5	1.5	0.4	0.1	0.2
Burak pastewny	140	—	48.8	9.1	8.5	7.6	8.6	7.6	2.1	1.1	5.3
Marchew	120	—	74.8	14.3	3.5	29.1	5.0	11.8	4.2	4.0	2.8
Burak cukrowy	146	—	45.3	11.1	4.2	10.2	7.3	7.5	2.0	0.8	1.9
<i>e) Owoce.</i>											
Jabłko cały owoc	831	0.6	2.2	0.8	0.6	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	—
Gruszka „ „	831	0.6	3.3	1.8	0.9	0.3	0.2	0.5	0.2	0.1	—
Poziomka „ „	902	—	3.3	0.7	0.9	0.5	—	0.5	0.1	0.4	0.1
Wiśnia „ „	825	—	3.9	2.0	0.1	0.3	0.2	0.6	0.2	0.4	0.1
Sliwka „ „	838	—	2.9	1.7	—	0.3	0.2	0.4	0.1	0.1	—
Agrest „ „	903	—	3.3	1.3	0.3	0.4	0.2	0.7	0.2	0.1	—
Winogrono cały o- woc	830	1.7	8.8	5.0	0.1	1.0	0.4	1.4	0.5	0.3	0.1
II. Słoma.											
<i>a) Zboża.</i>											
Pszenica ozima	143	4.8	46.0	6.3	0.6	2.7	1.1	2.2	1.1	31.0	0.8
„ jara	143	5.6	38.1	11.0	1.0	2.6	0.9	2.0	1.2	18.2	0.8
Żyto ozime	143	4.0	38.2	8.6	0.7	3.1	1.2	2.5	1.6	18.8	0.8
„ jare	143	5.6	46.7	11.7	—	4.0	1.2	2.8	1.5	25.2	—
Jęczmień	143	6.4	45.9	10.7	1.6	3.3	1.2	1.9	1.8	23.4	1.5
Owies	143	5.6	61.6	16.3	2.0	4.3	2.3	2.8	2.0	28.8	2.7
Kukurydza	150	4.8	45.3	16.4	0.5	4.9	2.6	3.8	2.4	13.1	0.6
Hreczka	160	13.0	51.7	24.2	1.1	9.5	1.9	6.1	2.7	2.9	4.1
<i>b) Inne rośliny gospodarskie.</i>											
Bobik	160	16.3	44.9	19.4	0.8	12.0	2.6	2.9	1.8	3.2	2.0
Bób	160	—	40.2	12.8	3.2	11.1	2.5	3.9	1.7	1.9	3.1
Groch	160	10.4	43.1	9.9	1.8	15.9	3.5	3.5	2.7	2.9	2.3
Wyka	160	12.0	44.1	6.3	6.9	15.6	3.7	2.7	3.3	3.6	2.2
Łubin	160	9.4	42.6	17.7	1.3	9.7	3.4	2.5	3.4	1.2	1.4
Soja	140	13.1	32.7	5.0	0.7	14.6	5.0	3.1	2.1	1.8	—
Mak	160	—	48.6	18.4	0.6	14.7	3.1	1.6	1.5	5.5	1.3
Rzepak	160	5.6	41.3	11.3	3.9	11.7	2.5	2.5	3.1	2.6	3.5
III. Pławy.											
Pszenica ozima	143	7.2	92.0	8.4	1.7	1.7	1.2	4.0	—	74.7	—
Żyto ozime	143	5.8	82.7	5.2	0.9	3.5	1.1	5.6	0.1	66.4	0.4
Ości jęczmienia	143	4.8	118.6	9.3	1.1	12.5	1.5	2.4	3.6	85.6	0.8
Owies	143	6.4	71.2	4.5	2.9	4.0	1.5	1.3	3.5	50.4	0.8
Kaczany kukurydz.	140	2.3	4.5	2.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	1.3	0.2

Wyszczególnienie	Wody	Azotu	Popiołu	Tlenku potas.	Tlenku sodow.	Tlenku wapiowego	Tlenku magnewego	Kwasu fosfor.	Kwasu siark.	Krzemionki	Chloru
Strączyny bobiku	150	16.8	54.7	35.5	1.3	6.8	6.0	2.7	1.2	0.3	1.0
„ lubinu	143	7.2	19.1	9.4	1.3	4.4	0.8	1.0	0.4	0.9	0.3
„ rzepaku	140	6.4	70.1	9.5	3.0	35.1	5.8	3.7	6.4	0.8	3.5
Łuski lnu	116	5.6	53.9	15.0	3.0	15.6	3.3	4.5	3.8	4.5	4.1
„ lnianki	112	4.3	43.3	12.7	1.3	16.0	2.3	1.5	4.6	3.6	0.7
IV. Siano.											
<i>a) Siano łąkowe i trawy.</i>											
Siano łąkowe	143	15.5	59.8	16.0	2.2	9.5	4.1	4.3	3.1	17.2	3.7
Trawa z wczesnego pokosu i potraw	160	19.1	76.0	22.3	3.0	10.4	5.1	5.9	4.1	19.4	4.5
Trawa kwaśna	140	—	37.2	8.8	—	7.0	1.8	1.4	3.7	13.8	—
Zboża w czasie kwitnienia	150	—	59.4	19.3	1.0	3.4	1.7	5.6	1.5	24.7	2.3
Kupkówka	143	—	50.8	16.7	2.2	3.1	1.4	3.6	1.3	16.7	3.6
Rajgras angielski	143	16.3	58.2	20.2	2.0	4.3	1.3	6.2	2.3	18.5	6.1
<i>b) Rośliny motylkowe.</i>											
Koniczyna czerwona młoda	167	35.5	82.3	29.7	1.9	23.5	7.6	10.0	1.8	2.5	3.3
Koniczyna czerwona w pączkach	165	24.5	68.4	25.3	1.4	20.7	7.6	6.9	1.7	1.8	2.4
Koniczyna czerwona kwitnąca	160	19.7	57.6	18.6	1.1	20.1	6.3	5.6	1.9	1.6	2.2
Koniczyna czerwona dojrzała	150	12.5	44.7	10.0	1.4	15.8	6.9	4.4	1.4	3.0	1.3
Koniczyna biała kwitnąca	165	23.2	61.1	13.1	4.4	18.4	5.8	7.8	4.5	2.7	2.6
Koniczyna szwedz.	160	24.0	40.0	11.1	1.2	13.6	5.0	4.1	1.6	1.6	2.2
Koniczyna inkarnatka	167	19.5	50.7	11.7	4.3	16.0	3.1	3.6	1.3	8.2	1.8
Lucerna rozkwitająca	160	23.0	62.0	14.6	1.1	25.2	3.1	5.3	3.6	5.9	1.9
Lucerna chmielowa	167	23.3	53.7	16.8	4.4	14.9	4.5	4.4	2.2	1.9	4.8
Esparceta kwitn.	167	22.1	45.8	13.0	1.5	16.8	3.0	4.6	1.4	3.7	1.8
Przelot kwitnący	167	22.1	53.2	14.5	0.7	27.7	2.5	4.7	0.7	1.7	6.6
Seradela	167	21.6	81.6	31.9	1.7	18.2	2.8	9.1	3.1	7.0	2.1
Wyka zwykła	167	22.7	56.0	19.7	2.4	16.3	4.6	6.2	3.4	1.1	1.4
„ piaskowa											
„ obie w okr. kwitn.	167	41.5	84.2	24.4	0.8	18.1	5.7	9.7	4.3	7.3	2.5
Łubin	167	27.4	34.2	8.0	2.5	8.8	3.3	5.8	1.9	2.4	0.6
Groch zielony	167	22.9	62.4	23.2	2.3	15.6	6.3	6.8	5.1	0.8	2.0

Wyszczególnienie	Wody	Azotu	Popiołu	Tlenku potas.	Tlenku sodow.	Tlenku wapienowego	Tlenku magnezowego	Kwasu fosfor.	Kwasu siark.	Krzemionki	Chloru
V. Pasza zielona.											
<i>a) Pasza łąkowa i trawy.</i>											
Zboża kwitnące	785	4.5	15.0	4.4	0.3	0.9	0.4	1.4	0.4	6.2	0.6
Żyto na paszę	760	5.3	16.3	6.3	0.1	1.2	0.5	2.4	0.2	5.2	0.6
Owies zielony	810	3.7	14.2	5.6	0.5	0.9	0.4	1.3	0.5	4.4	0.6
Kukurydza zielona	829	1.9	10.4	3.7	0.5	1.4	1.1	1.0	0.3	1.9	0.5
Mohar rozkwit.	750	5.0	17.4	6.3	0.4	1.8	1.6	1.0	0.6	4.9	0.9
Sorgo	773	4.0	14.0	3.9	1.9	1.3	0.6	0.8	0.5	4.0	1.1
Trawa wcz. pokos. i potraw.	800	5.6	18.1	5.3	0.7	2.5	1.2	1.1	1.0	4.6	1.1
Rajgras	700	5.7	20.4	7.1	0.7	1.5	0.4	2.2	0.8	6.5	2.1
Kupkówka	700	—	17.8	5.9	0.8	1.1	0.5	1.3	0.5	5.9	1.3
Tymotka	700	5.4	20.5	7.1	0.4	1.7	0.7	2.4	0.6	6.6	1.1
<i>b) Rośliny motylkowe.</i>											
Koniczyna czerwona młoda	860	6.0	14.0	5.1	0.3	3.9	1.3	1.7	0.3	0.4	0.6
Koniczyna czerwona w pączkach	820	5.3	14.7	5.5	0.3	4.5	1.6	1.5	0.4	0.4	0.5
Koniczyna czerwona kwitnąca	800	4.8	13.7	4.4	0.3	4.8	1.5	1.3	0.4	0.4	0.5
Koniczyna biała kwitnąca	805	5.6	14.3	3.1	1.0	4.3	1.4	1.8	1.1	0.6	0.6
Koniczyna szwedzka kwitnąca	820	5.3	8.6	2.4	0.3	2.9	1.1	0.9	0.4	0.3	0.5
Koniczyna inkarnatka kwitnąca	815	4.3	11.3	2.6	1.0	3.6	0.7	0.8	0.3	1.8	0.4
Lucerna rozkwitająca	740	7.2	19.2	4.5	0.3	8.5	0.9	1.6	1.1	1.8	0.6
Esparceta kwitn.	800	5.1	11.0	3.1	0.4	4.0	0.7	1.1	0.3	0.9	0.4
Przełot	830	4.5	10.9	3.0	0.1	5.7	0.5	1.0	0.2	0.4	0.1
Seradela	800	4.8	19.6	7.7	0.4	4.3	0.7	2.2	0.8	1.7	0.5
Łubin zielony	850	5.0	6.2	1.5	0.5	1.6	0.6	1.1	0.4	0.4	1.1
Groch	815	5.1	13.9	5.2	0.5	3.5	1.4	1.5	1.1	0.2	0.4
VI. Okopowe.											
Ziemniaki	750	3.4	9.5	5.8	0.3	0.3	0.5	1.6	0.6	0.2	0.3
Burak pastewny	880	1.8	9.1	4.8	1.5	0.3	0.4	0.8	0.3	0.2	0.9
„ cukrowy	815	1.6	7.1	3.8	0.6	0.4	0.6	0.9	0.3	0.2	0.3
Główki buraków cukrowych	840	2.0	9.6	2.8	2.3	0.9	1.1	1.2	0.7	0.2	0.2
Brukiew	870	2.1	7.5	3.5	0.4	0.9	0.3	1.1	0.7	0.1	0.5
Rzepa (Turnips)	920	1.8	6.4	2.9	0.6	0.7	0.2	0.8	0.7	0.1	0.3
Marchew	850	2.2	8.2	3.0	1.7	0.9	0.4	1.1	0.5	0.2	0.4

Wyszczególnienie	Wody	Azotu	Popiołu	Tlenku potas.	Tlenku sodow.	Tlenku wapienowego	Tlenku magnezowego	Kwasu fosfor.	Kwasu siark.	Krzemionki	Chloru
Bulwy	800	3.2	9.8	4.7	1.0	0.3	0.3	1.4	0.6	0.2	0.4
Cykorja	800	2.5	6.7	2.6	1.0	0.5	0.3	0.8	0.5	0.3	0.5
VII. Liście i nać okop.											
Ziemniaki prawie dojrzałe	770	4.9	19.7	4.3	0.4	6.4	3.3	1.6	1.3	0.9	1.1
Ziemniaki niedojrzałe	825	6.3	16.5	4.4	0.3	5.1	2.4	1.2	0.8	1.2	0.9
Burak pastewny	905	3.0	14.6	4.5	2.8	1.6	1.4	1.0	0.8	0.5	2.3
" cukrowy	897	3.0	15.3	4.0	2.0	3.1	1.7	0.7	0.8	1.6	1.3
Brukiew	884	3.4	19.6	2.8	0.8	6.5	0.8	2.0	2.3	2.1	1.5
Rzepa (Turnips)	898	3.0	11.9	2.8	1.1	3.9	0.5	0.9	1.1	0.5	1.2
Marchew	822	5.1	23.9	2.9	4.7	7.9	0.8	1.0	1.8	2.4	2.4
Kapusta	890	2.4	15.6	5.8	1.5	2.8	0.6	1.4	2.4	0.1	1.3
Bulwy	800	5.3	14.5	3.1	0.2	5.0	1.3	0.7	0.2	3.6	0.4
Cykorja	850	3.5	16.5	4.3	2.9	3.3	0.4	1.0	1.4	0.6	2.7
VIII. Rośliny przemysł.											
Len—włókna	100	—	6.8	0.3	0.3	3.6	0.3	0.7	0.3	0.8	—
Konopie lodygi	108	—	31.7	5.5	0.6	16.8	2.1	2.1	0.6	3.1	0.6
Chmiel—cała rośl.	140	25.0	72.9	17.9	1.9	19.7	7.0	5.8	2.9	13.3	3.7
" szyszki	120	32.2	66.4	23.0	1.5	11.0	3.6	11.1	2.4	10.9	2.1
Tyto—liście	180	34.8	40.7	40.9	4.5	50.7	10.4	6.6	8.5	8.1	9.4
" lodygi	180	24.6	64.7	28.2	6.6	12.4	0.5	9.2	2.2	1.6	2.4
IX. Materyały podściółowe.											
Sitowie	140	—	56.0	16.9	4.7	4.2	3.0	4.3	2.0	11.8	7.3
Trawa morska	150	16.4	146.7	17.7	31.0	20.9	12.5	4.2	34.7	2.9	24.2
Trzcina	180	—	33.5	6.0	0.2	2.7	0.9	1.8	0.8	20.0	1.2
Turzyce	140	—	60.0	20.2	4.4	3.6	2.6	4.2	2.0	18.8	3.8
Mech	250	10.5	20.6	3.4	1.4	2.9	1.3	1.6	1.1	5.5	0.7
Paprocie	250	—	48.7	18.6	1.8	5.6	3.1	3.7	1.7	10.0	3.7
Liście bukowe w sierpniu	560	13.0	21.6	4.4	0.4	6.3	1.6	1.8	0.5	6.2	—
Ściółka z liści bukowych	140	10.0	46.7	2.3	0.5	21.2	3.1	2.4	1.0	14.5	—
Ściółka z liści dębowych	140	10.0	46.1	3.5	1.3	17.1	4.3	2.0	0.9	15.4	—
Ściółka z igieł świerka	126	9.0	40.3	1.3	0.4	16.0	1.8	2.0	0.6	18.1	—
Ściół. z igieł sosny	135	8.0	12.2	1.3	0.5	4.6	1.2	1.0	0.5	1.8	—
Ściółka z igieł miodrzewiu	140	—	34.3	1.6	0.5	7.5	2.4	1.3	0.6	19.6	—
Ściół. z igieł jodły	132	—	32.8	2.7	0.5	19.5	2.3	2.7	0.8	2.5	—
" z trocin	150	—	28.1	7.4	1.8	10.8	2.0	3.0	1.4	0.8	—

Wyszczególnienie	Wody	Azotu	Popiołu	Tlenku potas.	Tlenku sodow.	Tlenku wapiowego	Tlenku magnewego	Kwasu fosfor.	Kwasu siark.	Krzemionki	Chloru
X. Wytwory i odpadki fabryczne.											
Otreby hreczane	140	27.2	29.8	9.7	0.6	2.9	4.0	10.7	0.9	0.6	—
> jęczmienne	120	17.6	49.5	8.3	0.7	1.9	3.1	9.1	0.9	24.1	0.6
> pszenne	131	22.4	53.5	15.3	0.3	1.5	9.0	26.9	—	0.2	—
> żytnie	125	23.2	71.9	19.4	0.5	2.1	11.4	34.4	—	1.4	—
Mąka jęczmienna	140	16.0	20.0	5.8	0.5	0.6	2.7	9.5	0.6	—	—
> pszenna przednia	126	18.9	4.4	1.5	—	0.3	0.4	2.2	—	—	—
Mąka pszenna chlebowa	120	21.6	11.2	3.5	0.1	0.6	1.4	5.6	—	—	—
Mąka żytnia	142	16.8	16.9	6.5	0.3	0.2	1.4	8.2	—	—	—
> kukurydzana	140	16.0	5.9	1.7	0.2	0.4	0.9	2.7	—	—	—
> ryżowa karmowa	100	19.1	54.7	6.1	1.2	1.2	9.5	23.8	0.2	10.3	—
Łuski owsa	140	4.3	34.7	4.9	0.3	1.4	1.0	1.6	1.3	23.2	0.5
> ryżu	100	4.9	153.9	2.4	0.5	0.8	0.1	4.1	0.7	143.5	0.2
Wysłodziny	948	0.8	3.3	0.3	0.1	1.1	0.2	0.2	0.1	0.7	0.1
Melassa buraczana	172	12.8	82.6	58.7	10.1	4.1	0.3	0.5	1.6	0.3	8.2
Wywar z melassy	920	3.2	12.1	9.5	1.3	0.1	—	0.1	0.2	—	0.5
Wypluczyny ziemniaczane (Pulpa)	850	1.3	1.1	0.2	—	0.5	0.1	0.3	—	—	—
Wywar ziemniacz.	930	1.6	6.8	3.0	0.5	0.3	0.6	1.3	0.5	0.2	0.2
Ślód zielony	475	10.4	14.6	2.5	—	0.5	1.2	5.3	—	4.8	—
> suszony	75	16.0	25.6	4.4	—	1.0	2.2	9.3	—	8.5	—
Kiełki słodowe	80	36.8	67.6	20.8	1.2	1.9	1.9	18.2	2.7	14.9	4.7
Słodziny	766	7.8	10.6	0.4	0.1	1.5	1.1	3.9	—	3.5	—
Piwo	900	0.5	3.1	1.1	0.3	0.1	0.2	1.0	0.1	0.3	0.1
Makuchy rzepak.	113	50.5	57.0	13.0	1.9	7.1	7.3	20.0	3.4	2.9	0.4
> lniane	122	47.2	51.3	12.5	0.8	4.3	8.1	16.2	1.7	6.4	0.4
> makowe	115	51.0	77.4	2.3	2.3	27.1	6.2	31.7	1.9	5.6	0.5
> słonecz.	103	59.7	49.7	11.7	—	5.4	8.1	21.5	1.0	0.3	0.3
> palmowe	100	25.9	26.1	5.0	0.2	3.1	4.5	11.0	0.5	0.8	—
> kokosowe z nasion	127	37.4	53.3	19.6	1.5	5.5	3.0	13.0	1.8	1.8	6.2
> bawelny	112	62.1	66.4	15.8	—	2.9	10.1	30.5	0.8	5.5	—
Makuchy z orzechów ziemnych	104	75.6	39.7	15.0	0.9	1.6	5.2	13.1	0.9	1.2	0.9
Makuchy sezamowe	111	58.6	93.8	14.5	3.5	25.1	12.8	32.7	1.7	0.9	0.6
XI. Zwierzęta i produkta zwierzęce.											
Wół żyjący	597	26.6	46.6	1.7	1.4	20.8	0.6	18.6	—	0.1	2.8
Ciełę	662	25.0	38.0	2.4	0.6	16.3	0.5	13.8	—	0.1	3.0
Owca	591	22.4	31.7	1.5	1.4	13.2	0.4	12.3	—	0.2	2.2
Świnia	520	20.0	21.6	1.8	0.2	9.2	0.4	8.8	—	—	1.2

Wyszczególnienie	Wody	Azotu	Popiołu	Tlenku potas.	Tlenku sodow.	Tlenku wapniowego	Tlenku magnezowego	Kwasu fosfor.	Kwasu siark.	Krzemionki	Chloru
Mięso ssących	763	35.2	10.2	3.8	1.0	0.3	0.3	4.2	0.1	0.1	0.5
Krew wołu	790	32.0	7.9	0.6	3.6	0.1	—	0.4	0.2	0.1	2.7
Jajo kurze bez skorupy	737	20.0	9.2	1.6	2.1	1.0	0.1	3.5	—	—	0.8
Wetna myta	128	94.4	9.8	1.9	0.3	2.4	0.6	1.8	—	2.5	0.8
" niemyta	150	54.0	70.8	56.2	3.0	1.8	0.4	0.7	3.4	2.0	3.2
Mleko krowie	875	5.4	7.2	1.7	0.4	1.7	0.2	2.0	0.1	—	1.0
" " zbier.	911	4.6	7.9	2.1	0.5	1.7	0.2	2.2	0.3	—	0.9
Serwatka	933	0.9	5.4	1.7	0.7	1.0	—	0.9	0.2	—	0.8
Ser z kwaśn. mleka	480	52.3	68.4	3.3	31.3	1.7	—	9.4	—	—	30.1
" ze słodkiego	513	51.2	50.1	6.6	0.7	17.7	1.2	19.2	0.1	—	3.7
Mleko owcze	816	11.2	7.3	1.6	0.3	2.1	—	2.6	0.1	0.2	0.6

* Zdaniem Kłopotowskiego najwięcej soli od węgla białego zawiera krowi towarowy chleb dojrzewany i pieczony w piecu. Zależą od niego przedewszystkiem sery Kłopotowskiego i sery Kłopotowskiego, jak i dojrzewany i pieczony chleb i sery Kłopotowskiego. Wzrost i dojrzewanie sery Kłopotowskiego może być używane do sery 2-3 lata — sery 4-5 lat.

Podstawy do oceny nasienia według danych przyjętych przez
o. k. stację oceny nasion w Wiedniu i Prof. Dr. F. Nobbego w Tarandzie.*)

Liczba	Rodzaj nasienia	Czystość %	Siła kielkowania %	Wartość użytk.	1 kg. zawiera ziarn. tysięcy	Używać można nasienie mające lat	Waga hekto-litra w kg.
I. Rośliny pastewne motylkowe.							
1.	Koniczyna czerwona	97	90	87	550	2—3	75
2.	„ szwedzka	95	75	71	1420	2—3	75
3.	„ biała	96	78	75	1550	2—3	76
4.	„ inkarnatka	98	86	84	285	2—3	73
5.	Lucerna	98	89	87	465	2—3	77
6.	„ piaskowa	98	85	83	445	2—3	77
7.	„ chmielowa	95	75	71	610	2—3	76
8.	Esparceta	97	72	70	50	2—3	33
9.	Przelot	94	80	75	385	2—3	75
10.	Seradela	94	80	75	290	2—3	46
11.	Nostrzyk	98	82	80	520	2—3	80
12.	Bobik	99	97	96	1	4—5	80
13.	Groch	97	90	87	3—5	5—6	80
14.	Wyka	97	90	87	13	3—4	80
15.	Łubin żółty	98	90	88	6—7	2—3	75
16.	„ niebieski	98	90	88	6—7	2—3	75
17.	„ biały	98	85	83	6—7	2—3	70
2. Trawy.							
18.	Tymotka	97	92	89	2060	3—4	50
19.	Wiklina łąkowa	90	53	48	5759	2—3	17
20.	„ szorstka	90	68	61	7571	2—3	19
21.	Grzebienica	90	65	59	2345	2—3	37
22.	Mietlica rozłogowa	85	85	72	18970	2—3	20
23.	Ostrzyca trzcinowata	90	70	63	2525	0—1	25—30
24.	Rajgras angielski	95	82	78	500	2—3	22
25.	„ włoski	95	75	71	590	2—3	22
26.	„ francuski	70	75	53	400	2—3	16
27.	Kupkówka	80	78	62	1185	2—3	20
28.	Kostrzewa łąkowa	92	80	74	655	2—3	22
29.	„ owcza	80	65	52	1520	2—3	16
30.	„ czerwona	75	55	41	1420	2—3	17
31.	„ trzcinowata	90	75	68	625	2—3	18
32.	Wyczyniec łąkowy	82	50	41	2050	2—3	8

*) Zdolność kielkowania nasion zależy od wielu bardzo czynników, towarzyszących dojrzewaniu i przechowywaniu. Należy zawsze przed siewem badać siłę kielkowania zarówno nasienia kupnego jak i produkowanego u siebie, a szczególnie przechowywanego przez lat parę. Dobrze przechowane nasiona mogą być używane do siewu 2—3 lata — oleiste 6—8 lat.

Liczba	Rodzaj nasienia	Czystość %	Siła kiełkowania %	Wartość użytek.	1 kg. zawiera ziarn tysięcy	Używać można nasienie mające lat	Waga hektolitra w kg.
34.	Wehnica kłosówka	70	80	56	2400	3—4	8—11
35.	Owies złocisty	65	42	27	3720	2—3	10
36.	Stokłosa bezostna	89	80	64	—	2—3	—
37.	„ wyprostow.	80	60	48	—	2—3	—
38.	Tomka wonna	90	35	31	1837	2—3	14
3. Różne nasiona.							
39.	Pszenvca	99.5	95	—	24	2—3	76
40.	Żyto	99.5	95	—	32	2—3	72
41.	Jęczmień	99.3	95	—	22	2—3	64
42.	Owies	97.5	90	—	27	2—3	46
43.	Kukurydza	99.2	84—10	—	3	3—4	73
44.	Rzepak	99.7	69—100	—	175	2—3	70
45.	Rzepak	99	65—99	—	445	2—3	64
46.	Rzepa	98	91—99	—	358	2—3	61
47.	Gorczyca czarna	96	86	—	557	3—4	63
48.	Lnianka	98	96	—	1085	2—3	62
49.	Len	98	90	88	220	2—3	66
50.	Konopie	98	90	88	47	2—3	46
51.	Hreczka	100	82—93	—	12	2—3	64
52.	Buraki	97	170	—	40	3—4	22—27
53.	Cykorja	90	75	67	727	2—3	40—45
54.	Szporok polny	96	74	71	1370	6—8	60
55.	„ olbrzymi	95	72	69	950	6—8	60
56.	Marchew	90—95	70—80	—	725	2—3	20—35
57.	Proso cukrowe	99	85	—	36	2—3	50—55
4. Nasłona drzew.							
58.	Sosna	96	65	62	150—170	—	50—55
59.	Swierk	96	63	61	16—20	—	30—35
60.	Jodła	86	25	22	133	—	52—56
61.	Modrzew	87	37	32	169	—	41—50
62.	Brzoza	35	25	9	1600—1900	—	8—10
63.	Oleha biała	60	19	11	—	—	—
64.	„ czarna	70	30	21	600—700	—	30—35
65.	Dąb szypułkowy	96	70	67	250—350	—	65—70
66.	„ zwyczajny	96	65	62	1 sztuk	—	65—70
67.	Buk	97	32	29	4—5	—	41—48
68.	Wiaz	64	30	21	130—150	—	3—4
69.	Akacja	98	75	54	48—55	—	70—80

Ilość wysiewu nasion roślin gospodarskich na mórg austriacki lub nowopolski *).

Liczba	Rodzaj rośliny	Długość okresu wegetacyjnego w tyg.	Ilość wysiewu na mórg w kg.		Odległość w cm.		Głębokość na- przykrycia na- sienia w cm.
			rzutowo	rzędo- wo	rzę- dów	roślin w rzę- dach	
I. Zboża.							
1.	Pszenica ozima	42—50	75—145	58—116	10—25	—	2—5
2.	„ jara	18—20	85—130	79—100	10—20	—	2—5
3.	Zyto ozime	40—45	75—110	60—85	10—25	—	2.5—6
4.	„ jare	16—20	90—125	70—100	10—20	—	2.5—6
5.	Jęczmień jary 2 i 4 rzędowy	10—18	80—120	55—100	10—20	—	2.5—7
6.	Jęczmień ozimy	40—46	90—120	70—90	10—12	—	3—7
7.	Owies	16—22	75—130	40—80	10—25	—	2.5—7
8.	Kukurydza gr. ziarn.	20—26	—	28—43	50—80	20—40	3—8
9.	„ drob. „	20—26	—	17—23	40—60	15—30	2.5—6
10.	Proso zwyczajne	14—16	12—18	7—13	20—40	—	1—2.5
11.	Mohar	18—20	7—12	6—9	15—25	—	1—2.5
12.	Sorgo	22—26	—	12—26	50—80	20—40	2—4
13.	Hreczka	12—16	40—70	30—45	20—30	—	2.5—5
II. Groszkowe.							
14.	Groch późny	16—20	85—110	63—97	25—40	—	3—8
15.	„ wczesny	16—20	110—140	100—120	20—35	—	3—8
16.	Bobik gruboziarnisty	22—28	130—165	100—130	35—60	—	4—10
17.	„ średnio i dro- bnoziarnisty	22—28	120—155	90—125	30—45	—	4—8
18.	Soja	22—28	—	23—46	20—50	—	3—6
19.	Wyka	18—22	70—105	50—80	15—25	—	3—6
20.	Soczewica	14—18	45—90	35—70	15—25	—	2—5
21.	Fasola	16—20	—	70—100	30—60	15—30	4—8
22.	Wyka pias.(v.villosa)	20—24	45—70	37—55	—	—	3—5
23.	Wyka piaskowa z ży- tem św. Jańskim	40—45	28—40.5 40.5—52	—	—	—	3—5
24.	Łubin żółty i nieb.	16—24	70—150	50—100	25—40	—	3—8
25.	„ biały	20—24	103—150	80—110	25—40	—	3—6
III Oleiste.							
26.	Rzepak ozimy	46—48	7—10	4.5—7.5	40—60	—	1—3
27.	„ letni	16—18	9—12.5	5.5—9	30—50	—	1—3
28.	Rzepak ozimy	42—46	5—7.5	3.5—6	30—40	—	1—3
29.	„ letni	10—12	7.5—11.5	6—9	25—35	—	1—4
30.	Lnianka	12—14	4—5	3—4.5	15—25	—	1—2.5

*) Podane ilości wysiewu dotyczą przeciętnych warunków. Siejąc w warunkach mniej sprzyjających, więc późno, lub na glebach źle przygotowanych, należy siać gęściej. Przy roślinach pastewnych, na długotrwałe pastwisko, łąki sieje się niekiedy i dwa razy gęściej, niż podano.

Liczba	Rodzaj rośliny	Długość okresu vegetacyjnego w tyg.	Ilość wysiewu na mórg w kg.		Odległość w cm.		Głębokość przykrycia na- sienia w cm.
			rzutowo	rzędo- wo	rzę- dów	roślin w rze- dach	
31.	Gorzycza biała	14—16	6.5—10.5	4.5—8	30—40	—	2—4
32.	Mak	16—18	3—5	1.5—3.5	30—50	—	0.5—2
33.	Słonecznik	20—28	—	3.5—7	60—90	40—50	2.5—5
IV. Przemysłowe.							
34.	Len na ziarno	14—18	60—100	60—80	8—16	—	2—4
35.	» » włókna	12—15	130—170	—	—	—	2—4
36.	Konopie na ziarno	18—22	28—56	17—34	50—80	20—30	2.5—5
37.	» » włókna	16—20	—	—	—	—	2.5—5
38.	Gorzycza czarna	14—16	2.5—3.0	1.5—2.0	25—35	—	1—3
39.	Kminek	48—52	—	3.5—6.0	25—40	—	1—2.5
40.	Koper	16—20	8.5—11.5	7.0—9.0	25—35	—	1—3
41.	Anyz	16—20	8.0—11.5	6.0—8.5	30—40	—	1—3
42.	Koriander	18—22	8.5—14	7—9	30—45	—	2—4
43.	Tytoń	22—26	—	—	40—80	30—60	0—0.5
V. Okopowe.							
44.	Ziemniaki wielkie	16—26	—	1000—1400	50—70	30—50	2.5—15
45.	» średnie	16—26	—	700—1000	50—70	30—50	2.5—15
46.	» drobne	16—26	—	450—700	50—60	30—40	2.5—12
47.	Buraki pastewne	26—30	—	11.5—17	45—60	30—40	2—5
48.	» cukrowe	26—30	—	17—23	40—48	20—30	2—5
49.	Brukiew	18—20	—	4.5—7	45—65	30—40	1—3
50.	Marchew	26—28	3.5—4.5	2.3—3.5	40—60	20—30	0.5—1.5
51.	Rzepa	14—18	—	0.6—1.2	45—65	25—35	1—3
52.	» zasiewściern.	10—12	1.25—2.45	—	—	—	1—3
53.	Pasternak	21—26	—	4.5—7.0	40—60	20—30	1—3
54.	Cykorya	16—20	5.5—7.0	4.5—6.0	35—45	20—30	0.5—2
55.	Bulwy	24—28	—	600—900	45—70	30—50	2.5—10
56.	Kapusta	na	0.3—0.6	—	60—80	40—60	1—3
57.	Burak past.	roz-	5.8—8.6	—	15—20	1—3	2—5
58.	Brukiew	sadę	2.5—3.5	—	15—20	1—3	1—3
VI. Pastewne.							
59.	Koniczyna czerw.	10—12	9—14	7—10.4	10—15	—	0.5—2
60.	» szwedz.	10—14	8—10	6—8	10—15	—	0.5—2
61.	» biała	14—16	6—9	5—7	8—12	—	0.5—2
62.	» inkarn.	12—14	10—14	8—10	10—15	—	0.5—2
63.	Lucerna	8—10	14—20	12—17	15—25	—	0.5—2
64.	» chmielow.	10—12	12—17	9—14	10—15	—	0.5—2
65.	» piaskowa	13—15	17—23	14—20	15—25	—	0.5—2
66.	Esparceta	14—16	100—140	74—104	15—25	—	1.5—3
67.	Przelot	10—12	9—14	7—14	10—20	—	1—3
68.	Seradela	16—18	14—20	12—17	10—15	—	1.5—3
69.	Nostrzyk	12—14	25—30	17—23	30—40	—	0.5—2
70.	Komonica	8—12	14—23	12—21	10—15	—	0.5—2

Liczba	Rodzaj rośliny	Długość okresu wegetacyjnego w tyg.	Ilość wysiewu na mórg w kg.		Odległość w cm.		Głębokość przykrycia na- sienia w cm.
			rzutowo	rzędo- wo	rzę- dów	roślin w rzę- dach	
71.	Komonica błotna	—	9—14	7—12	10—15	—	0.5—2
72.	Kukurydza	14—18	65—90	50—80	30—50	—	3—8
73.	Sorgo	14—18	35—50	25—35	30—50	—	2—4
74.	Mohar	10—13	17—23	14—17	10—20	—	1—2.5
75.	Żyto	32—36	100—140	—	—	—	3—7
76.	Owies	12—14	90—140	—	—	—	2.5—7
77.	Groch pastewny	14—16	130—160	90—140	15—25	—	3—8
78.	Bobik	14—16	130—170	100—150	20—30	—	4—10
79.	Wyka ptasia	6—8	75—100	110—140	12—18	—	3—5
80.	„ plotowa	—	130—140	100—130	12—18	—	3—5
81.	„ piask. z żyt. Św. Jańsk.	36—40	70—90 11.5—23	—	—	—	3—5
82.	Lubin złoty i nie- bieski	14—20	115—155	90—130	20—30	—	3—6
83.	„ biały	15—20	150—200	115—155	20—30	—	3—6
84.	Rzepak pastewny	8—10	10—14	8.5—11.5	30—40	—	1—3
85.	Rzepak „	8—10	7—9	5.8—8	25—35	—	1—3
86.	Gorzycza biała	8—10	10—14	8.5—11.5	20—30	—	2—4
87.	Hreczka zyczajna	8—12	70—80	60—70	15—25	—	2.5—5
88.	Szparek	7—8	10—12	8—10	8—12	—	1
VII. Trawy.							
89.	Tymotka	12—14	6—10.5	4.5—8	8—12	—	0—2
90.	Wiklina łąkowa	8—10	9—14	7—9	8—12	—	0—2
91.	„ szorstka	8—10	10—14.5	8—10.5	8—12	—	0—2
92.	Grzebienica pospolita	8—10	11.5—23	8.5—14.5	8—12	—	0—2
93.	Mietlica łąkowa	12—14	5.5—8.5	4.5—7	8—12	—	0—2
94.	Ostrzyca trzcinowata	—	12—14	9—10	8—12	—	0—2
95.	Rajgras angielski	10—12	23—46	17—34.5	8—12	—	0—2
96.	„ włoski	10—12	23—46	17—34.5	8—12	—	0—2
97.	„ francuski	8—10	46—69	34.5—52	8—12	—	0—2
98.	Kupkówka	12—16	14.5—26	11.5—17	8—12	—	0—2
99.	Kostrzewa łąkowa	10—12	46—86	34.5—69	8—12	—	0—2
100.	„ owcza	8—10	11.5—23	8.5—17	8—12	—	0—2
101.	„ czerwona	10—12	20—31.5	17—26	8—12	—	0—2
102.	„ trzcinow.	12—14	23—40.5	17.5—29	8—12	—	0—2
103.	Wyczyniec łąkowy	8—10	14.5—29	11.5—23	8—12	—	0—2
104.	Welnica kłosówka	—	8.5—11.5	7—9.5	8—12	—	0—2
105.	Owies złocisty	12—16	14.5—20	10—14	8—12	—	0—2
106.	Stokłosa bezostna	—	40—42	34—36	8—12	—	0—2
107.	„ wyprostow.	—	38—38	30—32	8—12	—	0—2
108.	Tomka wonna	—	14—16	10—12	8—12	—	0—2

Tabliczka do zamiany ilości wysiewu, dawek nawozu itp. w kg. na mórg austr., na mórg nowopolski, dziesięcinę i f. rosyjskie.

Kg. na mórg austr.	Odpowiada funtów rosyjsk.		Kg. na mórg austr.	Odpowiada funtów rosyjsk.		Kg. na mórg austr.	Odpowiada funtów rosyjsk.		
	na mórg nowopol.	na dziesięcinę		na mórg nowopol.	na dziesięcinę		na mórg nowopol.	na dziesięcinę	
100	237	421	410	973	1737	720	1709	3052	1 hektolitr = 25 garncom
110	261	466	420	997	1780	730	1732	3094	= 0.78 korca ^(3/40)
120	284	508	430	1040	1822	740	1756	3136	= 3.8 czetwetyka
130	308	551	440	1044	1865	750	1780	3179	
140	332	593	450	1068	1907	760	1803	3221	
150	356	635	460	1091	1950	770	1827	3263	1 kg. = 2.44 f. ruskiego
160	379	678	470	1115	1992	780	1850	3306	16.48 kg. = 1 pud
170	403	720	480	1140	2034	790	1875	3348	100 kg. = 6 pud. 4 f.
180	427	763	490	1163	2077	800	1898	3390	
190	450	805	500	1187	2119	810	1922	3433	
200	474	847	510	1210	2160	820	1946	3475	2.4 cm. = 1 cal polski
210	498	890	520	1234	2204	830	1970	3518	2.5 » = 1 cal ang.
220	522	932	530	1258	2246	840	1993	3560	4.4 » = 1 werszek
230	545	974	540	1281	2288	850	2017	3602	
240	569	1017	550	1305	2331	860	2041	3645	kilometr = 0.937 wiorsty
250	593	1059	530	1329	2373	870	2065	3687	
260	617	1102	570	1353	2416	880	2088	3730	1 hektar = 10.000 metrów ²
270	640	1144	580	1376	2458	890	2112	3772	= 100 arów
280	664	1186	590	1400	2500	900	2136	3815	= 1.86 morgi nowopol.
290	688	1229	600	1424	2543	910	2160	3857	
300	712	1271	610	1448	2584	920	2183	3899	= 1 mórg n. p. 236 pręt.
310	735	1314	620	1471	2628	930	2207	3942	= 0.915 dziesięciny
320	759	1356	630	1495	2670	940	2237	3984	
330	783	1398	640	1519	2712	950	2254	4026	9 (quintal) = 100 kg.
340	807	1441	650	1542	2755	960	2278	4069	
350	830	1483	660	1566	2797	970	2302	4111	1 mórg austr. = 1600 sążni
360	854	1526	670	1590	2840	980	2326	4150	= 5755 m. ²
370	878	1568	680	1614	2882	990	2349	4196	= 1 mórg n. p. i 8 pr.
380	901	1610	690	1637	2924	1000	2373	4238	1 mórg nowopolski = 5599 m. ²
390	925	1653	700	1662	2967				
400	949	1695	710	1685	3009				= 1557 sążni.

Jednostki i dziesiątki kilogr. obliczają się według tej samej tablicy przez postawienie przecinka w odpowiedniem miejscu.

Charakterystyka rolnicza ważniejszych

Skrócenia: M. k. = Mięszanka koniczynowa. — Ł. prz. = Łąka
4 = Trawy trwałe. W. = Wysokopienne. — N. = Niskopienne.

Liczba	Nazwa	Trwała	Rozłogi	Kwitnie
1.	Koniczyna czerwona zwykła	2	—	VI—VII
2.	„ „ „ trwałe	5—6	—	VI—VII
3.	„ „ szwedzka	3	—	VI—VII
4.	„ „ biała	3	Ndz.	V—VIII
5.	Komonica zwykła	4	—	VII
6.	„ „ błotna	4	Ndz.	VI—VIII
7.	Lucerna zwykła	6—20	—	VI—VII
8.	„ „ piaskowa	6—10	—	VI—VII
9.	„ „ chmielowa	1—2	—	V—IX
10.	Esparceta	4—7	—	VI—VII
11.	Przelot	2	—	VI—VIII
12.	Tymotka	4—6	—	VI—VII
13.	Wiklina łąkowa	4	Pdz.	V
14.	„ „ szorstka	4	Ndz.	VI
15.	Grzebienica	4	—	VI
16.	Mietlica rozłogowa	4	Ndz. Pdz.	VI—VII
17.	Ostrzyca trzcinowata	4	Pdz.	VI—VII
18.	Rajgras angielski	1—4	Pdz.	V—IX
19.	„ „ włoski	1—2	—	VI—IX
20.	„ „ francuski	3—5	—	VI
21.	Trawa kupkówka	4	—	VI
22.	Kostrzewa łąkowa	4	—	V—VI
23.	„ „ owcza	4	—	V—VI
24.	„ „ czerwona	4	Pdz.	V
25.	„ „ trzcinowata	4	Pdz.	V—VI
26.	Wyczyniec łąkowy	4	Pdz.	V
27.	Wielnica kłosówka	4	—	V
28.	Owsik złoty	4	—	VI—VIII
29.	Stokłosa bezostna	4	Pdz.	VI
30.	„ „ wyprostowana	4	—	V—VI
31.	Krwawnik	4	—	VI
32.	Tomka wonna	4	—	V

roślin pastewnych łąkowych.

przezienna. — Ł. trw. = Łąka trwała. — Past. = Pastwisko. —
Pdz. = Podziemne. — Ndz. = Nadziemne.

Nadaje się na	Odpowiednia gleba	Odrost po pierwszym pokosie	Wysok. wzrostu
M. k.	Zwięzłe nie nazbyt suche	dobry	
M. k. Ł. prz. Ł. trw.	„ „ „ „	„	
„ „ „ „	Zwięzłe wilgotne	praw. żaden	
Ł. prz. Ł. trw. Past.	Lżejsze, próchniczne	„	
Ł. trw. Past.	Wszelkie grunta, szczególnie wapniste, suche	slaby	
Ł. trw.	Torfy, mursze	praw. żaden	
M. k.	Bogate gleby, przepuszczalne o niskim poziomie wody gruntowej, głębokie	3—5 pokos.	
„	Lżejsze glinki, piaski	2 pokosy	
„	Ubogie, lekkie, wapniste	dobry	
M. k. Ł. trw.	Lżejsze, wapniste, głębokie, stanowiska cieplejsze	1 pokos	
M. k.	Lekkie glinki, piaski zasobne w wapno	„	
M. k. Ł. trw. Ł. prz.	Glinki, gliny ciężkie i wilgotne	dobry	W.
Ł. trw. Ł. prz.	Glinki, gliniaste piaski choćby suche	mierny	N.
Ł. trw. Ł. prz.	Wilgotne i mokre grunta	praw. żaden	W.
Ł. trw. Ł. prz. Past.	Średnio zwięzłe, nie suche	mierny	N.
„ „ „ „	Wilgotne	dobry	N.
Ł. trw.	Zwięzlejsze, wilgotne, mursze	„	W.
M. k. Past.	Zwięzlejsze, wilgotne, lub wilgotne piaski	slaby	N.
M. k.	Glinki dobrego gatunku	dobry	N.
M. k. Ł. trw. Ł. prz.	Wszelkie lepsze wapniste	mierny	W.
„ „ „ „	Wszelkie lepsze	dobry	W.
Ł. trw. Ł. prz.	Gleby wilgotne. lecz nie kwaśne	„	W.
Ł. trw. Ł. prz. Past.	Wszelkie suche gleby	slaby	N.
Ł. trw. Past.	Gleby suche też mursze	„	N.
„ „ „ „	Wszelkie a szczególnie wilgotne i mursze	dobry	W.
Ł. trw. Ł. prz.	Mniej zwięzłe, szczególnie na łąki zalewane	„	W.
„ „ „ „	Slabsze, też mursze gorszego gatunku nierozłożone	mierny	W.
„ „ „ „	Wszelkie, też lepsze mursze	dobry	W.
„ „ „ „	Lekkie, nie za suche. Mursze	średni	W.
„ „ „ „	Lekkie, suche	mierny	W.
Ł. trw. Ł. prz. Past.	Niezbyt zwięzłe	slaby	N.
„ „ „ „	Slabsze	„	N.

Koniczyny na suchych gruntach zalecają wysiewać albo bardzo wczesną wiosną, albo przeciwnie już wtedy, kiedy roślina ochronna wyrosła, cieniuje rolę i stanowi osłonę. Albo wreszcie doradzają zasiew koniczyny lub lucerny w podorane ściernisko w lipcu lub w sierpniu; radzą też w tym celu głębsze przykrycie broną, zasiew siewnikiem rzędowym razem z rośliną ochronną.

Koniczyna szwedzka. (*Trifolium hybridum*). Nadaje się oprócz stanowisk wilgotnych, na suche gliny, nawet lepiej od koniczyny czerwonej. Ze względu na trwałość (3-5 lat) należy siewać ją w mieszance z czerwoną, jeśli koniczynę mamy używać przez lat dwa. Koniczyna szwedzka daje jeden obfity pokos. Przydatność jej na grunta wilgotne jest ogólnie znana.

Przełot. (*Anthyllis vulneraria*). Jest dobrą rośliną pastewną dla owiec i bydła w stanie suchym i zielonym. Krowy początkowo nie chcą jeść, ale łatwo przywykają. Siano przygotowywać brnatne szczególnie jeśli się go zbierze późno. Przełot nadaje się na grunta suche, wapienne, piaski, gliny. Nie nadaje się na gleby wilgotne. Początkowy rozwój bardzo słaby dopiero z końcem maja, równo z kwiatem, zaczyna się najsilniej rozwijać. Kosić kiedy dobrze rozkwitnie. Przełot daje jeden tylko obfity pokos i jest doskonałym przedplonem, bo wcześniej z pola schodzi.

Lucerna. (*Medicago sativa*). Zalety: długowieczność i obfitość paszy. Nasienie prowansalskie najlepsze. Lucerna nie znosi wody gruntowej, lubi wapno i głęboką warstwę rodzajną. Potrzebuje silnego nawożenia. Nawozić: tomaszyną 300 kg. na morg i 400 kg. kaimtu; przyorać głęboko. Przykrywać na zimę przegniłym nawozem. Dodawać do nasienia 2-4 kg. trawy kupkowej na morg. Wsiewać w jęczmień lub owies rzadki, który się następnie na zielono skasza. Wysiew lucerny w połowie maja. Radzą też siał w lipcu bez rośliny ochronnej w świeżo zaoranym ścierniu.

Lucerna chmielowa. (*M. lupulina*). Roślina 2-letnia. Nadaje się na grunta lekkie, suche, wapiaste, dobrze wytrzyma zimno. Daje plon już w 1-szym roku po zasiewie, w 2-gim roku po skoszeniu zamiera; przez wypadanie ziarna zachwaszcza pole. Znosi dobrze spasanie; lepsza na pastwisko, niż na koszenie. Odpowiednia na pastwisko krótkotrwałe mieszanka z 65% koniczyny białej i 35% lucerny chmielowej z rajgrasem włoskim. Podsiwiają nią zboże, by na jesieni mieć pognoj zielony.

Koniczyna inkarnatka. (*Trifolium incarnatum*). U nas siewaną bywa tylko na wiosnę w ugorach. Daje obfity paszę. Nie przewyższa swemi zaletami mieszanek z wyki i t. p. Inkarnatkę siewają na zachodzie w ścierniska nie później, niż 20. VIII, często z rajgrasem angielskim. Tego rodzaju posiew daje bardzo wczesną zieloną paszę i po niej można jeszcze sadzić kartofle i t. p. Ozy jednak inkarnatka, w ten sposób siana, wytrzymałaby nasze zimy, nie wiadomo, bo brak w tej mierze dłuższych doświadczeń.

Wyka paskowa. (*Vicia villosa*). Nadaje się na wszelkie, byle niezbyt ciężkie, gleby. Wytrzyma doskonale nasze zimy i może u nas zastąpić ścierniskową inkarnatkę. Sieje się ją wczesną jesienią z żytem. Na morg 30-45 kg. wyki i 45-70 żyta świętojańskiego. W połowie maja mamy już bardzo obfity pokos paszy. Ziarno wyki paskowej zbierać z zasiewu zimowego. Doradzają też siał najpierw wykę, później kiedy to wszędzie żyto (siewnikiem rzędowym).

Seradela. (*Ornithopus sativus*). Jednoroczna roślina. Nadaje

się na piaski, ale też i na suche glinki. Wsiewać najlepiej w żyto rzędowo wczesną wiosną. Po zbiorze żyta zaczyna się dopiero rozwijać. Pokos z początkiem września; doskonała pasza. Dobry międzyplon na zielony pognój.

Esparceta. (*Onobrychis sativa*). Nadaje się na grunta suche, wapiaste, pływkie. Warunkiem udawania się obfitość wapna w podglebiu. Esparceta trwać może lat kilkanaście. W pierwszym roku szkodzią przymrozki. Nie znosi spasania. Jeden pokos. Przykrycie nasienia ekstyrpatorem. Wysiew w owies. W latach następnych dobrze jest podsiewać pod bronę, puste miejsca. Jako domieszka nadaje się rajgras francuski.

Nostrzyk. (*Melilotus albus*). Dobry na pastwisko dla owiec. Może być używanym na zieloną paszę. Krowy przyzwyczajają się do jego przenikliwego zapachu. Nadaje się na bardzo jałową grunty, odłogi. Jest rośliną wieloletnią. Daje w 1-ym roku 3—4 pokosy. Może być stosowany na zielony pognój jako międzyplon. Sieje się na wiosnę w roślinę ochronną, lub, w lecie w ścierńisko.

Tymotka. (*Phleum pratense*). Trawa u nas najwięcej rozpowszechniona. Nadaje się na wszelkie grunty. Odpowiednia na cięższe grunty. Daje w 2-gim roku użytkowania największy plon; trwa 4—6 lat. W mieszankach daje się jej do 20% czystego wysiewu. Lepsza na paszę koszoną, jak na pastwisko.

Trawa kupkowa. (*Dactylis glomerata*). Trawa doskonała, która się u nas rozpowszechnić powinna jako dodatek do koniczyn, zasiewanych na użytek 2 lub 3-letni. Nieodpowiednia tylko na piaski.

Rajgras włoski. (*Lolium italicum*). Doskonale na paszę koszoną i zalecać go należy jako przymieszka do koniczyny czerwonej lub szwedzkiej na użytek jedno — lub dwuletni. Nie wszędzie dobrze przzimowują.

Rajgras angielski. (*Lolium perenne*). Może być zasiewany w mieszankach tylko na długotrwały użytek na pastwiska.

Rajgras francuski. (*Arrhenatherum elatius*). Nadaje się na pasze koszone. Nie należy do traw bardzo trwałych. Już pierwszego roku daje obfity pokos. Na dobrych ziemiach daje 3—4 pokosy. Jako przymieszka do esparcety, koniczyn.

Kostrzewa owcza. (*Festuca ovina*). Trawa doskonale znosząca suszę. Choć niewielkiej wartości nadaje się na pastwiska, na suche grunty w mieszance i może służyć jako przymieszka do innych lepszych traw.

Stoklosa bezostna. (*Bromus inermis*). Należy również do traw opornych na posuchę. Pasza twarda, średniej wartości. Trwa lat kilkanaście. Daje pokos już 1-go roku po zasianiu. Sieją ją zwykle samą.

Mohar. (*Setaria germanica*). Uznanym na podstawie długoletniego doświadczenia, jako w naszych warunkach bardzo pewna roślina pastwna. Może być siewany późno, znosi dobrze posuchę; ma krótki okres wegetacyjny.

Sorgo. (*Sorghum sacharratum*). Różne odmiany zasługują na uwagę specjalnie na gruntach suchych w klimacie ciepłym. W tych okolicznościach dać może większą masę paszy jak zielona kukurydza. Wysiew w końcu maja. Nadaje się do uprawy

ścierniskowej. Na morg wysiewa się 20 kg. rzędowo w odległości rzędów 37—42 cm. a w rzędach 10—12 cm. Ogrzebywanie tak jak przy kukurydzy.

Kukurydza. Przeciwno wronom pożerającym nasienie zaleca Tetard: 6 litrów smołowca, 3 litry nafty i 1 litr kwasu karbолоwego wymieszać i wsypać do tego 12—13 hl. nasienia. Smołowiec podgrzewa się ostrożnie i wlewa następnie naftę i kwas karbолоwy. Otrzymuje się w ten sposób łatwo płynną mieszaninę. W paczce szerokiej rozsypuje się korzec zboża i polewa 1 litrem mieszaniny, a następnie mięsza starannie szuflą, by każde ziarno stało się czarnem.

Dla ułatwienia rozsiewu Tetard daje na 10 hl. około 10 litrów drobno sproszkowanego fosforytu i mięsza. Nasiona można potem rozsiewać ręką lub siewnikiem. Manipulacja ta powstrzymuje kiełkowanie o 2—3 dni.

Gorczyca biała. (*Sinapis alba*). Zaleta: szybki rozwój w 5—6 tygodni, obfity pokos. Siał w odstępach co 1—2 tygodni. Nadaje się na grunta żyzne, w kulturze — można siać w każdej porze roku. Doskonała pasza dla krów. Rzutowo na morg 10—12 kg. nasienia. Kosić w czasie kwiatu. Zasiew mieszany z tatarką.

Brukiew. (*Brassica napus rapifera*). Na ciężkie lub mokre grunta gdzie się nie udają inne rośliny pastewne. Flaucuje się z rozsady w rzędy na 40—50 cm. W rozsadniku rzędy na 10 cm. Wyjmując z rozsadnika, nie wrywać, lecz podważać z ziemią młode roślinki i dopiero wówczas otrząsać je z ziemi. Brukiew przechowuje się gorzej od buraków przez zimę. Na morg 2—3 kg. nasienia.

Rzepa. (*Brassica rapa rapifera*). Zalecaną być może, jako uprawa w ścierniskach w lipcu lub w sierpniu. Na morg 1.5—3 kg. ziarna przy siewie rzutowym, 1—2 kg. przy siewie rzędowym. Rzędy na 30—35 cm. Przy rzutowym siewie zamiast ograbywania silne bronowanie.

Bulwa. (*Topinambur. Helianthus tuberosus*). Roślina trwała, mogąca być 4—5 lat na jednym miejscu. Nadaje się na liche odlogi. Sadzenie w rzędy na 75 cm. W rzędach 40—45. Po 5-ciu latach można siać znowu na tem samym miejscu. Bulw w kopcach i piwnicach długo przechowywać nie można.

Kapusta głowiasta. (*Brass ol. acephala*). Na mokre lub torfiaste grunta, daje dużą masę zielonej paszy. Sadzi się ją z rozsady w końcu maja na 50—100 cm. w kwadrat. Liście obrywa się w miarę potrzeby, zaczynając od sierpnia.

Szparek. (*Spergula arvensis*). Mały, nadaje się na pastwisko. Odpowiedni na lekkie grunta, jako przedplon. Zaleca się szybkim rozwojem 6—8 tygodni. Zachwaszcza grunt. Wysiewa się na morg 10—12 kg.

Mieszanki pastewne

biorąc za podstawę do obliczenia ilości wysiewu przeciętną wartość nasienia. P. str. 24. Kupując nasienie koniczyń lub traw należy je zawsze poddawać kontroli stacyi doświadczałnej. Wysiew na morg.

Pasza koszona.

I. Piaski.

Ia. na morg: łubinu żółt.	60 kg.	Ib. Seradelli	12 kg.
wyki	40 »	łubinu żółt.	60 »
hreczki	25 »	hreczki	35 »
	125 kg.		107 kg.

Pasza koszona. II. *Glinki i gliny.*

II a. wyki	60 kg.	II b. żyta	30 kg.
łobiku	40 »	wyki	30 »
owsa	30 »	hreczki	20 »
	130 kg.		80 kg.
II c. gorczycy	12 kg.	II d. koniczyny czerw. . .	3 kg.
hreczki	10 »	rajgrasu włosk.	12 »
	22 kg.		20 kg.
II e. koniczyny czerw. . .	4 kg.	II f. wyki piaskowej . . .	50 kg.
» szwedz.	4 »	żyta	50 »
rajgrasu włoskiego . . .	12 »		100 kg.
	20 kg.		
II g. lucerny	18 kg.	II h. esparcety	110 kg.
trawy kupkowej	21 »	rajgrasu franc.	40 »
	39 kg.		150 kg.

III. *Wilgotne gliny.*

III a. koniczyny szwedz. . .	6 kg.	III b. koniczyny szwedz. . .	6 kg.
» czerw.	4 »	» czerw.	6 »
tymotki	2 »	trawy kupkowej	6 »
wyczyńca łąkowego . . .	2 »	tymotki	4 »
	14 kg.		22 kg.

IV. *Pastwisko krótkotrwałe na piaskach.*

IV a. przelotu	12 kg.	IV b. koniczyny białej . . .	2·4 kg.
koniczyny czerw.	4 »	» szwedz.	1·0 »
» białej	4 »	przelotu	3·0 »
tymotki	4 »	lucerny chmiel.	1·0 »
kostrzewy owczej	8 »	rajgrasu ang.	7·6 »
	32 kg.	» włosk.	1·5 »
			16·5 kg.

V. *Pastwisko na oiężkie gruntu podgórskie na użytek 3—6 lat:*

V. koniczyny czerw.	1 kg.	tymotki	4 »
» białej	1 »	wikliny łąkowej	3 »
» szwedz.	6 »	wyczyńca łąkowego	1 »
rajgrasu franc.	6 »	mietlicy rozłogowej	1 »
trawy kupkowej	8 »		
			31 kg.

VI. *Pastwiska stałe*
według Dr. Weinzierla:Na *glinki średnio wilgotne:*Na *grunta ciężkie i gliny:*

VI a. Koniczyny białej	1·4 kg.	VI b. Konicz. czerw. trw.	1·2 kg.
» szwedz.	0·8 »	» szwedzkiej	2·4 »
Komonicy posp.	0·8 »	Tymotki	1·0 »
Tymotki	2·1 »	Wikliny szorstkiej	1·0 »
Wikliny łąkowej	2·1 »	Grzebienicy	6·0 »
Grzebienicy	6·0 »	Mietlicy rozłogow.	1·4 »
Rajgrasu angielsk.	9·5 »	Rajgrasu angielsk.	6·3 »
Kostrzewy łąkow.	6·6 »	Kostrzewy łąkowej	6·6 »
Trawy kupkowej	4·3 »	Trawy kupkowej	4·3 »
Owsika złotego	0·9 »	Wyczyńca łąkow.	1·8 »
	34·6 kg.		32·0 kg.

Na grunta piaszczyste:

VI c. Koniczyn. szwedz.	3.3 kg.
Tymotki	4.2 >
Kostrzewy owczej	3.3 >
„ czerw.	2.0 >
„ trzcin.	3.0 >
Trawy kupkowej	4.3 >
Stokłosa wyprost.	7.1 >
„ bezostnej	8.2 >
Krwawnika (<i>Achil.</i> <i>mil.</i>)	1.6 >
	47.0 kg.

VII.*) **Podsiew łąk** uskutecznić należy po zbiorze siana; rozsiać i przywalować: Weinzierl doradza używać mieszanki składającej się z:

Trawy kupkowej	6.5 kg.
Tymotki	1.6 >
Grzebienicy	0.5 >
Wikliny łąkowej	0.4 >
Mietlicy rozlog.	0.3 >
Konicz. szwedz.	0.5 >
	9.8 kg.

VIII. Mieszanki na łąki (Ł) i pastwiska (P) według Dr. C. A. Webera w kilogramach i dekagramach na m².

	a.		b.		c.		d.		e.	f.	g.	h.	Średnia wartość użytkowa
	Ł.	P.	Ł.	P.	Ł.	P.	Ł.	P.					
Tomka wonna	0.20	—	0.20	—	0.20	—	0.20	—	—	—	—	—	31
Ostrzyca trzcinowa	—	—	—	—	0.65	—	—	—	—	—	—	—	63
Tymotka	2.25	2.25	2.25	2.25	2.05	2.25	2.25	2.60	2.90	2.25	2.25	2.25	89
Mietlica rozlog.	1.25	1.25	—	—	2.85	2.40	—	—	—	—	—	—	72
Raigras franc.	—	—	2.75	—	—	—	2.30	—	—	—	3.80	—	53
Owsiak złocisty	—	—	1.30	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	27
Wiklina szorst.	1.00	1.00	—	—	1.15	1.85	1.15	1.35	—	—	—	—	61
„ łąkowa	2.75	2.95	3.55	6.25	1.25	1.25	2.20	2.75	5.20	—	—	—	48
Kupkówka	—	—	4.35	—	—	—	5.60	—	—	1.30	2.60	2.10	62
Grzebienica	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	2.20	1.95	2.05	1.20	1.35	59
Kostrzewa czerwona	1.50	1.50	1.50	2.20	1.50	1.50	1.50	—	—	—	—	—	41
Kostrzewa łąkowa	6.25	5.00	—	—	6.25	4.90	—	—	—	5.95	—	5.95	74
Raigras włoski	1.85	—	2.00	—	2.00	—	2.00	—	—	2.00	2.00	2.00	71
„ angielski	—	2.85	1.80	5.65	—	2.85	1.80	5.65	5.65	2.85	2.85	2.85	78
Komonica zwykła	—	—	2.25	—	—	—	—	—	—	—	3.80	—	58
Komon. błotn.	2.35	2.85	—	—	2.35	2.35	2.20	3.20	—	—	—	1.70	60
Koniczyn. czerwona	0.90	0.90	0.90	0.90	0.70	0.80	0.80	—	—	1.15	1.15	1.15	87
Konicz. szwedzka	0.70	—	0.70	—	1.00	1.00	1.70	—	—	1.00	1.70	1.00	71
Koniczyn. biała	1.85	3.10	1.85	4.80	1.20	1.20	1.20	3.60	5.70	1.85	1.75	1.75	75
Lucerna chinilowa	—	—	—	—	—	—	—	—	2.10	3.50	0.75	1.70	70

VIII. a—e. Trwałe łąki i pastwiska.

a) Na piaski. i torfy wyżynne (z poziomem wody gruntowej odległym w lecie od naziomu na 30 cm.) glinki, gliny, iły i nie.

*) Ilości podane = $\frac{1}{3}$ czystego obsiewu. Przy roślinności rzadszej wysiewać więcej.

napiaszczone torfowiska nizinne (poziom wody w lecie na 40 do 50 cm. od powierzchni).

b) Na piaski, napiaszczone torfy nizinne, glinki i gliny (poziom wody gruntowej o 50⁰/₀ niższy jak w a).

c) Dla miejsc jak a), ale gorzej odwodnionych.

d) Na miejsca wyższe silniej odwodnione, niż a).

e) Na suche piaski i glinki.

VIII. f—h. Łąki przemienne na użytek 3—6 letni.

f) Na wilgotne glinki i piaski i napiaszczone torfy nizinne osuszone na 60—80 cm.

g) Na suche glinki i piaski i napiaszczone torfy — osuszone więcej, niż na 80 cm.

h) Na wilgotne glinki i piaski i nienapiaszczone torfy nizinne, odwodnione na 50 cm.

Do zasiewu mieszanek należy nasiona zawsze kupować oddzielnie z gwarancją co do czystości, pochodzenia i siły kiełkowania. Strzedz się gotowych mieszanek. Przed siewem wymięszać z 4—5 krotną ilością piasku słabo wilgotnego i grubsze nasiona osobno, drobniejsze osobno. Na lekkich ziemiach można grubsze nasiona przykryć lekką broną, drobniejsze przywalcować. Na zwiezłych glebach i jedne i drugie przywalcować silnie. Rola musi być dobrze wyrobiona. Roślina ochronna nie jest konieczną i p. być rzadko sianą. Po każdym pokosie silnie walcować młode rośliny.

To samo dotyczy pastwisk.

Według naszych doświadczeń najodpowiedniejszy termin do wysiewu mieszanek jest w naszych warunkach klimatycznych — czerwiec do początku lipca.

Nawożenie młodych roślin, szczególnie kompostem, oddaje znakomite usługi.

Wartość użytkowa nasion traw zależy od ⁰/₀ czystości i siły kiełkowania. Liczba wyrażająca wartość użytkową nasienia otrzymuje się przez pomnożenie liczby wyrażającej siłę kiełkowania przez liczbę wyrażającą czystość. I tak n. p. rajgras mający czystość 95 i siłę kiełkowania 60 (wartość użytkowa 57⁰/₀) będzie miał przybliżenie tę samą wartość jak rajgras o czystości 80⁰/₀ i sile kiełkowania 71⁰/₀ (wartość użytkowa 57⁰/₀), gdyż jak w jednym, tak i w drugim wypadku w 100 ziarnach będzie 57 nasion rajgrasu zdolnych do jednakowej wartości roślin. Naturalnie lepszem jest przy tem nasienie czystsze, choć gorzej kiełkujące.

Podane poniżej zestawienia mieszanek są obliczone według przeciętnej wartości użytkowej nasienia. Przy zasiewie musimy uwzględniać jakość nasienia, i w razie gorszego produktu należy ilość wysiewu odpowiednio zwiększyć. To samo dotyczy niesprzyjających warunków gleby i uprawy. W tych wypadkach należy niekiedy siać i dwa razy gęściej, niż podano.

Zestawienie mieszanek opierać się musi na znajomości gleby, oraz obserwacji roślin dziko rosnących w danej okolicy. Z tego względu podane poniżej zestawienia muszą być modyfikowane, szczególnie przy powtórzonym już wysiewie na podstawie osiągniętych wyników. W tym wypadku należy zasięgać porady krajowej stacji doświadczalnej botaniczno-rolniczej we Lwowie lub c. k. Zakładu doświadczalnego w Krakowie.

Chcących się bliżej zapoznać z tą kwestyą, odsyłamy do Weinzierla-Górskiego: »O zestawieniu i uprawie mieszanek trawnych«, — oraz »Uprawy łąk« Sikorskiego.

Łąki.

Przy odwodnianiu łąk zwracać uwagę, by ono było w miarę, nie za małe i nie za wielkie. Poziom wody gruntowej na łące w okresie wegetacyjnym powinien sięgać 0.5 m. od powierzchni. Szczególniej na łąkach torfowych ważnem jest, by łąka nie wysychała nadto w lecie. W tym celu zatrzymywać odpływ wody w rowach przy pomocy stawideł.

Podniesienie plonu łąk osiąga się przez uprawę. Ta polega na wyrównaniu powierzchni, niszczeniu krzewów i t. p., bronowaniu i walcowaniu. Bronowanie niszczy mech, ułatwia dostęp powietrza, powinno być silne i odpowiedniemi bronami. (Bacher Rudnice - Cerwinka Praga). Bronowanie łąk bardzo suchych może być czasem bardzo szkodliwe. Walcowanie ma na celu przycięcie-cierosłn wyciągniętych przez mroz; pobudza krzewienie się.

Nawożenie. Kompostowanie daje ogromne rezultaty na wszelkiego gatunku łąkach. Kompost rozwozi się w ziemi, rozrzuca. na wiosnę bronuje. Praktycznie układać kupy kompostowe na samych łąkach. Ilość kompostu rozmaita 20—100 fur. Uprawa łąk torfowych systemu St. Paula z Jacknitz polega na wywożeniu kompostu w zimie, na zmarzniętą łąkę. (około 20 m³ czyli 40 fur na mórg). Kępki kompostu rozrzuca się jak tylko wierzchnia warstewka łąki rozmarznie, i konie jeszcze z łatwością przejdą, bronuje się bardzo silnie. Następnie podsiewa koniczynę szwedzką samą, lub z domieszką czerwonej w ilości około 5 kg. i tymotki 3 kg. na mórg. Kompostowanie i siew powtarza co 3 lata.

Nawożenie niemal powszechnie dające dobre wyniki na łąkach jest potasowo-fosforowe: potas w postaci kainitu w ilości 300—600 kg. na mórg, i 150—300 kg. tomasyny. Tomasynę zastąpić można mąką kostną odklejoną 100—200 kg. a na torfach zasobnych w wapno — superfosfatem.

Dawanie obornika i nawozów azotowych na łąki nie oplaca się i większość łąk, posiadających odpowiednią florę roślin motylkowych może się najzupełniej obejść bez nich. Nawozy azotowe na łąkach zmniejszają ilość roślin motylkowych.

Zamiast używać bezpośrednio gnojówki na łąki, lepiej używać ją do zlewania kup kompostowych.

Polepszenie stanu roślinności. Wpływać można na roślinność przez: 1) przyspieszanie lub opóźnianie kosby, przez co uniemożliwiamy lub utrudniamy obsiew pewnych roślin; 2) przez plewienie; 3) przez podsiew mieszaną trawą, najlepiej po zbiorze siana (patrz powyżej str. 37); 4) przez zaoranie i obsiew. Zasiew całkowity łąki poprzedzać winna staranna uprawa kilkuletnia; wynawożenie obornikiem, zasiew roślin dodatnio wpływających na fizyk. własności gleby, więc okopowych. Na wytworzenie murawy trzeba dłuższego czasu. Jest ono do pewnego stopnia może ryzykiem, bo dobrze odpowiedniej mieszanek traw na trwałą łąkę jest szczególnie trudnem.

Do podsiewu łąk nie powinno się w żadnym razie używać t. zw. patrochów siennych i chwastów z pod młynka.

Nawadnianie łąk. Wartość nawadniania zależy od jakości i ilości wody. Łąki nawadniane dają największe plony. Nawadnianie ma miejsce głównie w jesieni. Woda mętna przepływająca przez dużą ilość wsi i miast, woda, w której dużo drobnoustrojów, roślin i zwierząt, będzie wodą do nawadniania najodpowiedniejszą. Do nawadniania używać można kół wodnych, wiatraków.

Nawadniać szczególnie wtedy, kiedy temperatura wody jest wyższą od temperatury powietrza. Przy systemie zalewowym, nawadnienie powinno być przegrodzone okresami czasu, w którym łąka może dobrze obeschnąć. Zamrażanie wody na powierzchni łąki nie jest dobrem, przed mrozami łąka powinna dobrze obeschnąć.

Rzadsze a dla naszych warunków przydatne sposoby przyrządzania paszy.

1. Suszenie koniczyny, siana i t. p. na rogalach, ostrzewkach, kozłach, piramidkach, przedstawia następujące korzyści: pasza łatwiej schnie, po deszczu prędko obsycha; nie potrzeba przewracać, rozrzucać, zbijać na kopiec. Zasada ułożenia siana na rusztowaniu, by leżało luźno; na móg potrzebą 20—50 rogali¹⁾.

2. Przygotowywanie siana metodą zaparzania. W kilka godzin po skoszeniu układa się rośliny ścięte w wielkie kupy o 3—5 m. średnicy i 3—4 m. wysokości i udeptuje; po 24—30 godzinach następuje bardzo silne zagrzanie. Kiedy temperatura podniesie się do 70° i trawa zbrumacieje, rozrzucają (zwykle po 48—60 godzinach od skoszenia); po kilku godzinach przesychną zupełnie.

3. Przygotowywanie siana brunatnego, Siano przeleżałe na pokosach (2—4 dni). Liście i kwiat p. b. zwidłe, ale się jeszcze mocno trzymać lodyg. Łodygi skręcone nie powinny wydawać ani kropelki wilgoci. Pokosy p. b. równomiernie przewiednięte, trzeba je więc przewracać i układać w małe kopki. Pod spód stogu daje się słonę, chrust i t. p. Podwiednięte pokosy układa się: 1) w małe stogi okrągłe, 3 m. średnicy u spodu; 4—5 m. wysokości, które układa jeden człowiek (25—30 q siana); 2) w duże stogi 5 m. średnicy: w środek stogu wbija się żerdź na 6—7 m. wysoką i przywiązuje sznurek w celu kontrolowania okrągłości stogu. Wierzch stogu ułożony spadzisto pokrywa się słomą.

Przy układaniu stogów zwracać uwagę na równomierne układanie i silne udeptywanie. Miejsca puste, mniej ubite pleśnieją i gniją. Po ułożeniu stogu temperatura podnosi się do 80—90°, siano przesychna. Zbyt wysokie podniesienie temperatury może spowodować zwęglenie a nawet samozapalenie. Proces schnięcia trwa 5—10 tygodni. Małe stogi są bezpieczniejsze.

Kiszonki. (Fermentacja octowa przy temp. 18—35° C. f.; kwasu masłowego najsilniej przy 35—40°, kwasu mlekowego najsilniejsza koło 50° f. Dla kiszonek najodpowiedniejszą jest fermentacja kwasu mlekowego). Przy kiszonkach ubijanie, udeptywanie, prasowanie ma na celu wytworzenie jednolitej masy, przejętej sokiem roślinnym. Twardsze rośliny ugniata się silniej, daje się na spód. Kiszonka, przy której temperatura była niska, zawiera dużo kwasu octowego i masłowego (kwaśna kiszonka). W kiszonce, przy której temperatura doszła wyżej, przeważa kwas mlekowy; k. taka jest aromatyczniejsza. Nazywają ją słodką kiszonką (ensilage). Doły do zakiszania wykopuje się w suchem położeniu o prostopadłych ścianach. Głębokość 1½—2½ m i odpowiednia do potrzeb długość. Udeptywanie paszy wykonuje się ludźmi lub zwierzętami. Pasza p. b. tak wysoko, by po opadnięciu była nieco wyżej, niż krawędź rowu. Z wierzchu pokrywa

¹⁾ Bliższe szczegóły: Zbiór i przechowywanie roślin pastewnych, S. Böhmer. Wyd. Tow. gospodarze we Lwowie.

się ją słomą i ziemią 0.6 m. Murowane doły (silo), betonowane lub asfaltowane (12 m. dług., 1.5—5 m. głęb., 2.5—5 m. szer.). Ze spodu otwór zamykany dla wydobywania paszy, na wierzchu dach. Pasza grubsza musi być rzunięta na sieczkę lub siekana w dole łopatami, siekaczami. Dół należy wypełnić jednego, a co najdalej w ciągu dwóch dni. Dół wypełnia się ponad powierzchnię i pokrywa kiszonkę deskami, obciąża 1 m.² powierzchni 5 q. (t. j. około 150 cegieł). Po 7—9 tygodniach pasza jest gotową do użytku. Przechowuje się doskonale przez zimę do wiosny. Jako kiszonki przechowywać można kukurydzę, sorgo, późno zebrane poplony, liście buraczane itp.

Liście buraczane przechowywać się dają bardzo dobrze w kopcach składanych podobnie jak buraki, kartofle.

Przeciętne i największe zbierane plony roślin gospodarskich z morga austriackiego. *)

Liczba	Rodzaj rośliny	Zbiory zwykłe z morga w q.		Zbiory największe, jakie zbierano w q.	
		ziarna, kłębów, korzeni	słomy, naci, liści	ziarna, kłębów, korzeni	słomy, naci, liści
I. Zboża.					
1.	Pszemca ozima	8—17	18—25	27.4	51.8
2.	„ jara	6—11	11—23	17.2	32.2
3.	Żyto ozime	5—11	18—31	28.0	55.3
4.	„ jare	4—8	8—18	12.6	28.8
5.	Jęczmień jary 2-rzędowy	8—15	9—13	20.7	28.8
6.	„ „ 6-rzędowy	6—11	7—14	16.1	23.0
7.	„ ozimy	12—17	11—21	25.3	34.5
8.	Owies	9—18	14—34	28.8	51.8
9.	Kukurydza	9—28	17—34	41.4	51.8
10.	Proso zwyczajne	5—10	9—21	16.1	32.2
11.	Mohar	2—4	20—32	6.9	48.3
12.	Sorgo	5—11	14—21	23.0	41.4
13.	Hreczka	5—9	14—18	16.1	29.9
II. Groszkowe.					
14.	Groch	5—12	14—23	20.7	40.3
15.	Bobik	8—16	14—28	23.0	41.5

*) Nie posiadając odpowiednich zestawień dla naszego kraju, podajemy poniższą tablicę obliczoną na podstawie najlepszych źródeł niemieckich, plony „największe zbierane” są wskazówką, możliwość wyprodukowania tak znacznej masy roślinnej, przy odpowiednich sprzyjających warunkach. Są one pewnym ideałem do którego dążyć powinniśmy.

Liczba	Rodzaj rośliny	Zbiory zwykłe z morga w q.		Zbiory najwięk- sze jakie zbie- rano w q.	
		ziarna, kłąbów, korzeni	słomy, naci, liści	ziarna, kłąbów, korzeni	słomy, naci, liści
16.	Soja	7—14	9—17	20.7	25.3
17.	Wyka	8—12	11—18	18.2	25.3
18.	Soczewica	5—10	4—9	16.1	16.1
19.	Fasola	7—14	7—11	20.7	17.3
20.	Wyka piaskowa (jara)	4—7	11—21	11.5	27.6
21.	z żytem św.-jańsk.	6—11	17—31	17.3	41.4
22.	Łubiu żółty	4—12	9—11	9.2	11.5
23.	niebieski	5—11	11—17	11.5	17.2
24.	biały	8—11	14—18	13.8	18.4
III. Oleiste.					
25.	Rzepak ozimy	7—16	14—28	23.0	30.1
26.	letni	5—11	9—17	15.0	25.3
27.	Rzepak ozimy	5—12	11—23	18.4	34.5
28.	letni	4—7	8—14	11.5	23.0
29.	Lnianka	4—7	9—14	11.5	23.0
30.	Gorzycza biała	5—9	11—18	13.8	26.5
31.	Mak	4—8	11—17	11.5	26.5
32.	Słonecznik	3—6	18—29	11.5	55.0
IV. Przemysłowe.					
33.	Len na ziarno	6—12	11—17	17.2	25.3
34.	Len na włókna	3—7	14—28	—	40.3
35.	Konopie na ziarno	3—8	14—23	11.5	32.2
36.	» » włókna	2—6	17—34	—	48.3
37.	Gorzycza czarna	4—9	11—17	13.8	25.3
38.	Kmińnek	6—11	11—21	17.2	31.1
39.	Koper	4—7	11—21	10.3	28.8
40.	Anyż	4—7	9—18	10.3	26.5
41.	Koriander	5—10	15—23	13.8	31.0
42.	Chmiel	szyszek 2—9			12.6
43.	Tytoń	suchych liści 5—14			18.4
V. Okopowe.					
44.	Ziemniaki	58—138	14—34	184	46
45.	Buraki pastewne	140—280	34—69	391	98
46.	» cukrowe	140—230	34—59	330	75
47.	Brukiew	115—290	23—58	368	74
48.	Marchew	140—280	23—46	460	77
49.	Rzepa	115—290	23—46	460	92
50.	» zasiew ściernisk.	60—170	7—17	184	23
51.	Pasternak	90—210	18—41	288	58
52.	Cykorya	90—160	23—40	207	52
53.	Bulwy	46—115	23—58	161	81
54.	Kapusta	główek 140—280			460

Liczba	Rodzaj nasienia	Zbiory zwykłe z morga w q. na nasienie		Zbiory zwykłe z morga w q. na paszę		Zbiory najwięk- sze jakie zbierano w q.	
		ziarna	słomy	paszy zielon.	siana	paszy ziel.	siana
VI. Pastewne.							
55.	Koniczyna czerw.	1—3	9—11	70—140	17—35	230	58
56.	„ szwedz.	1—2	7—10	70—140	14—27	172	35
57.	„ biała	1.5—3	11—16	40—80	9—17	103	23
58.	„ inkarn.	2—4	11—17	70—100	14—21	144	29
59.	Lucerna	2—4.5	11—17	100—280	28—70	345	92
60.	„ chmiel.	2—3	11—18	45—100	11—28	150	37
61.	„ piaskowa	1—2	6—10	80—160	21—41	253	52
62.	Esparceta	3—5	9—18	70—140	17—34	184	46
63.	Przełot	2—4.5	14—20	45—110	11—35	184	46
64.	Seradella	2—9	5—20	70—170	14—35	288	60
65.	Nostrzyk	4—9	20—40	90—180	23—46	230	58
66.	Komonica	—	—	35—70	8—16	92	23
67.	Kukurydza	—	—	140—345	30—70	518	103
68.	Sorgo	—	—	160—320	45—100	460	150
69.	Mohar	—	—	115—172	28—40	230	60
70.	Żyto	—	—	46—60	11—17	103	26
71.	Owies	—	—	60—80	15—20	115	30
72.	Groch pastewny	—	—	70—140	17—30	184	46
73.	Bobik	—	—	90—140	20—35	184	46
74.	Wyka pastewna	—	—	90—140	18—28	172	34
75.	„ piaskowa	—	—	90—140	18—37	288	58
76.	Łubin żółty	—	—	69—138	14—29	242	48
77.	„ niebieski	—	—	86—172	17—34	265	53
78.	„ biały	—	—	86—172	17—34	288	58
79.	Rzepak pastewny	—	—	92—115	18—23	150	30
80.	Rzypik	—	—	92—115	18—23	150	30
81.	Gorzycza biała	—	—	69—138	17—29	172	44
82.	Hreczka zwyczajna	—	—	58—138	15—34	172	44
VII. Trawy.							
83.	Tymotka	1.7—3.4	5.8—11.5	46—138	20—60	184	80
84.	Wiklina łąkowa	—	—	58—114	18—37	161	52
85.	„ szorstka	—	—	58—114	18—37	161	52
86.	Grzebieńca posp.	0.9—1.3	—	46—92	15—30	115	37
87.	Mietlica łąkowa	—	—	58—115	29—58	150	75
88.	Rajgras angielski	1.6—2.3	13.8—18.4	69—138	23—46	173	58
89.	„ włoski	1.8—2.5	23—34.5	115—161	44—61	182	69
90.	„ francuski	1.7—2.3	23—34.5	69—172	22—56	207	99
91.	Kupkówka	1.2—1.7	—	172—242	70—96	300	120
92.	Kostrzewa łąkowa	1.2—1.6	4.1—7.2	69—184	30—80	230	101
93.	„ owcza	—	—	34.5—58	15—25	80	36
94.	„ czerw.	—	—	46—92	20—39	115	48
95.	„ trzcinowat.	1.7—2.3	—	172—253	60—92	322	115
96.	Wyczyniec łąkowy	1.1—2.3	—	69—115	29—58	196	63
97.	Owies złocisty	1.1—2.3	—	69—104	23—40	138	46

Co się dzieje z roślinami, które uszkodził grad?

I. **Zboża.** a) **Pazentca:** Jeżeli grad spadnie wcześniej, kiedy rośliny mają około 30 cm wysokości, to kłosa znajdują się jeszcze blisko ziemi. Jeżeli zostają złamane źdźbła nad kłosami, kłoszenie nie może posuwać się naprzód. W tym wypadku zaleca się ścinać źdźbła poniżej miejsc, w których uległy one złamaniu, aby w ten sposób umożliwić kłosom wydobycie się na wierzch. Jeżeli zaś kłosa są tak wysoko, że miejsca złamane znajdują się poniżej nich lub też w nich samych, zboże należy zupełnie skosić, ażeby wywołać tworzenie się nowych pędów. Gdy spadnie grad bezpośrednio po wydobyciu się kłosów z nasady liści źdźbła zostaną złamane nad kłosami, należy zostawić zboże w spokoju. Kłosa rozsadzają nasadę liścia z boku i wydobędą się powoli na wierzch. Ziarno w tym wypadku będzie zapewne lekkie. O ile źdźbła zostaną złamane poniżej kłosów, to zboże należy skosić.

b) **Jęczmień:** Ze wszystkich zbóż jęczmień najłatwiej odrasta; dopóki nie przekwitnie tworzy nowe pędy. O ile więc grad spadnie przed tym czasem, najlepiej jęczmień skosić, żeby mógł dobrze rozwinąć boczne pędy. Jeżeli źdźbła zostaną złamane przez grad po przekwitnięciu jęczmienia, pomimo to ziarna utworzą się, tylko będą złejsze. Przeoranie pola jęczmiennego zalecane jest tylko wówczas, gdy kłosa i źdźbła zostaną całkiem przybite do ziemi, lub też, gdy kłosa są pooblamywane.

c) **Żyto:** Jeżeli grad uszkodzi żyto przed wykłoszeniem, to należy je skosić, ponieważ kłosa zostają w tym wypadku uszkodzone. Odrastające pędy rozwijają się jak żyto jare. Jeżeli grad spadnie podczas kwitnienia żyta, to należy je skosić i obsiać inną rośliną; gdy zaś grad spadnie po okwitnięciu, można zostawić żyto w spokoju, o ile tylko kłosa i źdźbła nie są przybite do ziemi, ponieważ i w złamanych źdźbłach wykształcają się ziarna.

d) **Owies:** Dopóki wiechy owsa nie są widoczne, w razie gradu należy owies skosić, gdyż wytworzy on jeszcze liczne pędy. Jeżeli wiechy już wydoły się na wierzch to, o ile owies nie przekwitł, powinno się go przeorać szczególnie gdy nie był podsiany koniczyną. Po przekwitnięciu i na złamanych źdźbłach tworzą się lekkie ziarna.

II. **Rośliny siane w zboże:** Jeżeli w zboże była wsiana koniczyna, to zalecić można w razie gradu skoszenie, bo koniczyna może dać duży pokos. Jeżeli grad spadnie tak wcześniej, że młode pędy koniczyny zostaną wbite w ziemię, to w razie sprzyjających okoliczności można podsiać. Jeżeli grad spadnie po przekwitnięciu rośliny ochronnej, rolnik powinien się zdecydować, na czym mu więcej zależy, czy na plonie ziarna, czy na paszy; zaleźnie od tego, zostawi on wszystko w spokoju lub też skosi. To ostatnie można zalecić w razie złego sprzętu siana.

III. **Motylkowe** nie odrastają, o ile zostają skoszone. Jednak uszkodzone przez grad rośliny dają (z wyjątkiem bobu) nowe pędy z kwiatami i owocami. O ile więc rośliny nie są w zupełności zniszczone przez grad, można zalecić zostawienie ich w spokoju.

IV. **Buraki:** O ile grad spadnie na pole buraczane bardzo wcześniej, to należy uprawić pole na nowo. Na starsze buraki grad ma ten wpływ, że wytwarzają one kosztem korzeni nowe liście;

korzenie będą więc mniejsze i trzeba będzie zadowolić się mniejszym plonem.

V. Ziemiaki: Szkoda wyrządzona przez grad polega głównie na tem, że nać wytwarza kosztem kłębów nowe pędy; wskutek tego kłęby zostają na czas jakiś powstrzymane w rozwoju; obcięta naci zalecać nie można.

VI. Rośliny pastewne i łąki wskazanem jest zaraz skosić, gdyż po grudzie rozwój roślin jest słabszy i zwiększa się w nich wartość drzewnika.

(Tygodnik rolniczy).

Niszczenie chwastów.

Przez prof. Dr. K. Micyński.

A) Chwasty jednoroczne rozmnajające się z nasion. Dają się we znaki najwięcej w zasiewach jarych, lnie, strączkowych na nasienie.

Gorzyca polna czyli pszonak (*Sinapis arvensis*) i ognicha, (*Raphanus Raphanistrum*), łoboda, lebioda (*Atriplex*), rdesty (*Polygonum*) Czyścić należy ziarno do siewu na młynkach z sitami i na tryerze. Dawać stanowisko dla zbóż jarych po ziemiakach lub wogóle okopowiznach starannie z chwastów oczyszczonych. Ziemiaki bronować wcześniej dwukrotnie. Unikać wiosennej orki pod jare obsiewy, gdyż przez nią wydobywa się mnóstwo nasion chwastów ku wierzchowi, które potem zagłaszają zboże. Nadzwyczajnie ważnem jest wczesne a bardzo płytkie podorywanie ścierniska (wieloskibowcami) i utrzymywanie pokładu w stanie czystym aż do następnej jesiennej orki. Zamiast podorywki wieloskibowcami, można na lżejszych ziemiach użyć z wielką korzyścią do zdarcia ścierni bron talerzowych, o ile nie ma perzu, w razie zaś przeciwnym kultywatorów i bron sprężynowych. Wschodzące chwasty nasienne niszczy się potem kilkakrotnem bronowaniem. Na wiosnę rolę zoraną w jesieni wyrównać włoką — a skoro chwasty zejdu, zniszczyć je broną jeszcze przed siewami.

W owsie, jęczmieniu, pszenicy jarej, można bardzo dobrze wyniszczyć pszonak energicznem bronowaniem już po wzejściu i zakorzenieniu się zboża w poprzek rzędów, jeśli zboża rzędowo zasiane. Chwasty wówczas mają małe jeszcze korzonki i wysychają wyciągnięte na wierzch. Ze względu na pewne przerzedzenie zboża przez tę czynność, siać należy z umysłu nieco gęściej, zwłaszcza na słabszych polach. Koniczynę można w takim razie wsiewać dopiero później po zbronowaniu, wybierając porę wilgotną. Gdy niema koniczyny można także używać rozczynów soli niszczących chwasty mianowicie: 15%—20% rozczyn siarczanu żelazowego, w ilości około 300 litrów na morg lub 5% rozczyn siarczanu miedzi w ilości 250 litrów. Także rozczyn saletry chilijskiej 10—15% lub kałnitu, niszczy gorczycę nie szkodząc zbożu — a można też tego sposobu używać i w celu nawożenia wierzchniego. — Rozpylanie tych rozczynów odbywa się zapomocą ręcznych tornistrowych lub konnych sikawek rozpylających. Skrapianie takie skutkuje jednakże tylko, dopóki pszonak nie wykształci więcej jak 4 listki i w porze suchej i niszczy jedynie chwasty z rodziny krzyżowych (*cruciferae*) inne liściaste rośliny jak rdest, łobodę, oset, uszkadza trochę ale nie niszczy.

Owsik (*Avena fatua i sterilis*). Szkodliwy w owsie i jęczmieniu. Ziarno do siewu starannie oczyścić na wialni, owsik lekki

wylatuje do pośladu. Unikanie orki wiosennej. W ostateczności plewienie owsika, który wpada w oczy wcześniej rozwiniętymi wysokimi źdźbłami i wiechami.

B) Chwasty dwuletnie rozmnażające się z nasienia: Kąkol, bławat, mak polny, rumianek psi, mietlica, stokłosa, pszeniec, szelężnik. Występują szkodliwie w oziminach. Nasienie do siewu czyścić starannie na sitach i tryerach. Podorywać ścierniska bardzo płytko i zaraz po zbiorze kłosowych, a następnie czyszczenie pola jak wyżej. Stanowisko po mieszankach bardzo gęstych a wczesnych, lub też na dobrze uprawnym czarnym ugorze, w którym przez bronowanie lub extyrpatores, mnóstwo z nasiennych chwastów wyczyścić można. Silne bronowanie pszenicy i koniczyny na wiosnę. — Racyjalnie uprawiony ugor czarny, wprowadzenie w rotację uprawy okopowych i orki głębokiej. Siew w szerokie rzędy 18—20 cm. i motyczenie zasiewów, ozimych, raz lub dwa razy. Ten ostatni środek niezmiernie korzystnie na czystość pól oddziaływa.

Po drogach i miedzach chwasty kosić możliwie często przed okwitnięciem.

Unikać nawożenia oziminy pod korzeń obornikiem świeżym nierozłożonym.

C) Chwasty wleolatełnie rozmnażające się z kłączów i korzeni.

Perz. Orka głęboka 30—35 cm. wykonana starannie plugami piętrowymi (z podrzynaczami), przy płaskiej uprawie usuwa perz radykalnie. Jeśli jednak nie dość równo i starannie wykonana, jeśli znajdują się miejsca zorane płycej (przy grzbietach, składach, zagonach) to więcej szkodzi jak pomaga. — Podorywać pola zaperzone płytko, dobrze łamiąciami wieloskibowcami, na roli lekkiej, sypkiej, zostawić pokład w najeżonej skibie aż przeschnie, potem broną wytrząpać perz i zgrabać. Na rolach, które się łatwo twardo zsuchają, bronować zaraz. Przy silnym zaperzeniu trzeba orkę płytką po jakimś czasie powtórzyć, a zamiast bron zwykłych używać płytkich extyrpatorów o okrągłych z przodu łapach, lub brony sprężynowej; najłatwiej wyczyścić pole w ugorze. Perz ginie dość dobrze w zasiewach roślin szybko rosnących, gęsto zasianych, jak tatarka, gorczyca, gęste mieszanki pastewne, po których zbiorze szybko powinna nastąpić orka głęboka lub przynajmniej podorywka i broną, zanim resztki perzu się wznowią.

Oset. Orka głęboka i wyciąganie odciętych kłączów i korzeni za plugiem i po orce, skoro się zazielenią. Wycinanie nisko przy ziemi kilkakrotnie w ciągu lata, zapomocą łopatkı ostrej lub noża osadzonego na lasce. Motyczenie zbóż sianych w szersze rzędy. Koszenie ostów po miedzach, drogach i nieużytkach zanim okwitną i rozleją się z wiatrem.

Skrzyp. Na rolach nieprzepuszczalnych, ubogich w wapno, radykalnym środkiem jest osuszenie roli przez drenowanie i utrzymanie przewiewności i pulchności przez głęboką uprawę i spulchnienie powierzchni. Oprócz tego pilne plewienie i wycinanie skrzypu przez całe lato. Silne wapniowanie.

Silniejsze gleby (lepiej nawożone) mniej cierpią od skrzypu.

Szozaw. Na rolach nieprzepuszczalnych, zakwaszonych i zwęższych. Oprócz starannej głębokiej uprawy osuszenie i wapniowanie.

Podbiał niszczyć najlepiej drenowaniem i osuszeniem roli. Płaskie liście podbiału niszczeją również w zupełności po skro-

pieniu rozczykami soli używanych do tępienia gorczycy (patrz wyżej), lecz odrastają potem z kłęczów i głęboka uprawa.

Chwasty na łąkach tępi się unormowaniem wilgotności łąki t. j. dobrym odpływem i przepływem wody, w położeniach niższych bronowaniem w jesieni i na wiosnę bronami łańcuchowymi (mech). Wycinaniem trwałych roślin szkodliwych jak osty, szalej (cykuta) zimowit i t. p., wreszcie tłumi się je przez racjonalne nawożenie fosforowo-potasowe, skutkiem czego roślinność pożyteczna bierze górę. Niektóre wczesnie wysiewające się chwasty łąkowe jak szelęznik (*Rhinanthus minor*), Fioletka (*Lychnis flos Cuculi*), Jaskier, można powoli usunąć przez bardzo wczesne koszenie łąk w ciągu paru lat po sobie (w końcu maja).

Kanianka na koniczynie, lucernie, lnje. Nasienie koniczyny wysiewać czyste i dorodne, żądając przy zakupie gwarancji za czystość i kontrolować przy pomocy stacji botaniczno-rolniczej we Lwowie.

Na polach, łąkach i w zaroślach niszczyć przekopywaniem gniazd kamianki i dbać, aby ustawa o kaniance była ściśle wykonywaną tak na obszarach dworskich jak i w gminach sąsiednich.

Koniczynę na nasienie zbierać li tylko z łąnów całkowicie wolnych od kamianki. Do czyszczenia nasion koniczyny czerwonej z dobrym skutkiem, używa się maszyny „Cusouta” z fabr. br. Röber w Wutha. Maszyna ta jednak nie oczyści koniczyny szwedzkiej ani białej.

Zapobieganie chorobom roślinnym. Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami.

Przez prof. Dr. K. Miczyńskiego.

1. **Wybór odpornych odmian.** Rozmaite odmiany jednej i tej samej rośliny są rozmaicie odporne przeciw zakażeniu pasorzytami. W tym kierunku należy przeprowadzać próby i obserwacje, i niezawodnie jest to droga mająca przed sobą jak najlepsze widoki. Mogą być odmiany odporne tylko w pewnych warunkach kultury lub tylko przy pewnym stanie pogody. Mogą być znów odmiany ogólnie odporniejsze we wszelkich warunkach.

2. **Odpowiednia uprawa i nawożenie,** stanowisko w płodozmianie. Na te względy rolnicy mało zwracają uwagi, a jednak jest to droga bardzo skuteczna do zapobiegania chorobom roślinnym, a więc i podniesienia czystego dochodu w gospodarstwie.

Ogólna odporność rośliny przeciw chorobom wzrasta znakomicie w miarę szybszego rozwoju i wzrostu roślin. W szczególności przeciw grzybom pasorzytnym oddziaływa dobrze pulchność roli, głęboka uprawa, wapnowanie — niekiedy także nawożenie kwasem fosforowym. Dobry wpływ mają: siew rzędowy nie za głęboki, — siew w rzadsze rzędy i motyczenie zasiewów zbóż.

Śnieć pszenicy. Zapobieżenie śnieci jest możliwe następującymi środkami: 1. Bejcowanie siarkanem miedziowym. Na 103 ltr. wody $\frac{1}{2}$ kgr. siark. miedziow. (sinego kamienia). Do kadzi z tym roztworem wspanuje się zboże, miesza i daje go tyle, by było przykryte na 8—10 cm. wodą. Po 12—16 godzinach odlewamy płyn i zalewamy ziarno mlekiem wapiennym (6 kgr. wapna. świeżego, 110 ltr. wody), przez 5 minut mieszamy i następnie

rozsypujemy ziarno na klepisku, by wyschło. Wywóz nasienia w pole nskuteczniejsza się w workach, które przez 16 godzin mokły w 1/2% roztworze siarczanu miedziowego, a następnie wyschły. Przy wysiewie pszenicy tak hajcowanej, siewnik ustawić należy na większy wymiar ziarna, gdyż ono napęczniało i zwiększyło swą objętość o 1/3 część.

2. Mniej mozolnym od pierwszego sposobem jest zalewanie pszenicy bordoliną, (mieszaniną bordoską (*Bouillie bordelaise*) 2 kg. siarczanu miedzi rozpuszcza się w 100 litrach wody, osobno gasi się 2 kg. wapna gaszonego, a rozrobiwszy je z trochę wody na gęste mleko wapienne, wlewa się do pierwszego roztworu, ciągle mieszając). Tym płynem zalewa się pszenicę i miesza doskonale po poprzednim opłukaniu ziarna pod prądem czystej wody, pozostawiając tak przez 15 minut, a następnie zlewa płyn, który może być 2 i 3 razy użyty. Na jednorazowe zalanie 100 kg. ziarna potrzeba około 47 litrów płynu.

3. Zanurzenie ziarna na 5 minut w wodzie cieplej 53—56° C. Łatwe do wykonania gdzie jest kocioł, z którego gorącą wodę miesza się z zimną w kadzi, a ziarno zanurza w stosownym koszu.

4. Hajcowanie formaliną jest nieco droższe ale wygodniejsze od sposobów poprzednich. 1 kg. kupnej formaliny (we Lwowie 2 K. 50 h.) rozpuszcza się w 250 l. wody i tym płynem skrapia się przy pomocy konewki ogrodowej z sitem ziarno rozosiłane na równym klepisku. Przerabia się dobrze szufłą i skrapia raz jeszcze obficie. Na noc okrywa się workami lub płachtą zamoczoną w tym samym roztworze. Radykalniej działa zanurzenie ziarna w tym płynie na 10—15 minut i rozosiłanie, aby obeschło, należy jednak postępować bardzo dokładnie, gdyż dłuższe pozostawianie ziarna w formalinie niszczy siłę kiełkowania.

5. 1% roztwór kreoliny, w którym 20 minut zanurza się ziarno, niszczy śnieć również.

Głównie na owsie, jęczmieniu i pszenicy usuwa się częściowo przez zanurzenie ziarna na pięć minut w wodzie cieplej 54—57° C. lub z pomocą roztworu formaliny tak, jak śnieć, dla owsa trzeba brać jednak roztwór słabszy i 1 kg. formaliny na 850 l. wody.

Zaraza ziemniaczana. Wybór odpornych odmian. Celują pod tym względem nowe odmiany Dolkowskiego. Osuszenie gleby, drenowanie. Skrapianie naci ziemniaczanej wyżej opisaną bordoliną w ilości 300 litrów na morg, raz lub dwa razy w roku. Oplącić się to może zwłaszcza przy produkcji wczesnych odmian stołowych. Skrapianie takie wpływa korzystnie na plony.

Rosa mączna na krzewach, chmielu, winorośli daje się zniszczyć przez rozpylenie na nich drobno sproszkowanej siarki.

Rdza na liściach krzewów tudzież czerni na liściach i owocach ziarnkowych gruszkach i jabłkach daje się niszczyć przez dwukrotne skrapianie z wiosną drzew i krzewów owocowych płynem bordoskim za pomocą właściwych sikawek rozpylających.

Rdza na zbożach nie da się zniszczyć środkami zewnętrznymi — zapobiega się jej przez osuszenie i pogłębienie gleby, przez wapnowanie, rzadszy siew w szerokie rzędy, wreszcie wybór odmian więcej odpornych.

Mysz. Za pomocą 1. tyfusu mysiego, którego dostarcza Akademia weterynaryjna we Lwowie, 2. owsa strychninowanego (Aichmüller, Stryj; Wasmuth, Hamburg; J. Torök, Budapeszt (Kiralyi ut.), 3. pszenicy zatrutej arsenikiem (rozpuścić na litr wody 20 gr. arseniku i gotować w tym roztworze psze-

nicę przez godzinę. Dla odróżnienia od niezatrutej zabarwić błękitem metylowym), 4. za pomocą pigulek fosforowych fabryka „Tlen“ we Lwowie, (apteka w Bursztynie). Ziarno wysypuje się do dziur mysich na polu odpowiednimi przyrządami. Środki pod 2, 3 i 4 dają pewniejsze wyniki od 1. Stosować je należy starymnie, nie opuszczać dziur i powtarzać po pewnym czasie, kiedy znowu się myszy pokażą. Do zakładania trucizny w nocy służą specjalne przyrządy blaszane (karabinki), których dostarcza m. i. Oddział Handl. Tow. Gosp. we Lwowie.

Niedźwiadki, turkucie czyli podjadki. 1) Zakładanie doniczek wypełnionych wodą wkopanych w ziemię, w które podjadki wpadają. Od doniczki do doniczki dobrze jest poukładać kije grube wcisnięte do ziemi, przez które podjadki nie mogą przeleźć i szukając dogodniejszego przejścia wpadają do lapek. 2) Wyszukiwanie i wykopywanie gniazd. 3) Zakopywanie świeżego końskiego nawozu jako przynęty i niszczenie zbierających się podjadków.

Krety. W celu odstraszenia kretów ma być dobrym karbid wapniowy, który w małych kawałkach zakopuje się do chodników krecich. Ten sam skutek mają dawać: zakopywanie smołowca, główek śledziowych, oraz silnie pachnących roślin jak kozłka czyli waleriany, czosnku itp.

Druciki. Walcowanie roli. Płytkie umieszczanie nasienia. Chwyatanie na kawałki ziemniaków. Posypywanie obficie kainitem.

Mszyce, drobniejsze lszki niszczyć można na bobiku, grochu, wierzbie koszykarskiej a) emulsją naftową z mydłem: 100 l. wody letniej 1—2 l. nafty, 1—2 k. mydła miękkiego. Zlewa się razem, silnie klóci zapomocą miotły i spryskuje rośliny obficie.

b) Mszyce na młodych pędach drzewek owocowych, chelki na rozsadzie warzyw i kapusty, niszczy się przez skrapianie 1) odwarem z kwasy (Farm. Radix. Quassiae Amarae) z dodatkiem mydła (1 kg. kwasy i 100 l. wody i 1 kg. mydła). 2) Roztworem wyciągu tytoniowego („Tabak ekstrakt“ sprzedawany w Austrii w trafikach po 1 kor. 60 h. za 1 kg. i 6 kor. za 5 kg.). Na 100 l. wody 1 kg. ekstraktu rozpuścić i tym spryskiwać.

Niezmiarka paskowana. Wczesny siew zbóż, jarzyn, zniszczenie zarazonej słomy. Niezmiarka zbożowa i mucha heska oraz dziedzielnik, przeorywanie szybko ściernisk głęboko odrazu, aby wyniszczyć poczwaraki śledzące w ścierni. Późny zasiew ozimim.

Chrabąszoz majowy. Zbieranie gromadne w czasie rójki wypadającej w okresach 4-letnich. Zbieranie i niszczenie pędraków w roli i ogrodach w roku poprzedzającym rójkę, wtedy bowiem pędraki siedzą tuż pod powierzchnią.

Zapobieganie szkodom zrzadzonym przez owady polegać musi głównie na niedopuszczeniu do rozmnażania się, a w drugiej linii dopiero na zniszczeniu szkodników przez zbieranie, polewanie, wypuszczanie ptactwa domowego. Zwracać należy uwagę na ochronę ptaków owadożerczych, zakładanie sztucznych gniazd dla ptaków. itp. Dla walki z owadami trzeba się dobrze zapoznać z warunkami rozwoju i rozmnażania szkodników. Wskazówki obszerniejsze znajdzie czytelnik w „Chorobach roślin“ Franka i Sorauera, wydanie c. k. Tow. Gospodar. Lwów 1896 oraz w Encyklopedyi rolniczej, Warszawa i w książce M. Kowalewskiego: O zwierzętach szkodliwych i użytecznych. Lwów, wydanie „Macierzy polskiej“ (z ilustracyami).

UWAGI I LICZBY DOTYCZĄCE HODOWLI

zestawione według

prof. St. Chaniewskiego i Z. Moczarskiego.

Sposób użycia tablic żywienia Dr. O Kellnera z Möckern

O. Kellner uznaje drogę doświadczenia na zwierzęciu za jedyne miarodajną i oznacza wartość pokarmową danej paszy, nie na mocy jej składu chemicznego, lecz na podstawie istotnej, doświadczalnie wykazanej, praktycznej jej wydajności.

Na wyprowadzenie teoretycznej wartości drogą obliczeń pozwala Kellner tylko w razie porównania dwóch karm o zupełnie zbliżonych własnościach, nieco tylko różniących się w swym składzie chemicznym, na przykład na porównanie mniej tłustego makuchu lnianego z takimże makuchem lnianym o większej zawartości tłuszczu, ale już nie wolno porównywać w ten sposób makuchu lnianego ze słonecznikowym, a tem bardziej jest niedopuszczalnem porównanie na podstawie składu chemicznego makuchu i siana. Jeżeli sobie uprzytomnimy, że większość danych Wolffa właśnie w ten sposób wyprowadzoną została i przypomnimy sobie, jak często dane Wolffa w praktyce zawodziły, krytyczne i prawdziwie naukowe, bo na bezpośredniem doświadczeniu oparte stanowisko Kellnera, tem większego nabiera znaczenia.

Wykluczenie teoretycznych wyliczeń pociągnęło za sobą konieczność przeprowadzenia ogromnej ilości bezpośrednich doświadczeń, które też wykonane zostały przez Kellnera i jego uczniów, a także przez licznych innych badaczy.

Przed przystąpieniem do właściwego rozwinięcia przedmiotu, idąc śladem Kellnera, przypomnimy sobie niezbędne do jasnego zrozumienia rzeczy, podstawowe wiadomości o składzie chemicznym pokarmów i o ich asymilacji i zużyciu w ustroju zwierzęcym.

Ustrój zwierzęcy w ogólnych zarysach składa się z komórek i ze złożeń śród i międzykomórkowych, złączonych ze sobą w t. zw. tkanki (nerwowe, gruczołowe, mięśniowe, łączne i t. d.) oraz z soków, krążących wśród tkanek. Komórki zwierzęce są złożone z białkowych zarodki, dalej posiadają one »jądra« również białkowe, lecz odmiennej nieco natury o białku t. zw. jądrowem. Złogi śródkomórkowe przeważnie składają się z tłuszczów, czasem z węglowodanów (glikogenu), złogi międzykomórkowe najczęściej zawierają materię mineralną: fosforan i węglan wapniowy w większej ilości. Soki ustroju złożone są z wody, soli mineralnych, ciał białkowych i innych, które bądź stanowią stały składnik soków, bądź też przejściowo tam się znajdują, czy to w drodze do komórek, czy też z komórek przez soki poza ustrój wynoszone. Wszystkie powyższe składniki znajdują się w ciągłej

przemianie, nie²wyłączając złożeń mineralnych. Przemiany te polegają przeważnie na powolnem utlenianiu, tlenem pobieranym przez płuca, a roznoszonym po ustroju przez krew. Utlenianie, będąc jakby powolnem spalaniem, dostarcza ustrojowi potrzebnej energii do wszelkich jego czynności życiowych. W miarę utleniania składniki ustroju ulegają zniszczeniu i na ich miejsce jest przyjmowany w postaci pokarmów nowy materiał mniej lub więcej od składników ustroju odmienny. Materiał ten, zanim wejdzie w skład ustroju, przejść musi szereg procesów upodobnienia czyli asymilacji.

Pasze pochodzenia roślinnego składają się z wody, soli mineralnych i z materji organicznej, powstałej w roślinach pod wpływem energii słonecznej z pokarmów, czerpanych z powietrza i z ziemi.

Roślinna materia organiczna zasadniczo nie różni się od materji organicznej zwierzęcej. Znajdujemy w niej ciała białkowe, tłuszcze i węglowodany (skrobia i cukry), oraz blisko z niemi spokrewnione kwasy organiczne bezazotowe, podobne do takichże ciał w ustroju zwierzęcym, aczkolwiek indentycznie nie te same. Dalej rośliny zawierają nieraz dużą odsetkę ciał azotowych niebiałkowych (przeważnie t. zw. amidy), również podobne ciała znajdujemy w wydzielinach ustroju zwierzęcego. Wreszcie spotykamy w roślinach włókniak roślinny — twór w ustroju zwierzęcym nieznanym. Składem swoim włókniak roślinny zbliżony jest do węglowodanów.

Z powyższych składników pokarmowych tłuszcze, włókniak roślinny i, ujęte wspólną nazwą ciał wyciągowych bezazotowych, węglowodany, kwasy organiczne bezazotowe i pokrewne są ciałami nie zawierającymi azotu, siarki ani fosforu a zbudowanymi li tylko z rozmaitego ustosunkowania i powiązania trzech pierwiastków chemicznych: węgla, wodoru i tlenu. Powyższe składniki pasz w licznych przypadkach mogą się wzajemnie zastępować w ustroju, nie mogą jednak w zupełności wystarczyć tam, gdzie chodzi o powiększenie ilości białka, gdyż w skład cząsteczki białka, oprócz węgla, wodoru i tlenu, nieodzownie wchodzi azot, siarka, a w pewnej mierze i fosfor. Tłuszcze, włókniak roślinny i ciała wyciągowe bezazotowe nie mogą zatem zastąpić białka, które w ustrojach wyższych, do jakich należą nasze zwierzęta domowe, może powstać naogół tylko z białka.

Naodwrot białko może służyć zarówno do wytworzenia tłuszczów jak i ciał wyciągowych bezazotowych (glikogen, kwas mlekowy).

Zawarte w paszach związki organiczne azotowe, jednak niebiałkowe, mogą służyć za materiał do wytworzenia zarodki u niższych istot roślinnych np. u drobnoustrojów. Może to być pośrednio z korzyścią dla odżywienia zwierząt gospodarskich: mianowicie drobnoustroje, obficie znajdujące się w żwaczku u zwierząt przeżuwających, przerabiają ciała azotowe niebiałkowe paszy na białko zarodki własnych organizmów. Dostając się następnie wraz z karmą do trawieńca, białko to zostaje przez ustrój strawione i przyswojone, a zatem pośrednio zwierzęta przeżuwające mogą korzystać z materji azotowej niebiałkowej. Dalej materia ta, służąc drobnoustrojom za pokarm, przyczynia się do mniejszego użycia przez te ostatnie cennego białka, a więc działa oszczędzająco na jego ilość, spotrzebowaną w paszy. Dzieje się to jednak w bardzo niewielkim stopniu i może mieć znaczenia

tylko w razie niezmiernie małej ilości białka w paszy. Naogół związki azotowe niebiałkowe nie posiadają bezpośredniego znaczenia przy osadzaniu materji w ustroju lub wytwarzaniu siły — przechodzą one przez ustrój i wydzielone zostają, nie ulegając większym zmianom — i, jako nie mające znaczenia pokarmowego z obliczeń wartości paszy przez Kellnera wyłączone zostały.

Prócz swego znaczenia dla budowy zarodki białko odgrywa ważną rolę w budowie kości i to nie tylko dla ich białkowej osnowy, ale nawet i przy złogach mineralnych. Dla budowy lub odnowy tych złogów (przeważnie fosforanu trójwapniowego) mogą służyć fosforany mineralne, rozpuszczane w słabych kwasach, dalej kwas fosforowy złączony z tłuszczami i związkami azotowymi niebiałkowymi (lecytyna), ale najlepiej, najnaturalniej dla ustroju białko, zawierające fosfor (np. sernik mleka). Budowa tkanek t. zw. osadzanie mięsa (nie tłuszczu!) odbywa się tylko w młodości, kiedy zwierzę jeszcze jest zdolne do wzrostu, w późniejszym okresie życia mamy do czynienia tylko z odnową zużytej materji białkowej w tkankach, oraz z regeneracją tkanki gruczołów, błon śluzowych i skóry. Wyjątkowo tylko podczas gojenia się ran, odbywa się nowotworzenie tkanki łącznej (blizny). Również w stanach patologicznych spotykamy się z wyrastaniem tkanek przy powstawaniu chorobliwych nowotworów.

Wyjątkowe znaczenie białka w gospodarstwie ustroju wymaga dostarczania go w dostatecznej ilości, szczególnie w następujących razach:

- 1) u młodzieży dla umożliwienia dobrego wzrostu tkanki mięśniowej i formowania silnych kości;
- 2) u zwierząt ciężarnych dla rozwoju zarodka;
- 3) u zwierząt dojnych dla wytworzenia większej ilości białkowej wydzieliny gruczołowej;
- 4) u osobników męskich płciowo czynnych, dla wytworzenia spermy;
- 5) u owiec dla produkcji wełny;
- 6) u młodych tuczników dla obfitego osadzania mięsa;
- 7) u zwierząt wykonywających wysiłoną pracę, połączoną ze zniszczeniem tkanek mięśniowych (konie wyścigowe, psy myśliwskie);
- 8) u ozdrowieńców po przebyciu ciężkich chorób gorączkowych, lub podczas gojenia się ran.

Przeistaczanie przyjętych pokarmów na materję własnego organizmu odbywa się przedewszystkiem pod wpływem soków trawiennych, wydzielanych w różnych częściach kanału pokarmowego. Zadaniem tych wydzielin jest przystosowanie, zmiażdżonych przez zęby i język, pokarmów dla wessania przez ściany kanału pokarmowego do naczyń krwionośnych i limfatycznych. Drogą tych naczyń, wessane pokarmy zostają roznoszone po całym ciele i, dostając się w ten sposób do poszczególnych tkanek, służą do ich odnowy w miarę zużywania przez obumieranie komórek (złuszczenie naskórka, odrost włosów, ostrzyżonej wełny), w tkankach rosnących służą do powiększania ich objętości — do ich wzrostu. Dalej zastępując materję komórek, zużyta przez wykonywanie czynności życiowych, pokarmy służą pośrednio do wytwarzania wydzielin materyalnych ustroju (sole trawiające, sperma, mleko) a także do wytwarzania energii czuciowej wzgl. myślowej a nadewszystko do wytwarzania energii ruchowej, zwierząt roboczych, ta ostatnia najwięcej nas dotyczy.

Bądź przechodząc w istotę tkanki zwierzęcej, bądź też krążąc tylko w sokach ustroju, przyjęte pokarmy ulegają powolnemu utlenianiu, przyczem wydziela się ciepło, służące do utrzymania stałej temperatury ciała zwierzęcia, wreszcie produkty ich rozkładu wydzielone zostają na zewnątrz. Pokarmy niezużyte gromadzą się w ustroju po części w postaci t. zw. «białka krążącego» t. j. zawartego w sokach ustroju, po części w postaci glikogenu (węglowodanu zwierzęcego), głównie zaś w postaci tłuszczu, osadzającego się w szpiku kostnym, w tkance podskórnej i między mięśniowej, wogóle wszędzie w tworach łącznotkankowych.

Aczkolwiek białko, ulegając powolnemu utlenieniu w ustroju, wytwarza w nim energię zarówno kinetyczną (ruchową) jak i ciepłą, oraz rozkładając się częściowo, może służyć do wytworzenia tłuszczu, jednakże głównym źródłem energii i tłuszczu w ustroju nie jest białko, lecz węglowodany i tłuszcze pokarmów. One to utleniając się w ustroju, dostarczają mu energii ruchu i ciepła, nierozłożony zaś ich nadmiar służy do wytworzenia zapasów tłuszczu. Działanie węglowodanów a tłuszczów zasadniczo między sobą się nie różni i w doświadczeniach nad zwierzętami można w zupełności zastąpić jedne drugimi. Przytem zgodnie z większą wartością ciepłą tłuszczów, jedną część strawnego tłuszczu w karmach mieszanych należy przyjąć za równą 2,2 częściom strawnych węglowodanów. Stosunek ten istnieje zarówno pod względem możliwości osadzenia tłuszczu w ustroju, jak i pod względem wytwarzania siły. Pomimo, że z czysto fizyologicznego punktu widzenia można nieograniczenie zastępować węglowodany przez tłuszcze i naodwrot, to jednak przy żywieniu zwierząt gospodarskich należy się wystrzegać dawania tłuszczu w paszach ponad pewną miarę, gdyż zmniejsza on chęć do jada, wywołuje zaburzenia trawienia i wogóle szkodzi wynikom żywienia. Stwierdzono, że 1 kg. tłuszczu dziennie na 1000 kg. żywej wagi u dorosłych zwierząt trawożernych, jest to dopuszczalne maximum. Zwierzęta młode w pierwszych okresach rozwoju, potrzebują i znoszą dobrze znacznie większe ilości tłuszczu w żywieniu.

Ten zatem wzgląd każe nam baczyć na stosunek tłuszczu w układanych przez nas normach karmowych.

II. Białko tłuszcz i węglowodan obok dostatecznej ilości soli mineralnych i wody są to trzy filary, na których opiera się utrzymanie zwierząt przy życiu i ich produkcya. Chodzi obecnie o to, ażeby określić jaka suma tych składników jest potrzebna różnym zwierzętom przy różnej ich użytkowości, oraz jaki stosunek między tymi składnikami winien być zachowany.

Dotychczas odpowiedź na te pytania wysnuwano z małej ilości faktycznych danych, przeważnie osiągniętych z doświadczeń nad królikami, baranami i psami i uogólnianych na wszelkie zwierzęta i pasze. Oceniano pasze na podstawie ich składu chemicznego, przyjmując za zasadę hipotezę o równowartości (izodynamii) składników pasz. Tą drogą otrzymano wspólną miarę dla wszystkich pokarmów. Jednostką tej miary, którą przyjęto dla oznaczenia wartości wszystkich składników, była wartość spalna skrobi t. j. ilość ciepła, jaką dawała skrobia przy utlenieniu. Wartość strawnych ciał azotowych białkowych i niebiałkowych przyjmowano za równą wartości spalnej skrobi, wartość tłuszczów za 2,4 razy większą, włóknik uznawano za $\frac{1}{10}$ wartościowy albo zgoła pomijany. W ten sposób wyrażone w kilogra-

mach składniki azotowe paszy + tłuszcze, (pomnożone przez 2,4) + bezazotowe + połowa włókniaka — oto była ilość jednostek karmowych zawartych w paszy. I tak postępowano zawsze, bez względu na paszę, na sposób jej przechowania i podania zwierzęciu. Tymczasem analiza chemiczna i wykazana przez nią zawartość poszczególnych składników nie jest dostateczną podstawą dla oceny paszy z punktu widzenia jej wartości użytkowej dla zwierzęcia i dla wyliczenia norm karmowych. Już Emil Wolff — sam twórca teorii o równowartości jednakowych składników pokarmowych w różnych paszach, pośrednio uznawał jej błędność, jednak dopiero prace Kellnera i odpowiednio oświetlenie przez niego prac innych badaczy — nawet samego Wolffa, zadały stanowczy cios tej teorii. Niepodobna przytoczyć materiału dowodowego, zebranego przez Kellnera, ciekawi znajdą go w jego «Żywieniu».

Na miejsce obalonej teorii równowartościowości, Kellner nie stawia nowej, lecz każe nam liczyć się z faktycznie istniejącą względną wartościowością i oznacza ją nie drogą wyliczeń lecz doświadczalnie.

Poglądy swoje streszcza Kellner w następujących słowach: «Sam stosunek ilościowy białka, tłuszczu i węglowodanów nie jest dostateczną podstawą dla wyliczenia norm karmowych. Wyliczenie to opierać należy na faktycznej sile wytwórczej, jaką każda karma posiada. Zupełnie inaczej zachowują się makuuchy w porównaniu z otrębami, wytloki a ziemniaki, ziarna zbóż a odpadki przemysłowe, wreszcie rozmaite siano i słomy, obfitujące w surowy włókniak roślinny zachowują się zupełnie inaczej, niż wszystkie inne środki karmowe. Gdybyśmy stali na tem stanowisku, którego do niedawna powszechnie się trzymało, że te same strawne składniki posiadają równą wartość karmową bez względu na to, czy podajemy je zwierzęciu w postaci słomy, czy w postaci ziarna zbożowego, to popełnialibyśmy grube błędy.

Również nie wystarcza poprostu wykreślić surowy włókniak roślinny z rzędu pokarmów produkcyjnych i pozostałe składniki oceniać jak wyżej, gdyż wówczas również myliliibyśmy się bardzo. Surowy włókniak ma w niektórych przypadkach wartość ujemną, to zn. potrzebuje on do strawienia i przeróbki większego wydatku energii, niż jej sam zwierzęciu dostarcza. Innym razem działa on zupełnie tak samo, jak węglowodany o najwyższej wartości odżywczej. Winę słabego działania licznych środków karmowych żadną miarą nie ponosi sam włókniak roślinny lub praca przeżuwania, lecz odgrywają tu rolę rozmaite inne czynniki, których przyczyć nie możemy. Jedne karmy obfitują w mało wartościowe kwasy organiczne, inne w kanale pokarmowym nie tylko ulegają rozpuszczeniu przez soki trawienia, ale z łatwością ulegają gnicciu, inne znów mniej są przystępne dla trawienia w żołądku, niż w kiszka. Słowem istnieją tu tak powiklane i tak mało wyjaśnione stosunki, że dotąd jesteśmy zmuszeni oznaczać ogólną wartość pokarmową strawnej części paszy na drodze doświadczalnej i przy obliczeniu norm karmowych używać tak osiągniętych wyników, jako podstawy»¹⁾.

Zgodnie z powyższymi wywodami, Kellner oznacza wartość wytwórczą kariny doświadczalnie i za miarę tej wartości przyjmuje dwa czynniki: doświadczalnie oznaczoną zawartość stra-

¹⁾ O. Kellner. Die Ernährung. Wyd. 3. Str. 388 i 389.

wnego białka jako wartość białkową karmy, oraz również doświadczalnie oznaczone działanie produkcyjne (energetyczne i tłuszczowe) wartość skrobiowa. Przelicza on przytem faktyczne działanie całej ilości chemicznie oznaczonych (również z doświadczeń na zwierzętach) strawnych składników w danej paszy tak, jak gdyby działanie to było osiągnięte przez pewną ilość czystej skrobi. Ilość skrobi, wyrażoną w kilogramach, która w ustroju zwierzęcia zdziałałaby tyle, ile zdziała centnar metryczny danej paszy, nazywa Kellner wartością skrobiową tej paszy. Stosunek zaś między faktycznym działaniem strawnych składników paszy, a ich wartością teoretycznie wyliczoną na danych podstawach hipotezy izodynamicznej (teorii równowartościowości) nazwał Kellner wartościowością karmy. Gdzie faktyczne działanie jest równe wartości wyliczonej, nazywa on paszę pełnowartościową i oznacza ją liczbą 100, gdzie zaś jest mniejsze — oznacza to działanie w odsetkach pełnej wartościowości.

Potrzebę różnych zwierząt przy rozmaitej produkcji pod względem wartości białkowej i skrobiowej karmy, podobnie jak i poprzednie dane, określa Kellner na mocy szczegółowych doświadczeń.

Oznaczenie zawartości białka i tłuszczu w karmie, oraz jej wartości w porównaniu z czystą skrobią nie określa jeszcze dostatecznie paszy. Pozostaje jeszcze określenie jej objętości, przytem nie tyle liczyć się trzeba z objętością karmy, zadanej zwierzęciu, ile z tą objętością, jaką ta karma przyjmie w kanale pokarmowym. Albowiem karma winna przyjmować w ustroju pewną dość stałą dla każdego zwierzęcia objętość, gdyż z jednej strony przy należytem wypełnieniu kanału pokarmowego soki trawienne mogą odpowiednio spełniać swoje zadanie, oraz istnieje normalny bodziec dla przesuwania karmy ku odbytowi, z drugiej zaś strony nadmierne przepelnienie żołądka i kiszek powoduje zaburzenia chorobowe. Karmy suche zostają doprowadzone do stanu miazgi przez wydzieliny ścian kanału pokarmowego i wypitą wodę, przyczem wodę przyjmują aż do stałego składu miazgi, wynoszącego zależnie od gatunku zwierzęcia około 15—30% suchej masy i 70—80% wody. I tak świnia przyjmuje na 1 część suchej masy 7—8 części wody, krowa na 1 część s. m., 4—6 części wody, wół tyleż, koń 2—3 części, a to przy pożywieniu zwykłym i dowolnem pojeniu. Wobec tego sucha masa karmy określa jednocześnie objętość, jaką ona przyjmie w kanale pokarmowym. Potrzeby zwierząt co do suchej masy zostały również doświadczalnie określone.

Wreszcie co do ilości i jakości potrzebnych dla ustroju soli mineralnych ścisłych danych jeszcze nie posiadamy. W paszach zwykłych jest ich prawdopodobnie nadmiar. Gdy zaś mamy powody do posądzania (lub analiza nam wykazuje), że w danej paszy ilość soli mineralnych jest bardzo mała, będziemy oczywiście sole te dodawać, szczególnie dotyczy to soli kwasu fosforowego i wapna u zwierząt młodych. Doświadczenie wykazało, że małe ilości soli kuchennej są pożądane dla wszystkich zwierząt i przy wszelkich paszach.

Z powyższych wywodów wynika, że poza tem, żeby wogóle pasza była «jadalna» i nie zawierała wręcz szkodliwych składników, paszę określają przedewszystkiem następujące czynniki:

a) Sucha masa karmy, jako czynnik określający jej objętość, jaką przyjmuje w kanale pokarmowym zwierzęcia.

b) Wartość skrobiowa karmy — jako wyraz możności wytwarzania energii i ruchu i osadzania tłuszczu w ustroju.

c) Zawartość białka w karmie, jako czynnika stanowiącego o jej możności służenia za materiał do wytwarzania i zastępowania zużytej zarodki (protoplazmy).

d) Zawartość tłuszczu w karmie ze względu na ograniczoną zdolność trawienia tego składnika przez ustrój.

Wreszcie e) zawartość w ogóle ciał azotowych i bezazotowych (mniej tłuszczu) w karmie.

Zarówno w obszernem, jak i w popularnem wydaniu swej książki o żywieniu, Kellner umieszcza te same trzy tablice do obliczania paszy (Tabellen zur Futterberechnung). Pierwsza z nich obejmuje skład chemiczny, strawność i wartość produkcyjną pasz. Druga wykazuje wyniki doświadczeń nad trawieniem poszczególnych składników przez zwierzęta przeżuwające, konie i nierogaciznę. Wreszcie trzecia tablica — to normy żywienia.

Przegląd rozpoczniemy od norm Kellnera, a zatem od trzeciej tablicy (Fütterungsnormen). Wszystkie cyfry pomieszczone w tej tablicy, jak zresztą i w pozostałych, wyrażone są w kilogramach i obliczone na dobę i 1000 kg żywej wagi zwierząt. Są one ujęte w sześć kolumn, w tych pierwszej oznacza ilość suchej masy paszy, jaką posiadać powinna całkowita dzienna dawka dla 1000 kg żywej wagi; jak wiemy ma to znaczenie ze względu na objętość, jaką pasza przyjmuje w kanale pokarmowym zwierzęcia. Z pozostałych pięciu kolumn dotyczących strawnych składników pokarmowych, pierwsze dwie oznaczają potrzebną wartość produkcyjną paszy, wyrażoną w jej zawartości strawnego białka (kolumna druga) i w jej wartości skrobiowej (kolumna trzecia).

Pozostałe trzy kolumny mają znaczenie dodatkowe i obejmują potrzebną zawartość strawnych związków azotowych wogóle, zawartość tłuszczu, oraz pozostałych po odjęciu tłuszczu strawnych ciał bezazotowych. O znaczeniu nieprzekraczania dopuszczalnego maximum zawartości tłuszczu, była już mowa. Podanie zaś ogólnej ilości ciał azotowych i bezazotowych (bez tłuszczu) ma znaczenie następujące:

Stosunek ciał azotowych wogóle, a więc zarówno niebiałkowych, jak i białkowych do ciał bezazotowych wywiera wpływ na wyzyskiwanie tych ostatnich. Mianowicie przy stosunku nieprzekraczającym 1:8—10, a u nierogacizny nawet przy stosunku 1:12 ciał azotowych do bezazotowych, trawienie i chłonięcie tych ostatnich odbywa się normalnie. Jeżeli ilość ciał azotowych jest mniejsza, niż tego powyższy stosunek wymaga, strawność węglowodanów zmniejsza się i nawet względnie łatwo strawna skrobia przechodzi niezmienną do kału.

Ostatnie zatem trzy kolumny mają znaczenie dodatkowej orientacji, czy dawki paszy, ułożone przez nas na podstawie trzech pierwszych kolumn, odpowiadają wymaganiom organizmu pod względem nie przekraczalnego maximum tłuszczu i pod względem stosunku ciał azotowych do bezazotowych, czyli pod względem t. zw. «stosunku kareinnego».

Rozpatrywana przez nas tablica rozpada się zasadniczo na dwa działy: normy żywienia zwierząt dojrzałych i normy wyznaczone dla młodzieży, przytem uwzględnione jest bydło, dalej owce, konie robocze i nierogacizna; w normach zaś dla mło-

dzieży, zrzebięta są pominięte. W liczbach dotyczących bydła, mamy normy utrzymywania wołów podczas zupełnego spoczynku, podczas pracy i podczas opasu, następnie normy dla krów mlecznych.

Wyznaczenie norm żywienia wołów podczas zimowego postoju najmniej przedstawia trudności dla badacza. Ma on tu do czynienia ze zwierzętami bezpłciowymi, które prócz naskórka, rogów i racic i niewielkiej ilości soków trawiennych, nie wytwarzają materii azotowej, które dalej, nie wykonywając pracy, nie zużywają w tym celu energii. Współczesne oznaczenie potrzebnej dla zwierzęcia ilości karmy, wykonywa się przeważnie w t. zw. aparacie respiracyjnym. Jest to stajenka hermetycznie zamknięta, gdzie wszelkie produkty przemiany (stałe, ciekłe i lotne, np. dwutlenek węgla, metan) są zbierane i w całości lub w próbkach badane. W nowszych aparatach znajdują się urządzenia kalorymetryczne, pozwalające na oznaczenie ilości ciepła oswobodzonego przez ustrój z danej paszy. W podobnym aparacie zwierzę przebywa czas dłuższy, conajmniej kilkanaście dni, otrzymując ściśle odważone dawki paszy, o dobrze wiadomym składzie chemicznym.

Przy oznaczeniu norm dla zimowli bez pracy idzie o oznaczenie minimum paszy, przy której zwierzęta na wadze nie tracą. To minimum, czyli karnę bytową, Kellner oznacza dla 1000 kg żywej wagi wołów, przy ciepłe w stajni od 12—16° C jako równą 0.5 kg strawnego białka i 5.2 kg wartości skrobiowej (to ostatnie znaczy, że dawka paszy ma mieć wartość energetyczną, równą wartości energetycznej 5.2 kg skrobi). W tablicy podane są jednak cyfry nieco wyższe, mianowicie 0.6—0.8 i wartość skrobiowa 60, a to ze względu na unikanie w praktyce granic minimalnych, których bezwiedne przekroczenie byłoby ze szkodą zwierzęcia, oraz ze względu na możliwość użycia zwierząt do bardzo lekkiej pracy pociągowej, bez zwiększania dawki pokarmowej. Powyższe cyfry są podane dla wołów o przeciętnej wadze osobnika około 600 kg i obliczone na 1000 kg żywej wagi. Potrzeba białka jest w prostym stosunku do wagi zwierzęcia i na każde 100 kg wynosi 60—80 gramów, lecz wartość skrobiowa paszy musi stosunkowo wzrastać u zwierząt mniejszych, a to ze względu na stosunkowo większe u nich promieniowanie ciepła; mają one bowiem powierzchnię ciała stosunkowo większą w odniesieniu do masy. Różnice w potrzebnej wartości skrobiowej paszy, są następujące:

wół wagi:	300	400	500	600	700	800 kg
wartość skrobiowa dawki dziennej dla						
każdego osobnika	2.3	2.8	3.5	3.7	4.1	4.5
wartość skrobiowa, przeliczona na 1000 kg żywej wagi zwierząt	7.7	7.0	6.5	6.1	5.8	5.5

A zatem oczywiście potrzebna wartość skrobiowa paszy z powiększeniem wagi zwierzęcia absolutnie wzrasta, stosunkowo jednak, t. j. po przeliczeniu na jednakową wagę, stale się zmniejsza w miarę wzrostu wagi zwierzęcia.

Gospodarzy, którzy według tych norm zechcą układać dawki paszy dla swych zimujących wołów, zadziwią większe ilości potrzebnej paszy, niż u nas zwykle i to z dobrym wynikiem się stosuje. Wynika to z różnicy w wartości słomy. Mianowicie zachwaszczenie naszych pól, szczególnie b. pożywnymi wyczkami

jest silniejsze. a także odmiany zbóż u nas uprawiane po większej części mają delikatniejszą i strawniejszą słomę.

W każdym razie cyfry podane przez Kellnera, dotyczące potrzeby białka i wartości skrobiowej muszą nam służyć tylko za punkt wyjścia dla samodzielnego wyprowadzenia dawek paszy. Ściśle ekonomiczne żywienie jest niemożliwe bez wagi setnej dla ważenia inwentarza, gdyż tylko stałe ważenie pozwala nam kontrolować wyniki naszych zabiegów. Posiadając taką wagę możemy dostatecznie ściśle oznaczyć ilość paszy konieczną. Mianowicie rozpocząć należy od normy Kellnera, a następnie pomalu odstępować w dół, póki się nie osiągnie kresu, przy którym zwierzęta zaczęną tracić na wadze, wówczas znowu nieco powiększyć dawki a gdy waga inwentarza się ustali, przy nich pozostać. Tak przeprowadzone doświadczenie ma przede wszystkim znaczenie dla odnośnego gospodarza. Ogłoszone następnie w pismach fachowych, nie jest pozbawione wartości ogólniejszej, szczególnie jeżeli zwierzęta i dawki paszy były ściśle ważone, gdy pasze treściwe (dokupne) były posłane do analizy, gdy jeszcze była notowana ciepłota stajni, na dworze i ciepłota wypijanej wody. Na taką pożyteczną rozrywkę naukową w ciągu zimowych miesięcy jest dosyć czasu, a systematyczność, jaką za sobą pociąga, nie przyniesie szkody gospodarstwu.

Żywienie wołów roboczych i opasowych ma wspólną cechę niskiego zużycia białka obok wysokiej wartości skrobiowej paszy. Jednak zapotrzebowanie białka jest już nieco wyższe, niż podczas bezczynnej zimowli: tłómaczymy to głównie użytkowaniem na wytworzenie białkowych soków trawiennych, potrzebnych dla trawienia zwiększonych dawek paszy, nie zaś użytkowaniem na wytworzenie tłuszczu lub siły pociągowej. Co do ilości ciał azotowych wogóle, to ogólna zasada, aby stosunek ich do ciał bezazotowych nie był obszerniejszy, niż 1:8—10 i tu znajduje zastosowanie. Wprawdzie przy szerszym stosunku zwierzę pracę wykonywać może i Kellner przytacza spostrzeżenie nad końmi dorożkarskimi, które otrzymywały karmę o stosunku 1:21 i nawet 1:28 i pomimo to trzymały się w doskonałej kondycji. W takim razie jednak składniki bezazotowe muszą być dawane w nadmiarze, gdyż wyzyskiwanie ich jest niedostateczne. Co do zawartości tłuszczu, to u zwierząt roboczych prędzej zbliżać się można do strawnego maximum 1 kg na dobę i 1000 kg żywej wagi.

Wartość skrobiowa dawki przeznaczonej dla wołu, przy umiarkowanej pracy wynosząca 9.7 kg, została przez Kellnera wyznaczona w następujący sposób. Na mocy bezpośrednich doświadczeń nad ludźmi, psami i końmi okazało się, że 1 kg wartości skrobiowej służy do wykonania pracy równiej 533000 kilogramometrom; że zaś od 1000 kg żywej wagi wołu wymagamy na dobę 2,400.000 kgm pracy, a zatem dla wykonania tej pracy musimy mu dostarczyć paszy o 2.400:533—4.5 kg wartości skrobiowej. Dla teje żywej wagi wołu potrzeba na spełnienie własnych czynności życiowych, jak wiemy 5.2 kg wartości skrobiowych, a zatem w sumie dostarczyć musimy j. w. 9.7 kg w. sk. na dobę i 1000 kg żywej wagi. To, zresztą nie jedyne u Kellnera, odstępstwo od ogólnej zasady wyprowadzania wszystkich danych

na zasadzie bezpośredniego doświadczenia jest spowodowane nowością metody i wprost brakiem czasu na przeprowadzenie wszystkich potrzebnych doświadczeń. Przy pracowitości Kellnera i licznej rzeszy jego uczniów i naśladowców, braki te w krótkim czasie usunięte zostaną. Ilość białka potrzebna przy pracy wołów i wynosząca dla średniej pracy 1·4 kg również wprowadzoną została z analogii u ludzi, psów i koni.

● Natomiast cyfry dotyczące opasów pochodzą już wszystkie z bezpośrednich doświadczeń. Doświadczenia te wykazały, że przy opasie zwierząt młodych przyrost na wadze pochodzi w $\frac{2}{3}$ od przybytku tłuszczu, w $\frac{1}{4}$ od przybytku wody, a zaledwie pozostała $\frac{1}{12}$ przypada na przyrost ciał azotowych i mineralnych. U zwierząt dorosłych przyrost właściwego mięsa (substancji białkowej — nie tłuszczu, jest zaledwie dostrzegalny. Doświadczenie wieków wykazało również, że pokarmy mączne i tłuste najbardziej tuczą. Białko w nadmiarze (w stosunku wyższym niż 1:4) nie tylko nie tuczy, lecz może powodować chudnięcie ustroju (kuracje ochudzające).

Cyfry podane przez Kellnera (1·6 białka, 11·5 w. skr.) dotyczą szybkiego tuczenia wołów z przyrostem dziennym około 2·5 kg na dobę i 1000 kg początkowej żywej wagi. Dla większości gospodarstw będą one mogły służyć tylko za punkt wyjścia przy wyznaczaniu dawek i tu tygodniowe ważenie tuczonych zwierząt wykaże, czy nasze odstępstwo od tych norm jest uzasadnione. Bliższe szczegóły dotyczące wyboru pasz i okresów opasania, znajdują szerokie uwzględnienie w książce Kellnera, tu jednak dla braku miejsca pominięte być muszą.

Przestępujemy do rozpatrzenia cyfr odnoszących się do żywienia krów dojnych. Mleko jest wydzieliną, w której trzecią część suchej masy stanowi białko. Białko to pojawia się w mleku, jako produkt czynności, a poczęści rozpadu nabłonka gruczołu mlecznego; dalej tłuszcz i cukier w mleku zawarty mają w większej części to samo pochodzenie. Tworzenie mleka wymaga ciągłej odnowy tkanki gruczołu, a zatem dopływu materiału jakim jest, jeżeli nie tylko, to w każdym razie głównie białko w licznych swych odmianach. To też głównym miernikiem wartości paszy przeznaczonej dla krów dojnych jest zawarte w niem białko.

Wartość skrobiowa paszy pozostaje tu na drugim planie, gdyż wskazuje tylko ilość żywej siły i ciepła, jaką pasza zwierzęciu dostarcza. «Jeżeli zmniejszymy zawartość białka w paszy, mówi Kellner, to szybko zmniejszy się wydajność mleka, mimo skądinąd jeszcze zupełnie wystarczającej zawartości ciał bezazotowych». To stawianie zawartości białka na pierwszym planie znalazło wyraz w rozpatrywanej przez nas tablicy. Mianowicie Kellner w miarę wzrastania mleczości krowy od 5 litrów do 20 litrów na sztukę, podnosi zawartość białka w paszy od kg do 3·2 kg na dobę i 1000 kg żywej wagi, podczas, gdy jednocześnie wartość skrobiową podnosi z 7·8 na 16·6 kg, a zatem ilość białka potraja, wartość zaś skrobiową jednocześnie tylko podwaja. Miernikiem przeto użytkowości paszy jest zawartość białka i wartość skrobiowa, dwie równorzędne, lecz niewspółmierne wielkości, a wyzyskiwanie jednej i drugiej może być miernikiem użytkowości krów mlecznych.

Przez długi czas obijało się o uszy nasze, że «krowa py-skiem doi»; miało to oznaczać, że krowa jest to mechanizm do przerabiania paszy na mleko, w którym mleczność zależy bardziej od ilości i jakości zadawanej paszy, niż od doskonałości tego mechanizmu. «Jak żywisz, tak doisz», mówiono. Tymcza-sem takie stawianie paszy na pierwszym miejscu nie odpowiada rzeczywistości. W istocie wydajność mleka przedewszystkiem zależy od indywidualności krowy i jeżeli może być ona nazwaną mechanizmem do przerabiania paszy na mleko, to od doskonałości tego mechanizmu zależy ilość i jakość wytworzonego mleka «przy odpowiedniej ilości paszy zużytej». Często o tem zapominamy szukając krów, któreby nie jadły, a mleko dawały. Kierunek ten «oszczędnościowy» wyszedł z Danii, gdzie jednym z zadań związków kontrolnych jest poszukiwanie krów o szczególnie rozwiniętej własności przetwarzania paszy na mleko możliwie tłuste. I nic dziwnego w tem nie ma: stosunek między wydajnością mleka i masła (względnie tłuszczu) z jednej strony, a zużyciem paszy z drugiej, zawsze interesuje właściciela obory, gdyż stanowi najczęściej o dochodzie z krów. Okazuje się jednak, że stosunek ten u krów zdrowych i normalnie żywionych, przy odpowiednim pielęgnowaniu (ciepłota stajni, czyszczenie bydła, pojenie, dojenie etc.) jest stały. Zdrowa krowa w normalnych warunkach dla wydania tyle i takiego mleka, jakie odpowiada jej indywidualności, zawsze zużywa jednakową (w granicach bardzo małych wahań) ilość paszy. Nie pasza wytwarza mleko, lecz krowa i jej wymię, a zadaniem żywienia jest dostarczenie krowie dostatecznego materiału do wytworzenia tego mleka.

Tylko w czasie bezpośrednim po ocieleniu, na działalność rozwijającego się jeszcze gruczołu mlecznego możemy wpłynąć przez paszę; wpływamy wówczas na jego rozwój; gdy ten już jest ukończony, żadnem żywieniem nie uczynimy ze zlej dojki dobrą. Możemy tylko i powinniśmy podnieść wydajność mleka do pożądanego maximum, do jakiego zdolna jest dana krowa.

Prawda, że przez czas krótki można przez forsowne żywienie paszami białkowemi zwiększyć wydajność mleka nieco ponad fizyologiczne maximum, lecz z jednej strony koszta przewyższą wartość otrzymanego mleka, z drugiej zaś nadmiar białka w pokarmie ujemnie wpływa na zdrowie zwierzęcia, czyni je nerwowem, skłonem do zaziębień wskutek przekrwienia skóry, powoduje wreszcie jego chudnięcie, rozmaite przypadłości nerkowe i t. d. Można także, również jednak przez czas krótki, otrzymywać dużą wydajność mleka przy niedostatecznem żywieniu — kosztem organizmu zwierzęcia.

Jedynie jednak racjonalne żywienie, bo na czas dłuższy obliczone, powinno dostarczać krowie prócz karmy bytowej to, co ona na wytworzenie mleka zużywa. A zatem wartość produkcyjną paszy stosujemy do mleczności krowy. Wskazówką, czy dobrze żywimy, jest brak strat na wadze krów przy nie wahającej się mleczności, dowodem zaś, że osiągnęliśmy odpowiadające naszym krowom maximum wydajności jest, iż dodatki paszy treściwej nie zwiększają wybitnie udojów.

Kellner rozróżnia wydajność mleka około 5, 10, 15 i 20 litrów na sztukę i do tych ilości stosuje cztery normy o silnie wzrastającej zawartości białka, mniej zaś powiększając wartość skrobiową i jeszcze mniej ilość suchej masy.

Wykonanie racjonalnego żywienia krów dojnych jest możliwe tylko przy stosowaniu systemu indywidualnego. Wymownym rzecznikiem tego systemu jest dr. Jan Marszałkiewicz, który w swych pracach p. t. «Sumaryczne, grupowe a indywidualne żywienie bydła». Lwów 1906, oraz «Indywidualne żywienie krów dojnych». Lwów 1907, w jasnych słowach przedstawia sposób przeprowadzenia tego systemu i udowadnia, że nie przedstawia ono nieprzezwycięzonych trudności. Istotnie w paru najlepszych oborach zarówno Galicyi jak i Królestwa jest system ten od dłuższego czasu stosowany z najlepszym skutkiem.

W ogólnych zarysach polega on na wyznaczeniu karmy bytowej, wspólnej dla wszystkich krów i rozdzielonej w równych częściach pomiędzy nie, oraz na odmierzaniu każdej krowie dodatków paszy treściwej w stosunku do ilości danego przez nią mleka. Dalszym staraniem hodowcy winno być dopilnowanie, aby każda krowa mogła swą część zjeść bez przeszkód, co się skutecznia przez odpowiednie urządzenie żłobów oraz wiązanie krów. Karmę bytową, oraz ilość potrzebnych dodatków nie trudno wyliczyć według tabl. I i III-ej.

Pozostałe cyfry, dotyczące owiec, koni roboczych i tuczenia nierogacizny, pochodzą przeważnie z bezpośrednich doświadczeń. Podobnie jak z poprzednich korzystać z nich należy jako z wytycznych; chcąc je stosować w praktyce z korzyścią, należy również żywić indywidualnie, a conajmniej grupami, ważyć pasze, ważyć inwentarz, pasze dokupywane posyłać do analizy.

Normy żywienia młodzieży również obliczone są na 1000 kg żywej wagi, przyczem podane jest przy każdej normie wiek i jednostkowa waga zwierzęcia. Wobec tego, że w stosunku między wiekiem, a wagą zwierzęcia wahania bywają bardzo znaczne i tych cyfr nie można przyjmować jako absolutne, lecz należy wprowadzać do nich modyfikacje, wymagane przez warunki i surowo siebie i służbę kontrolować z wagą w rękę.

Tablica pierwsza obejmuje skład chemiczny pasz, bywających w mniej lub więcej częstem użyciu, strawność poszczególnych składników, oraz wartość produkcyjną i wartościowość. Dane te podane w odsetkach ogólnej masy paszy, w układzie oryginalnym ujęte są w 14 rubryk, z nich sześć pierwszych jest poświęconych składowi chemicznemu, a więc 1) woda, 2) ciała azotowe wogóle, czyli t. zw. surowe białko dawnych autorów, 3) surowy tłuszcz (pojęcie to obejmuje tłuszcze, wosk, zielen, wogóle ciała w eterze rozpuszczalne), 4) ciała wyciągowe bezazotowe (cukry, skrobia, kwasy organiczne bezazotowe), 5) surowy włóknik roślinny (blonnik czyli cellulosa, drzewnik czyli lignina, korek i t. p.), wreszcie 6) części popielne (sole mineralne). W następujących czterech rubrykach (7—10) widzimy powtórzenie tych samych składników z wyjątkiem wody i popiołu, tym razem jednak wyrażono ich część strawną, również w odsetkach ogólnej masy paszy.

Kolumna 11-a obejmuje wartościowość paszy; jest to, jak wiemy, stosunek jej wartości skrobiowej do wartości, jaka wynikała ze składu strawnych składników paszy, przyjętej za 100. Pojęcie wartościowości wcale nie odpowiada temu, co w praktyce przywykliśmy określać mianem treściwej paszy. Naprzykład ziemiaki mają wartościowość równą 100, gdyż ich faktyczna

wartość energetyczna równa się tejże, wyliczonej z zawartości strawnych składników, czyli innymi słowy energia, jakiej dostarczają ustrojowi, w zupełności odpowiada ich zawartości strawnych składników. Treściwymi zaś nie są, bo zawierają około 75% wody. Suszone kielki słodowe są b. treściwą paszą, a jednakże mają wartościowość tylko 84, gdyż z ich składników strawnych wynika wartość skrobiowa 59·9, a tymczasem faktycznie stwierdzoną została wartość skrobiowa tylko 50·3, a więc równa 84% teoretycznej. Są pasze o wartościowości ujemnej. Na przykład bywa używane spasanie podczas braku paszy suchych gałązek drzew, obcinanych w zimie i ciętych na sieczkę, przytem nie jest obojętnem, z jakich drzew gałązki są brane, np. akacyowe mają wartościowość dodatnią 41, tymczasem bukowe posiadają wartościowość ujemną równą -139. Znaczy to, że z ilości zawartego w nich strawnego białka, tłuszczów, węglowodanów i włókniaka możnaby sądzić, że mają wartość skrobiową około +9·3; tymczasem faktycznie mają W. S. -12·9; stosunek -12·9 do +9·29 jest jak -139 do 100, skąd wartościowość tych gałązek jest -139. Tę różnicę między teorią (zawartość strawnych składników) a praktyką (wartość skrobiowa) objaśniamy tem, że do strawienia zawartości tych gałązek potrzeba tyle pracy żucia, soków trawiennych, tyle jednym słowem zużycia energii, że skórka nie starczy za wyprawę i powstaje w ustroju deficyt. Wartość skrobiową ujemną danej paszy należy pojmować tak, że dodanie tej paszy równa ujęciu jakiegokolwiek paszy o tej samej wartości dodatniej.

Rubryka 12 i 13, to znane nam, czysto Kellnerowskie, rubryki, oznaczające wartość produkcyjną paszy, a mianowicie wartość białkową t. zn. zawartość czystego strawnego białka i wartość skrobiową t. zn. faktyczną wartość energetyczną i tłuszczotwórczą (steato-plastyczną) mierzoną w dobrze nam już znanych jednostkach skrobiowych.

Jak z powyższego wyliczenia widzimy dla czterech rubryk tablicy III-ciej znajdujemy w tablicy I-ej odpowiednik; są to obie kolumny produkcyjnej wartości paszy, dalej rubryka strawnych ciał azotowych wogóle (białkowych i niebiałkowych) oraz rubryka strawnego tłuszczu, natomiast odpowiedniki dla rubryki 1-ej i 6-ej tabl. III-ej musimy sobie wyliczać. Suchą masę znajdujemy, odejmując odsetkę wody od 100, odpowiednik zaś kolumny 6-ej tabl. III-ej otrzymujemy przez dodanie pozycyi strawne ciała wyciągowe bezazotowe + strawny (surowy włókniak roślinny). Nie stanowi to wielkiej pracy, lecz niepotrzebnie utrudnia orientację. Wszak jesteśmy mniej pracowici, niż Niemcy, a szczególnie nie lubimy roboty niekoniecznie potrzebnej i której łatwo uniknąć, toteż to próżne, a ciągle przerachowywanie może niejednego zniechęcić do używania tablic Kellnera wogóle. Uważając to za wadę w układzie tablic, w kalendarzu Dublańskim, przeznaczonym do rąk praktyków, umieściliśmy tylko te przerachowane liczby, jako mające bezpośrednie zastosowanie praktyczne. W proponowanym układzie rubryka ostatnia wartościowości nie należy do niezbędnie potrzebnych, włączamy ją jednak ze względu na jej znaczenie pośrednie, przy żywieniu zwierząt chorych, brzemiennych i t. p., gdzie unika się mało wartościowych.

Użycie tablicy III-ej (normy karmowe) i I-ej (skład pasz) w praktyce przedstawia się jak następuje. Przypuśćmy, że dla

wyżywienia 30 krów o przeciętnej wadze 600 kg. w ciągu 210 dni, mamy po odtrąceniu strat przy przechowaniu i t. d. 1200 centn. metr. buraków pastewnych, 150 centn. metr. wyborowego siana łąkowego, 150 centn. m. słomy żytniej i 240 c. m. owsianki. Posiadamy zatem na sztukę dziennie około 18 kg. buraków, 2·4 kg. siana, 4·8 kg. koniczyny, 2·4 kg. słomy ozimej i 3·6 kg. słomy jarej. Przerachowawszy te dane na 1000 kg. żywej wagi, a więc w danym przykładzie podzieliwszy przez 6 i pomnożywszy przez 10, musimy następnie przedewszystkiem określić według tablicy I-ej ich objętościowość (suchą masę) i wartość wytwórczą

	na 1000 kg. ż. w.	S. m.	WB.	WS.
buraki pastewne	30 kg.	3·60	0·030	1·890
siano łąkowe	4 >	3·40	0·200	1·448
» koniczynowe	8 >	6·72	0·360	2·280
słoma żytnia	4 >	3·62	0·016	0·424
» owsiana	6 >	5·14	0·060	1·020
Razem		22·48	0·666	7·062

Odrzuciwszy setnei tysięczne, otrzymujemy S. m. 22·4, WB. 0·6, Ws. 7·0, jako wartość naszej paszy podstawowej. Zajrzawszy do tablicy III-ej Kellnera, widzimy, że dla krów, dających dziennie do 5 litrów mleka, potrzeba na 1000 kg. żywej wagi Sm. 22—27 kg. WB. 1·0—1·3, WS. 7·8—8·3, przyjąwszy liczbę średnie 24·5, 1·2 i 8·0 widzimy, że naszej paszy podstawowej brak Sm. 2·1, WB. 0·6 i WS. 1·0, a zatem brak nam jeszcze przedewszystkiem połowy potrzebnej ilości białka; wyszukać więc musimy dodatek, obfitujący w strawne białko. Przypuśćmy, że łatwo dokupić możemy dobre wytloki słonecznikowe (makuchy) i kielki słodowe z gorzelnii. Dla pokrycia braku suchej masy 2·1 kg. potrzeba około 2·4 kg. ogólnej ilości wytloków (kuchów) i kielków. Sprawdziwszy, że same kuchy w tej ilości dalyby nam za dużo białka, a same kielki za mało, decydujemy się dać $\frac{2}{3}$ kuchów, a $\frac{1}{3}$ kielków, przedstawi się to jak następuje:

	na 1000 kg. żywej wagi	Sm.	WB.	WS.
Wytłok słonecznikowy	1·6 kg.	1·4	0·5	1·1
Kielki słodowe	0·8 >	0·7	0·1	0·4
Razem		2·1	0·6	1·5

jak widzimy, przy tej kombinacji mamy w potrzebnej ilości suchej paszy poszukiwaną ilość białka. Pod względem wartości skrobiowej pasza nasza zamiast WS. 8·0 będzie miała WS. 8·5. Niewielką tę nadwyżkę ponad przepisana normę możemy spokojnie dopuścić, wogóle bowiem w praktyce zawsze jest lepiej operować małemi nadwyżkami, uwzględniając powstające zawsze i nie dające się przewidzieć straty w paszy. Podobnie obliczamy dodatek dla krów przy 20 l. i t. d. Pozostaje nam jeszcze sprawdzić, czy w projektowanych przez nas dawkach ilość tłuszczu nie przewyższa dozwolonego maximum, a stosunek ciał azotowych wogóle do bezazotowych nie jest zbyt luźnym. Obliczenia te dokonamy z łatwością na mocy rubryk tablicy I-ej, obejmujących treść paszy.

W przytoczonym przykładzie widać, że rubryki umieszczone w uproszczonym układzie tablicy I-ej Kellnera, wystarczają dla obliczenia dawek paszy. Istotnie pozostałe, znajdujące w oryginalnej, rubryki oraz cała tablica II-a mają w naszych warunkach

znaczenie więcej teoretyczne. Są to rubryki, dotyczące ogólnego składu chemicznego pasz, tablica zaś II-ga jestto niezmiernie ciekawe zestawienie setek doświadczeń nad strawnością poszczególnych składników u zwierząt przeżuujących, koni i świń*).

Używa się tych rubryk i tej tablicy w razie zastosowania paszy o składzie chemicznym nam wiadomym z analizy kontrolnej, a przytem różniącym się od składu przeciętnego podanego w tablicy I-ej, w celu wyliczenia jej wartości białkowej i wartości skrobiowej. Podobna analiza kontrolna jest konieczna przy używaniu pasz treściwych zakupywanych na targu, a pożądana przy użyciu słomy, siana, okopowizn i t. p., aczkolwiek tu na oko już dość pewne dane otrzymać można, pozwalające na zakwalifikowanie paszy do tej lub owej kategorii, znajdującej swój odpowiednik w tablicach.

W razie wyliczania WB i WS. paszy na zasadzie analizy, postępuje się, jak następuje. Weźmy przykład przytoczony przez Kellnera**) otrzymaliśmy, jako wynik analizy, zakupionego przez nas makucha rzepakowego, zawartość materji azotowej 36·5%, tłuszczu 8%, ciał wyciągowych bezazotowych 25·8%, wreszcie surowego włókniaka 11·50%. Z tablicy II-ej określamy część strawną tych składników, na mocy licznych doświadczeń oznaczoną dla wytłoku rzepakowego. Po przerachowaniu okazuje się w naszym makuchu części strawnych: materji azotowej 29·6%, dalej tłuszczu 6·3%, ciał wyciągowych bezazotowych 19·6% i włókniaka 0·9%. Z pominiętych rubryk tablicy I-ej widzimy, że na 33·1 części materji azotowej wogóle w makuchu rzepakowym przypada 4·4 mat. azotow. niebiałkowej, a zatem na 36·5 części mat. az., jakie mamy w naszym wytłoku, liczyć należy 4·8 części ciał azotow. niebiałkowych. Związki te, aczkolwiek nie posiadają dla ustroju wartości plastycznej ani energetycznej i przechodzą przez niego w całości, są zupełnie strawne, ilość ich zatem musimy odjąć od ilości strawnych ciał azotowych wogóle, otrzymamy wówczas ilość strawnego białka 29·6—4·8=24·8, a zatem wartość białkowa naszego wytłoku rzepakowego wynosi WB. 24·8.

Pozostaje nam jeszcze oznaczenie WS. — wartości skrobiowej: tę oznaczamy, używając dla strawnego białka mnożnika 0·94, dla takiegoż tłuszczu 2·41, wreszcie dla strawnych węglowodanów i włókniaka 1·0.

Otrzymujemy:

strawne białko	$24·8 \times 0·94 =$	WS. 23·3
strawny tłuszcz	$6·3 \times 2·41 =$	» 15·2
strawn. c. w. bezaz. + str. włókniak	$20·5 \times 1·0 =$	» 20·5
		<hr/>
		Razem 59·0

a zatem teoretyczna wartość skrobiowa naszego wytłoku wynosi 59·0. Jednak w makuchu rzepakowym stosunek wartości skrobiowej faktycznej do teoretycznej ma się jak 95 do 100, a zatem potrącić musimy 5% od otrzymanej cyfry, wówczas uzyskamy przybliżoną istotną wartość skrobiową badanego wytłoku WS=56%. Porównawszy otrzymane cyfry z podanymi w tablicy

*) Tablicę drugą dla braku miejsca w kalendarzu nie umieściliśmy. Ciekawi znajdą ją w polskiem tłumaczeniu dzieła Kellnera.

**) Ernährung. 1906. str. 572.

I-ej, widzimy, że nasz wytłok ma WB. nieco większą, WS. zaś mniejszą, niż przeciętna podana w tablicy.

Dla siana, słomy, plew i pasz zielonych rachunek prowadzi się podobnie do powyższego, z tą jednak różnicą, że dla wyliczenia faktycznej wartości skrobiowej z takiejże WS. teoretycznej, nie posilkujemy się ich wartościowością, lecz dla każdego procentu zawartego w danej paszy surowego włókniaka roślinnego w ogóle (nie tylko strawnego!), odejmujemy odpowiednią ilość WS. według następującej tabliczki:

Rodzaj paszy:	Przy ogólnej ilości zawartego włókniaka równej:	na każdy % odejmuje się od wartości skrobiowej całej paszy:
siano	obojętna	0·58
słoma	"	0·58
plewy	"	0·29
pasza zielona	do 4 %	0·29
"	około 6 %	0·34
"	" 8 %	0·38
"	" 10 %	0·43
"	" 12 %	0·48
"	" 14 %	0·53
"	" 16 % i więcej	0·58

Jak widzimy zatem, rubryki ogólnego składu chemicznego w tablicy I-ej i tablica II-ga mają popierwsze znaczenie dopiero wówczas, gdy ocenimy chcemy paszę zanalizowaną, powtóre użycie ich wymaga większych wyliczeń które rolnik-praktyk najlepiej poleci wykonać stacyi, wykonywującej analizę kontrolną. Przeciwnie użycie rubryk objętości (sucha masa) i wartości produkcyjnej, t. j. wartości białkowej i skrobiowej jest tak proste, że istotnie można mieć nadzieję, iż wkrótce nowa ta metoda stanie się u nas dobrem powszechnem.

Zaznaczyć jeszcze wypada, że dla pasz nowo-wprowadzonych w handel i nie budanych jeszcze na strawność i wartościowość a więc nie pomieszczonych w tabl. II-ej, nie można się posilkować żadanymi danymi analizy, gdyż, jak już wielokrotnie zaznaczyliśmy, wartość produkcyjna paszy, a jej skład chemiczny są nieraz wartościami zupełnie rozbieżnymi i chcąc z drugiego sądzić o pierwszej, trzeba znać stosunek zachodzący między nimi, a ten dla każdego rodzaju paszy jest inny.

Rozpowszechnienie zasad Kellnera i użycia jego tablic wśród najszerzego ogółu, podkreślenie tego, co w nauce Kellnera jest istotnego i nowego, a w zastosowaniu praktycznem, nie następuje większych trudności, jest zadaniem niniejszego działu kalendarza. Dla tego, kto zechce zapoznać się z żywieniem według Kellnera w całej rozciągłości, oczywiście krótki artykuł nie może wystarczyć i ten znajdzie jasne i proste tłumaczenie wielu dotąd ciemnych punktów w pracy Kellnera, mającej wkrótce wyjść w polskiej szacie.

UWAGA: co do następującej tablicy str. 66 i nast.: «Wartość białkowa» == (przeważnie) ilości czystego strawnego białka (patrz poprzedni artykuł). «Wartość skrobiowa» patrz poprzedni artykuł:

Zawartość

składników pokarmowych pasz na podstawie prac O. Kellnera.

Tablica I-a.

Rodzaj paszy	Objęto- ściowość	Wartość wytwórcza		Zawartość składników strawnych surowych			Wartość energetyczna
		wartość białkowa	wartość skrobiowa	surowe białko	surowe tłuszcze	ciężka wycią- gowa beza- towa i wiółk.	
1. Pasje zielone.							
<i>a) Trawy:</i>							
Trawa przed samym kwit.	25.0	1.5	13.1	2.0	0.4	13.0	87
» z żyznego pastwiska (pastwiska wypasowego).	21.8	2.3	13.1	3.4	0.6	10.9	92
» z pastwiska	20.0	1.7	11.1	2.5	0.4	9.9	91
» z dobrej łąki zalew.	19.2	1.3	9.9	2.4	0.4	9.5	87
Trawy słodkie podczas kwit.	30.0	1.3	13.7	2.0	0.4	15.5	79
Jęczmień podczas kłoszenia się	19.0	1.5	7. . .	1.8	0.3	9.5	80
» podczas i po kwit.	31.4	1.3	16.0	1.5	0.3	18.5	79
Owies podczas kłoszenia się	16.1	1.4	8.5	1.7	0.4	7.5	89
» » kwitnienia	23.2	1.2	10.0	1.4	0.4	11.4	75
» » dojrzewania	46.4	2.1	14.7	2.4	0.8	21.9	58
Proso	13.0	0.4	5.4	0.7	0.1	6.0	82
Kukurydza amerykańska	17.2	0.3	7.3	0.7	0.2	8.2	82
Żyto pastewne	23.4	1.4	11.3	2.1	0.5	11.9	80
Sorgo cukrowe	19.9	0.7	8.1	1.2	0.2	9.1	79
Trawa kupkowa na początku kwitnienia	20.4	0.8	10.7	1.5	0.4	10.6	89
Trawa kupkowa podc. kwit.	27.0	1.0	12.9	1.5	0.4	13.8	83
Kukurydza europejska	19.4	0.6	9.1	1.0	0.3	9.8	83
Mohar podczas kwitnienia	27.0	1.0	10.6	1.8	0.3	12.8	74
Rajgras angielski podcz. kwit.	24.8	1.3	10.6	1.8	0.3	11.4	81
» francuski podcz. kwit.	31.5	1.7	13.7	2.1	0.4	15.7	76
» włoski podcz. kwit.	25.0	1.3	11.4	2.1	0.5	11.3	85
Tymotka podczas kwit.	33.1	1.0	14.0	1.6	0.5	15.9	79
<i>b) Koniczynowate i groszkowe:</i>							
Kon. czerw. b. młoda na pastw.	17.0	2.1	10.0	3.4	0.4	8.1	92
» » podczas pączkow.	15.9	1.4	8.8	2.4	0.4	7.8	89
» » przed zakwit.	19.0	1.7	10.2	2.5	0.5	9.3	86
» podczas pełnego kwit.	21.0	1.7	9.7	2.2	0.4	9.3	83
» szwedzka pocz. kwit.	17.8	1.3	7.9	2.4	0.5	7.4	82
» » podc. peł. kwit.	18.2	1.0	7.6	1.6	0.4	8.0	79
» biała przed zakwit.	18.5	1.9	8.8	2.8	0.5	7.3	88
Inkarnatka podczas kwit.	18.5	1.5	9.0	2.1	0.5	8.7	81
Lucerna b. młoda	18.9	2.7	8.7	4.3	0.4	6.7	87
» przed zakwitnięciem	24.0	1.7	9.1	3.2	0.4	9.2	79
» podcz. pełn. kwit.	24.0	1.5	8.4	2.7	0.4	9.2	74
Esparceta pocz. kwit.	19.0	1.9	9.5	2.6	0.4	8.7	85

Rodzaj paszy	Objęto- ściowość sucha masa	Wartość wytwórcza		Zawartość składników strawnych surowych			Wartośćowa energetyczna pełna 100
		wartość białkowa	wartość skrobiowa	surowe białko	surowo- tłuszcz.	ciężka wycią- gowa bezoazo- towa i włók.	
Esparceta podc. pełn. kwitn.	20.0	1.6	7.6	2.3	0.3	8.0	76
Seradela na pocz. kwitn. . .	13.3	1.5	6.6	2.0	0.4	5.3	88
„ podczas. pełn. kwitn. . .	17.7	1.5	7.3	2.1	0.5	6.5	82
Lucerna chmiel. w pocz. kwit.	20.0	1.6	9.1	2.4	0.4	8.7	83
Przelot	18.0	1.6	7.9	1.4	0.3	8.4	83
Bobik w pocz. kwitnienia . .	15.0	1.5	7.1	2.3	0.5	5.7	88
Groch	15.4	1.9	6.6	2.9	0.3	5.5	83
Wyka pastewna, pocz. kwitn.	15.5	1.8	7.3	2.9	0.3	6.2	86
„ podczas kwitnienia . . .	17.5	1.4	7.5	2.2	0.3	7.2	83
Wyka piaskowa podc. kwitn.	16.6	2.0	6.9	2.9	0.4	5.9	81
Łubin, początek kwitnienia .	12.2	1.1	5.9	2.2	0.2	5.3	88
„ podczas kwitnienia . . .	16.9	0.8	7.1	2.1	0.2	7.6	81
Peluszka	16.8	1.6	6.8	2.4	0.3	6.7	77
<i>c) Inne rośliny pastewne:</i>							
Gryka podczas kwitnienia . .	16.3	1.1	8.1	1.6	0.3	7.7	87
Tatarka	50.0	0.7	6.0	1.4	1.5	15.6	31
Rzepak ozimy podczas kwitn.	14.1	1.3	7.0	2.0	0.5	5.8	87
Gorzycza biała	14.9	1.3	7.2	1.9	0.2	6.4	90
Szparek podczas kwitnienia .	19.7	1.0	9.6	1.5	0.3	9.6	86
Złotochrust	51.3	1.5	9.0	2.2	0.5	20.5	39
Żywokost	11.5	0.9	5.2	1.5	0.2	4.5	91
<i>d) Liście i ziola:</i>							
Kapusta pastewna	15.3	1.2	9.4	1.8	0.4	8.2	94
Nać ziemniaczana przed zbior.	23.0	0.6	7.2	1.1	0.2	8.3	78
„ marchwi	18.2	1.5	7.8	2.2	0.5	6.1	91
„ buraków pastewnych . . .	11.0	1.0	5.3	1.6	0.2	4.4	92
„ bulwy (Topinambur) . . .	32.3	1.7	16.2	2.0	0.5	16.3	91
Kapusta głowiasta	10.0	0.7	5.4	1.2	0.1	5.1	91
Nać i głowy burak. cukr. . .	16.2	1.4	7.2	1.7	0.2	7.0	84
II. Kiszonki i siana brunatne.							
<i>a) Kiszonki dołowane:</i>							
Esparceta	16.7	1.3	6.2	2.3	0.5	6.0	76
Żyto pastewne	13.1	0.5	5.6	0.9	0.2	6.0	81
Trawa	19.4	0.9	7.9	1.4	0.4	8.5	78
Trawy z koniczyną	20.0	1.3	8.6	2.2	0.5	8.4	81
Owies zielony	23.7	0.6	8.0	1.1	0.4	11.0	72
Koński ząb	18.5	0.4	8.6	9.8	0.4	8.4	82
Nać ziemniaczana	25.0	0.3	8.0	1.2	1.2	6.7	86
Łubin	18.0	1.1	8.0	2.1	0.8	7.4	80
Lucerna	16.9	1.5	6.6	2.5	0.7	5.4	81
Koniczyna czerwona	21.7	1.7	9.2	2.9	0.6	8.6	81
Liście buraków pastewnych .	22.4	0.7	7.9	2.0	0.5	7.2	87
Liście i głowy burak. cukr. .	23.0	0.2	9.5	1.5	0.3	9.7	91

Rodzaj paszy	Objęto- ściowość	Wartość wytwórcza		Zawartość składników strawnych surowych			Wartośćowa energetyczna
		wartość białkowa	wartość skrobiowa	surowe białko	surowe tłuszczo	ciała wycią- gowe- bezaso- towe i wídk.	
<i>b) Kiszonki stogowane:</i>							
Gryka	29.7	0.7	13.0	1.5	0.4	14.6	81
Trawa	32.0	0.7	12.3	1.9	1.3	13.4	74
Koński żąb	28.2	0.5	7.8	1.2	0.6	8.0	81
Łubin	19.7	0.7	5.6	1.8	0.5	8.1	58
Lucerna	27.5	1.2	7.8	3.0	1.6	8.5	61
Koniczyna czerwona	30.0	1.9	11.8	3.9	1.0	11.6	77
Seradela	34.7	2.2	14.5	4.5	0.7	13.8	76
Owies z wyką	28.7	0.8	6.7	2.0	0.4	7.0	78
<i>c) Siana brunatne:</i>							
Esparceta	89.0	6.2	25.6	11.4	2.8	32.3	59
Lucerna	80.0	5.1	23.7	9.0	1.6	28.2	66
Koński żąb	70.0	1.0	24.7	2.7	0.8	34.8	66
Koniczyna czerwona	85.5	6.8	31.6	8.9	1.3	36.4	70
Trawa łąkowa	84.2	5.1	36.1	6.6	1.5	42.0	73
Siano.							
<i>a) Siano łąkowe i z traw:</i>							
Siano łąkowe liche	85.7	2.5	18.9	3.4	0.5	34.9	49
„ „ niezłe	85.7	3.2	23.7	4.6	0.6	36.4	58
„ „ dobre	85.7	3.8	31.0	5.4	1.0	40.7	67
„ „ b. dobre	85.0	5.0	36.2	7.4	1.3	41.7	74
„ „ doskonałe	84.0	6.5	40.6	9.2	1.5	42.8	78
Otawa z łąk dobr. nienawad.	85.2	5.6	35.7	6.9	1.6	40.4	74
„ z łąk wilgotn. nawad.	85.0	6.0	37.4	7.4	2.1	39.4	77
Siano górskie	85.5	6.4	38.5	8.2	2.1	42.1	74
„ z łąk torfowych	89.0	3.7	34.7	5.1	1.3	44.1	69
Otawa z łąk torfowych	85.0	5.4	33.8	7.0	1.2	39.9	72
Siano z łąk kwaśnych	87.0	3.0	20.9	3.8	0.8	36.8	52
Owies w porze kwitn.	88.5	4.8	35.2	5.6	1.7	44.8	67
Siano z moharu	86.6	4.8	30.3	6.1	0.9	41.0	64
Rajgras ang. podczas kwitn.	85.7	3.3	22.5	5.1	0.8	35.3	56
„ fran. „	85.7	3.5	21.0	5.6	0.8	33.1	55
„ włosk. „	85.7	4.9	35.6	7.1	1.4	41.5	73
Żyto podczas kłoszenia się	85.7	6.2	36.6	7.3	1.5	41.4	69
Trawy słodkie	85.7	4.0	30.2	5.3	1.1	40.9	65
Siano z tymotki	85.7	3.2	29.1	4.0	1.0	40.6	64
<i>b) Koniczynowate i strączkowe:</i>							
Siano z konicz. czerw. liche	85.0	4.0	25.2	5.7	1.0	36.2	60
„ „ „ niezłe	84.0	4.5	28.5	7.0	1.2	37.0	66
„ „ „ dobre	83.5	5.5	31.9	8.5	1.7	37.3	70
„ „ „ dosk.	83.5	7.0	35.6	10.7	2.1	37.8	70
„ „ „ wylu- gowane przez deszcze	84.0	4.8	18.3	6.1	0.7	31.5	49

Rodzaj paszy	Objęto- ściowość	Wartość wytwórcza		Zawartość składników strawnych surowych			Wartość energetyczna pełna = 100	
		sucha masa	wartość białkowa	wartość skrobiowa	surowo białko	surowo tłuszcz.		ciężn. wycią- gowe bezazo- towe i włók.
Lucerna przed kwitn.	84.0	8.1	26.5	12.1	1.1	32.4	63	
„ „ podczas kwitn.	83.5	6.2	22.4	9.7	1.2	31.3	57	
Esparceta przed kwitn.	84.2	7.8	32.9	10.9	2.1	35.9	70	
„ „ podczas kwitn.	83.5	7.5	31.1	9.6	1.6	37.1	66	
Lucerna chmielowa	84.0	8.6	31.0	11.8	1.6	34.0	69	
Komonica	87.5	5.1	33.0	7.4	1.5	38.3	72	
Inkarnatka	83.3	5.5	27.4	8.3	1.0	35.4	64	
Lucerna piaskowa	83.3	8.3	25.8	11.7	1.2	33.1	60	
Kon. szwedz. podczas kwitn.	84.0	5.6	29.8	8.3	1.3	36.9	67	
Seradela	84.0	9.2	31.4	11.4	2.0	33.7	68	
Konicz. biała podczas kwitn.	84.0	4.9	32.1	8.5	2.1	36.8	71	
Przelot	84.0	4.9	27.7	6.1	1.0	37.7	62	
Groch na pocz. kwitn.	84.0	12.0	32.6	16.7	1.7	31.4	71	
„ „ podczas kwitn.	83.3	6.6	27.8	9.4	1.6	33.1	66	
Wyka past. na pocz. kwitn.	83.3	10.8	30.4	15.1	1.4	31.1	69	
„ „ podczas kwitn.	83.3	6.6	26.9	9.4	1.5	32.5	65	
Łubin żółty podczas kwitn.	84.0	8.5	33.8	13.7	1.1	39.0	69	
„ „ do połowy prze- kwitły	84.0	5.3	28.9	10.2	1.0	38.7	63	
Wyka piask. podczas kwitn.	84.0	13.7	30.2	18.9	1.4	38.3	73	
Siano z wyki z owsem podczas kwitn.	84.0	4.2	28.8	6.5	1.7	35.6	67	
<i>c) Inne rośliny pastewne</i>								
Szparek	85.5	6.3	35.8	7.7	1.2	30.2	74	
Hreczka (gryka)	86.0	4.7	27.7	6.2	1.0	39.5	60	
Rzepak	84.5	8.5	35.8	11.0	2.2	35.4	75	
Gorczyca biała na pocz. kw.	85.0	4.0	27.7	6.3	1.4	36.5	65	
Złotochrust	85.0	2.7	14.0	3.6	0.9	33.9	37	
Żywokost przed kwitn.	85.0	9.5	37.5	12.0	1.8	31.8	85	
<i>Liście i ziola:</i>								
Liście pokrzywy	88.6	9.3	48.0	12.8	4.9	36.0	89	
„ „ i lodygi chmielu	89.4	6.1	31.1	8.0	9.5	34.7	79	
Nać ziemniaczana	90.0	2.3	23.3	3.8	0.6	34.0	68	
„ „ bulwy (i sopinanbur)	87.5	6.1	37.3	7.6	1.1	37.7	82	
Liście i głowy bur. cukr. susz.	86.0	6.1	32.2	6.7	0.4	35.6	78	
IV. Słomy.								
<i>a) Słoma zbóż.</i>								
Jęczmień jary	85.7	0.6	19.0	0.9	0.5	40.3	46	
„ „ przerosły kon.	85.7	2.4	24.2	3.2	1.0	39.3	56	
„ „ ozimy	85.7	0.5	10.7	0.7	0.4	33.7	31	
Słoma owsiana	85.7	1.0	17.0	1.3	0.5	37.4	43	

Rodzaj paszy	Objęto- ściowość	Wartość wytwórcza		Zawartość składników strawnych surowych			Wartościowość energetyczna — 100
		wartość białkowa	wartość skrobiowa	surowe błonko	surowe tłuszcze	ciężka wycią- gowa licząca tłowe i włók.	
Słoma z prosa	85.0	1.2	22.3	1.6	1.1	39.4	52
Kukurydzianka	85.0	1.3	20.3	1.7	0.5	40.7	47
Słoma ryżowa	86.8	1.2	13.5	2.5	1.0	30.8	40
» jara średnia	85.7	1.0	18.8	1.2	0.4	39.6	46
» » dobra	85.7	2.2	20.7	2.6	0.8	38.1	50
» żytnia ozima	85.7	0.4	10.6	0.6	0.4	34.9	30
» pszenna ozima	85.7	—	10.9	0.2	0.4	33.7	32
» ozima średnia	85.7	—	11.5	0.2	0.4	35.1	32
» » bardzo dobra	85.7	0.4	16.7	0.8	0.5	37.5	43
<i>b) Słoma strąkowych</i>							
Słoma z bobiku	81.6	3.2	19.2	4.0	0.5	36.0	48
» z grochu	86.4	3.4	16.2	4.3	0.7	32.2	44
» z wyki pastewnej	86.7	3.2	12.7	4.1	0.8	31.8	35
» strąkowych średnia	84.0	3.0	15.2	3.8	0.4	33.6	41
» » b. dobra	84.0	3.8	19.1	5.0	0.5	34.5	49
» lubinu	84.0	1.6	19.4	2.5	0.4	41.0	45
» konicz. czerw.	84.0	3.1	5.8	4.0	0.6	27.5	18
» wyki piaskowej	84.0	2.1	11.4	2.8	0.4	31.7	33
<i>c) Inne rośliny.</i>							
Słoma gryki	84.0	1.7	15.7	2.2	0.5	35.2	42
» maku	84.0	2.2	17.2	2.8	0.6	33.6	47
» rzepaku	84.0	0.7	15.2	1.0	0.5	34.4	42
V. Plevy, łuski, strązyny.							
<i>a) Zboża.</i>							
Sorgo	94.3	1.1	40.7	1.5	0.1	46.3	85
Jęczmień	85.5	0.5	24.5	0.8	0.5	31.7	74
Owies	86.2	1.4	28.6	1.9	0.8	32.5	79
Proso	88.0	1.2	19.4	1.7	0.7	28.7	62
Kaczany kukur. bez ziarn.	86.9	1.2	21.1	1.6	0.4	41.7	49
Plevy żytnie	85.7	0.7	22.0	1.1	0.4	33.3	67
» pszenne	84.0	0.9	24.3	1.4	0.5	31.3	74
<i>b) Strączkowe</i>							
Bobik	85.0	4.0	21.8	5.2	1.0	35.5	53
Groch	86.0	3.7	20.1	4.9	0.5	36.1	50
Soczewica	85.0	8.3	30.3	10.1	1.0	31.8	73
Łubin	85.0	1.8	14.4	2.6	0.2	39.7	45
Soja	88.0	2.0	32.0	2.8	0.8	46.0	65
Wyka	85.0	3.9	20.1	5.1	1.1	33.0	52

Rodzaj paszy	Objęto- ściowość sucha masa	Wartość wytwózca		Wartość składników strawnych surowych			Wartość energii pełna 100
		wartość białkowa	wartość skrobiowa	surowe białko	surowe tłuszczo	ciężka wyciągowa biazono- towa i włók.	
<i>c) Inne rośliny</i>							
Gryka	86.8	1.6	17.8	2.1	0.5	27.9	59
Len	88.4	1.0	17.7	1.4	1.7	25.2	60
Lnianka (camelina)	88.8	0.7	14.1	1.0	0.4	25.7	52
Rzepak	84.0	1.1	12.7	1.5	0.7	31.9	37
Rzypik	84.8	1.1	12.4	1.5	0.6	32.0	36
VI. Korzenie i kłęby.							
Ziemniaki średnie	25.0	0.1	19.0	1.1	—	18.9	100
» wodniste	17.0	0.2	12.7	0.9	—	12.5	100
» mączyste	26.9	0.1	19.8	1.1	—	19.7	100
» bardzo mączyste	32.0	0.2	24.8	1.3	—	24.6	100
» przemarznięte	38.0	0.2	31.5	0.9	—	31.3	100
» zakiszone	26.5	0.1	17.7	1.1	0.1	18.4	95
» przem. i parzone	33.5	—	27.1	0.8	—	27.1	100
» » i zakiszone	31.1	—	22.0	0.9	0.1	23.0	95
» suszone	88.0	0.7	68.8	1.5	—	68.1	100
Brukiew (karpiele)	12.0	0.4	6.7	1.2	—	7.1	90
Rzepa	12.2	0.3	7.5	1.2	—	8.5	85
» zakiszona	14.4	0.2	8.1	1.2	0.1	9.1	80
Marchew	13.0	0.4	8.7	0.8	0.1	9.6	87
Pasternak	16.8	0.5	11.6	0.9	0.1	13.3	86
Burak pastewny duży	10.5	0.1	5.0	0.9	—	6.7	74
» » mały	13.5	0.1	7.4	0.8	—	10.4	70
» » średni	12.0	0.1	6.3	0.8	—	8.6	72
Rzepa ścierniskowa	8.5	0.2	4.6	0.6	—	5.8	77
Bulwa (topinambur)	20.4	0.4	16.4	1.0	—	16.0	92
Brukiew	9.2	0.3	4.8	0.8	—	5.8	78
Burak cukrowy	25.0	0.3	15.8	0.9	—	20.8	75
VII. Ziarna i nasiona.							
<i>1) Ziarna zbożowe.</i>							
Pszenica-orkisz w plewie	86.3	7.2	53.1	8.2	1.0	48.9	92
» bez plew	86.1	10.0	74.3	11.1	1.9	61.3	100
Jęczmień przeciętnie	85.7	6.1	72.0	6.6	1.9	63.7	99
» o ziarnie pełnym	85.7	5.9	75.8	6.3	1.6	67.9	99
» » niewypełn.	85.7	6.5	66.4	7.1	2.2	58.0	97
» pastewny	85.7	8.0	67.9	8.8	2.1	57.8	98
Owies przeciętnie	86.7	7.2	59.7	8.0	4.0	47.4	95
» o ziarnie pełnym	86.7	5.6	63.1	6.2	3.5	52.7	96
» » niewypełnion.	86.7	9.2	54.8	10.2	4.6	40.7	93
Proso	87.5	7.4	59.7	8.0	3.1	48.5	95
Kukurydza przeciętnie	87.0	6.6	81.5	7.1	3.9	67.0	100
Koński ząb amerykański	87.0	6.7	81.6	7.2	4.5	65.8	100
Kukurydza ameryk. twarda	87.0	6.8	81.8	7.3	4.3	66.3	100

Rodzaj paszy	Objętość	Wartość wytwórcza		Zawartość składników strawnych surowych			Wartość energetyczna pełna 100	
		sucha masa	wartość białkowa	wartość skrobiowa	surowe białka	surowe tłuszcze		ciężko- wycią- gowa bezo- towa i włók.
Kukurydza ameryk. słodka	87.0	7.9	82.9	8.5	7.0	60.7	100	
Sorgo zwykłe	84.8	4.1	67.9	4.6	2.5	59.5	99	
Ryż wyluskany i wytarty	87.4	5.5	82.0	5.8	0.2	76.5	100	
Żyto przeciętne	86.6	8.7	71.3	9.6	1.1	61.9	95	
> o ziarnie pełnem	86.6	7.0	73.7	7.7	0.9	67.7	97	
> „ niewypełnion.	86.6	11.3	65.8	12.7	1.5	58.0	92	
Pszenica przeciętne	86.6	9.0	71.3	10.2	1.2	64.4	95	
> o ziarnie wypełnionem	86.6	7.7	73.1	8.6	1.0	66.3	97	
> „ „ niewypełn.	86.6	10.9	65.8	12.5	1.4	58.6	92	
> „ „ jara	86.6	9.9	70.0	11.4	1.2	63.1	95	
<i>2) Nasiona strąkowe.</i>								
Bobik	85.7	19.3	66.6	22.1	1.2	48.2	97	
Groch	86.0	16.9	68.6	19.4	1.0	52.4	98	
Soczewica	86.0	19.1	69.5	21.9	1.2	50.3	99	
Lubin żółty	86.0	30.6	67.3	34.4	3.8	34.6	94	
> niebieski	86.0	23.3	71.0	26.3	5.2	41.3	96	
> biały	86.0	23.2	71.7	26.1	6.1	40.5	95	
> żółty odgorycz. świeży	67.5	29.4	58.2	29.8	4.1	26.5	93	
> „ „ wysuszony	86.0	37.5	74.6	38.0	5.4	33.7	93	
> nieb. świeży	67.0	20.9	56.5	21.4	3.7	31.7	95	
Wyka piaskowa	84.0	17.9	67.6	20.4	1.2	50.5	97	
Seradela	86.0	13.8	48.9	16.1	6.2	28.7	89	
Wyka	86.7	20.0	69.7	22.9	1.5	49.7	98	
<i>3) Nasiona oleiste</i>								
Siemię konopne	91.1	12.8	104.1	13.7	29.3	25.8	96	
> lnianki	92.3	17.1	99.4	19.1	26.9	21.1	97	
> lniane	92.9	18.1	119.2	19.4	34.7	20.1	99	
Mak	92.8	13.6	127.6	14.9	40.9	17.8	99	
Rzepak	92.7	13.8	130.3	15.9	42.8	15.9	99	
Nasienie słonecznikowe	92.5	11.1	96.0	12.8	30.7	19.7	92	
<i>4) Inne nasionu i owoce.</i>								
Gryka	85.9	7.5	52.7	8.5	1.9	45.8	93	
Nasienie buraków pastewn.	86.1	4.6	30.3	7.2	3.2	28.4	76	
> „ „ cukrowych	90.0	4.8	28.1	7.4	3.3	29.0	71	
VIII. Odpadki i wytwory przemysłowe.								
<i>a) Odpadki młynarskie.</i>								
Otreby gryczane grube	84.4	4.3	25.8	4.8	1.2	30.3	70	
> „ „ drobne	88.0	9.9	55.2	11.4	3.4	42.7	94	

Rodzaj paszy	Objęto- ściowość sucha masa	Wartość wytwórcza		Zawartość składników strawnych surowych			Wartość energetyczna pełna = 100
		wartość białkowa	wartość węglowa	surowe białko	surowe węglowod.	ciężka wycią- gowa bezoazo- towa i włók.	
Osyпка gryczana gruba	88.0	20.6	64.9	24.4	6.8	32.5	98
„ „ „ drobna	85.3	5.9	70.3	6.8	1.4	62.1	100
Łuska grochowa	88.0	4.0	30.8	4.4	0.5	38.9	70
Otręby grochowe	86.5	20.6	68.8	18.3	1.6	48.4	97
Osyпка grochowa	88.3	9.7	49.5	10.9	0.8	44.6	90
Łuska orzecha ziemnego	89.9	2.1	0.1	2.6	2.8	9.2	1
Otręby orzecha ziemnego	89.5	15.3	73.7	16.3	16.3	25.7	93
Otręby jęczmienne	89.5	10.8	57.5	11.2	2.7	44.1	93
Osyпка jęczmienna	86.8	9.1	67.3	10.2	2.0	55.8	99
Łuska owsiana	86.0	—	18.3	—	0.2	27.2	66
Osyпка owsiana gruba	90.0	7.6	55.9	8.8	3.8	45.8	93
„ owsiana drobna	90.0	11.0	64.2	12.6	5.4	45.7	97
Otręby owsiane	90.4	3.4	45.3	3.8	1.5	45.5	88
Osyпка żytnia	87.4	9.9	77.5	11.0	2.0	64.0	100
Otręby żytnie	87.5	10.8	46.9	12.5	2.4	44.6	79
Osyпка pszenna	87.4	11.0	73.0	12.3	2.9	56.7	100
Otręby pszenne drobne	86.8	11.1	48.1	12.9	3.7	42.6	79
Otręby pszenne grube	86.8	9.8	42.6	11.3	3.0	39.7	77
<i>b) Odpadki krochmalni.</i>							
Włókno ziemniaczane świeże	14.0	—	8.6	—	—	9.0	95
„ „ „ suche	86.0	—	50.9	—	—	53.6	95
<i>c) Odpadki cukrownicze.</i>							
Wysłodziny świeże	7.0	0.3	5.0	0.3	—	5.0	94
„ prasowane	15.0	0.6	10.6	0.7	—	10.7	94
„ zakiszone	11.6	0.3	6.5	0.5	0.1	6.6	90
„ suszone	88.8	3.6	51.9	4.1	—	63.1	78
Melassa zwykła	78.1	—	48.0	5.4	—	54.9	87
Wysłodziny z melassa	90.0	2.7	50.5	4.6	—	60.2	81
„ z cukrem	91.8	2.0	55.2	3.4	—	67.6	80
<i>d) Odpadki przemysłu fer- mentacyjnego.</i>							
Młóto piwne świeże	23.8	3.5	12.7	3.7	1.5	8.6	86
„ „ „ suszone	90.5	13.7	48.4	14.6	6.2	32.9	84
„ gorzelnicze suszone	92.8	12.9	51.9	13.8	6.3	36.9	84
Wywar zbożowy	92.5	12.2	54.4	15.0	7.0	39.9	84
Chmiel wylugowany	89.1	3.0	28.7	4.7	4.4	22.6	83
Wywar ziemniaczany świeży	5.7	0.5	2.6	0.6	—	2.3	99
„ „ „ suszony	90.0	9.4	31.2	12.2	1.8	22.4	90
Słód zielony	52.0	3.9	39.9	5.2	1.1	35.5	96
„ suszony	92.5	5.7	71.0	7.6	1.9	64.6	96
Kielki słodowe	88.0	11.4	38.7	18.5	1.1	38.6	75
Wywar kukurydzowy świeży	8.7	1.1	5.5	1.3	0.8	3.6	90

Rodzaj paszy	Objęto- ściowość	Wartość wytwórcza		Zawartość składników strawnych surowych			Wartośćowa energetyczna pełna 100	
		sucha masa	wartość białkowa	wartość skrobiowa	surowe białko	surowe tłuszcze		ciężka wycią- gowa heksazo- towa ! wólk.
Wywar kukurydź. suszony	90.0	15.1	60.6	18.2	12.0	29.2	88	
» żytni świeży	7.8	0.9	4.8	1.1	0.3	4.1	87	
» » suszony	90.0	11.9	53.2	14.5	4.9	43.0	84	
<i>e) Wytłoczyny olejne.</i>								
Wytłok i osypka z niełuska- nego nasienia bawełny	89.5	17.1	39.2	18.1	6.1	17.4	81	
To samo z łuskanego nasienia	91.2	40.7	73.1	42.3	9.1	14.7	98	
Wytłok z orzecha ziemnego	90.2	38.7	75.7	40.0	8.3	20.8	98	
» konopny	88.0	22.6	49.0	23.9	9.0	11.9	89	
Mąka konopna odtłuszczona	89.5	25.5	35.8	27.6	2.6	12.4	86	
Wytłok z lnianki	89.5	25.5	70.7	26.4	9.2	27.8	96	
» lniany	89.0	27.2	71.8	28.8	7.9	29.7	97	
Mąka lniana odtłuszczona	89.8	31.4	64.8	32.2	3.4	30.7	96	
Wytłok makowy	88.5	26.6	66.2	28.2	11.2	17.4	95	
» palmowy	90.3	14.6	78.8	15.0	8.3	45.1	100	
Osypka palmowa odtłuszcz.	89.1	15.4	66.1	15.9	1.5	48.4	100	
Wytłok rzepakowy	90.0	23.0	61.1	27.4	8.1	23.2	95	
Mąka rzepakowa odtłuszcz.	90.0	24.4	53.3	28.9	4.0	25.2	94	
Odpadki jałowcowe	90.2	2.2	65.0	2.7	16.3	32.2	88	
Wytłok migdałowy	89.5	34.3	85.6	36.7	15.7	18.2	97	
» sezamowy	90.5	34.2	71.0	35.8	11.3	13.6	97	
» słonecznikowy	90.8	32.4	72.0	35.5	11.1	18.2	95	
IX. Wytwory i odpadki zwierzęce.								
Mąka z krwi	91.0	68.0	67.7	77.2	2.0	—	100	
» rybną chuda	87.2	43.6	44.0	47.3	1.6	—	100	
» » tłusta	89.2	40.1	64.2	43.6	11.0	—	100	
» padlinowa	93.0	24.1	—	28.9	16.2	—	70	
» mięsna	89.2	63.6	89.9	67.2	12.5	—	100	
Mleko krowie	12.3	3.3	14.7	3.3	3.4	4.6	100	
» zbierane	10.2	3.8	9.0	3.8	0.8	4.6	100	
» odtłuszczone	9.7	3.8	7.6	3.8	0.2	4.7	100	
Maślanka	9.9	3.8	9.2	3.8	1.1	4.0	100	
Chrabąszcze świeże	31.1	12.1	19.1	14.4	3.1	—	100	
» suszone	85.6	34.0	52.9	39.7	8.7	—	100	
Serwatka słodka	7.3	0.9	6.4	0.9	0.8	4.9	100	
» kwaśna	6.9	0.9	5.0	0.9	0.2	4.9	100	
Mąka wielorybia bez kości	92.7	47.1	101.6	56.1	23.8	—	100	
» » z kośćmi	94.4	38.6	86.4	46.0	20.8	—	100	

Dla ilustracji zmian, zachodzących w stosunku ciał białkowych do niebiałkowych w grupie «surowe białko» kolumna 4-a poprzedniej tablicy podajemy następujące przykłady:

Rodzaj paszy	‰ azotu w suchej substancji	Z całego azotu ‰	
		w białku	w amidach
Siano łąkowe sprzęt d. $\frac{24}{4}$. . .	4.01	78.2	51.8
» » » d. $\frac{19}{5}$. . .	2.61	81.	19.
» » » d. $\frac{10}{6}$. . .	1.96	85.2	14.8
» » » g. $\frac{26}{6}$. . .	1.35	92.5	7.5
Trawa kupkowa kwitnąca . . .	1.40	6.89	31.1
» » » dojrzała . . .	1.04	79.5	20.5
Tymotka nawożona $\frac{6}{6}$. . .	2.0	61.	39.
» nie » . . .	1.2	71.3	28.7
» nawożona $\frac{23}{6}$. . .	1.34	68.7	31.3
» nie » . . .	0.83	77.	22.9
Trawa łąkowa świeża	1.60	84.	16.
Ta sama zakons.: słodka . . .	1.89	61.4	38.6
» » kiszonka . . .	1.86	51.	49.
Kukurydza zakon. bad. $\frac{24}{11}$. . .	1.61	72.9	27.
» ta sama » $\frac{7}{12}$. . .	1.49	67.5	32.5
» » » $\frac{11}{1}$. . .	1.63	58.9	41.5
» » » $\frac{8}{2}$. . .	1.72	43.8	56.2
Kartofle nienawożone	1.14	83.4	16.6
» 2 ctn. saletry na hektar . . .	1.46	74.	26.
» 3 » » » . . .	1.80	58.7	40.3
Łubin żółty niedojrzały	7.00	78.	22.
» » dojrzały	6.84	92.5	7.5
» » odgoryczony	6.26	98.5	1.5
Melasa maximum	2.45	77.3	75.7
» minimum	1.32	24.3	22.7

Normy żywienia (t. zw. tablica III-a).

(na dobę i 1000 kg żywej wagi).

Rodzaj zwierząt	substanc. sucha w pa- szy całkow.	Wartość wytwórcza		Składniki strawne		
		wartość białko- wa	wartość skro- biowa	surowe białko	tłuszcz	bezażotowe ciała wy- ciągowe i włóknik
1. Woły dorosłe, w spo- czynku, karma zachow.	15—21	0.6—0.8	6.0	0.7	0.1	7.5—9.5
2. Woły robocze:						
przy lekkiej pracy . . .	20—25	1.1	7.4	1.3	0.3	10.6
» średniej » . . .	22—28	1.4	9.7	1.7	0.5	12.2
» silnej » . . .	25—30	1.8	12.8	2.2	0.8	14.2
3. Bydło opas. w stanie wy- rosłym	24—32	1.5—1.7	12.5—14.5	1.8—2.2	0.7	13.0—16.0
4. Krowy przy udoju:						
5 kg na 500 kg żyw. wag.	22—27	1.0—1.3	7.8—8.3	1.2—1.6	0.3	9.8—10.8
10 kg » » » » »	25—29	1.6—1.9	9.8—11.2	1.9—2.3	0.5	11.5—12.8
15 kg » » » » »	27—33	2.2—2.5	11.8—13.9	2.6—3.0	0.6	12.9—14.7
20 kg » » » » »	27—34	2.8—3.2	13.9—16.6	3.3—3.8	0.8	13.9—15.3
5. Owce dorosłe:						
karma z. ras mniejsz. lach.	18—23	1.0	8.3	1.2	0.2	10.5
» » » więcej »	20—26	1.2	9.0	1.5	0.2	11.0
6. Owce opas. wyrosłe . .	24—32	1.6	14.5	1.9	0.7	16.0
7. Konie robocze:						
przy lekkiej pracy . . .	18—23	1.0	9.2	1.2	0.4	9.8
» średniej » . . .	21—26	1.4	11.6	1.6	0.6	11.3
» silnej » . . .	23—28	2.0	15.0	2.2	0.8	13.7
8. Świnie opas. wyrosłe:						
I. period	33—37	3.0	27.5	3.9	0.7	26.0
II. »	28—33	2.8	26.1	3.3	0.5	25.0
III. »	24—28	2.0	19.8	2.6	0.4	19.0
9. Bydło rosące:						
a) Bydło mleczne i pocią- gowe.						
wiek mleśący : żywej wagi :						
2—3 70 kg.	23	3.4	18.5	3.7	2.0	13.0
3—6 140 kg.	24	2.8	14.7	3.1	1.0	13.0
6—12 240 kg.	26	2.3	12.5	2.9	0.6	12.7
12—18 320 kg.	26	1.8	10.5	2.2	0.4	12.4
18—24 400 kg.	26	1.3	9.2	1.6	0.3	12.0
b) Przyszłe bydło opasowe.						
wiek mleśący : żywej wagi :						
2—3 70 kg.	23	4.5	19.5	5.0	2.3	13.2
3—6 150 kg.	24	3.5	17.4	4.0	2.0	13.0
6—12 250 kg.	26	2.8	14.4	3.2	1.0	13.0
12—18 350 kg.	26	2.2	11.2	2.6	0.5	12.5
18—24 490 kg.	26	4.5	10.0	1.8	0.4	12.0

Rodzaj zwierząt		substanc. sucha w pa- szy całkow.	Wartość wytwórcza		Składniki strawne		
			wartość białko- wa	wartość skro- biowa	białko surowe	tłuszcz	bezasotowe ciała wy- ciągowe i wędznik
		kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.
10. Jagnięta:							
<i>a) rasy wełniste.</i>							
wiek młesący:	żywej wagi:						
5-6	28 kg.	27	3.0	16.4	3.3	0.8	15.6
6-8	33 kg.	25	2.5	13.0	2.8	0.6	13.5
8-11	38 kg.	23	1.8	10.7	2.1	0.5	11.5
11-15	41 kg.	22	1.5	10.2	1.8	0.4	11.3
15-20	45 kg.	22	1.2	9.7	1.5	0.4	11.0
<i>b) rasy mięsne.</i>							
5-6	30 kg.	28	4.5	17.2	5.0	1.0	15.8
6-8	33 kg.	27	3.5	15.4	4.0	0.7	15.0
8-11	46 kg.	26	2.5	13.8	3.0	0.5	14.5
11-15	54 kg.	25	2.0	11.4	2.4	0.4	12.5
15-20	70 kg.	24	1.5	10.2	1.8	0.4	12.0
<i>c) jagnięta opasowe</i>							
6-7	30 kg.	31	3.5	17.0	4.0	0.8	16.0
7-9	40 kg.	30	3.0	16.0	3.5	0.7	15.0
9-11	50 kg.	28	2.5	15.0	3.0	0.7	14.5
11. Świnie rosnące:							
<i>a) świnie na chów.</i>							
2-3	20 kg.	44	6.2	33.8	6.6	1.0	28.0
3-5	40 kg.	36	4.0	27.3	5.0	0.8	23.0
5-6	55 kg.	32	3.0	23.2	3.8	0.5	21.0
6-9	80 kg.	28	2.3	20.2	3.0	0.3	19.0
9-12	120 kg.	25	1.7	15.8	2.2	0.2	15.0
<i>b) świnie opasowe.</i>							
2-3	20 kg.	44	6.2	33.8	6.6	1.0	28.0
3-5	50 kg.	36	4.5	32.0	5.6	0.9	25.5
5-6	65 kg.	32	3.5	26.5	4.4	0.7	22.5
6-9	90 kg.	28	3.0	24.5	3.9	0.5	20.5
9-12	130 kg.	25	2.4	19.8	3.2	0.3	18.5

UWAGA: «Białkiem surowym» nazywamy ogólną ilość ciał azotowych i nawet niebiałkowych.

Przykłady dawek dziennych na 1000 kg. ż. w.

1. Woły. a) zimowa karma bytowa.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Wysłodzin kisz.	30	Wywar kartofl.	50	Słomy ozimej	10
Słomy owianej	10	Słomy ozimej	10	» strąkowej	10
» strączkow.	5	» jarej	8	Wysłodzin	30
Siana kon. czerw.	5			Melasy	2

4.		5.		6.	
Słomy ozimej	6	Słomy ozimej	6	Słomy ozimej	12
Plew pszennych	6	„ jarej	8	„ jarej	6
Słomy jarej	8	Kartofli	20	Łubinu odgor. św.	6
Buraków pastew.	30	Siana śred. ładn.	4	Melasy	2
Słodzin świeżych	5				

b) przy średniej pracy.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Buraków	25	Kartofli	10	Siana konicz.	2
Sieczka konicz. w.	6	Koniczyny	5	„ łąkow. śr.	6
Słomy ozimej	8	Słomy ozimej	10	Słomy ozimej	6
„ jarej	6	Owsianki	8	„ jarej	6
Makuchów rzep.	2	Otrąb pszennych	2	Śruty jęczm.	8
4.	kg.	5.	kg.	6.	kg.
Wysłodzin kwasz.	40	Kartofli	20	Siana łąkow.	10
Słomy ozimej	10	Siana koniczyn.	5	Słomy ozimej	10
Siana średniego	8	Siana łąkowego	5	Siana konicz.	5
Melasy	2	Słomy jarej	10	Łubinu odgor. św.	4
		Makuchów rzep.	2	Melasy	2

c) przy silnej pracy.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Słomy ozimej	6	Słomy ozimej	10	Słomy ozimej	5
„ jarej	6	Siana konicz.	8	Wyczanki	10
Wysłodzin	60	Wysłodzin kwasz.	50	Siana łąkowego	10
Makuchów rzepak.	2	Łubinu odg. św.	8	Kartofli	20
Śruty z bobiku	4			Śruty żytniej	4
4.	kg.	5.	kg.	6.	kg.
Słomy jarej	10	Kartofli	20	Końs. zębu św.	60
Koniczyny świeżej	80	Koniczyny siana	10	Słomy ozimej	10
Mąki past. żytniej	5	Słomy ozimej	8	Siana konicz.	5
		„ jarej	4	Śruty żytniej	2
		Makuchów rzep.	2		

II. Opasy (bydło).

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Wywaru kartofl.	100	Wysłodzin kwasz.	60	Siana koniczyn.	6
Siana łąk. średn.	8	Siana łąkow.	10	„ łąkowego	8
Słomy ozimej	4	Słomy jarej	4	Słomy ozimej	6
„ jarej	4	Otrąb żytnich	6	Wysłodzin	50
Mąki żytn. karm.	8	Makuchów rzep.	2	Słodzin	20
				Śruty jęczm.	2
				Otrąb	2

4.

Siana łąk.	10
Słomy i plew	5
Buraków past. . . .	50
Otrąb pszennych . .	4
Łubinu odg. śwież. .	8

5.

Siana łąk.	10
" koniczyn. . .	4
Słomy ozimej	6
Kartofli	40
Makuchów rzep. . .	3

6.

Kartofli*) nizko % 100	
Siana łąkow.	5
Makuchu rzep. . . .	2

III. Krowy dojne. a) średnio mleczne (7¹/₂ l.).

1. kg.

Buraków past. . . .	30
Siana ład. dobr. . . .	8
Słomy ozimej	5
" jarej	7
Otrąb pszennych . .	2
Makuchu rzep. . . .	2 ¹ / ₂

4. kg.

Wysłodzin kwasz. . .	40
Siana konicz.	8
Słomy ozimej	8
Siana łąkowego . .	4
Otrąb pszennych . .	4

2. kg.

Kartofli	20
Siana łąkow.	8
" z konicz. . . .	5
Słomy jarej	2
" ozimej	5
Makuchu lnian. . . .	2

5. kg.

Kukurydzy kisz. . .	30
Siana konicz.	8
Jęczmionki	5
Plew pszennych . .	3
Otrąb	4
Makuchu rzepak. . .	2

3. kg.

Wywaru kartof. . . .	50
Siana łąk. śred. . . .	10
Słomy jarej	10
Mąki karm. żytn. . .	3
Makuchu rzep. . . .	1

6. kg.

Prasowanki łubin. .	50
Słomy ozimej	10
Siana z seradeli . .	8
Otrąb pszennych . .	4

b) wysoka mleczność (10 litrów).

1. kg.

Buraków	50
Koniczyny siana . . .	8
Słomy oz. i plew . . .	10
Makuchu rzepak. . .	2
Otrąb pszennych . .	4

4.

Wysłodzin kisz. . . .	35
Siana łąkowego . . .	4
" konicz.	6
Owsianki	4
Plew pszennych . . .	3
Słodzin świeżych . .	20
Makuchu rzepak. . .	2 ¹ / ₂
Kielków słodow. . .	2

2. kg.

Kartofli	20
Siana esparcety . . .	10
Słomy jarej	5
" ozimej	4
Słodzin	20
Kielków słodow. . .	2

5.

Wysłodzin kisz. . . .	40
Siana konicz.	10
Słomy i plew	5
Makuchu konopn. . .	2
Sruty hobikowej . .	2

3. kg.

Wywaru i kart. . . .	75
Siana łąk. śred. . . .	8
Słomy różnej	10
Bobiku śruty	2
Otrąb pszennych . .	4

6.

Kiszonki z liści bur. .	40
Siana konicz.	10
Jęczmionki	8
Melasy	2
Otrąb	2
Makuchu lnian. . . .	2

*) Żywienie samemi kartoflami ad libitum, a zatem karmą 1:14 uważamy za zupełnie nieracjonalne, nie daje bowiem przyrostu żywej wagi, tylko nieco tłuszczu.

IV. Młodzież bydła ras mlecznych.

a) w wieku 2—3 m., średnio ż. w. 70 kg. na sztukę.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Mleka zbieran.	4	Mąki groch.	0.5	Śruty jęczm.	0.75
Siana łąk. młod.	1	Siana łąkow.	1.25	Siana łąk.	1
Owsa	0.5	Owsianej mąki	0.5	Kielków słodow.	0.5
Siemienia lnian.	0.25	Siemienia lnian.	0.25	Siemienia lnian.	0.3

b) w wieku 3—6 m., przy żyw. wadze śred. 140 kg. na sztukę.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Siana łąkowego	2	Siana młodego	2	Siana łąk. młod.	2
Owsa	1	Owsa	1	Buraków	3
Otrąb żytnich	0.5	Kielków słod.	0.5	Śruty jęczmien.	1
Makuchu lnian.	0.75	Makuchu lnian.	0.5	Makuchu lnian.	0.75

c) w wieku 6—12 m., przy ż. w. 220 kg. na sztukę.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Buraków	4	Kartofli	3	Siana łąkowego	3
Siana łąkowego	3	Siana łąk.	4	„ konicz.	2
Owsianki	2	Słomy jarej	2	Owsianki	1
Plew	1	Makuchu rzep.	0.75	Śruty jęczmiennej	2
Kielków słodow.	0.5				
Makuchu rzep.	0.25				

V. Młodzież bydła ras mięsnych.

a) w wieku 3—6 m., śred. ż. w. 150 kg. na sztukę.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Siana łąk. młod.	2	Siana łąk. młod.	25	Siana łąk.	3
Owsa	1	Marchwi	30	Buraków	3
Otrąb żytnich	1	Śruty grochowej	1	Kielków słodow.	0.5
Makuchu lnianego	0.5	Makuchu lnianego	0.5	Owsa	0.5
				Makuchu lnianego	0.25

b) w wieku 6—12 m., śred. ż. w. 250 kg. na sztukę.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Buraków	4	Wysłodzin	10	Kartofli	3
Siana łąk.	4	Siana łąk.	4	Siana	3
Słomy jarej	2	Słomy jarej	2	Wyczanki	2
Makuchu lnian.	1	Owsa	1	Owsa	0.5
Owsa	1	Makuchu rzepak.	0.5	Makuchu lnian.	1.0
		„ lnian.	0.5	Otrąb żytnich	0.5

c) w wieku 12—18 m., śred. ż. w. 340 kg. na sztukę.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Buraków	10	Wysłodzin kisz.	10	Kartofli	4
Siana średn.	3	Siana łąk. śred.	4	Siana koniczyn.	2
Słomy strączk.	3	Słomy jarej	3	Siana łąk.	2
„ jarej	2	Owsa	1	Słomy jarej	2
Makuchu rzepak.	1	Kielków słod.	0.5	Śruty jęczmien.	1½
Mąki karm. żytn.	0.5	Makuchu rzep.	0.75	Makuchu rzep.	1

VI. Owoce cienko waluiste na 1000 kg. ż. w.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Słomy strączkow.	10	Buraków	20	Kartofli	15
Siana koniczyn.	5	Siana łąk. II	10	Siana łąk. II	10
Siana łąk. II	5	Słomy	12	Siana przelotu	5
Słomy ozimej	10	Strączyn rzep.	5	Słomy ozimej	12
Łubinu	2	Otrąb	2.5		
		Makuchu rzepak.	0.5		

VII. Prosięta opasowe na 10 szt. w wieku:

1a. 2—3 m. 20 kg. ż. w.		1b. 3—5 m. śred. ż. w.		1c. 5—7 m. ż. w. 65 kg.	
	kg.		50 kg. kg.		kg.
Mleka chudego	20	Mleka odtłuszc.	30	Mleka odtłuszc.	40
Śruty jęczmiennej	4	Kartofli	30	Kartofli	50
Kukurydzy	2	Otrąb żytnich	4	Otrąb żytnich	4
Grochu	2	Śruty jęczmiennej	4	Mąki jęczm. karm.	2
2a.		2b.		2c.	
Mleka niezbiaran.	15	Kartofli	40	Buraków	30
Śruty jęczmiennej	4	Grochowej mąki	6	Kartofli	30
Grochu	3	Śruty jęczmiennej	5	Grochowej mąki	4
Otrąb żytnich	1	Mąki mięsnej	0.5	Otrąb żytnich	5
				Mąki jęczm. karm.	3
				Makuchu lnianego	1

VIII. Tuczniki 8—10 m., wagi począt. 100 kg. na sztukę.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Mleka chudego	1	Kartofli	5	Kartofli	5
Serwatki	3	Śruty jęczmiennej	1	Śruty jęczmiennej	1.5
Śruty jęczmienn.	0.5	Śruty kukurydzy	1	Mąki karm. żytn.	1
Mąki pastewnej	1.0	Grochu	1	Mąki mięsnej	0.3
Kartofli	4.0				
Grochu	0.5				

IX. Konie, średnia praca (1,000.000 kgm. pracy konia wagi 450 kg.) na 1.000 kg. ż. w.

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Owsa	6	Owsa	9	Kukurydzy	10
Siana łąkow.	15	Siana łąkow.	10	Siana łąkow. śr.	6
Siana koniczyny	5	Siana koniczyny	6	Siana koniczyny	6
Słomy ozimej	2	Słomy ozimej	4	Słomy ozimej	3
				Makuchu rzepak.	1
4.		5.		6.	
Kartofli	18	Marchwi	20	Owsa	7
Siana łąkow.	10	Siana łąkow.	10	Kukurydzy	3
Słomy ozimej	3	Słomy ozimej	3	Siana łąkow.	5
Makuchu	2	Śruty żytniej	3	Słomy jarej	3
Mąki karm. żytn.	4	Śruty bobikowej	3	Słomy owsianej	2
				Śruty bobikow.	2
				Makuchu	2

Silna praca ($1\frac{1}{2}$ —2,000.000 kgm. pracy konia 450 kg. ż. wagi).

1.	kg.	2.	kg.	3.	kg.
Owasa	18	Owasa	5	Owasa	8
Siana łak. śred.	6	Kukurydzy	8	Żyta	8
Słomy owsianej	3	Siana łak.	8	Siana łakow.	4
Bobiku	2.5	Siana koniczyny	4	Siana koniczyny	4
		Słomy ozimej	3	Słomy jarej	3
		Makuchu	2	Makuchu rzepak.	1
				Makuchu lnianego	1

Normy przyjęte w stadzie państwowem w Mezöhegyes.

Rodzaj zwierzęcia	Kg. na sztukę		
	owasa	siana	słomy jarej
Żrebięta od 3 do 6 tygodni	0.3	—	—
„ „ 7 tyg. do odsadzenia ($\frac{1}{2}$ roku)	1	—	—
„ „ odsadzone od $\frac{1}{2}$ —1 roku	2.25	4	2
Ogierki roczniaki przy pastwisku	2	1	2
„ „ w stajni	3	4	4
„ 2-letnie przy pastwisku	1.5	1	2
„ „ w stajni	3	5	4
Ogiery 3-letnie przy pastwisku	2	1	2
„ „ po wzięciu na stajnię	4.5	6	—
„ „ stadne w zwykłym czasie	4.5	5	2
„ „ podczas stanowienia	5	6	—
Klaczki 1-roczne przy pastwisku	2	1	2
„ „ na stajni	3	4	4
„ 2-letnie przy pastwisku	1.5	1	2
„ „ na stajni	2.5	5	4
Klaczki 3—4-letnie przy pastwisku	2	1	2
„ „ na stajni	3	5	4
„ „ po wzięciu na stajnię	4	5	—
„ „ od przyjęcia do stada do 5 lat w.	5	5	—
„ „ stadne bez źrebiąt przy pastwisku	—	3	3
„ „ „ na stajni	2	6	8
„ „ źrebne przy pastwisku	2	3	4
„ „ „ na stajni	2.5	8	5
„ „ ze źrebiętami przy pastwisku	2.5	3	3
„ „ „ na stajni	3	8	6
„ „ czasami zaprzęgane	5	8	3
Służbowe konie zaprzężne	5	8	3
„ „ wierzchowe	3.5	5	2
Konie przeznaczone na sprzedaż	5	6	—

Do częściowej zamiany owsa innym pokarmem uważa się 1 kg. owsa za równoważnik 2 kg. siana, 0.75 kg. jęczmienia, 0.75 kg. otrąb, 0.60 kg. kukurydzy, 0.60 kg. bobiku, 8 kg. zieleniny.

Okopowe używają jako dodatek (po odjęciu w zamian czegoś z owsa).

Pastwisko odrywa w hodowli niezmiernie ważną rolę, pomimo to często niebywa należycie doceniane. Wychowywać młodzię do jakiegokolwiek użytku przeznaczoną bez pastwiska stale jest wprost niepodobieństwem. Bez ruchu na świeżem powietrzu, bez słońca młodzię musi się rozwinąć nienormalnie: zanikają organa ruchu, oddychanie staje się mniej głębokiem, obieg krwi, tętno wolniejsze i słabsze, czynność skóry jako regulator ciepła słabnie. cała przemiana materji bardziej upośledzona. Stąd wrażliwość nadmierna na wpływy zewnętrzne, mała odporność i stopniowe wyrodnienie (degeneracya). Czas jakiś mogą się ujawnić złe skutki tego przeciwnego naturze wychowu, ale ukażą się się niechybnie pod postacią chorób różnych, upośledzonej płodności itp. Najdalej posunięto wyłączenie ruchu w chowie świń angielskich, u nich też najwyraźniej występują skutki tego przechodowania, co jest poprostu zwyrodnieniem, dobieganiem rasy do kresu. Nawet dla zwierząt wprost na opas przeznaczonych, ruch za młodu jest koniecznym dla normalnego rozwoju mięśni, co się w lepszym wydatku mięsnym ujawnia.

Pastwisko nadto daje nam w najtańszej postaci najcenniejsze azotowe pokarmy w młodej roślinności. Gdy pastwisko jest niedostateczne, to lepiej jest zwierzęta w domu dokarmiać, niż nie paść ich wcale. Najgorsze są pastwiska na niskich, ubogich ziemiach t. z. kwaśne. Rośliny na nich rosnące zawierają nieraz nawet sporo składników odżywczych, ale w formie mniej strawnej, przede wszystkim zaś okazują brak w pożytecznych składnikach mineralnych, a głównie wapna (rzadziej kwasu fosforowego). Pastwiska suche dają paszę zbyt zdrewniałą, trudniej strawną. Najlepsze są na gruntach ciepłych, żyznych, silnie naświetlonych stokach gorskich, a w każdym razie tylko na glebie obfitującej w wapno.

Dla trzody chlewnej najlepsze jest pastwisko z koniczyny czerwonej, tak podzielone i użytkowane, by na niem zawsze młoda roślinność się znalazła. Odpowiednio używane wystarczy do wyżywienia 30—40 wieprzaków 6—12 miesięcznych na przestrzeni 1 ha na 4 miesiące. Pole dla trzody podzielić najlepiej na części, przyczem na działkach 1 2 3 kolejno się pasie, z działków 4 5 6 sprząta wezwanie na zielono, z działków 7 8 9 na siano i następnie używa na pastwisko.

1	2	3
6	5	4
7	8	9

Pastwisko, wystarczające dla wyżywienia bydła (500 kg.) lub owiec (40 kg.) przez lato, oblicza się z ilości spodziewanego z hektara zbioru siana z uwzględnieniem dni pasienia. Wystarczy 1 ha, względnie 1 mórg pastwiska, na 150 dni dla wymienionej obok ilości sztuk przy spodziewanym zbiorze siana w ctn. metr.

Rodzaj pastwiska	Wyżywi sztuk		Spodziewany zbiór siana	
	1 ha.	1 mg.	z 1 ha.	z 1 mg.
Wypasowe dobre	2.3—2.9	bydła 1.3—1.7	55—70	ctn. 32—40
Bydłące b. dobre	1.9—2.3	» 1.1—1.3	45—55	» 26—32
» dobre	1.5—1.9	» 0.9—1.1	35—45	» 20—26
» średnie	1—1.5	» 0.5—0.9	25—35	» 14—20
Owcze dobre	8.7—11.5	owiec 5.0—6.5	25—35	» 14—20
» średnie	6—8.7	» 3.5—5.0	15—25	» 9—14
» łącze	2.5—6	» 1.4—3.5	6—15	» 3.5—9
» b. nędzne	1—2.5	» 0.5—1.4	3—6	» 1.8—3.5

Bydło mleczne. Dobra dójka winna w ciągu roku dać minimalnie ilość mleka = pięciokrotnej swej żywej wagi. Np. ważąca 500 kg. — 2500 kg. = 2427 mleka. Mleczność dochodzi swego maximum po 5 m. cielęcia, poczem zwykle spada. Średni skład mleka krowiego i siary (kolostrum) jest następujący:

	Mleko: od do	średnio	Siara: średnio
Wody	83—90 ⁰ / ₀	87.5	74.1
Tłuszczu	0.8—8 ⁰ / ₀	3.4	2.5
Sernika	2—4.5 ⁰ / ₀	3.1	2.8
Albuminu itp.	0.2—0.9 ⁰ / ₀	0.7	16.5
Cukru mlek.	3.0—6.0 ⁰ / ₀	4.5	3.0
Popiołu	0.6—0.9 ⁰ / ₀	0.7	1.1

Średni ciężar właściwy mleka przy 15° C. = 1.03 (1.027—1.035). Litr waży 1.03 kg. Temperatura zmaslenia podkwaszonej śmietany 15—17° C., słodkiej 11—13° C. Dobre oddzielenie tłuszczu na wirówce ponad 90⁰/₀ czyli z pozostawieniem 0.3⁰/₀ tłuszczu w mleku chudym (mx.). Z mleka średniego, przy odebraniu 16⁰/₀ śmietany, otrzymamy ze 100 kg. mleka, 84 kg. mleka chudego, 3.6 kg. masła, 12.4 kg. maślanki, a w nich:

	16 kg. śmietanki	84 kg. mleka chudego	12.4 kg. maślanki	3.6 kg. maśła
Wody	11.24	76.06	10.89	0.53
Tłuszczu	3.13	0.27	0.13	3.00
Sernika	0.51	2.69	0.60	0.07
Albuminu	0.11	0.59	0.10	
Cukru mlek.	0.72	3.78	0.68	
Popiołu	0.11	0.59	0.10	

Produkcya mięsa. Spożycie pokarmu i możność osadzenia z niego pewnej części w ciele jako przyrostu są znakomicie większe u zwierząt młodych, niż u dorosłych. Zdolności te największe u ssawców z wiekiem maleją. Najlepszym producentem mięsa jest młodzię.

Ciele w wieku do 4-ech tygodni potrzebuje do swego rozwoju $\frac{1}{8}$ do $\frac{1}{7}$ swojej żywej wagi mleka, a gdy należy do ras mięsnych, to nawet $\frac{1}{6}$ do $\frac{1}{5}$. Ze spożytego w mleku białka ulega rozkładowi tylko około 25%, reszta może przejść do przyrostu. Z bezazotowych składników mleka pozostaje w organizmie cielęcia około $\frac{1}{3}$ części. Przyrost dzienny w pierwszych 4 tygodniach życia może przenosić 2% z. w. W następnych 4 tygodniach spada do 1%.

Pożywienie prostą na opas w wieku około 5 miesięcy stawianych, powinno mieć stosunek 1:5, a stopniowo przechodzić do 1:7, a nawet 1:8. Maximum zużycia białka dzienne wynosi w tym wieku 0.5% z. w. Większe dawki nie dają korzystnego efektu. Przyrost dzienny na młodych tucznikach bardzo dobry dochodzi do 1 $\frac{1}{2}$ % z. w., średni 1%. U starszych, rocznych mx. przyrostu dziennego wynosi 0.75% z. w.

Bydła opasowe i skopy niezbyt stare dają przyrostu przy odpowiednim żywieniu 0.20%. Wynikiem bardzo dobrym będzie przyrost dzienny 0.30%. Młode pasione mogą dać do 0.40% jako mx. przyrostu dziennego w stosunku do swojej żywej wagi.

Waga rzeźna w stosunku do żywej.

Wół chudy w. rz.	48 $\frac{0}{0}$	w. żyw.	Skop średn. utrzym. cienki	43 $\frac{0}{0}$	
Krowa chuda w. rz.	45 $\frac{0}{0}$	» » » »	» » » »	mięśny 46 $\frac{0}{0}$	
Wół dobrze trzymany	50 $\frac{0}{0}$	w. ż.	» » » »	podpasiony cienki 47 $\frac{0}{0}$	
Krowa » » » »	48 $\frac{0}{0}$	» » » »	» » » »	mięśny 53 $\frac{0}{0}$	
Wół podpasiony w. rz.	56 $\frac{0}{0}$	» » » »	» » » »	utuczony cienki 54 $\frac{0}{0}$	
Krowa » » » »	53 $\frac{0}{0}$	» » » »	» » » »	mięśny 59 $\frac{0}{0}$	
Wół utuczony » » » »	60 $\frac{0}{0}$	» » » »	» » » »	Świnie popr. niżej roku podp. 70 $\frac{0}{0}$	
Krowa » » » »	57 $\frac{0}{0}$	» » » »	» » » »	» » » »	75 $\frac{0}{0}$
Ciele chude » » » »	58 $\frac{0}{0}$	» » » »	» » » »	niżej » tucz. 77 $\frac{0}{0}$	
» tłuste » » » »	65 $\frac{0}{0}$	» » » »	» » » »	wyżej » » 82 $\frac{0}{0}$	

Na 1 kg. mięsa wypada w gramach z wołu:

tłustego	356	mięsa	289	tłuszczu	390	wody
chudego	308	»	81	»	597	»
	+ 48	»	+ 158	»	- 207	»

Udział poszczególnych części ciała w wadze żywej zwierząt.

Na 100 ż. w. przypada na	W ó ł				S k o p				Świnia		Ciele tuste	
	chudy	średnio utrzymany	podpaślonny	tłusty	chudy	średnio utrzymany	podpaślonny	tłusty	b. tłusty	podpaślonna		utuczona
Krew	5.0	4.7	4.2	3.9	3.9	3.9	3.6	3.2	3.2	7.3	3.6	4.8
Skórę, łeb, rogi Wnętrznosci oczyszczone	14.4	13.7	12.4	10.7	24.0	22.8	20.0	18.0	16.1	—	—	13.5
Mięso i tłuszcz	46.0	49.7	58.6	64.8	46.3	49.4	54.3	59.6	65.1	74.5	84.6	62.4
Zawart. kiszek	20.2	18.0	15.0	12.0	16.0	15.0	14.0	12.0	10.0	7.0	5.0	7.0
Wagę rzeźną stanowią w % żywej wagi:												
Mięso	34.6	36.0	38.0	35.0	33.2	33.5	33.1	29.0	27.0	46.0	40.0	43.0
Tłuszcz w mię- sie	1.0	2.0	7.9	11.7	2.0	3.3	8.0	14.7	20.5	16.5	32.4	5.5
Tłuszcz trzewi razem	2.3	4.3	4.5	8.0	4.0	6.0	7.3	10.4	12.4	3.6	6.4	4.6
Kości	8.1	7.4	7.3	7.1	7.1	6.6	5.5	5.5	5.2	8.0	5.8	9.3
Waga rzeźna t. z. mięso razem	46	49.7	58.6	64.8	46.3	49.4	54.3	59.6	65.1	74.5	84.6	62.4

Skład mięsa z różnych części ciała w %.

	Wół chudy			Wół tłusty		
	szyja	krzy- żówka	żebro przedn.	szyja	krzy- żówka	żebro przedn.
Woda	77.5	77.4	76.5	73.5	63.0	50.5
Tłuszcz	0.9	1.1	1.3	5.8	16.7	34.0
Popiół	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0
Substancja mięsna	20.0	20.3	21.0	19.5	18.8	14.5
Sucha substancja	22.5	22.6	23.5	26.5	36.6	49.5

Przyjmując (Wolff) wartość tłuszczu w mięsie o 25% wyższą niż substancji mięsnej wypadnie wartość użytkowa najlepszego mięsa z tłustego wołu dwa razy wyższa, niż poszczególne gatunki, najlepsze chude będzie mniej pożywne, niż najgorsze z tuczono-
nego zwierzęcia. Uwzględnienie smaku wymaga, by ceny gatun-
kowe mięsa były bardzo różne (w Anglii najlepsze jest 4 razy
droższe od ostatniego z tegoż wołu). Mięsne rasy mają właśnie
te części ciała, dające najlepsze mięso, silnie rozwinięte.

Grzanie się (latowanie) samic.

Rodzaj zwierząt	Trwanie okresu	Powrót po niezapłodnieniu	Powrót po porodzie
Klacz	5—7 dni	3—4 tygodni	5—9 dni
Krowa	2—3 „	3—4 „	21—28 „
Owca	2—3 „	17—28 dni	7 miesięcy
Świnia	2—4 „	9—12 „	4—5 tygod. m. × 9 tyg.

Kalendarz do obliczania terminów porodu.

Trwanie ciąży — siedzenie na jajach.

Klacz	48 $\frac{1}{2}$ tygod.	340 dni	średnio (wahania od 307—412 dni).
Krowa	40 $\frac{1}{2}$ „	284 „	„ „ 240—311 „
Owca	22 „	152 „	„ „ 146—157 „
Świnia	16 „	116 „	„ „ 112—120 „
Suka	9 „	63—65 dni.	Kotka 8 tygodni, 46—60 dni. Kury siedzą średnio 21 dni (19—24) dni. Gołębie 18—19 dni. Indyki 26—29 dni. Kaczki 28—32 dni. Gęsi 28—33 dni.

Zajście w ciążę	Klacz 340 dni	Krowa 285 dni	Owca i koza 154 dni	Świnia 120 dni
1 stycz.	6 grud.	12 paźdz.	3 czerw.	30 kwiet.
6 „	11 „	17 „	8 „	5 maja
11 „	16 „	22 „	13 „	10 „
16 „	21 „	27 „	18 „	15 „
21 „	26 „	1 listop.	23 „	20 „
26 „	31 „	6 „	28 „	25 „
31 „	5 stycz.	11 „	3 lipca	30 „
5 luty	10 „	16 „	8 „	4 czerw.
10 „	15 „	21 „	13 „	9 „
15 „	20 „	26 „	18 „	14 „
20 „	25 „	1 grud.	23 „	19 „
25 „	30 „	6 „	28 „	24 „
2 marca	4 luty	11 „	2 sierp.	29 „
7 „	9 „	16 „	7 „	4 lipca
12 „	14 „	21 „	12 „	9 „
17 „	19 „	26 „	17 „	14 „
22 „	24 „	31 „	22 „	19 „
27 „	1 marca	5 stycz.	27 „	24 „
1 kwiet.	6 „	10 „	1 wrzes.	29 „
6 „	11 „	15 „	6 „	2 sierp.
11 „	16 „	20 „	11 „	8 „
16 „	21 „	25 „	16 „	13 „
21 „	26 „	30 „	21 „	18 „
26 „	1 kwiet.	4 luty	26 „	23 „

Zajście w ciężę	Klacz 340 dni	Krowa 285 dni	Owca i koza 154 dni	Świnia 120 dni
1 maja	5 kwiet.	9 luty	1 paźdz.	28 sierp.
6 »	10 »	14 »	6 »	2 wrześ.
11 »	15 »	19 »	11 »	7 »
16 »	20 »	24 »	16 »	12 »
21 »	25 »	1 mar.	21 »	17 »
26 »	30 »	6 »	26 »	22 »
31 »	5 maja	11 »	31 »	27 »
5 czerw.	10 »	16 »	5 listop.	2 paźdz.
10 »	15 »	21 »	10 »	7 »
15 »	20 »	26 »	15 »	12 »
20 »	25 »	31 »	20 »	17 »
25 »	30 »	5 kwiet.	25 »	22 »
30 »	4 czerw.	10 »	30 »	27 »
5 lipca	9 »	15 »	5 grud.	1 listop.
10 »	14 »	20 »	10 »	6 »
15 »	19 »	25 »	15 »	11 »
20 »	24 »	30 »	20 »	16 »
25 »	29 »	5 maja	25 »	21 »
30 »	4 lipca	10 »	30 »	26 »
4 sierp.	9 »	15 »	4 stycz.	1 grudz.
9 »	14 »	20 »	9 »	6 »
14 »	19 »	25 »	14 »	11 »
19 »	24 »	30 »	19 »	16 »
24 »	29 »	4 czerw.	24 »	21 »
29 »	3 sierp.	9 »	29 »	26 »
3 wrześ.	8 »	14 »	3 luty	31 »
8 »	13 »	19 »	8 »	5 stycz.
13 »	17 »	24 »	13 »	10 »
18 »	23 »	29 »	18 »	15 »
23 »	28 »	4 lipca	23 »	20 »
28 »	2 wrześ.	9 »	28 »	25 »
3 paźdz.	7 »	14 »	5 marca	30 »
8 »	12 »	19 »	10 »	4 luty
13 »	17 »	24 »	15 »	9 »
18 »	22 »	29 »	20 »	14 »
23 »	27 »	3 sierp.	25 »	19 »
28 »	2 paźdz.	8 »	30 »	24 »
2 listop.	7 »	13 »	4 kwiet.	1 mar.
7 »	12 »	18 »	9 »	6 »
12 »	17 »	23 »	14 »	11 »
17 »	22 »	28 »	19 »	16 »
22 »	27 »	2 wrześ.	24 »	21 »
27 »	1 listop.	7 »	29 »	26 »
2 grud.	6 »	12 »	4 maja	31 »
7 »	11 »	17 »	9 »	5 kwiet.
12 »	16 »	22 »	14 »	10 »
17 »	21 »	27 »	19 »	15 »
22 »	26 »	2 paźdz.	24 »	20 »
27 »	1 grud.	7 »	29 »	25 »
31 »	5 »			29 »

Trwanie ssania przy chowie.

Żrebięta . . .	3—5 miesięcy	Jagnięta . . .	2—4 miesięcy
Cielęta . . .	1 ¹ / ₂ —3	Prosięta . . .	5—8 tygodni.

Ciele rasy mlecznych wymaga mleka pełnego 1/7—1/8 swej wagi dziennie. Cielęta rasy mięsnych 1/5—1/6. Mleka pełnego 10—12 kg daje 1 kg. przyrostu cielęcia, mleka chudego 15—20 kg. daje 1 kg. przyrostu. Właściwie zużywa ciele w pierwszych dwóch tygodniach wieku na utworzenie 1 kg. przyrostu 1.04 kg. suchej substancji mleka, później średnio 1.25 kg. s. s. mleka.

Jak otrzymać mleko dobrej jakości.

Dobroć mleka zależy od pory i od sposobu jego wydobycia. Najlepsze mleko otrzymuje się w porze wiosennej, w końcu czerwca, w maju i w październiku. W czasie zimy mleko jest gorsze, a w lato w czasie suszy też jest gorsze. Dobroć mleka zależy także od pory dnia, w której jest ono wydobyte. Najlepsze mleko otrzymuje się w godzinach rannych, w porze zimowej w południe, a w porze letniej w godzinach wieczornych. Dobroć mleka zależy także od sposobu jego wydobycia. Najlepsze mleko otrzymuje się przy pomocy rączki, a nie przy pomocy maszyn. Dobroć mleka zależy także od sposobu jego przechowywania. Najlepsze mleko otrzymuje się przy pomocy butelek i słoików, a nie przy pomocy beczek. Dobroć mleka zależy także od sposobu jego podania. Najlepsze mleko otrzymuje się przy pomocy kielicha, a nie przy pomocy lejka.

Wskazówki z zakresu mleczarstwa

opodał Dr. TADEUSZ RYLSKI, dyrektor krajowej szkoły mleczarskiej w Rzeszowie.

Skład i ciężar właściwy mleka.

Procentowy skład mleka jest następujący:

Wody	od 83—91, w przecięciu	87·8	
Tłuszczu	» 2—8, »	3·4	sucha masa . 12·0
Ciał białkowych	» 2—4·5 »	3·4	
Cukru mlekowego	» 3—6·6 »	4·7	
Soli mineralnych	» 0·6—1·0 »	0·7	

Stosownie do składu mleka zmienia się także jego ciężar właściwy, który u poszczególnych krów waha w granicach 1·028—1·035, w mleku zaś całych obór od 1·029—1·033. Jako średni ciężar właściwy przyjmuje się 1·03165 (wszystko przy 15° C.).

Jak otrzymać można dobre mleko.

Dobroć mleka zależy od paszy i od postępowania z niem przed i po wydoju.

1) **Pasza:** Na skład mleka (o ile krowy są dostatecznie żywione), wywiera pasza wpływ bardzo ograniczony. O ile jednak ten wpływ istnieje, przyjęć można, że na ilość tłuszczu w mleku wpływają dodatnio: makuchy kokosowe, palmowe, słonecznikowe, z ziarna dyni i bawełny — natomiast ujemny wpływ na zawartość tłuszczu w mleku wywierają: mąka żytnia, sruutowany jęczmień, dalej pasze wodniste, a ubogie w meterye azotowe (wytłoki, buraki, ziemniaki, bulwy, kapusta, rzepa, brukiew), zwłaszcza jeśli je spaszamy bez dostatecznego dodatku pasz treściwych.

Na jakość mleka i jego produktów wywiera pasza wpływ znaczny.

Dodatnio na smak mleka oddziałują: zielona koniczyna, lucerna i esparseta, trawa ze słodkich łąk, marchew, srutowy jęczmień (z mniejszą ilością tłuszczu ale powiększa zawartość cukru mlekowego), owies gnieciony (nadaje mleku smak orzechów) i dobra mąka ryżowa.

Ujemnie na smak mleka oddziałują: znaczniejsze ilości słomy, zwłaszcza źle zebranej, dziki czosnek w trawie, sianie, lub słomie się znajdujący, siano, zawierające dużo rdestów (wywołuje krwawe mleko), zbyt wielkie ilości buraków pastewnych, liści i głów buraków cukrowych, świeżych i zakwaszonych, wytłoków buraczanych, a dalej większe ilości jak 4—6 kg. ziemniaków surowych, rzepy, kapusty i t. p. Z pasz treściwych makuchy rzepakowe rozgotowane lub namoczone w wodzie, a nawet suche spaszane w większej ilości, jak 1 kg na sztukę i makuchy lniane, zadawane w ilości większej jak 2 kg. — wreszcie wszelkie pasze nadgniłe lub zapleśniałe.

Również wszelka zepsuta lub fermentowana pasza wpływa ujemnie na jakość masła, a przedewszystkiem serów — dalej ujemnie na te produkty działa: sruutowany bób, wyka, groch, łubin nieodgoryczony, hreczka (zarówno na zielono, w sianie, jak w ziarnie); nadmierne ilości białej gorzycy, ziemniaków i brahy, kapusty, buraków, wytłoków, pulpy, wreszcie zła, nie-

czysta woda. Brukiew nadaje masłu i mleku właściwy smak nieprzyjemny, który jednak przez pasteuryzowanie usunąć można.

Natomiast wiadomo, że specjalny aromat, jaki posiada masło z paszy wiosennej, jest wywołany częściowo przez aromatyczne zioła (pasza górską). Jak na smak, również i na konsystencję masła wywierają niektóre pasze silny wpływ i tak powodują

Konsystencję twardą:	Konsystencję mięką :
Groch	Makuchy rzepakowe
Wyka	„ słonecznikowe
Otręby żytnie	Owies (w dużych ilościach)
Makuchy lniane	Kukurydza
z nas. bawełnianego	Hreczka
palmowe	Otręby pszenne.
Liście, głowy i wytloki buraczane	
Surowe kartofle	
Pastwiska przepasione (dużo twardych łodyg traw)	
Rzepa.	

Wiadomość tę w praktyce wyzyskuje się w ten sposób, że w porze zimowej podawać można makuchy rzepakowe, aby masło nie było zbyt twarde, w porze letniej lniane, aby masło zbyt się nie rozplyało.

Najlepszą jakość mleka i masła uzyskamy, gdy w paszy zimowej ograniczyć się możemy na dobrem sianie, siewce owianej lub jęczmiennej, miernych ilościach baraków, lub marchwi pastewnej, otrębach pszennych lub makuchach rzepakowych (suchych).

2) Postępowanie przy i po wydojeniu. Starać się przedewszystkiem należy o możliwie największą czystość. A więc przedewszystkiem samo dojenie odbywać się powinno w czystej, wentylowanej oborze — świeża zmieniana ściółka — (byle nie tuż przed dojeniem) czysto utrzymane krowy (ogony krów dobrze jest przy dojeniu podwiązywać) — mycie wymion i sąsiednich części podbrzusza, ale tak, aby podczas dojenia były już zupełnie wyschnięte — mycie rąk dojarki — mycie, wyparzenie naczyń (używać najlepiej blaszanych) — zdajanie pierwszych strzyków mleka osobno jako najwięcej zanieczyszczonych — wreszcie wyniesienie mleka natychmiast po wydojeniu z obory.

Jeśli mleka nie przerabia się natychmiast na miejscu, tylko musi się dalej transportować, nieodzownem jest poświęcenie jednej z chłodnych izb w budynkach gospodarczych (lub piwnic, hyle suchych i wentylowanych) wyłącznie do przechowywania udojów. Lokal taki powinien być tak wybrany, aby mleko znajdowało tam ochronę przed szkodliwymi wpływami. Nie powinien zatem być w żadnym bezpośrednim związku z oborą, zdaleka od gnojowiska i t. p., okno zwrócone na północ, aby mleko usunąć ile możności od bezpośredniego ogrzania promieniami słońca. Z drugiej strony potrzebny jest piec, aby w mrozy zimowe chronić mleko od zamarzania i nadać mu taką temperaturę, aby również w czasie transportu nie zamarzło. Naturalnie głównym warunkiem dobrego lokalu jest możliwość utrzymania czystości (podłoga z gładkiego nieporowatego materiału: szlifo-

wany beton, asfalt, płytki szamotowe gładkie — dobry odpływ dla wody — ściany z cementowym narzutem, jeśli możliwe, pociągnięte farbą emaliową jasną do zmywania — powłoka: płaskie sklepienie na trawersach, również z narzutem cementowym — dobra wentylacja — łatwość doprowadzenia wody do budynku w większej ilości)

W izbie tej wykonuje się dwie roboty: cedzenie i chłodzenie. Cedzenie, jeśli ma rzeczywiście przyczynić się do możliwie dokładnego usunięcia grubszych części brudu, powinno:

I-o. Zostać wykonane jak najszybciej po wydojeniu, zanim brud ten się zdola rozpuścić.

II-o. Mleka przed cedzeniem nie należy gwałtownie przelewać i klócić, aby pył i grudki nawozu nie rozbiły się na drobniejsze części, które przez sita przechodzą.

III-o. Przedmiot, przez który się cedzi, musi być po każdorazowym użyciu jyk najstaranniej oczyszczony i musi być tego rodzaju, aby wogóle istniała możliwość oczyszczania go.

Plótna (barchan) po każdorazowym użyciu starannie wyprać w ciepłej wodzie, kilkakrotnie przepłukać, wygotować i szybko wysuszyć.

Z sit od tkanych z drutu, lepsze t. z. Themannowskie (blacha z wycięciami węzłowatymi). Bardzo dobre sita z wkładami wacianymi (cedzić przez nie należy jeszcze ciepłe mleko).

Chłodzić należy — zwłaszcza w porze ciepłej — do możliwie najniższej temperatury (najmniej 10° C). Jeżeli jest znaczna ilość wody do dyspozycji, zwłaszcza ze źródeł wyżej położonych, chłodzić można przez wstawienie naczyń z mlekiem do basenów betonowych z przepływającą zimną wodą, przyczem powierzchnia wody powinna być nieco wyżej jak mleka.

Naczynia w czasie chłodzenia powinny być otwarte, inaczej mleko nabiera silnego zapachu stajennego. Przy tym sposobie chłodzenia, przed wstawieniem w wodę, należy mleko kilkakrotnie przelać z naczynia do naczynia, aby się przewietrzyło.

Lepszym jest chłodzenie zapomocą chłodziaków rurowych lub talerzowych (dopływ wody u dołu), które mają tę wyższość, że mleko szybko chłodzą i równocześnie bardzo dokładnie je przewietrzają.

Do chwili wysyłki przechowuje się mleko w tej izbie dbając o jak najniższą temperaturę, czyste, wolne od pyłu powietrze i o to, aby naczynia były przykryte (np. plótnem) ale nie zamknięte szczelnie.

W czasie transportu starać się należy, aby mleko się nie nagrzewało, zwłaszcza w porze letniej, (wozy zamknięte z lodem, przykryte plótnem zwilżonym lub słomą), wreszcie aby naczynia nie ulegały silnym wstrząśnieniom, gdyż inaczej przez ruch mleka zwłaszcza w ciepłe mogą się częściowo zbić grudki masła. Dlatego należy je wypełniać mlekiem do wierzchu lub używać plywaków.

Zapłata dostawcom za mleko.

Cenę za mleko ustanawia się:

- 1) według stałej ceny za litr lub kilogram;
- 2) „ „ zawartości tłuszczu;

3) według ilości masła (Butterantheile), którą z danego mleka wyrobić można.

a) Płacenie według umówionej z góry ceny za jednostkę wagi lub miary mleka — u nas przeważnie wprowadzone — jest najłatwiejsze do obliczenia, ale zupełnie niesprawiedliwe, gdyż np. ze 100 litrów mleka o 2·5% tłuszczu otrzymujemy 2·69 kg. masła, z tej samej zaś ilości mleka o 4·0% tłuszczu 4·49 kg. masła, czyli więcej o 1·80 kg. płacimy zaś jednakowo.

b) Sposób płacenia według zawartości tłuszczu jest dwojaki:
c) Za litr (lub kilogram) mleka o oznaczonej zawartości tłuszczu płaci odbiorca stałą umówioną cenę, za mleko zaś o niższej lub wyższej zawartości odpowiednio mniej lub więcej np.: za mleko o 3·25—3·50% tłuszczu przyjęto cenę 8 groszy za litr, za każdy zaś $\frac{1}{4}$ % mniej lub więcej o $\frac{1}{2}$ gr. Stosownie do tego należałoby zapłacić za mleko o 2·80% tłuszczu — 7 groszy, za mleko o 3·65% tłuszczu — 9 groszy. d) Oznacza się cenę za kiloprocent tłuszczu. Pod kilo-procentem tłuszczu rozumie się procent tłuszczu w kilogramie mleka, np. mleko o zawartości tłuszczu 3·7% ma 3·7 kiloprocentów tłuszczu.

Przedewszystkiem obliczyć należy cenę, którą za kiloprocent mleczarnia płacić może. Postępuje się w następujący sposób: Obliczono, że np. w roku zeszłym dostarczono 216.290 litrów mleka o przeciętnej zawartości tłuszczu 3·319%; ilość kiloprocentów wynosiła $(216\ 290 \times 3\ 319) = 717\ 923\ 46$. Cały czysty dochód wynosił 21.252 koron, można zatem ofiarować dostawcom za kiloprocent tłuszczu $(21\ 252 : 717\ 923\ 46) = 2\ 96$ grosza, przeciętna więc cena w powyższym wypadku za litr mleka wynosić będzie: $3\ 319 \times 2\ 96 = 9\ 824$ grosza.

(Na tej podstawie zestawiono dokładne tabele, dozwalające ze znanej zawartości tłuszczu i ceny przyjętej za kiloprocent odczytać należytość za 1 kg. mleka (W. Mund: Die Bezahlung der Milch nach Fett-Prozenten. Bremen 1896 i inne).

Jest to sposób płacenia za mleko sprawiedliwszy, niż poprzedni, jednak jeszcze niedoskonały. Wadą jego jest to, że na podstawie tego rachunku mleko ubogie w tłuszcz płaci się stosunkowo drożej, niż tłuste. Najsprawiedliwszym sposobem płacenia jest:

e) w stosunku do wyrobionego masła (Butterantheile). Jeżeli więc np. dostawca A. dostarczał mleko o przeciętnej zawartości tłuszczu 3%, to ze 100 litrów mleka otrzymano masła 3·29 kg. (tabela str. 80), czyli udziałów w masle należy mu policzyć 3·29 (za 100 litrów mleka). Pozostaje więc tylko oznaczenie ceny za jeden udział, co wykonuje się w podobny sposób jak przy kiloprocentach. (Tabele: W. Helm: »Tabelle für die Bezahlung der Milch nach Gewicht und Fettgehalt«. Miesch-Prenclau; Julius Frost: »Die Bezahlung von Milch und Rahm nach Butteranteilen«. Heinsius-Leipzig. W. Brader: Tabellen zur Berechnung des Milchgeldes bei Bezahlung nach Kilo oder Liter. Hildesheim).

Zafalszowanie mleka.

Najczęściej spotykanymi rodzajami zafalszowania mleka są: zebranie śmietany, dolanie wody, zebranie śmietany z równoczesnem dolaniem wody.

Ponieważ ciężar właściwy poszczególnych składników mleka jest różny, w szczególności zaś c. w. tłuszczu wynosi 0·93, su-

chej masy bez tłuszczu 16, zaś wody jak wiadomo 1, przeto każda zmiana w stosunku tych składników do siebie, spowodowana czyto zebraniem tłuszczu, czy dolaniem wody, powoduje przedewszystkiem zmianę ciężaru właściwego mleka.

I tak: dolanie wody obniża ciężar właściwy (każdych 10^o, dolanej wody obniża c. w. o 3 stopnie lactodensimetru).

Zebranie śmietany podwyższa ciężar właściwy.

Zebranie śmietany i równoczesne dolanie wody pozostaje zazwyczaj bez wybitnego wpływu na c. w.

Aby uzyskać pewność, że w danym wypadku zafalszowane mleko, w któryś z powyżej wymienionych sposobów i aby sprawdzić rodzaj zafalszowania, należy zbadać dokładnie mleko podejrzone, a następnie do 24 godzin wziąć próbę stojącą z tego samego udoju i tych samych krów, od których mleko podejrzone dostarczono i również go zbadać.

Badanie mleka dla stwierdzenia zafalszowania polega na:

1) Dokładnem oznaczeniu c. w.

2) Dokładnem oznaczeniu zawartości tłuszczu.

3) Obliczenie według formuły Fleischmanna i Babeocka lub Halenkego (patrz str. 6) ilości procentowej suchej masy.

4) Podobne obliczenie suchej masy wolnej od tłuszczu (str. 95).

5) Obliczenie c. w. suchej masy (str. 95).

Powyższe wartości wahają w mleku normalnem, w następujących granicach:

Ciężar właściwy 1.029—1.034

Tłuszcz 2.5—4.5

Sucha masa 10.3—14.7

Sucha masa wolna od tłuszczu 7.8—10.2

Ciężar właściwy suchej masy 1.3—1.4

Natomiast w porównaniu z próbą stojącą wartości te zmieniają się następująco:

	mleko odtłuszczone	mleko roz- wodnione	mleko niezna- cznie rozwod. i odtłuszczone
Ciężar właściwy	zwiększa się	zmniejsza się	niezmienione czasem nieco zw. lub zmn.
Tłuszcz	zmniejsza bar- dzo znacznie		zmniejsza się b. silnie
Sucha masa	zmn. się mniej jak tłuszcz		zmniejsza się mniej silnie
Sucha masa bez tłuszczu	zwiększa się nieznacznie		niezmienione czasem nieco zw. lub zmn.
C. w. such. masy	zwiększa się		niezmien.

Formuły potrzebne do obliczenia powyższych wartości.

Oznaczając ciężar właściwy przez s , tłuszcz przez f , suchą masę przez t , suchą masę wolną od tłuszczu przez r , wreszcie ciężar właściwy suchej masy przez m , otrzymamy:

1) *Formuła Fleischmanna i Babeocka dla obliczenia suchej masy (t):*

$$t = 1,2 f + 2,665 \cdot \frac{100 s - 100}{s}$$

$$\text{np. jeżeli } s = 10321 \\ f = 3,7\%$$

$$\text{to } t = 1,2 \times 3,7 + 2,665 \cdot \frac{100 \cdot 10321 - 100}{10321} = 72,729$$

Formuła Halenkego:

$$\frac{t}{f} = \frac{f \times 5 + s}{4} + 0,07$$

Przez *s* w powyższej formule rozumie się stopnie laktodensimetru, a więc jeżeli przyjmiemy *c. w.* = 1,0321 to odpowiadać to będzie 32,1 stopni laktodensim. np.: *s* = 3,21

$$f = 3,7, \text{ zatem}$$

$$t = \frac{3,7 \times 5 + 3,21}{4} + 0,07 = 12,72\% \text{ suchej masy}$$

2) *Sucha masa wolna od tłuszczu (r):*

$$r = t - f$$

3) *Ciężar właściwy suchej masy (m):*

$$m = \frac{t}{t - \frac{100 s - 100}{s}}$$

$$\text{np.: } t = 12,25 \\ s = 1,0316, \text{ zatem}$$

$$m = \frac{12,25}{12,25 - \frac{100 \times 1,0316 - 100}{1,0316}} = 1,33$$

Uwaga: Dla ułatwienia obliczenia «*t*» wypracował Fleischmann tabele za pomocą których wartość «*t*» uzyskuje się przez proste dodanie dwu cyfr, zaś dla «*m*» przez odjęcie i podzielenie (Prof. Dr. W. Fleischmann: Lehrbuch der Milchwirtschaft Lipsk. IV wydanie).

Stopień zafalszowania

obliczyć można przy pomocy następujących formuł:

1) *Obliczenie procentu dolanej wody:*

Stopnie laktodens. próby stajennej — stopnie próby podejrz. $\times 100$

Stopnie laktodens. próby stajen.

$$\text{np.: stop. laktodens. pr. stajennej} = 32^{\circ}$$

$$\text{„ „ „ w mlecz.} = 29,1^{\circ}$$

$$\text{Rozwodnienie} = \frac{32 - 29,1 \times 100}{32} = 9,1\%$$

1,0...

Tuszcz 0/0	1,0...														Tuszcz 0/0		
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
1.1																	1.1
2																	2
3																	3
4																	4
5																	5
6																	6
7																	7
8																	8
9																	9
2.0																	2.0
1																	1
2																	2
3																	3
4																	4
5																	5
6																	6
7																	7
8																	8
9																	9
3.0																	3.0
1																	1
2																	2
3																	3
4																	4
5																	5
6																	6
7																	7
8																	8
9																	9
4.0																	4.0
1																	1
2																	2
3																	3
4																	4
5																	5
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			

Odtłuszczone
i rozwodnione

Odtłuszczone

Rozwodnione

Wątpliwe

Wątpl.

Nieodpowiednie

Rozwodnione

Możliwe

Zwykle

Możliwe

Kalkulacye.

I. Obliczenie wydatku masła przy danej tłuściości mleka.

a) *Formuła Fleischmanna*: Oznaczywszy zawartość tłuszczu w mleku przez f , ilość masła ze 100 ltr. mleka przez x , zaś zawartość tłuszczu w mleku zbieranem = 0.2%, możemy obliczyć wydatek masła za pomocą wzoru:

$$x = f - 0.17 \times 1.155$$

np.: jeśli $f = 3.5\%$ to $x = 3.5 - 0.17 \times 1.155 = 3.84$ kg. masła za 100 ltr. mleka.

b) *Formuła Hittchera*: $B = 1.2 f - 0.31$

B = oznacza ilość masła ze 100 ltr. mleka; f = tłuszcz w mleku pełnem. W formule tej przyjęto, że w mleku zbieranem pozostaje 0.2% tłuszczu, w maślanie zaś 0.55%. Z tego powodu formuła ta zastosowaną być może przy obliczeniu wydatku masła w mleczarniach ręcznych.

Dla mleczarni parowych odpowiedniejszą będzie modyfikacya tej formuły następująca:

$$B = 1.2 f - 0.26.$$

(Na podstawie formuły Hittchera ułożone są tabele Trosta «Die Bezahlung von Milch u. Rahm nach Butteranteilen». Lipsk 1901).

Zamieszczona na następnej stronie tabelka podaje wydatek masła obliczony z mleka o znanej zawartości tłuszczu, według pierwszej formuły Hittchera.

Potrzebna ilość mleka na 1 kilogram masła, przy znanej zawartości tłuszczu:

Przyпускаjąc normalnie dobry przerób: oddzielenie tłuszczu = 90%, zmaślenie = 97%, i tłuszczu w maśle = 83%, otrzymamy 1 kg. masła z — ilości mleka przy % tłuszczu w mleku:

Tłuszcz mleka %	Mleka kg. na 1 kg. masła	Tłuszcz mleka %	Mleka kg. na 1 kg. masła	Tłuszcz mleka %	Mleka kg. na 1 kg. masła
2.50	38.03	3.31	28.47	4.20	22.64
2.54	37.44	3.40	27.96	4.24	22.42
2.60	36.57	3.44	27.64	4.30	22.11
2.64	36.01	3.50	27.16	4.34	21.96
2.70	35.21	3.54	26.86	4.40	21.61
2.74	34.70	3.60	26.41	4.44	21.41
2.80	33.96	3.64	26.12	4.50	21.13
2.84	33.48	3.70	25.69	4.54	20.94
2.90	32.78	3.74	25.42	4.60	20.67
2.94	32.34	3.80	25.12	4.64	20.49
3.00	31.69	3.84	24.76	4.70	20.13
3.04	31.27	3.90	24.38	4.74	20.06
3.10	30.69	3.94	24.13	4.80	19.81
3.14	30.28	4.00	23.77	4.84	19.64
3.20	29.71	4.04	23.53	4.90	19.40
3.24	29.34	4.10	23.19	4.94	19.25
3.30	28.81	4.14	22.97	5.00	19.01

Ilość mleka w kg.		Zawartość tłuszczu w mleku:													
		2.50	2.60	2.70	2.80	2.90	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
Ilość masła w kilogramach:															
10	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43
20	0.54	0.56	0.58	0.61	0.63	0.65	0.68	0.70	0.73	0.75	0.78	0.80	0.82	0.85	0.87
30	0.80	0.84	0.88	0.91	0.95	0.98	1.02	1.06	1.09	1.13	1.16	1.20	1.24	1.27	1.31
40	1.07	1.12	1.17	1.22	1.27	1.31	1.36	1.41	1.46	1.51	1.55	1.60	1.65	1.70	1.75
50	1.34	1.40	1.46	1.52	1.58	1.64	1.70	1.76	1.82	1.88	1.94	2.00	2.06	2.12	2.18
60	1.61	1.68	1.76	1.83	1.90	1.92	2.04	2.12	2.19	2.26	2.33	2.40	2.48	2.55	2.62
70	1.88	1.96	2.05	2.13	2.22	2.30	2.38	2.47	2.55	2.64	2.72	2.80	2.89	2.97	3.06
80	2.15	2.25	2.34	2.44	2.53	2.63	2.73	2.82	2.92	3.01	3.11	3.21	3.30	3.40	3.49
90	2.42	2.53	2.63	2.74	2.85	2.96	3.07	3.17	3.28	3.39	3.50	3.61	3.71	3.82	3.93
100	2.69	2.81	2.93	3.05	3.17	3.29	3.41	3.53	3.65	3.77	3.89	4.01	4.13	4.25	4.37
I kg. masła = kg. ml.	37.08	35.58	34.14	32.78	31.54	30.40	29.32	28.32	27.38	26.52	25.70	24.94	24.22	23.52	22.88

Przy $\frac{0}{100}$ tłuszczu w mleku mniejszym od $2.5\frac{0}{100}$ należy podwoić odnośną liczbę poniżej $5\frac{0}{100}$. Przy wyższych nad $5\frac{0}{100}$ ilościach tłuszczu — połowa cyfry odpowiadającej liczbie ponad $2.5\frac{0}{100}$ (dla $2.4\frac{0}{100} = 19.81 \times 2 = 39.62$; dla $5.4\frac{0}{100} = 35.21 : 2 = 17.6$). Wydatek masła uważa się za b. dobry, gdy idzie 20 l. mleka na 1 kg. masła, średni przy 25 l., mierny przy 30 l. na 1 kg. masła.

II. Oznaczenie procentowej zawartości tłuszczu w śmietanie.

Znając zawartość tłuszczu w mleku i ilość litrów śmietany, otrzymanej ze 100 litrów mleka, możemy obliczyć zawartość tłuszczu w śmietanie na podstawie następującej formuły:

$$\frac{f - 0.20}{S} \times 100 = fs.$$

($f = \frac{0}{100}$ tłuszczu w mleku; $0.20 =$ przeciętny $\frac{0}{100}$ tłuszczu w mleku zbieranem; $S =$ ilość śmietany; $fs = \frac{0}{100}$ tłuszczu w śmietanie).

III. Oznaczenie wydatku masła ze śmietany

o znanej zawartości w niej tłuszczu, możliwe jest za pomocą następującej formuły:

$$B = sf - 0.4 \times 1.175$$

$B =$ ilość masła ze 100 ltr. śmietany; $sf = \frac{0}{100}$ tłuszczu w śmietanie.

Można także użyć wzoru nieco odmiennego:

$$B = \frac{sf - 0.4125}{0.84}$$

Na podstawie tej formułki, otrzymamy masła ze 100 kg. śmietany:

15 $\frac{0}{100}$ tłuszczu	17.37 kg. masła
16 »	18.56 » »
17 »	19.75 » »
18 »	20.94 » »
19 »	22.13 » »
20 »	23.32 » »
21 »	24.51 » »
22 »	25.70 » »
23 »	26.89 » »
24 »	28.08 » »
25 »	29.27 » »

IV. Wydatek masła i twarogu przy przeróbce 100 ltr. mleka.

Przyjąwszy zawartość tłuszczu w mleku na $3.36\frac{0}{100}$, to przy użyciu wirówki otrzymamy w przybliżeniu:

Śmietany 15 kg.	{ masła 3.64 kg.
	{ maślanki 12.00 »
	{ strata 0.36 »
Mleka chud. 88.36 kg.	{ twarogu 7.39 kg.
	{ serwatki 73.00 »
	{ strata 2.97 »
Strata przy wirów. <u>0.64 kg.</u>	<u>0.64 kg.</u>
100.00 kg.	100.00 kg.

Oznaczenie wagi bydłęcia za pomocą mierzenia.

Radca Pressler z Tharand w Saksonii wykazał, że żywa waga bydłęcia daje się bardzo dokładnie oznaczyć zapomocą miary. Liczne pomiary wołów i cieląt różnych ras dowiodły, że różnice między wagą obliczoną z pomiarów, a określoną bezpośrednio przez ważenie, częstokroć różnią się zaledwie o ułamek odsetki, a przy większej ilości jednocześnie mierzonego (wzgl. ważonego) bydła zupełnie się znoszą.

Mierzenie odbywa się w następujący sposób a) Po ustawieniu zwierzęcia możliwie równo i swobodnie zarazem, zaczyna się mierzenie *obwodu klatki piersiowej*, poczynając od kłębu, skąd taśmę przeciąga się po prawej łopatce aż pomiędzy przednie nogi, dalej między nogami i tuż za lewą łopatką napowrót do kłębu. Otrzymana liczba centymetrów jest obwodem klatki piersiowej. Taśma musi przebiegać na jednej stronie zwierzęcia tuż poza łopatką, na drugiej zaś w kierunku możliwie prostym po łopatce — przytem taśma powinna być odpowiednio naciągnięta, lecz nie wpijać się w ciało. Dla sprawdzenia można tenże pomiar wykonać odwrotnie t. j. poprowadzić taśmę z lewej strony po łopatce, a z prawej poza nią. Wyniki nie powinny się różnić więcej, niż o 2—3 centymetry; zdarzają się jednak czasem zwierzęta zbudowane jednostronnie. Gdy bydło ma duże podgardle, trzeba je pomiędzy nogami tak usunąć, żeby taśma wszędzie mogła do ciała przylegać.



b) Następnie mierzymy *obwód podłużny*. W tym celu przeciągamy taśmę w poprzek piersi i łopatek w możliwie najkrótszej linii po brzuchu i górnej części uda, dalej wokół nasady ogona, aż do zetknięcia z przeciwległym jej końcem. Otrzymawszy te dwa pomiary, wyszukujemy w tablicy odnośną objętość wału, mającego średnicę równą znalezionej przez nas obwodowi piersiowemu i długość równą obwodowi podłużnemu. Dla oznaczenia wagi zwierzęcia w kilogramach należy tę objętość wału pomnożyć przez współczynnik inny dla każdej rasy, wieku, rodzaju i stanu wypasienia bydłęcia, a stały tylko dla danej rasy, wieku i t. d. Ten współczynnik oznacza się doświadczalnie przez podzielenie sumy wag bydłał możliwie jednakowych pod wyż wzmiankowanymi względami i podzielenie przez odnośną sumę objętości wałów. A to według wzoru

$$g : G = w : W$$

gdzie g jest waga, mająca być oznaczona zapomocą pomiaru, G waga średnia, określona bezpośrednio ważeniem, w , objętość wału odpowiadającego badanemu zwierzęciu, W przeciętna objętość wału dla danej rasy. Z powyższego wzoru:

$$g = \frac{G}{W} \times w, \quad \text{gdzie } \frac{G}{W} \text{ jest}$$

nasz współczynnik równający się przeciętnej wadze istotnej danej rasy, podzielonej przez przeciętnie jej odpowiadającą objętość wału. Oznaczywszy $\frac{G}{W} = M$ mamy $g = M \cdot w$, czyli poszuki-

wana waga równa się współczynnikowi stałemu M (powtarzamy raz jeszcze stałemu dla danej rasy, wieku i t. d.), pomnożonemu przez odnośną objętość wału. Droga licznych doświadczeń okazało się, że stały ten mnożnik najczęściej równa się dla wołów 39, 40, 41 (właściwie 0,39, 0,40, 0,41), dla młodzieży i buhajów 40, 41, 42, dla krów niezbyt wysoko cielnych zaś 42, 43, 44. Liczby niższe stosują się do zwierząt chudszych, liczby najwyższe do tłustych lub też bardzo dobrze zbudowanych i kościstych.

Przykłady: Wół roboczy wykazał 202 cm. obwodu piersiowego i 350 cm. obwodu podłużnego. Objętość wału odczytana na załączonej tablicy równa się 1122, co pomnożone przez współczynnik 0,39 równa się 439,92 lub też okrągło 440 kg. Krowa starsza, dobrze zbudowana i szeroka w grzbiecie przy tych samych wymiarach piersi i obwodu podłużnego, a przy mnożniku stałym 44 wykazywałaby $(1122 \times 0,44 =)$ 496,32 lub też okrągło 496 kg.

Tablica Presslera

L.	B. 172	174	176	178	180	L.	B. 212	214	216	218	220
350	813	832	852	871	891	330	1165	1187	1209	1232	1254
360	837	856	876	896	916	340	1200	1223	1246	1269	1292
370	860	880	900	921	942	350	1235	1259	1282	1306	1330
	B. 182	184	186	188	190	360	1271	1295	1319	1344	1368
290	755	771	788	805	822	370	1306	1331	1356	1381	1406
300	781	798	815	833	850	380	1341	1367	1392	1419	1444
310	807	824	842	861	879	390	1377	1403	1429	1456	1482
320	833	851	869	888	907	400	1412	1439	1466	1493	1520
330	859	877	897	916	935	410	1447	1475	1502	1530	1558
340	884	904	924	944	964	420	1483	1511	1539	1568	1596
350	911	931	951	972	992	430	1518	1547	1576	1605	1635
360	937	957	978	999	1020		B. 222	224	226	228	230
370	963	984	1005	1027	1049	350	1355	1379	1404	1429	1454
380	989	1010	1032	1055	1077	360	1394	1419	1444	1470	1496
390	1015	1037	1060	1083	1105	370	1432	1458	1484	1511	1537
	B. 192	194	196	198	200	380	1471	1498	1524	1551	1579
310	897	916	935	955	974	390	1510	1537	1564	1592	1620
320	926	946	965	985	1005	400	1548	1576	1604	1633	1662
330	955	975	996	1016	1037	410	1587	1616	1644	1674	1703
340	984	1005	1026	1047	1068	420	1626	1655	1685	1715	1745
350	1013	1035	1056	1078	1100	430	1664	1695	1725	1756	1787
360	1042	1064	1086	1108	1131	440	1703	1734	1765	1796	1828
370	1071	1094	1116	1139	1162	450	1742	1773	1805	1837	1870
380	1100	1123	1146	1170	1194		B. 232	234	236	238	240
390	1129	1153	1177	1201	1225	360	1522	1548	1575	1602	1629
400	1158	1182	1207	1231	1257	370	1564	1591	1618	1646	1674
410	1187	1212	1237	1262	1298	380	1606	1634	1662	1691	1719
	B. 202	204	206	208	210	390	1649	1677	1706	1735	1764
320	1026	1046	1067	1087	1108	400	1691	1720	1750	1780	1810
330	1058	1079	1100	1121	1143	410	1733	1763	1793	1824	1855
340	1090	1111	1133	1155	1178	420	1775	1806	1837	1869	1900
350	1122	1144	1166	1189	1212	430	1918	1849	1881	1913	1945
360	1154	1177	1200	1223	1247	440	1860	1892	1925	1958	1991
370	1186	1209	1233	1257	1282	450	1902	1935	1968	2002	2036
380	1218	1242	1266	1291	1316	460	1944	1979	2012	2046	2081
390	1250	1275	1300	1325	1351		B. 242	244	246	248	250
400	1282	1308	1333	1359	1386	380	1748	1777	1806	1836	1865
410	1314	1340	1366	1393	1420	390	1794	1824	1854	1884	1914
420	1346	1373	1400	1427	1455	400	1840	1870	1902	1932	1864

Objaśnienie:

L. Obwód podłużny w centymetrach. } liczby tłuste.
 B. Obwód klatki piersiowej. }

Liczby tłoczone zwykłymi czcionkami (nie tłuste) są objętości wałów (wał = walec, cylinder) dla danych obwodów.

WETERYNARYA

Podał prof. Stanisław Królikowski.

Odrażanie.

Odrażanie (odkażanie, dezynfekcja). W walce z chorobami zakaźnymi jednym z najpotężniejszych czynników tej walki jest zabicie lub usunięcie drobnoustrojów chorobotwórczych, znajdujących się w zetknięciu ze zdrowym jeszcze zwierzęciem lub w jego najbliższym sąsiedztwie. Osiągamy to zapomocą odrażania, które odbywać się może albo na drodze fizycznej albo chemicznej.

Do środków odrażających **fizycznych** należą:

Światło słoneczne, szczególnie nierozprószone, połączone z działaniem promieni ciepłikowych. Światło, działając przez długi czas, zabija nawet dość odporne grzybki chorobotwórcze.

Przewietrzanie (wentylacja). Wskutek silnego ruchu powietrza zakaźniki zostają oderwane od przedmiotów, do których przylegają i rozprószone w przestrzeni atmosferycznej, gdzie stają się prawie nieszkodliwymi już to z przyczyny, że znajdują się tam w bardzo małej ilości, już to, że zostają osłabione lub nawet zabite przez czynniki takie jak światło, tlen i t. p.

Przedmioty poddane odwietrzeniu należy układać tak, aby wiatr wiał od nich w pole a nie wprost na sąsiednie budowle. Przy przewietrzaniu stajen, po usunięciu zwierząt, okna i drzwi otwierają się na przestrzał. Drzwi i okna sąsiednich stajen obór i t. p. powinny być wtedy zamknięte.

Trzepanie przedmiotów na wietrze ułatwia akt przewietrzania. Co do kierunku wiatru i stosunku do sąsiednich pomieszczeń dla zwierząt i ludzi, zachować należy te same co powyżej ostrożności.

Wycieranie. Uskutecznia się ono za pomocą ścierek, wiechci z rogoży lub strużek drzewnych, gąbek, chleba, zamszy. Przedmioty użyte jako narzędzie do wycierania winny być z początku lekko wilgotne, a później mokre; po użyciu należy je spalić lub dokładnie chemicznie odkazić.

Wyskrobywanie. Stosuje się ono do ścian, podłóg, przegród i t. d. i dokonywa przy pomocy ostrych rydlówek, na wilgotno, zwłaszcza gdy idzie o choroby, które przenoszą się na ludzi.

Zimno jest bardzo słabym środkiem odkażającym; na wymrożenie więc przedmiotów zapowietrzonych nie liczyć nie można.

Gorąco. Odpowiednio wysoka ciepłota zabija wszystkie zakaźniki. Można przyjąć, iż gotowanie w wodzie, para wodna dochodząca do 115° C. i powietrze suche mające ciepłotę 120° C., jeżeli działają wskrós przedmiotów odkażanych przez nas, od jednej do paru godzin, stanowczo zabijają wszelkie grzybki chorobotwórcze. Do łatwiejszego przeprowadzenia odkażenia zapo-

mocą wysokiej ciepłoty znajdują się w handlu wygrzewalnie (termostaty) różnego systemu.

Środki odkażające chemiczne. Rozwijają one swoją czynność w zupełności dopiero wtedy, gdy działają w stanie ciepłym lub gorącym.

Rozdzielamy je na gazowe i niegazowe.

Przed rozpoczęciem odkażenia gazowego należy wszystkie szpary w budowlu pozatykać (najlepiej z zewnątrz), okna, drzwi i wentylatory dokładnie pozamykać, wreszcie zwierzęta wyprowadzić. Po dokonaniu dezynfekcyi przestrzeń odkażona winna zostać jeszcze przez dobę zamkniętą, następnie, zanim się doń zwierzęta wprowadzi, dobrze wywietrzona przez otwarcie na przestrzał okien i drzwi.

Środki odkażające gazowe działają znacznie energiczniej, jeżeli przedmioty im poddane są zwilgocone. Tutaj należą:

Chlor: otrzymuje się różnymi sposobami; najtańsze z nich są:
a) Soli kuchennej 4 części na wagę, dwutlenku manganu (braunsztejnu) 3 części, zmieszać w miseczce glinianej i oblać 9 częściami kwasu siarkowego. Jeżeli mieszaninę podgrzeje się na przykład na lampie spirytusowej, to chlor wywiązuje się prędzej.

b) Wapna chlorowego 1 część, kwasu solnego 2 części.

Odkażenie chlorem należy powierzać człowiekowi roztropnemu, a tenże powinien pamiętać, że wdychanie tego gazu jest dla płuc szkodliwe, ma więc mieć usta i nos przewiązane mokrą chusteczką. Sprawę trzeba załatwić szybko.

Chlor jako środek odkażający działa bardzo energicznie i pewniej niż inne gazy.

Bezwodnik kwasu siarkowego. Gaz ten otrzymuje się przez spalenie siarki. Działa mniej pewnie niż poprzedni; trzeba spalić ogromne ilości siarki, około 100 gramów na metr sześcienny przestrzeni stajennej, aby osiągnąć należyty skutek. Ostrożnie postępować, aby nie spowodować pożaru.

Formol. Pary formolu otrzymuje się już to za pomocą aparatu Lingnera (z Drezna) z t. zw. glikoformalu, już to za pomocą ogrzewania nad lampą spirytusową w przeznaczonych do tego przyrządach odpowiednio zrobionych kolaczyków Schering'a, na 1 m³ powietrza potrzebne są dwa kolaczyki. Wreszcie metodą wrocławską przez wyparowywanie wodnych roztworów formolu w kotłach do tego odpowiednio urządzonych, ogrzewanych spirytusem.

Odkażenie formolem wypada obecnie jeszcze dość drogo, zwłaszcza że wymaga kosztownych aparatów, jednak jako środek dezynfekcyjny formol jest środkiem doniosłym. Nieprzyjemny zapach formaldehydu usuwa się zapomocą rozpylania amoniaku. Między wieloma przyrządami do odkażania formaliną zasługuje na uwagę przyrząd dr. Gąsiorowskiego wyrabiany we Lwowie.

Kwas karbolowy (czysty), kreolina lub lizol w 2—3% roztworze, rozpylone zapomocą pulweryzatorów lub ogrodowej rozpraszającej sikawki, także mogą służyć do odkażania przestrzeni i ścian.

Wapno niegaszone. Posypuje się niem podłogi a następnie zlewa wodą. Świeżo rozczynione z wodą używa się do smarowania ścian, żłobów, przegród i t. d. Suche wapno miesza się z ziemią wykopaną w stajniach odwietrzanych, posypuje się niem padlinę w dołach, nawóz i t. p.

Ług z popiołu drzewnego. Popiół gotowany z wodą w stosunku 1 litra popiołu na litr wody, daje wyborny środek odkażający, którym myje się żłoby, drabinki, przegrody, drewniane ściany, podłogi, kubły, uprząż. Stosowane na gorąco działa lepiej niż na zimno. Tkaniny wełniane nie znoszą silnego ługu, zatem słabsze roztwory, których w tym razie używać musimy, służą tylko do odtłuszczenia przedmiotów.

Siarkan żelaza i siarkan miedzi. (koperwas żelazny i miedziany) używa się w proszku lub roztworze wodnym dla odkażania ustępów, ścieków i t. d. Są one środkiem dezynfekcyjnym dość słabym. Siarkan miedzi odpowiada swemu celowi przy odkażaniu kopyt i racie u zwierząt, gdyż zarazem zapobiega ich gniciu. W tym ostatnim celu zlewa się dwa razy dziennie podszwy, strzałkę rogową i szpary międzyraciczne.

Dziegieć. Wszelkie gatunki dziegieciu nadają się do odkażania, szczególnie jednak do tego celu dobry jest dziegieć sosnowy. Jedną część dziegieciu rozpuszcza się na ogniu z 20 częściami ługu popiołowego i natychmiast zużywa lub pozostawia w naczyniu zamkniętem w ciągu 24 godzin. Używa się do odkażania ścieków, dołów kloacznych, gnojówek, uprząży i t. p.

Kreolina, krezolina i lizol: trzy środki odkażające podobne do siebie ze sposobu i siły działania; używają ich z wodą w rozcieńczeniu 3—5%. Stosują się one do odkażania wszelkiego rodzaju przedmiotów, nie wyłączając żywych zwierząt, gdyż z ostrożnością użyte nie działają szkodliwie na zdrowie tych ostatnich. Żłoby po odkażeniu tymi środkami należy wymyć ługiem i wypłukać wodą. W oborach krów mlecznych niezupełnie stosowne z przyczyny zapachu swego, udzielającego się mleku.

Kwas karbolowy. Dzielny ten środek odkażający znajduje się w handlu już to jako t. zw. surowy, już to jako czysty. Surowy używa się nierozcieńczony dla odkażania rowków ściekowych, gnojówek, do polewania trupów zwierząt dobitych z powodu zarazy (czyni mięso wstrętne, więc zapobiega jego użyciu) lub padłych na nią.

Kwas karbolowy czysty znajduje się w handlu w stanie krystalicznym (do użycia niewłaściwy, gdyż manipulacja z nim trudna) i w stanie płynnym (*Acidum carbolicum liquefactum*). Używają się jego wodne roztwory (3—5%) dla odkażania powietrza (rozpylony), ścian, podłóg, przegród, żłobów (te po ukończeniu odkażenia muszą być dobrze wymyte), uprząży, koców, derek i t. p. Rozpuszczalność kwasu karbolowego w wodzie podnieść można przez dodanie doń gliceryny lub spirytusu. Kwas karbolowy ma wiele nieprzyjemną woń (mleko i mięso łatwo przejmują ten zapach) i jest bardzo trującym (!!); w stanie stężonym (począwszy od 10% roztworu) łatwo wywołuje na ciele oparzenia. Dlatego też użycie jego wymaga ostrożności i może być polecane tylko osobom roztopnym.

Sublimat rtęciowy, najdzielniejszy ze wszystkich znanych dotąd środków odkażających. Pomimo swych bardzo silnie trujących własności użyty w odpowiedni sposób jest najodpowiedniejszym do wszelkiego rodzaju odkażania nawet dla odrażania żywych zwierząt, nie wyłączając bydła rogatego, które jest czulsze od innych czworonogów na preparaty rtęciowe. Najmniej odpowiedni jest sublimat do odkażania ścian, gdyż wtedy użyty być musi w zbyt wielkiej ilości. Żłoby po jego użyciu winny być splukane obficie gorącą wodą, toż samo i po-

dłogi. W handlu znajduje się krystaliczny czysty i w postaci pastylek Angerer'a (jedna pastylka zawiera jeden gram sublimatu). Wydany być może tylko na zlecenie lekarskie. Dogodniej używać go w pastylkach; w stanie krystalicznym stosowanie jego jest z wielu względów znacznie niebezpieczniejsze. Roztwory w granicach 1:1000—10000 wody nie powinny być przekraczane!

Odkazanie gruntu. Trawy na gruncie zakażonym wyłączyć przez szereg lat od spasanania i zbioru, a gdy dojrzeją lub skoszone wyschną — spalać na miejscu. Osuszenie zapomocą rowów lub drenów. Niewielkie przestrzenie (grzebowiska, dziedzińce, stajnie) przysypywać wapnem niegaszonym lub chlorowem.

Odkazanie wody. W niewielkich zbiornikach naturalnych lub sztucznych spuszczenie wody, wyszlamowanie, obfite sypanie wapna, jeśli rybostan nie przeszkadza. W naczyniach: kilkogodzinne odstanie się wody, gotowanie, dodatek wapna niegaszonego w stosunku 0.5 kg. (w proszku) na 100 litrów wody; dodatek alunu w ilości 0.25—0.15 do litra wody, następnie po zmąceniu odstanie przez dobę.

Odkazanie karmy. Spalenie (wąglik, nosacizna, księgosusz, ospa owcza, pomór u świń) a w przyjaznych po temu warunkach spalenie jej zwierzętom niepodlegającym danej chorobie i to tylko z wiedzą i przy wskazówkach władz weterynaryjno-policyjnych. Zupelnemu zniszczeniu przez rzucenie do kompostów winno się poddać karmę zgniłą; niekiedy karma nadpsuta może być spasana po zaparzeniu lub przegotowaniu; karmę zabloconą wymyć (okopowe), poddać działaniu deszczu, wymłócić cepami na wietrze (siano zamulone, słomy pokryte czernią), przesiać (owies) i t. p. lecz nie w stajni.

Odkazanie stajen. Gruntowna dezynfekcyja stajen jest rzeczą kosztowną, uskutecznić ją przeto należy przy chorobach zakaźnych ciężkich (wąglik, księgosusz, zaraza płuc bydła rogatego, ospa owcza, nosacizna i t. d.), których zakaźniki są wytrzymałe na wpływy zewnętrzne. Przed przeprowadzeniem dezynfekcyi zasięgnąć porady lekarza weterynaryjnego. Przy sprzyjających okolicznościach można niekiedy bez dokonania w całej rozciągłości kosztownej dezynfekcyi stajen wykorzystać je, zamieniając na użytek dla innego gatunku zwierząt. Stajnie zamienić na oborę (nosacizna, influenza), owczarnię na oborę lub stajnię (ospa owcza) i t. d. Przedsięwzięcie odkazanie pomieszczeń dla zwierząt, nakreślić sobie ściśle plan postępowania i dokładnie go wykonać, unikając niepotrzebnych wydatków a nie skąpiąc na niezbędne. W różnych warunkach plan musi być różny; przedstawiony tu szemat musi być niekiedy stosownie do okoliczności zmieniony. Oto on:

a) Wywiezienie karmy ze stajen i z poddasza, postępując z nią prztem stosownie do rodzaju choroby, używając pomocy zwierząt danej chorobie nie podlegających.

b) Pozatykanie z zewnątrz wszystkich szpar w ścianach.

c) Usunięcie ze stajni zwierząt i przeprowadzenie ich do innego pomieszczenia po poddaniu najdokładniejszemu odkazaniu (patrz odkazanie zwierząt).

d) Usunięcie ze stajni mierzwy (patrz odkazanie mierzwy).

e) Usunięcie warstwy półmetrowej ziemi, jeżeli niema podłogi lub jest przegniła drewniana, zrobiona z kamienia pol-

nego, z gliny. Przegnile dyle spalić, kamień przelożyć warstwami słomy i wypalić.

f) Powynoszenie sprzętów ruchomych ze stajni i poddanie ich właściwemu odkażeniu.

g) Spalenie żłobów drewnianych i drabinek małowartościowych.

h) Odkażenie pułapu i ścian. Ściany drewniane: wymyć ługiem, zlanie roztworem kreoliny (kwasu karbolowego, sublimatu w stosunku 1 : 5000), pobielenie wapnem (wapnem chlorowem); ściany tynkowane wyskrobać a od podłogi po wysokość uszu zwierząt odbić i wytynkować nanowo, pozostałą część wytrzeć i wybielić.

Przegrody, drażki, drabinki wyskrobać, wymyć ługiem następnie odkazić kreoliną (3⁰/₀), sublimatem (1 : 2000); żłoby wymyć ługiem, drewniane zheblować, potem wymyć kreoliną, sublimatem (1 : 5000).

i) Odkażenie podłogi: wyskrobanie, wymyć ługiem, zlanie roztworem kreoliny (3⁰/₀), sublimatu (1 : 2000), posypanie wapnem niegaszonym lub chlorowem.

k) Odkażenie rowków ściekowych: wyskrobanie, zlanie olfite kwasem karbolowym surowym, kreoliną (3⁰/₀) lub sublimatem (1 : 1000).

l) Odkażenie przestrzeni stajennej przy pomocy gazów (chlor, bezwodnik kwasu siarkawego, formol).

m) Zamknięcie stajni na dobę.

n) Przewietrzenie.

o) Wniesienie sprzętów.

p) Wprowadzenie zwierząt.

Odkażenie uprzęży: wytarcie, wymyć ługiem, pociągnięcie roztworem kwasu karbolowego (5⁰/₀), kreoliny (3⁰/₀).

Odkażenie derek, koców, odzieży. Wytrzeć, wygotowanie w wodzie lub lugu stosownie do materiału. Z butami postąpić jak z uprzężą lub spalić.

Odkażenie sprzętów. Wymyć ługiem, roztworem kreoliny (3⁰/₀) lub sublimatu (1 : 2000); łańcuszki, rydło użyte przy dezynfekcyi wypalić. Przedmioty drewniane lub małowartościowe spalić.

Odkażenie osób. Kąpiel, dokładne wymyć włosów na głowie, zmiana odzieży. Do odkażania rąk podczas trwania dezynfekcyi używać mydła sublimatowego lub kreolinowego polskiej fabryki „Tlen“, poczem roztwór kreoliny (2⁰/₀) lub sublimatu (1 : 2000).

Odkażenie zwierząt. Zwierzęta długoszerstne ostrzyć, jeżeli pora na to pozwala, wymyć wodą z mydłem, oplukać wodą czystą i całe ciało rozczynem kreoliny (2⁰/₀) lub sublimatu (1 : 2000). Po oczyszczeniu ciała odkazić racice, kopyta (woda z mydłem, szczyotka, kreolina (3⁰/₀) lub sublimat (1 : 2000) wreszcie roztwór 10% koperwas miedzianego).

Odkażenie trupów i odpadków zwierzęcych. Zakopanie w dołach 2 metry głębokich, po przysypaniu wapnem niegaszonym lub zlaniu kwasem karbolowym surowym. Po zakopaniu na mogiłę narzucić słomy i chrustu, które następnie zapalić.

Odkażenie odchodów zwierząt i nawozu. Spalić (węgiel, księgosusz, nosaczyna), zakopać lub wywieźć na pole zwierzętami, które zarazie nie podlegają.

Szczegółowy traktat o dezynfekcyi znaleźć można w mojej książce p. t.: „Hygiena weterynaryjna“. Lwów 1897. (Cena 6 koron).

Środki przeczyszczające.

Sól Glauberska. Na raz: dla bydła 500—1000 grm.; dla koni 250—500 grm.; dla owiec i kóz 50—100 grm.; dla świń 25—50 grm. Zadaje się z flaszki rozpuszczoną w wodzie lub w postaci powideł a u koni jako galki po zarobieniu z mąką.

Olej lniany. Dla koni i bydła 250—500 grm., dla owiec, kóz i świń 50—100 grm. Zalać ostrożnie.

Aloes. Dla bydła na raz 50—75 grm.; dla koni 25—50, dla owiec i kóz 10—25, dla świń 5—10 grm.

Weź: aloesu sproszkowanego 45 grm., mydła szarego ile trzeba do zarobienia jednej galki. — Dać na raz koniowi—lub aloesu 30 grm., soli Glauberskiej 250 grm., mąki żytniej i wody ile trzeba do zarobienia na powidełka. Dać na dwa razy w ciągu dwóch godzin dla konia.

Aloesu 30 grm., soli Glauberskiej 500—750 grm. rozmieszać w litrze odwaru lnianego i skłóciwszy zalać z butelki na raz. Dla bydłęcia.

Środki powstrzymujące rozwolnienie.

Spokój, zaciszne, ciepłe stanowisko, dużo suchej podściółki, skrapianie brzucha spirytusem kamforowym i ciepłe zawijania brzucha lub mokre ogrzewające wysychające okłady na brzuch (prześcieradłem zmoczonem w zimnej wodzie i wyżętem obwinąć brzuch i ten wilgotny okład doskonale pokryć suchymi miękkimi kocami). Ze środków lekarskich podawać:

Siarkan żelaza: dla koni i bydła 10—55 grm.; dla owiec, kóz i świń 2—5 grm.

Weź: Siarkanu żelaza 15 grm., mąki żytniej 100 grm. zarobić na powidełka i dać na raz dla konia. Dla krowy dać taką samą dawkę w litrze do dwóch naparu rumiankowego.


Kwas garbnikowy. Tanina: Dla konia 5—15 grm., dla bydłęcia 10—25 grm., dla owcy i kozy 2—5 grm., dla cieląt i świń 1—2 grm. Stosuje się dla koni w pigułkach lub powidełkach, dla bydła w litrze naparu rumianku.

Weź: Taniny 30 grm., mąki pszennej 50 grm., wody ile trzeba na zrobienie z niego ciasta. Rozdzielić na 3 pigułki. Po jednej pigułce dziennie dla konia.

Weź: Taniny 5 grm., odwaru z siemienia lnianego z 20 grm. pół litra. Dać cielęciu po przedczeniu na dwa razy w ciągu dnia. Oprócz tego dawać mu kilka razy dziennie 3 szklance ciepłego naparu z rumianku i mięty.

Kora dębowa. Dla koni i bydła 25—50 grm.; dla owiec, kóz i świń 5—10 grm. Zagotować w dwudziestokrotnej ilości wody i dawać raz na dzień przez dni kilka.

I. Wzdęcie u bydła i owiec. Powstaje po przyjęciu w wielkiej ilości pokarmów łatwo fermentujących, jako to: młodej, świeżej koniczyny, lucerny, esparcety, zwłaszcza, gdy jeszcze nie zakwitły i gdy było do tego rodzaju pokarmu nie przyzwyczajone; zielonej gryki, wyki i soczewicy, kwaśnych traw, zepsutego wywaru słodu, zepsutych kielków kartofli, buraków, i innych gnijących roślin okopowych; powstaje przy otruciach zimowitem, makiem polnym, wilczą jagodą, cykatą, szalejem, ciemieżycą, eiseim; przy zadławieniach; przy chorobach zaka-



żnych n. p. przy węgliku; po zbyt szybkim pędzeniu lub wiezieniu na wozie z twardą podściółką.

Objawy polegają na wielkiej duszności, spowodowanej przepelnieniem gazami żołądka (żwacza), który z lewej strony w słabiznie tak się rozdyma, że po brzuchu da się hełnić. Śmierć może nastąpić już w parę kwadransów. — Zapobieganie polega na unikaniu wyżej wskazanych przyczyn.

Leczenie. W lżejszych wypadkach: silne rozcieranie lewej słabizny i lewej części brzucha, zimne zlewania i okłady na lewą słabiznę, ucisk dłońmi na żwacz, wyciągnięcie języka, zakładanie powrośła słomianego od rogu do rogu przez pysk ponad językiem, wreszcie zadawanie wody wapiennej lub amoniaku; lewatywy z wody z mydłem.

Woda wapienna. Wziąć wapna palonego (1 część na wagę) i zalać 100 częściami wody. Trzynać w dobrze zamkniętem naczyniu. Przed użyciem ostrożnie wodę zlać z osadu, a gdy się zmaci, to przesaczyć przez bibułę lub watę. Daje się hydłeciu od 1—2 litrów na raz — kilkakrotnie w ciągu dnia.

Amoniak. Wziąć 20 gm. amoniaku wlać do butelki chłodnej wody, skłócić i zadąć na raz; w razie potrzeby po godzinie dać taką samą drugą dawkę.

W ciężkich wypadkach gdy wzdęcie grozi śmiercią, wprowadza się do żołądka rurę przelykową.

Do tego służy cewa skrecona z grubego drutu i obszyta skórka, dłuższa i grubsza dla bydła, krótsza i cieńsza dla owiec. — Cewy gumowej nie należy używać, gdyż łatwo się psuje i staje się w użyciu niebezpieczną. Najlepiej weisnąć bydlę w kąt obory lub płotu, pysk podnieść do góry i szyję ile możności wyprostować; jeden pomocnik trzyma krowę za obadwa rogi, stojąc z tyłu głowy po lewej stronie, drugi pomocnik wyciąga język zwierzęcia ku przodowi i rozchyła mu pysk a kierujący rurą przelykową wprowadza ją w pysk ponad językiem ostrożnie do gardzieli i dalej w przelyk, aż do żołądka. Gdy cewa tam się dostanie, gazy zaczynają z szelestem uchodzić, aż do zupełnego opróżnienia żwacza. — Do ułatwienia wprowadzenia rury przelykowej służy knebelik w kształcie drewnianego kloeka z dziurą w połowie jego długości. Knebelik pomieszcza się tak w poprzek pyska, że otwór jego wypada w środku pyska; sznurkami przywiązuje się do rogów. Rurę przelykową wprowadza się przez ten otwór. Cewę taką, jak wskazaliśmy, można dostać w składach aptecznych lub chirurgicznych; wydatek nie wielki, bo 8 do 10 koron.

Trójgraniec. Gdy cewy polykowej nie ma pod ręką a wzdęcie zagraża życiu, należy użyć trójgranca (troakararu). Dostać go można w każdym składzie narzędzi chirurgicznych i w skle-

pach żelaznych. Wymacawszy ostatnie żebro i kłab biodrowy z lewej strony zwierzęcia wkłada się trójgranicznie ściśle na połowie przestrzeni między niemi. w miejscu, gdzie jest największe nadęcie z góry na dół i do środka w głab, kierując sztylet ku przodowi. Po wbiciu, sztylet się wyciąga, rurkę wsuwa się aż do końca i od czasu do czasu, gdy gazy iść przestają przepycha sztyletem; zostawić ją można i przez dni parę, lecz zatyka się koreczkiem z waty, aby powietrze do żołądka nie wchodziło, od czasu do czasu odytkając. Gdy gazy już nie wychodzą, rurkę wyjąć.

Ranę powstałą z przebicia smarować, póki się nie zagoi maścią borną lub kreolinową.

Po ustaniu wzdęcia należy przez kilka dni zachować ściśle dietę: dobre siano, niewielką ilość otrąb i t. p. aż do zjawienia się prawidłowego odzyskania i wolnych odchodów.

W razie zatwardzenia dać na przeczyszczenie.

U owiec postępuje się podobnie; przy masowem jednak wzdęciu, gdy mu naraz wiele sztuk ulega — stado wprowadzić w szybki ruch — jeżeli można przepędzić stado przez wodę lub gdy to niemożliwe, oblewać z wiadra wodą studzienną.


Wzdęcie chroniczne zwykle nie wielkie za to często się powtarzające powstaje na tle niestrawności, wywołanej najczęściej nieodpowiedniem żywieniem. Trzeba wtedy zmienić sposób karmienia na właściwy i dawać do wewnątrz środki poprawiające trawienie i apetyt.

Wziąć piołunu i korzenia tataraku po 50 grm., soli 25 grm. zaparzyć litrem wrzącej wody, a po półgodzinnem stanie odcedzić, wycisnąć do cedzonki dodawszy 10 grm. olejku terpentynowego ostrożnie zalać. Powtarzać to dwa razy dziennie. Obok tego można dać dwa razy dziennie:

Kwasu solnego rozcieńczonego aptecznego 10 grm., naparu z rumianku pół litra; dawkę tę przez kilka dni powtarzać.

Dyeta posilna, lecz dawać karmę w niewielkich ilościach i latwostrawną (siano, otręby, jako dodatek niewielką ilość drobno siekanych buraków lub marchwi).

II. Niestrawność. Chore zwierzę zdradza objawy silnego bólu, ogląda się na brzuch, jest niespokojne, to kładzie się, to wstaje, tłuże i tarza się po ziemi; odchodów stałych albo wcale niema lub też są skąpe, twarde. Śmierć może nastąpić już w kilka godzin. Przyczyną niestrawności bywa zwykle niewłaściwy sposób karmienia: zbyt obfite karmienie otrębami, plewą hreczaną, zbyt drobną sieczką, zbyt wielką ilością słomy, szczególnie żytniej i grochowinami, świeżą koniczyną, jęczmieńcem, gdy do nich zwierzę nie przywykło i wogóle przekarmienie, opojenie zimną wodą i inne. Leczenie zależy na zupełnem odjęciu karmy zwierzęciu (żarłocznym koniom nakładać w takim razie kaganiec, aby podściółki nie jadły) na zadawaniu lewatyw z chłodnej wody samej lub z dodatkiem mydła, rozcieraniu całego ciała, a szczególnie brzucha, garściami słomy po uprzedniem skropieniu skóry spirytusem kamforowym, wreszcie na dawaniu do wewnątrz środków przeczyszczają-



cych: sól Glauberska i t. d. (patrz środki przeczyszczające). W chwili, gdy koń wskutek bólów chce się kłaść na ziemię i tarzać, należy krokiem przeprowadzać go w rękę; gdy stoi spokojnie, pokryć i podwinąć brzuch derką. Po ustąpieniu niestrawności a zjawieniu się oddechów, jeszcze przez 24 godzin zachować jak najściślejszą dyetę.

III. Stłuczenia. Stłuczone miejsca, natychmiast po uszkodzeniu, niezbyt ugniatając, rozetrzeć dobrze dłonią po nasmarowaniu ich tłuszczem, wazeliną lub skropieniu ich spirytusem kamforowym, arniką... Po dokładnem roztarciu, jeżeli powstał obrzęk, dać z wody zimny okład, który należy zmieniać w miarę ogrzewania się go. lub kompres z grubego płótna, złożonego w kilkoro i zamoczonego w roztworze Burowa lub w wodzie, do której dodano na litr 20 gramów cukru ołowiowego i 10 gramów alunu; okład taki należy w ciągu pierwszych 48 godzin często zmieniać lub polewać temiż roztworami. W ciągu kilku dni następnych okład pokrywać grubą tkaniną i zmieniać trzy razy na dobę.

IV. Obtarcia. Świeże obtarcia dwa razy na dzień obsypywać proszkiem, złożonym z 5 gramów bieli cynkowej (Zincum oxydatum), 20 gramów alunu (Alumen crudum) i 25 części kredy (Creta praeparata). Pudrowanie skuteczniać przez dni kilka. Obtarcia nieco starsze, sączące ropiastą zasychającą w strupy wydzielinę, smarować maścią jodoformową (1 gram jodoformu na 10 gramów wazeliny), a po kilku dniach, gdy powierzchwnia obtarcia oczyści się, posypywać dwa razy dziennie proszkiem powyżej wskazanym. Uprząż, która spowodowała obtarcie, poprawić; zwierzę aż do zagojenia od pracy uwolnić. Gdy w miejscu stłuczenia lub obtarcia potworzyły się otwory sączące ropę, nie zwlekać z poradą weterynarską.

V. Rany. Wszystko, co wchodzić ma w zetknięcie z raną, winno być bezwzględnie czyste; woda, używana do przemywania rany i do robienia środków opatrunkowych, ma być przegotowana w nowym garnku lub naczyniu, służącym stale i wyłącznie tylko do gotowania wody (samowar, kociołek i t. p.). Ręce przed rozpoczęciem opatrunku dokładnie wymyć wodą z mydłem, a następnie 2% roztworem kreoliny, toż samo po ukończeniu opatrunku. Pierwszą rzeczą po zranieniu winno być zatamowanie krwotoku, jeżeli ten jest znaczny, jeżeli nieznaczny i nie grozi życiu, pozostawić go samemu sobie i tylko zapewnić zwierzęciu zupełny spokój. Tamowanie krwotoku uskutecznia się przez wywołanie ucisku na ranę zapomocą nalożenia na nią lub wciśnięcia w nią tamponów zrobionych z waty, zawiniętych w gazę, które następnie przyciskamy do rany płóciennym bandażem. W braku waty i gazy należy robić uciskadela z czystych chustek lub z ręczników złożonych w kilkoro i namoczonych w spirytusie. Uciskadla pozostawić należy do drugiego dnia. Opatrunek rany polega na usunięciu z niej zanieczyszczeń t. j. ziemi, brudu i t. d. zapomocą obfitego zlania jej z początku przegotowaną wodą a następnie jakim roztworem odkażającym np. kreoliną (2%), sublimatem (1 na 3000), kwasem karbolowym (3%). Robienie roztworów sublimatu rtęciowego i karbolu trzeba uskutecznić ostrożnie, gdyż są to środki trujące. Po wymyciu rany przykrywa ją się gazą karbolową, jodoformową, ajrołową lub tym podobną, na którą kładzie się grubą warstwę takieżże samej waty i umocowuje bandażem. Opatrunek zmienia się raz

na dzień lub rzadziej, stosownie do ilości wydzieliny przyrannej. Watę i gazę kupować w małych ilościach i dobrze zawiązać, aby się nie brudziły. Rany, mające zagłębienia, podminowane brzoży, poszarpane tkanki, wymagają umiejętnej, fachowej opieki.

VI. Wrzody. Opatrunek wrzodów wymaga jeszcze większej pieczołowitości niżli opatrunek czystych, świeżych ran, które zresztą, gdy będą zaniedbane, prędko zamieniają się na wrzody. Leczenie wrzodów polega na ich mechanicznem oczyszczeniu i użyciu środków dezynfekcyjnych, jak przy ranach, a obok tego na zapewnieniu swobodnego odpływu wydzieliny, zapomocą odpowiednich nacięć lub zakładania drenów, co już należy poruczyć znawcy. Początkowo, zanim wrzody wydzielają zaciną czystą ropę, roztwory odkażające winny być mocniejsze stopniowo jednak w miarę oczyszczania się wrzodu i zmniejszania się wydzieliny, należy robić je słabszymi. Sposób dokonywania opatrunku jest taki sam, jaki był podany przy ranach. I tutaj najważniejszą rzeczą jest czystość, a wreszcie zażądanie w odpowiednim czasie umiejętnej pomocy.

VII. Gruda u koni. Jest to złośliwe, uporczywe zapalenie skóry na pęcinach po stronie tylnej. Powstaje ono wskutek nieczystego utrzymywania kończyn, delikatności skóry, zaniedbania obtarć i innych uszkodzeń w tych miejscach. Zapobieganie i leczenie: po powrocie zwierzęcia z błoczonego do stajni nogi wymyć wodą i obetrzeć do suchości. Obtarcia i świeżo dopiero powstający wyprysk po obmyciu i osuszeniu przysypywać dwa razy dziennie proszkiem złożonym z 1 cz. bieli cynkowej, 4 części alumu i 5 części kredy preparowanej. Przy grudzie ropiejącej sinarować miejsca opanowane przez wyprysk masścią jodoformową (1 część jodoformu na 10 części wazeliny) a po kilku dniach, gdy wytwarzanie ropy się zmniejszy, obmyć wodą z mydłem, osuszyć i posypywać wyżej wskazanym proszkiem. Przy grudzie nieropiejącej, zastarzałej, oprócz proszkowania namaszczać raz na tydzień pęcinę gliceryną. W początkach choroby zwierzę na kilka dni od pracy uwolnić i pozostawić w spokoju. Przy grudzie zastarzałej ruch musi być bardzo ograniczony i to przez dość długi czas. Tak nazwana gruda zgorzelinowa, przy której wypadają obumarłe kawałki skóry, wymaga operacyjnych zabiegów, poruczyć zatem jej leczenie weterynarzowi.

VIII. Jchwat. Ostre zapalenie mięsnych części kopyta, występujące zwykle nagle na obydwóch przednich lub na wszystkich czterech kończynach, czemu towarzyszy silny ból i kulawizna, nazywany ochwatem. Powstaje on zwykle wskutek napojenia zimną wodą zgrzanego konia po szybkim ruchu lub wysiłonej pracy, wystawienie takiego zwierzęcia na wiatr, przeciągi i t. p. Konia podejrzanego o ochwat winno się przedstawić do zbadania lekarzowi weterynaryjnemu, gdyż choroba ta niedość energicznie leczona ciągnie się długo i pozostawia ślady na całe życie zwierzęcia. Leczenie polega w samym początku na obfitym upuście krwi, następnie zaś na zadaniu środków przeczyszczających (350 500 gramów soli Glauberskiej), skrapianiu (kilka razy na dzień) całego ciała kamforowym spirytusem i mocnem rozcieraniu (po każdym skropieniu) garściami słomy, szczotkami lub t. p. wreszcie na wytrwałych zimnych okładach kopyt. Okłady te najłatwiej skutecznie w ten sposób, że do oddziel-

nego stanowiska przywozi się wóz gliny, glinę zarabia wodą i wstawia się doń konia przednimi lub wszystkimi czterema kopytami, stosownie do tego, czy tylko przód, czy też i tył był zajęty. Na noc zwierzę przeprowadzić na kilka godzin do suchego stanowiska z obfitą podściółką, aby położywszy się mogło wypocząć. Dyeta początkowo winna być skąpą. Przez cały czas choroby dawać pokarm łatwo strawny.

IX Podbitek. Powstaje on najczęściej przez dostanie się kamyka pomiędzy ramię podkowy a podeszwę rogową. Przy ścisaniu kleszczami lub uderzaniu czemś twardem po podeszwie kopyta powstaje w chwili, gdy ścisamy miejsce nagniecione (znajdujące się najczęściej przy końcu ramion podeszwy obok strzałki), lub uderzaniu po niem — wyraźny ból, który zwierzę zdradza przez wrywanie nogi lub drganie mięśni. Z początku zapobiega zlewnu energicznie stosowany zimny okład (obwijanie grubem płótnem i zlewanie po niem zimną wodą, do której włożono lodu) okład z gliny mieszanej z drobno tłuczonym lodem). Kowale mają zwyczaj, gdy podejrzewają podbitek, wybierać róg z podeszwy głęboko aż do żywego, poszukując ropy. Koń prowadzony z powrotem do domu nabija sobie do ranki ziemi i brudu, skutkiem czego niezadługo powstaje owrzodzenie podeszwy kopytowej, przerzucające się zwykle na chrząstkę kopytową, co pociąga za sobą wielomiesięczną chorobę. Mnóstwo koni w ten sposób się marunie. Po zdjęciu rogu z miejsca chorego należy kopyta kąpać przez 20 minut w ciepłej wodzie, do której dodano (na pół kubła) dwie łyżki wapna chlorowego (Calcaria chlorata), następnie ranę przemyć 10% roztworem wodnym siarkanu miedzi (Cuprum sulfuricum), zasypać jodoformem, założyć gazę jodoformową i takąż watę, poczem obandażować płócienną obwiązką, szeroką na 10 ctm. a na 2 metry długą, obwinąć w ceratę (jeżeli pod koniem jest mokro) a na wierzch dać wojłok. Opatrunek zmieniać codziennie, wyjąwszy kąpiel. Jeżeli ropa zapuszcza się pod róg kopytowy — wezwać pomocy lekarza weterynaryjnego.

X. Nakłucia podeszwy lub strzałki rogowej gwoździem (nagwoźdzenie) lub innem jakim ostrokończystem ciałem są bardzo niebezpieczne, gdyż pociągają za sobą często owrzodzenie kości kopytowej, ścięgnię mięśnia zginającego staw kopytowy, zapalenie ropne stawu kopytowego i t. d. Gdy spostrzeże się nakłucie, należy natychmiast ciało raniące z rany wyciągnąć, kopyto obwiązać, aby przez drogę nie nabiło się błota lub kurzu, a po przyprowadzeniu do domu, róg w ścianach otworu nieco wybrać, nogę wykąpać w roztworze wapna chlorowego. Opatrzywszy jak należy (patrz podbitek), konia zaprowadzić do lekarza weterynaryjnego.

XI Gnicie strzałki kopytowej. Choroba polega na tem, że wskutek niedbalogo i wilgotnego utrzymywania kopyt, strzałki rogowe gniją, rozpadają się, w rowku strzałkowym żywe tkanki obnażają się, ropieją, spowodowując znaczną kulawiznę. Kopyto takie wydziela z siebie wstrętny odór; zgłębnik wsunięty w rowek strzałkowy, szczególnie w miejscu, gdzie ramiona strzałki przechodzą w piętki, wywołuje ból, wyjęty zaś z rowka jest pokryty ropiastą, mazistą, brudną, cuchnącą cieczą. Takie kopyto przedewszystkiem należy dokładnie oczyścić, gnijący i rozpadający się róg oddzielić, rowki strzałkowe dobrze w głębi oczyścić kawałkami płótna; następnie zrobić kąpiel w roztworze

wapna chlorowego (patrz podbitek); po kąpieli rowki osuszyć płótnem i zalawszy 10% roztworem siarkanu miedzi (koperwasu miedzianego v. siniego kamienia) rowki wypełnić mocno watą, gazą lub płótnem w celu rozszerzenia ich. Zalewanie skutecznieć dwa razy dziennie, dopóki kulawizna nie przejdzie. Przed każdym zalaniem watę z rowka strzałkowego wyjąć. Gdy rowki zostaną rozszerzone, dalszego zakładania watą zaprzestać. Umiarkowany ruch na świeżem powietrzu podczas suchej pogody sprzyja prędkiemu wyleczeniu. Jako środek zapobiegawczy zaleca się czyste utrzymanie kopyt i suche stano-wisko.

XII. O chorobach i wadach zwrotowych czyli ewikojnych. Gdy kto odstępuje drugiemu rzecz jaką pod tytułem obciążającym, natenczas winien jest ewikcyę na to, że rzecz ta ma własności, jakie wyraźnie umówione były, lub jakie zwykle są w niej dorozumiewane i że stosownie do natury interesu lub zaszczytowi umowy użytą być może (§ 922. Księgi ustaw cywil. z r. 1811 cz. II).

Kto zatem przydaje rzeczy własności, jakich nie ma, a które wyraźnie, lub też według natury interesu dorozumiewanie umówionemi były; kto zataja nadzwyczajne wady lub ciężary, kto pozbawia rzecz, która już nie istnieje lub do kogo innego należy, kto fałszywie uznaje, że rzecz do oznaczonego użytku jest zdalna, lub że jest wolną od zwyczajnych wad i ciężarów, ten, gdy pokaże się rzecz przeciwna, jest za to odpowiedzialnym. (§ 923).

Gdy bydło zachoruje lub padnie we dwadzieścia cztery godzin po odebraniu onego, natenczas jest domniemanie, że już przed oddaniem było chore (§ 924).

U w a g a. Domniemanie to rozciąga się na wszystkie zwierzęta, odnosi do wszystkich chorób. Sprzedawcy jednak przysługuje prawo dowieść, że choroba powstała u nowonabywcy.

Okresy zwrotowe dla poszczególnych chorób (§ 925).

Choroba.	Okres zwrotowy.
Wągry	8 dni
Ospa owcza	8 „
Parchy u owiec	8 „
Zoły podejrżane	15 „
Nosacizna	15 „
Gruźlica (choroba gruczołów)	15 „
Dychawica	30 „
Skołowacenie	30 „
Koler czyli wartogłowienie	30 „
Tyleczak (nosacizna skórna)	30 „
Narowistość	30 „
Jasna ślepotą lub kurza ślepotą	30 dni
Ślepotą miesięczną	30 „
Motylica	2 miesiące.
Robaki płucne	2 „

U w a g a. I przy tych chorobach nie jest wykluczony dowód przeciwny, iż wskazana wada powstała rzeczywiście dopiero u kupującego; jednakowoż fakt ten musi udowodnić oskarżony, co tylko przez rzeczoznawców stać się może.

Jednakże ten, kto bydło odebrał, wtenczas tylko do wzmiankowanego prawnego domniemania (923—925) odwołać się może, gdy oddawcę czyli ewiktora na tych miast o dostrzeżo-

nej wadzie za wiadomości, lub w jego nieobecności sądowi miejscowemu, albo w sztuce biegłym doniesie i o naoczne obejrzenie postara się (§ 926).

Jeżeli odbierający zaniedba tej ostrożności, natenczas do niego należy dowód, że byłę już przed zawarciem umowy miało wadę. Zawsze jednak może oddawca dowodzić, iż za skarżoną wadą dopiero po wydaniu powstała (§ 927).

Jeżeli wady rzeczywiście są widoczne, albo o ciężarach do rzeczy przywiązanych można się z ksiąg publicznych przekonać, natenczas żadna nie należy się ewikcyja, wyjąwszy, gdyby wyraźnie danem było zapewnienie, że jest wolną od wszelkich wad i ciężarów (§ 443). Za długi i zaległości rzecz obciążające, zawsze należy się ewikcyja (§ 928).

Jeżeli rzeczy oddawane są naogół, to jest tak, jak stoją lub leżą, bez liczenia, mierzenia lub ważenia, natenczas oddawca nie odpowiada za wady w nich odkryte, chyba by rzecz nie miała jakiej własności, którą albo oddawca fałszywie udawał, albo też odbierający sobie wymówił. Nawet i przy ryczałtowie nabywaniu można żądać poręki, gdyby np. cała trzoda była innej rasy, aniżeli było umówionem (§ 930).

Gdy w interesach obustronnie obowiązujących, strona jedna, ze względu na zwyczajną wartość rzeczy, nie dostaje ani połowę tego od drugiej, co jej dała, natenczas pozwala ustawa stronie pokrzywdzonej żądać zniesienia umowy i przywrócenia do dawnego stanu. Może jednak druga strona utrzymać w całości umowę, ofiarując dolożyć tyle, ile do zwyczajnej wartości brakuje. Niestosunkowość wartości oznacza się według czasu, w którym umowa zawartą została (§ 934).

Wzmiankowany środek prawny niema zastosowania, gdy się go kto rzekł wyraźnie lub oświadczył, iż ze szczególniejszego upodobania przyjmuje rzecz w nadzwyczajnej wartości, gdy pomimo, że mu prawdziwa wartość wiadomą była, przystał na niestosunkową wartość; gdy ze stosunku osób domniemywać się należy, iż chciałby zawrzeć umowę w części pod tytułem dawnym w części pod tytułem obciążającym; gdy prawdziwej wartości już dojść nie można; nakouiec gdy rzecz sądownie sprzedana była (§ 305, 1059, 1060, 1089, 1268).

Do powyższych paragrafów ustawy możemy dodać ze swej strony jeszcze następujące ostrzeżenie:

Każdy środek ochronny w ręku niesumiennego człowieka może się stać orężem do zgnębienia ludzi uczciwych lecz nieświadomych rzeczy. Tak się też rzecz ma i z przepisami o ewikcyi, których nieuczciwy sprzedawca lub nabywca niejednokrotnie używa do popelnienia oszustwa. Tego niestety dowieść w największej ilości wypadków bardzo trudno.

Nie łatwiejszego, jak stać się przedmiotem takiego nadużycia. Pod tym względem najbardziej wystrzegać się należy jarmarkowych, zawodowych handlarzy.

Taki handlarz, znając się wybornie na wadach koni nie raz dostrzeże w zwierzęciu wadę dającą prawo do ewikcyi, o której dawny posiadacz konia nic a nic nie wie; jest nią najczęściej naprzykład początek dychawicy i ślepoty miesięczna. Handlarz pomimo przekonania swego o istnieniu wady, kupuje konia, rozumie się nie powiadając o swem odkryciu, bo wie, że jeżeli konia tego z korzyścią nie sprzeda, to zmusi poprzedniego właściciela do jego odbioru z powrotem, a gdy

ten się opiera, to i do wynagrodzenia poniesionych strat, zwrotu kosztów utrzymania i t. d. Rady na to niema, bo nie podobna dowieść iż handlarz wadę widział, lecz o jej spostrzeżeniu nie wspominał.

Cheąc uniknąć strat lub narażenia się na proces, trzeba inaczej postępować przy sprzedaży a inaczej przy kupnie konia. Sprzedając trzeba sobie wyraźnie zastrzedz, że sprzedaje się zwierzę bez prawa do ewikcyi i to pod każdym względem, przyczem jednak rozumie się, iż sprzedający rzeczywiście ani nie wie ani nie ma podejrzenia, że jakakolwiek wada ewikcyjna lub choroba zmniejszająca wartość sprzedawanego zwierzęcia lub kwestyonująca jego użyteczność istnieje, bo w razie przeciwnym mógłby narażać się na proces karny ze wszelkimi jego smutnymi następstwami. Aby jednak takie zastrzeżenie miało doniosłość, nowonabywca koniecznie musi się na podawany sobie warunek zgodzić, pisemnie lub przy wiarygodnych świadkach. — Przy nabywaniu konia od zawodowego handlarza trzeba powiedzieć przeciwnie, mianowicie należy wziąć od niego zaręczenie, że koń jest zdrow zupełnie, że jest rzeczywiście takiego wieku, jak twierdzi handlarz i nie ma wad ani nie widocznych ani widocznych, obniżających wartość i użytkowość zwierzęcia, — ale to znowu musi sprzedający wyraźnie zaręczyć przy świadkach lub pisemnie inaczej można liczyć prawie na pewne, że się wyprze swego zaręczenia. Wprawdzie przy takich warunkach trudniej jest nabyć lub sprzedać zwierzę, ale za to ma się pewność, że nie będzie się napastowanym i narażonym na wielkie nieraz straty.

Rozumie się, wszystko to jest dobre wtedy, gdy handlarza jest na czem patrzeć, gdy więc jest materialnie odpowiedzialnym, w razie przeciwnym żadne z jego strony poręczenie najmniejszego nie ma znaczenia praktycznego.

XIII. Oznaczenie wieku zwierząt domowych ssących. a) Koń. Koń dorosły posiada w każdej szczękę po 3 pary zębów siecznych (1 para ∇ przednia, 2 para ∇ średnia, 3 para ∇ okrajki), razem 12. nadto po jednej parze kłów, i po 6 par zębów trzonowych, razem w obydwóch szczękach zębów 40; klacze kłów zwykle nie posiadają.

z. trzonowe	kły	siekacze	kły	z. trzonowe
6 5 4 3 2 1	—1—	3 2 1 1 2 3	—1—	1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 1	—1—	3 2 1 1 2 3	—1—	1 2 3 4 5 6

Rozpoznajemy lata konia głównie po siekaczach.

Siekacze mają na koronie wgłębienia (dolki, rejestry) otoczone wyniosłymi brzegami (przednim i tylnym).

Siekacze, kły i trzy pierwsze pary trzonowych zębów koń zmienia w ciągu pierwszych 2½ lat swego życia; zęby te nazywamy mlecznymi, zęby zaś, które na miejsce mlecznych wyrosły, i trzy ostatnie pary trzonowych nazywamy stałymi.

Zmiany, jakie zachodzą na siekaczach, dzielimy na sześć okresów.

Okres I zębów mlecznych. Żrebię rodzi się zwykle z 1 parą przednią siekaczów, między 4-ym a 6-ym tygodniem dostaje drugą parę (średnią), między 5-ym 6-ym a 9-m miesiącem trzecią parę (okrajki). Natychmiast po wyrosnięciu siekaczów brzegi ich się ściągają, dolki stają się coraz płytszymi, wreszcie znikają zupełnie.



U 15 miesięcznego źrebięcia giną dolki na przedniej parze.

U 2 letniego źrebięcia giną dolki i na średniej parze.

U 2½ letniego źrebięcia giną dolki i na okrajkach.



Okres II zmiany zębów. Po 2½ latach od urodzenia wypada przednia para siekaczy mlecznych, a zastępują je siekacze stałe, które w końcu trzeciego roku dorównywiają wysokości pozostałych mlecznych.

Ząb sieczny konia widziany w podłużnym przekroju. Przestrzeń wskazana przez linie punktowane (D) nazywa się dolką zębową lub rejestrem.



Siekacze konia trzechletniego. Pierwsze pary w obu szczękach stałe, całkowicie wyrosłe. Drugie i trzecie pary jeszcze mleczne.

Siekacze (w dolnej szczęce) u konia 4 letniego. Pierwsza i druga para zębów stałych, na których dolki jeszcze nie starte, trzecia mlecznych, na których dolki już są starte.



Siekacze i kły konia 5 letniego. Wszystkie 3 pary zębów stałych. Dolki jeszcze niestarte na żadnej parze.

Siekacze konia 7 letniego. Wszystkie zęby stałe; na pierwszej i drugiej parze dolki zupełnie starte, i pozostały tylko ślady po nich; na trzeciej parze dolki kończą się ścierać.

Po 3½ latach wypada średnia para, a wyrosłe w jej miejsce stałe zęby dorównywuują pozostałym w końcu czwartego roku.

Po 4½ latach wypadają okrajki, zastępujące je zaś zęby stałe zupełnie wyrastają w końcu piątego roku.

W piątym roku wyrastają u samców kły.

Okres III koron poprzecznie owalnych lub ściernia się dołków.

Koń pięcioletni ma już wszystkie zęby stałe, zarówno siekacze, kły jak i trzonowe.

Powierzchnia koron siekaczy ma wygląd poprzecznie owalny O, który powoli zmienia się od 10 roku życia pokolei, zaczawszy od przedniej pary dolnej szczęki a skończywszy na okrajkach w górnej szczęce w kształt prawie okrągły O.

Jednocześnie następuje ściernie się brzegów i znikanie dołków na koronach.

W końcu 6 roku znika dołek na pierwszej parze siekaczy szczęki dolnej.

W końcu 7 roku znika dołek na drugiej parze siekaczy szczęki dolnej.

W końcu 8 roku znika dołek na trzeciej parze siekaczy szczęki dolnej.

W końcu 9 roku znika dołek na pierwszej parze siekaczy szczęki górnej.

W końcu 10 roku znika dołek na drugiej parze siekaczy szczęki górnej.

W końcu 11 roku znika dołek na trzeciej parze siekaczy szczęki górnej.

Koń dwunastoletni ma starte dołki na wszystkich zębach siecznych, zarówno dolnej szczęki, jak i górnej.

Dalsze określanie wieku jest już niepewne.

Po dwunastu latach występuje:

Okres IV koron okrągłych, które stopniowo przyjmują kształt okrągły O, aż do lat 18, poczem zjawia się:

Okres V zębów o koronach trójkątnych Δ, zmieniający się wreszcie na:

Okres VI koron podłużno owalnych O, trwający do końca życia konia.

b) **Bydło rogate.** Siekaczy bydło rogate i owce posiadają 4 pary i to w dolnej szczęce; razem 8 siekaczy. (Pierwsza para √ przednia, druga para √ średnia pierwsza, trzecia para √ średnia druga, czwarta para √ okrajki), Kłów bydło posiada, trzonowych tak samo jak koń po 6 par w obu szczękach; razem bydło rogate posiada 32 zęby.

Trzonowe	Siekacze	Trzonowe
6 5 4 3 2 1 —		— 1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 1 —	— 4 3 2 1 1 2 3 4 —	— 1 2 3 4 5 6

Bydło rogate rodzi się z siekaczami mlecznymi, lub wyrastają mu one wszystkie w ciągu pierwszych 4 tygodni.

Od 18 do 20 miesięcy zmienia pierwszą parę siekaczy mlecznych na stałe.

Od 2 do 2½ lat zmienia drugą parę siekaczy mlecznych na stałe.

Od 2½ do 3 lat zmienia trzecią parę siekaczy mlecznych na stałe.

Od 3 $\frac{1}{2}$ do 3 $\frac{3}{4}$ roku zmienia czwartą parę siekaczy mlecznych na stałe.

Po rogach u krów poznaje się wiek w ten sposób, że gładki koniec rogu liczy się za trzy lata a każde obrączkowe wgłębienie (odpowiadające ciężarności) lub odpowiednia przestrzeń na rogu za rok.

c) **Owca.** Owce mają tyle samo zębów co bydło rogate i tak samo ułożonych. Do 5 tygodni wyrastają wszystkie siekacze mleczne.

Między 12 a 18 miesiącem zmienia się pierwsza para siekaczy mlecznych na stałe.

Między 18 a 24 miesiącem zmienia się druga para siekaczy mlecznych na stałe.

Między 30 a 33 miesiącem zmienia się trzecia para siekaczy mlecznych na stałe.

Między 36 a 45 miesiącem zmienia się czwarta para siekaczy mlecznych na stałe.

d) **Świnia.** Świnia posiada po 3 pary zębów siecznych w każdej szczęce, razem 12, po jednej parze kłów i po 7 par trzonowych — razem 44 zęby.

Trzonowe	Kły	Siekacze	Kły	Trzonowe
7 6 5 4 3 2 1	—1—	3 2 1 1 2 3	—1—	1 2 3 4 5 6 7
7 6 5 4 3 2 1	—1—	3 2 1 1 2 3	—1—	1 2 3 4 5 6 7

Okrajki mleczne i kły mleczne przynosi z sobą zwierzę na świat.

Między 2 a 4 tygodniem wyrasta pierwsza para siekaczy mlecznych.

Między 6 a 8 tygodniem wyrasta druga para siekaczy mlecznych w dolnej szczęce.

Między 8 a 12 tygodniem wyrasta druga para siekaczy mlecznych w górnej szczęce.

Między 8 a 9 tygodniem następuje zmiana okrajków i kłów mlecznych na stałe.

Między 11 a 13 miesiącem następuje zmiana pierwszej pary siekaczy mlecznych na stałe.

Między 16 a 17 miesiącem następuje zmiana drugiej pary siekaczy mlecznych na stałe w dolnej szczęce.

Między 16 a 18 miesiącem następuje zmiana trzeciej pary siekaczy mlecznych na stałe w górnej szczęce.

Rzecz poglądowo traktująca oznaczenie wieku konia znaleźć można w mojej „Tablicy poglądowej do rozpoznawania wieku konia”. Lwów. Cena w redakcyi Przeglądu weterynarskiego 1 kor. 20 hal. za pobraniem.

UWAGI I DATY Z ADMINISTRACYI GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO.

Ułożył Prof. Dr. Stefan Pawlik.

Zadanie administratora polega na takim ustosunkowaniu kosztów produkcji do otrzymanych wartości, czyli dochodu brutto, ażeby mógł uzyskać możliwie największy dochód czysty z danej produkcji i w danych miejscowych warunkach. System produkcji w gospodarstwie rolnem i leśnem, w którym małym nakładem w kapitałach i pracy wydobywamy z ziemi mały dochód brutto w stosunku do obszaru, ale wielki dochód czysty w stosunku do wartości ziemi nazywamy *systemem ekstensywnym* (obszarowym).

System zaś produkcji, przy którym musimy używać znacznych nakładów kapitału i pracy, ażeby z drogiej ziemi wydobyć wysoki dochód brutto, a stosunkowo niski dochód czysty nazywamy *systemem intensywnym* (forsownym, nakładowym). Odróżniamy forszę przez kapitał i forszę przez pracę, wreszcie razem wziętą forszę przez kapitał i pracę.

Odróżniamy systemy gospodarcze z przewagą:

I.	II.	III.
produkcji roślinnej	produkcji zwierzęcej	produkcji przemysłowej.

Gospodarstwo wyda wówczas najwyższy możliwy dochód, jeżeli każda poszczególne gałąź produkcji sama dla siebie przyniesie najwyższy dochód, względnie dopomoże drugiej do zwiększenia dochodu; ażeby to nastąpiło, potrzeba:

I.	II.	III.
takie rośliny uprawiać, które w danych warunkach zapewniają największy dochód;	takie zwierzęta i płody zwierzęce utrzymywać wzgl. produkować, które w danych warunkach agronomicznych i ekonomicznych zapewniają największy dochód;	taki przemysł wprowadzać, który rzeczywiście z I i II produkcją lub obydwoma jest ściśle związany i służy do ułatwienia a nawet umożliwienia zbytu płodów roślinnych lub zwierzęcych a opiera się na materiałach surowych w gospodarstwie wytwarzanych.

Nie mogąc się wdawać w szczegółowy rozbiór powyżej nazkicowanego podziału, przechodzimy do t. zw. typów organizacyjnych, opierających się na sposobie użytkowania z ziemi ornej i wskutek tego stojących w pewnym związku z uprawianymi roślinami.

Rozróżniamy następujące główne typy systemów polowego gospodarstwa:

1. *Ekstensywny system pastwiskowy*, w którym zauważyć możemy znaczne obszary pastwisk, nie będących w kulturze, obok

tych mało łąk naturalnych. Rozmiary gruntów ornych, służących wyłącznie do produkcji zbóż, minimalne. Role nie są nawożone, lecz odlogowane. W uprawę bierze się najlepsze grunta.

2. *Ekstenzywny system pastwiskowo-ziarnowy.* Przeważają pastwiska i łąki, o kulturze i pielęgnacji tychże nie ma mowy. Grunta orne stale uprawiane i odgraniczone od łąk i pastwisk. Przeważa produkcja zbożowych roślin. Występuje ugor czarny, nawożony obornikiem.

3. *Intenzywny system zbożowy.* Trwale pastwiska z wyjątkiem gorszych — owczych — zaorane. Na łąkach przebijają ślady kultury. Znaczna uprawa zbożowych na roli, przy obsiewanym ugorze. Obfitość łąk naturalnych spowodowuje zwiększenie uprawy zbożowych na roli i przeciwnie mały obszar łąk zmusza do obsiewu ról ornych roślinami pastewnymi. Obok nawozu stajennego używa się już nawozów pomocniczych. W uprawie i gorsze ziemie w miarę stosunku łąk do całego obszaru.

4. *System płodoziemny* charakteryzuje przede wszystkim zanik pastwisk owczych, obok widocznej kultury łąk. Rośliny zbożowe zajmują najwyższej połowę obszaru gruntów ornych. Wobec dobrego ustosunkowania łąk uprawia się na roli głównie rośliny targowe, między którymi poważne miejsce przyznajemy okopowym. W braku łąk wprowadza się na ziemiach odpowiednich znaczną uprawę roślin pastewnych, natomiast na lżejszych gorszych ziemiach wprowadza się nawozy zielone, z uwagi na ograniczony stan inwentarza żywego, a co zatem idzie mało obornika.

5. *Intenzywny system pastwiskowy.* Role orne wzrastają kosztem złych pastwisk; najlepsze role zamienia się w pastwiska. Wybitną rolę odgrywają łąki naturalne obok łąk sztucznych. System ten warunkują specjalne klimatyczne położenia i natura gleby, sprzyjająca bujnemu porostowi traw. Uprawa zbożowych roślin na roli ograniczona, produkcja ziarna jest na drugim miejscu, na pierwszym uzyskanie odpowiedniej ilości słomy na ściólkę.

Obok tych pięciu głównych typów systemów polowego gospodarstwa występuje jeszcze cały szereg pośrednich typów, zależnych jużto od warunków przyrodniczych, jużto od warunków ekonomicznych, wpływających wybitnie na ukształtowanie specjalnego systemu. I tak np. górzyste położenie, znaczne torfowiska itp., względnie wielkie zapasy pokarmów roślinnych w roli, tanie środki nawozowe, ułatwiony i bardzo korzystny zbyt pewnych surowych płodów lub produktów, zasób kapitału obiegowego, inteligencja kierownika przedsiębiorstwa itd. itd. mogą wpłynąć na wybór specjalnego systemu, odpowiadającego najlepiej danemu środowisku pracy gospodarza. Przy przejściu z ekstenzywnego do intenzywnego użytkowania gruntów, zauważyć możemy następujące momenta. Łąki i pastwiska bywają przede wszystkim oddzielnie stale jako takie uważane. Pielęgnacja łąk wzrasta, obok uprawy występuje już i nawożenie. Produkcja siana łąkowego wzrasta stale. Pastwiska bywają również systematyczniej użytkowane; usuwa się wszelkie chwasty i krzaki, równa się powierzchnię, otacza i przecina się w miarę potrzeby rowami itd. W obydwóch wypadkach nie występują większe zmiany w prowadzeniu i zarządzie gospodarstwa. Dopiero z chwilą zmiany pastwisk w role orne i odwrotnie może być o nich mowa. Odmienne przedstawia się sprawa intenzywniejszego użytkowania gruntów ornych. Tu występuje pewien już istniejący podział pól na łąny i pewne ściśle określone zmianowanie. Ale nawet w ramach istniejącego

zmianowania, można przejść do intensywniejszej formy przez osuszenie gruntów. W dalszym ciągu rozszerzamy obszar gruntów ornych kosztem pastwisk i nieużytków. Wreszcie wprowadzamy uprawę roślin, wymagających większego nakładu pracy i kapitału, roślin opłacających nakłady. Tu przynależą ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel itd. W zbożowym gospodarstwie, wprowadzenie uszlachetnionych odmian, hodowanie tychże, wskazuje również intensywniejszą formę użytkowania roli. Może zająć potrzebę zupełnej przeróbki dotychczasowego zmianowania, która to praca wymaga dokładnej znajomości przyrodniczych i ekonomicznych warunków danego gospodarstwa. Z taką przemianą, zwłaszcza początkowo w t. z. przejściowym okresie, napotykamy zwykle szereg mniejszych lub większych niedogodności, które nie powinny nas odstraszać, ale być pobudką do pracy. Wyższe plony, wyższe dochody w latach następnych, wynagradzają trud podjęty w zupełności, ale tylko wówczas, kiedy reorganizacją oparliśmy na poważnych studiach i możliwie dokładnym planie. Dobrze prowadzone zapiski gospodarskie ułatwiają wykonanie kalkulacyjnych rachunków i ułożenie odpowiedniego planu reorganizacji całego systemu gospodarstwa. Nie należy jednak uważać, że sporządzony plan jest schematem niewzruszalnym, ale — w miarę rozwoju i zmian stosunków — wprowadzać dalsze ulepszenia. Probiezmem dobrej organizacji gospodarstwa będą wyniki rachunkowe, wykazujące ciągły postęp w dochodach.

Powyższe uwagi wykazują potrzebę prowadzenia dokładnych zapisków, zbierania i systematycznego zestawiania tychże w liczbach, co nazywamy rachunkowością. Urządzenie ksiąg rachunkowych i sposób prowadzenia zależy od metody rachunkowej, jaką obierzemy. Ilość zaś ksiąg stosować należy do rozmiaru i składu przedsiębiorstwa, do ważności poszczególnych gałęzi przedsiębiorstwa, zadań, jakie rachunkowości postawimy i sił jakimi w celu prowadzenia rachunków rozporządzamy. W kancelarii gospodarza powinna być bezwarunkowo dokładna mapa posiadłości oraz spis parcel; wszelkie księgi gospodarskie winny być nie tylko prowadzone, ale nadto rok rocznie muszą być systematycznie przeprowadzone zamknięcia ksiąg. Wyniki ostateczne, tak co do plonów, jako też dochodów, użycia robocizny najemnej i akordowej itd. w tabelarycznych porównawczych zestawieniach z szeregu lat, dają obraz twórczej pracy gospodarza w przeszłości, a nadto są materiałem do zmian w przyszłości.

Ażebymy jednakże wyniki rachunkowe mogły być poważnie traktowane, potrzeba, ażeby we wszystkich szczegółach rachunkowych, jako też i w zestawieniu całości rachunku, widocznym było życie, a nie zimna martwota. Rachunkowość bowiem służy do wspierania planów gospodarza w jego administracyjnych kombinacjach, wszelkiewięc zapiski z myślą wykonane być muszą, a wtedy przedstawiać one będą myślącemu administratorowi wierny obraz gospodarstwa z pewnym planem zarządzanego.

UWAGI

o pomiarze i podziale pól na zmianowania i niwy*).

Z punktu gospodarskiego jednakże nie tak łatwo nie tyle o dokładny, ile o pomiar odpowiadający potrzebom i zamiarom gospodarstwa.

Przejdziemy w krótkości ważniejsze momenta, na które nie zwraca się dostatecznej uwagi.

1. Przy rozrzuconej posiadłości, złożonej z szeregu oddzielnych parcel, odgrywa poważną rolę rozciągłość granic, pociągające za sobą wiele niedogodności, między innymi stratę użytkowej powierzchni. Już sama konfiguracja parceli, przynależnej do danego gospodarstwa, obniża powierzchnię użytkową, i tem więcej, im stosunek szerokości do długości parceli jest mniej korzystny. I tak np. parcele, których stosunek długości do szerokości ma się jak 10 : 1 wykazują przy niżej wymienionych obszarach następującą długość granic:

Parcela	ha	średnia długość granicy na 1 ar
400	13'904 m	0'34 m
100	6'952 »	0'70 »
10	2'200 »	2'20 »
5	1'555 »	3'11 »
1	695 »	6'95 »
0'5	593 »	11'86 »
0'1	220 »	22'00 »
0'01	70 »	70'00 »

Im więcej oderwanych, małych parcel, o nieodpowiedniej konfiguracji tem gorzej, zwłaszcza gdy chodzi o role orne, uprawę, zbiór t. p.; przy innych stałych kulturach występują wprawdzie ujemne skutki ale w mniejszym stopniu.

2. Odległość parceli od środowiska zarządu t. j. od folwarku, wpływa ujemnie na wysokość dochodu, spowodowuje bowiem większe zapotrzebowanie sił sprzężajnych i pieszych do pokonania prac, wskutek przebywania dróg tam i z powrotem, utrudnia pozór i t. d. Jeśli się nadto uwzględni zły stan dróg wewnątrz majątku, złe dojazdy, znaczne spadki i wzniesienia, wówczas rachunek na niekorzyść wypadnie jeszcze gorzej.

Przejdźmy do podziału pól na zmianowania i niwy.

Pierwsze pytanie dotyczy liczby zmianowań, a więc jedno, dwa lub więcej. W okolicach nizinnych, w równym terenie, przy większej jednostajności gleby i podglebia, należy dążyć do ograniczenia liczby zmianowań do niezbędnego minimum. Jedynym motywem usprawiedliwiającym wprowadzenie dwóch zmianowań; może być zbyt wielkie oddalenie pól od folwarku. Wówczas na bliższych polach gospodarujemy intensywniej, wprowadzamy rośliny, wymagające większego nakładu pracy, nawozów stażennych i t. p. na odleglejszych natomiast w oddzielnym zmianowaniu dajemy więcej roślin pastewnych (koniczyn, traw), stosujemy t. zw. zielone podgnoje i nawozy pomocnicze, wogóle

*) Zobacz moją rozprawę: Teorya i praktyka pomiaru i podziału pól w gospod. ziem polskich. Lwów 1908.

wprowadzamy zmianowania bez roślin okopowych i kultur, wymagających wielkich starań zosiewnych.

Możliwość ułożenia kolejki polowej modyfikuje podział na zmianowania o tyle, że większe odległości, z powodu taniości przewozu jużto środków pomocniczych, jużto zwózki plodów tracą na znaczeniu.

W położeniach pagórkowatych napotykamy wiele więcej trudności przy podziale pól na zmianowania. Trudniej o skupioną figurę pól, różną jest wystawa tychże, rozmaitszą jakość gleby i podglebia, wreszcie naturalne granice nie zawsze sprzyjają np. przy bardzo wielkich krzywiznach, nie dopomagają do ułatwienia zamierzonego zadania. Tu i owdzie nie może być mowy o drobnem przesunięciu, względnie uregulowaniu granicy pól, przez zamianę sąsiednich parcel np. łąki na rolę orną. W każdym razie należy pamiętać, że każde wyprostowanie granic, względnie dróg, ułatwia przeprowadzenie podziału, i o ile da się tylko zrobić, dążyć do wyrównania,

Za wielką liczbą zmianowań, spowoduje zamęt w gospodarstwie i administracyi tegoż, utrudnia swobodę myśli kierownika, który, przeciążony drobiazgami, zapomina o wytycznych i ważnych celach gospodarstwa. Zwiększamy koszta produkcji samowolnie, przyczyniając się równocześnie do obniżenia dochodu.

O tak zwanych przydwórzonych rotacyach jeszcze słów kilka. Służą one przedewszystkiem do produkcji znaczniejszych ilości zielonej karmy dla inwentarza pożytkowego. Tem się ich konieczność uzasadnia. Chodzi o zmniejszenie kosztu dowozu karm, zawierających wielkie ilości wody. Łatwiej te pobliskie pola silnie wynawozic nawet obornikiem, łatwiej doglądać dokładnej uprawy zbioru.

Uwzględniwszy skład kultur danego gospodarstwa, naturę gleby i warunki klimatyczne, stosunki robocizny, oraz ceny ziemioplodów i hodowlanych produktów, nb. loco folwark, postanawiamy wybór roślin i te ujmujemy w pewien system, by każdej roślinie zapewnić najlepsze stanowisko w zmianowaniu. W dawniejszej dobie, kiedy rozpowszechnienie i użycie nawozów pomocniczych było nader małe, kiedy gospodarstwa same zaspokajając musiały potrzebę najrozmaitszych produktów, wybierano długi bardzo szereg roślin. Wobec ewolucyi stosunków społecznych, rozwoju komunikacyi, olbrzymiego przemysłu nawozowego, postępu nauk wspierających dzielnie zadania gospodarza, i nakoniec ukształtowania się cen produktów gospodarstwa wiejskiego wogóle, a stosunek robotniczych w szczególności, dawniejszy szemat musi upaść.

Wszelkie rozdrobnienie jużto zmianowań, jużto poletek w tychże może być tylko w wyjątkowych przypadkach usprawiedliwione, na ogół biorąc jest błędne, bo obniżające dochody gospodarstwa.

Wybierając zyt wiele roślin, rozstrzelamy produkcję, chcemy w ten sposób zmniejszyć ryzyko, a zapominamy o specjalizacyi i jej zaletach. I choć nasze warunki klimatyczne nie należą do dobrych, to przecież i w tych warunkach może i powinna produkcya rolna doznać pewnego podziału pracy. Uniwersalność nie dopłaca w żadnym zawodzie, a więc i w rolniczym także. Mamy zresztą dowody tej specjalizacyi u ziemian ...ale w Nowym Świecie. Łudzimy się najczęściej, że tak jak gospodarzemy, jest jadyńie dobrze, nie mamy jednakże na uspra-

wiedliwienie tego zdania w przeważnej liczbie przypadków rachunkowej i ścisłej podstawy.

Dalszym błędem, popełnianym w gospodarstwach, jest nieodpowiedni podział pól na niwy z uwagi na ich konfigurację. Zapewne nie posiadamy zbyt wiele swobody w tym razie. Trzeba się liczyć z całym szeregiem czynności (naturalne granice, spadki, wystawa, kierunek orki i t. d.), które wpływają na podział; nie można wszakże zapominać o ważnym prawie, odnoszącem się do stosunku długości łanu do jego szerokości. Im niwa jest dłuższą w stosunku do swej szerokości, tem mniejsze są straty czasu przy uprawach, tem wyższe więc zyski.

Nie potrzebną długo się rozwodzić nad uzasadnieniem, że dojazd dogodny do niwy ma wielkie znaczenie, zwłaszcza przy wywoźce nawozu i zwózce plonu. Przy pomocy matematyki Thuenen wzór matematyczny dla tak zwanej średniej odległości od punktu wjazdu na pole i nazwał to matematycznym punktem ciężkości.

Wzór Thuenena opiewa:

$$\frac{1}{3} \sqrt{r^2 + x^2} \frac{r^2}{3x} \lg \text{ nat. } \left(\frac{x + \sqrt{r^2 + x^2}}{r} \right)$$

Wyraża on średnią odległość wszystkich punktów dla trójkąta prostokątnego. A że każdą figurę geometryczną można podzielić na trójkąty, przeto na tej samej zasadzie można obliczyć średnią odległość i dla prostokątnej i trapezowej parceli.

Thuenen zwrócił u siebie w gospodarstwie i na ten czynnik uwagę i na podstawie żmudnych obliczeń usystemizował swoje państwo Izolowane. Obrachunki jego stwierdzają, że lepiej dla gospodarza, gdy niwy szerszą stroną (bokiem) przylegają do strony dojazdowej. Wówczas, wóz naładowany nawozem stajennym odbuwa mniejszą drogę po roli, większą zaś po twardej drodze.

W ten sposób ułatwia się wywózkę nawozu, zmniejszając zły wpływ utłaczania niwy przez krótszą metę, jaką z ciężarem przejeżdżamy. Znane są koleje w koniczynach, wybite przy zwózce plonu; na bardzo wązkich, a długich parcelach włościańskich widzi się często bardzo ujemne skutki niezbyt szczęśliwego podziału pól między rodzeństwo. W każdym razie ważniejszą rzeczą jest odpowiedni stosunek szerokości do długości parceli, choć i względ drugi godzien zastanowienia.

Wreszcie i wielkości niwy w zmianowaniu poświęć muszę słów kilka. Za wielkie i za małe niwy mają swoje wady. Pierwsze uniemożliwiają — przy za małej liczbie sprzężaju — wykonanie równomiernej uprawy (rzadziej), nawożenia. Radzą sobie gospodarze w ten sposób, iż dzielą niwy na ryzy, które w kolejnym porządku się uprawia i t. d. Za wielkie niwy przy klęskach elementarnych, jak grad, wylew oraz z powodu pasoryt roślinnych lub zarazy, przedstawiają większe ryzyko, które naturalnie wzrasta z wielkością niwy.

Za małe niwy utrudniają użycie machin większych, zwłaszcza siewników żniwiarek i kosiarek, i t. p., nadto utrudniają odpowiedni rozkład robocizny sprzężajnej i pieszej, koncentrację robocizny, dozór, oraz pasienie inwentarza pożytkowego. Wskutek rozdrobnienia niw traci się wiele godzin z dnia roboczego, tak sprzężajnego, jakoteż pieszego, co przeliczone na liczbę,

ogółem nżywanej siły roboczej, stanowi w ciągu okresu robót poważną rubrykę.

Starać się należy, by przy podziale uzyskać jak najwięcej niw o prostych liniach granicznych. Odciąć kliny i o ile możności przeznaczyć je pod uprawę innych roślin, np. wikliny wierzby, olszyny i t. p., by w ten sposób oszczędzić zabiegów przy każdorocznej uprawie i ułatwić wszelkie czynności, podejmowane w przyszłości.

Niwy — w zmianowaniu — powinny być o ile możności równe co do obszaru, dopuszczalną jest różnica o 10% z uwagi na naturalne granice. Przy różnej jakości gleby, a przyjęciu jednego zmianowania można wyrównywać wysokość plonu w ten sposób, że na gorszym kawałku oddziela się niwy większe. Lecz to tylko do pewnej granicy można czynić, gdyż spowoduje inne trudności, np. niemożność wynawożenia obornikiem, którego należałoby dać więcej na większą i do tego gorszą niwę.

Unikać składania niw z kilku oddzielnie leżących kawałków, zwłaszcza gdy są nimi, jakto bywa często, same kliny.

Rozwiązujemy jeszcze w inny sposób założenie jednego zmianowania na różnej glebie, że tworzymy podwójną liczbę niw. Każda niwa składa się wówczas z kawałka gorszego i lepszego i dołorem odpowiednich roślin wyrównywa się różnice gleby. A więc np. na lepszym kawałku niwy, siewamy koniczyinę czerwoną, a na drugim gorszym szwedzką lub białą, albo owies i jęczmień, żyto i pszenicę i t. p.

Cale łany mają miejscowe nazwy, znane dobrze w całej miejscowości, np. za wałem, pod młynem, za ogrodami, za stawem, pod krzyżem, na Karwatach, i t. d., które służą do orientacji, a przy wydawaniu dyspozycji ułatwiają objaśnienia gdzie i jakie roboty będą wykonywane. Niwy dostają liczby porządkowe, 1, 2, 3 i t. d. zmianowania zaś nazwy ogólniejsze, np. obszar główny, na piaskach, za baranem i t. p. Nie jest porządkiem, by niwy leżały obok siebie w kolejnym następstwie według liczb porządkowych. Jeśli tak leżą jak idą liczby, to w razie wystąpienia szkodnika np. na rzepaku przejście na sąsiednią niwę, mającą nieś rzepak, jest nadzwyczajnie ułatwionem i w tym wypadku jest większe niebezpieczeństwo, aniżeli wówczas, gdy są od siebie oddalone.

W każdym razie należy uwidocznić numerację niw palikami, siłwie umieszczonymi lub cementowymi słupami, dobrze jest nadto na niwach zaznaczyć ryzy hektarowe, lub kilkahektarowe; ostatnio wspomniane ułatwia gospodarzowi pracę na wydział, lub akordową, a robotnikom orientowania się w zarobku, jaki ich czeka.

Jeszcze na jeden ważny wzgląd chcę zwrócić uwagę przy podziale łanów na niwy, na umożliwienie regulowania zapasu wilgoci w glebie. O to musi się troszczyć gospodarz stale, ale ułatwi mu tę pracę dobry podział. Sprawę tę rozwiązał p. Korzybski, w ten sposób, że wziął pod uwagę powierzchniowe odprowadzenie wód, a stąd i kierunek orki. Chce, by każdy kawałek pola posiadał i użytkował tę tylko wodę, która na niego spada. Systemu p. Korzybskiego nie można w praktyce wszędzie skutecznie wprowadzić, rolnik musi sobie umieć radzić, by tam gdzie spadki małe, dać bruzdom kierunek spadku najsilniejszy, przegonami zaś niedozwalać wodzie przepływać

w brzdach dłuższych przestrzeni. W każdym razie i ten moment należy wziąć pod bliższą rozwagę przy podziale łąnów na niwy.

Z powyższego widzimy, że odpowiednio przeprowadzony pomiar i podział pól wymaga nie tylko ścisłej wiedzy technicznej, ale obok tejże znacznego zasobu wiedzy rolniczo-ekonomicznej.

Wskazówki do obliczania robót sprzężajnych i ręcznych.

a. Roboty sprzężajne.

Rodzaj pracy lub wyszczególnienie narzędzi i maszyn	W 12 godzinach można wykonać	
	hektarów od do	morgów od do
Uwaga: K. oznacza konie, W. woły.		
1. Uprawa ziemi i nawożenie.		
Orka płaska lub do średn. głęb. do 25 cm. (2 K.)	0.50	0.9
Orka głęboka 25—30 cm. (2 K.)	0.30	0.5
Orka do pełnej głębokości 35 cm. (4 K.) . . .	0.30—0.50	0.5—0.9
Podór ścierniska 6—10 cm. głęboko (2 K.) . .	0.30—0.70	0.5—1.2
" koniczyska (2 K.)	0.30—0.50	0.5—0.9
Podorywka lekka pługiem	0.75—1.10	1.3—1.9
Radlonka 18—20 cm. głęboko (2 K.)	0.40—0.50	0.7—0.9
Extyrpatorowanie 7—9 radlic	1.50—2.25	2.6—3.9
Gruberowanie 20—25 cm. głęboko (4 K.) . . .	1.50—2.00	2.6—3.5
Lekka brona na średnio zwięzłej glebie (2 K.)	2.10—2.75	3.7—4.8
" " " piaszczystej glebie (2 K.)	2.80—3.60	5.0—6.2
" " " Cegielskiego pozostała do kruszenia skorupy na siewie (1 K.)	9	15
" sprężynowa (42 K.) 9 zębów 1 m szer.	2.2—3.0	3.8—5.0
Walek gładki (2 K.)	3.00—4.50	5.2—7.8
" pięścieniowy (4 K.)	5.00—8.00	9.0—14.0
Znacznik Jordana (2 K.)	1.30—1.80	2.2—3.1
Pielnik pojedynczy (1 K.)	1.00—1.70	1.7—3.0
" kilkorzędowy (2 K.)	3.00—4.00	5.2—7.0
Obsypnik (1 K.)	1.00—1.30	1.7—2.2
Podskibnik Susty (1 K.)	0.30—0.45	0.5—0.8
Siewnik do rozrzucania nawozów pomocniczych 2 m. szer.	3.00—4.00	5.2—7.0
Siewnik do rozrzucania nawozów pomocniczych 2.5 m. szer.	4.00—6.00	7.0—10.0
Wywózka gnoju stajennego (2 K.) na przeprząg (stos. do odległości) 8—10 wozów .	0.35—0.50	0.6—9.0
2. Siew.		
Siewnik szerokorzutny (2 K.) szer. 4 m.	7.60—9.00	12.8—15.0
" 17 rzędowy (2 K.) szer. 2 m.	3.50—4.30	6.0—7.5
" " " ("), " 2 " przy wprawnych robotnikach	5.00	8.75
" taczkowy do konicyzn (1 K.) 3.8 m sz.	8.00—10.00	14.0—17.0
Przykrywanie siewu broną	2.00—2.75	3.5—4.8
" " " extyrpatorem	1.50—2.30	2.6—4.0
" " " pługiem wieloskibowym zależy od ilości skib i zaprzęgu	—	—

Rodzaj pracy lub wyszczególnienie narzędzi i maszyn	W 12 godzinach można wykonać	
	hektarów od do	morgów od do
Uwaga: K. oznacza konie, W. woły.		
3. Roboty żniwne.		
Kośba kosiarką traw (2 K.)	3.50—4.00	6.8—7.0
• żniwiarką (największa wydajność przy przeprzęgu 6 ha) 2 K. na zmianę	3.5—4.0	6.1—7.0
Kośba żniwiarką samowiązalką 1.5 m. szer.	3.5—5.0	6.1—8.5
Przetrasacz do siana (1—2 K.)	5.00—6.00	8.5—10.0
Grabienie ścierniska (1 K.)	5.00—6.50	8.7—1.3
• siana (1 K.) 2.5 m. sz. 27—36 zębów	5.0—7.0	8.5—10.0
Wyradlanie ziemniaków (3 K.)	1.00—1.0	1.7—1.7
• buraków (4 K.)	1—1.5	1.7—2.5
Kartoflarka z 12 ludźmi do zbierania ziemn. wykopie	1.00—1.10	1.7—2.0
Zwózka zboża na przeprząg przy dostat. li- czbie ludzi do nakładania i zrzucania w miare odległości 7—11 wozów (2 K.)	—	—
Zwózka siana (2 K.) 6—10 wozów	—	—
• potrawu (2 K.) 4—8	—	—

Prace, do których używamy wołów, są około 25% mniej wydajne.

Wydatek pracy sprzężaju konnego, względnie wołów, zależy od indywidualności zwierząt, a nadto od wielu czynników, ułatwiających lub utrudniających robotę, np. przy wszystkich robotach w roli, spoistości tejeże ma wielkie znaczenie.

Ustanowienie odpowiedniej ilości inwentarza roboczego wpływa pośrednio na zwiększenie dochodu z gospodarstwa. Za mały inwentarz roboczy nie dozwala na prawidłowe wykonanie upraw i czynności wszelkiego rodzaju, za wielki obciąża, względnie podnosi wydatek na robociznę. *Ilość utrzymywanego inwentarza roboczego zależy:* a) od obszaru i sposobu użytkowania ziemi ornej; b) od spoistości ziemi ornej; c) od warunków klimatycznych, a zwłaszcza długości okresu robót; d) od odległości gruntów od zabudowań t. j. folwarku; e) od figury pól, ich rozpołożenia i rozrzucenia parcel; f) od stanu środków komunikacyjnych tak wewnątrz gospodarstwa jakoteż i do miejsc zbytu; g) od organizacji polowego gospodarstwa; h) od łatwości donajęcia siły sprzężającej w okresach robót.

Okres wiosenny trwa od rozpoczęcia robót polowych do ukończenia zasiewów wiosennych i w klimacie sprzyjającym wynosi 60—65 dni, w niesprzyjającym 45—50 dni; *okres jesienny* od 20-go sierpnia do pierwszych mrozów 70—75 dni, w niesprzyjającym klimacie 50—60 dni.

Utrzymujemy w gospodarstwach	
intenzywnych	1 konia na 10—16 morgów
średnio intenzywnych	1 „ „ 12—20 „
extenzywnych	1 „ „ 18—27 „

Uwaga. Liczby podane w tablicy na str. 126 i 127 odnoszą się do wykonanej pracy przez dorosłych męskich i żeńskich robotników, jako dziennych najemników — w akordzie pracując, wykonają o $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ więcej.

b. Roboty ręczne.

Wyszczególnienie rodzaju pracy	W 12 godzinach wykona pracę w hektarach		Na hektar potrzeba przeto robotników		W 12 godzinach wykona pracę w morgach		Na morg potrzeba przeto robotników	
	męski	żeński	męskich	żeńsk.	męski	żeński	męskich	żeńsk.
1. Przy uprawie roślin zbożowych.								
Siew zboża ozimego	4-5	3-4	0.25-0.20	0.25	7-8.7	7.0	0.15-0.10	0.2
„ „ jarego	8.8-4.5	3.5	0.28-0.22	0.30	6.6-7.8	6.0	0.17-0.13	0.17
Kosba kosą zboża	0.5-0.6	—	2-1.6	—	0.8-1.0	—	1.0-0.8	—
Wiązanie zboża za kosą	—	0.5-0.6	—	1.6-2.0	—	0.9-1.0	—	0.9-1.1
Żęcie sierpem zboża	—	0.07-0.12	—	8-12	—	0.12-0.21	—	4.6-7.0
„ „ rzepaku	—	0.10-0.20	—	10-5	—	0.17-0.35	—	6.0-8.0
Przewracanie garsci pokosów	—	2-2.5	—	0.5-0.4	—	3.5-4.3	—	0.3-0.2
Zagrabianie ścierniska	1-2	1-2	1-0.5	1-0.5	1.7-3.5	1.7-3.5	0.6-0.3	0.6-0.3
Podawanie i składanie zboża w snopie, 3 mężczyzn i 3 żeńsk. robotn. podają i złożą dzien- nie 20 wozów. Licząc 5 wozów z ba potrzeba oprócz fornała . Młocka cepem zboża stosownie do więzby snopków 15-20	—	—	0.60	0.60	—	—	0.3	0.3
Młocka cepem zboża często bywa wykonywana w akordzie	—	—	—	—	—	—	—	—
Kosba strączkowych roślin (kosą)	0.25-0.40	—	2.7-4.0	—	0.4-0.7	—	1.5-2.3	—
2. Przy uprawie buraków.								
Sadzenie buraków	—	0.08-0.12	—	11-12	—	0.14-0.20	—	6-8
Flancowanie (sadzonek)	—	0.04-0.06	—	18-24	—	0.07-0.10	—	10-14
Przerywanie buraków	—	0.05-0.06	—	16-20	—	0.09-0.10	—	9-11
Motyżenie	—	0.06-0.08	—	18-20	—	0.10-0.14	—	10-12

Wyszczególnienie rodzaju pracy	W 12 godzinach wykona pracę w hektarach		Na hektar potrzeba przeto		W 12 godzinach wykona pracę w morgach		Na morg potrzeba przeto	
	robotnik		robotników		robotnik		robotników	
	męski	żeński	męskich	żeńsk.	męski	żeński	męsk.	żeńsk.
Kopanie buraków	—	0.05—0.06	—	20—30	—	1.10—0.12	—	10—15
Ładowanie buraków na wozy i składanie w kopce przy średnim plonie	—	—	2	2	—	—	1.2	1.2
3. Przy uprawie pastewnych roślin.								
Siew koniczyn lub traw	2.5—3.0	—	0.4	—	4—5	—	0.2	—
Kosba koniczyny	3.40—0.5	—	2.0—2.5	—	0.6—0.8	—	1.2—2.0	—
" traw (łąk)	0.28—0.5	—	2.0—3.6	—	0.5—0.8	—	2.0—2.2	—
Suszenie koniczów i traw wymaga ga bardzo różnej siły roboczej zależnie od stanu roślinności, metody susz. i stanu pogody; przeciętnie liczymy	—	0.06—0.10	—	10—16	—	0.10—0.17	—	6—10
Podawanie siana na wóz i skład; dla 20 wozów 3 męsk. i 3 żeńsk. robotn. nadto fornal, jeśli plon mamy 5 wozów z ha, wówczas potrzeba	—	—	0.75	0.75	—	—	0.4	0.4
4. Różne roboty.								
Nakładanie nawozu. 1 robotnik należy dziennie 7—8 wozów po 10 q, przeciętnie 75 q. Jeśli na hektar dajemy 300 q, wówczas potrzeba	—	—	4	4	—	—	2.3	—
Jeden robotnik żeński rozrzuci tyle, co należy męski, przy po- wyższym przykładzie	—	—	—	2—2.5	—	—	—	—
Zagrabyw. nawozu za plugiem	—	0.4—0.5	—	—	—	—	—	2.3
								1—1.4

Roboty akordowe.

Przez robociznę na wymiar, akordowa, rozumiemy wynagrodzenie w stosunku do wykonanej pracy np. kosbę za mórg, hektar, wykopanie 1 q. buraków, wybranie 1 m³ rowu i t. p. Stosować ją należy przede wszystkim w miejscowościach, gdzie brak robotnika, gdzie tenże na kilka godzin dziennie przychodzi, wogóle zaś *przy wszystkich robotach w gospodarstwie, które dadzą się po wykonaniu skontrolować nie tylko z uwagi na ilość ale i jakość wykonanej pracy.* Z obszerniejszem zastosowaniem pracy akordowej wzrastają wyniki z gospodarstwa wiejskiego, a zatem osiągamy i wyższe dochody. Za podstawę do obrachunku należy brać o ile możności wagę (ctn. metr.), lub miarę (mórg, hektar, metr b. metr³), wreszcie sztuki, kopy lub setki (np. przy powrósłach, snopkach, strzyży owiec i t. p.).

W akordzie wykona męski robotnik dziennie w 12 godzinach:

uwiąże powrósł	12—20 kóp
wyszyje snopków przy dobrym podawaczu	10 „
omłóci zboża cepami	15—20 snopków
namierzy zboża	40—50 q.
przeszufluje zboża	50—60 q.
ustawi zboża ozimego w półkopki	8—10 kóp
przebierze ziemniaków	7—10 hl.
ukraja ziemniaków do sadzenia	5—7 hl.
naładuje ziemniaków na wozy	30—40 q.
rozrzuci kretowizn na łące	0.9—1.5 ha — 1.6—2.6 morga
„ świeżego pokosu na łące	1—1.4 ha — 1.7—2.5 „
wywiąże siana w porcye	6—8 q.
ustawi tyczek chmielowych	3—6 kóp
odkryje chmielu	4—5 „
zakonczy i opali tyczek	4—5 „
wytyczkuje chmielu	10—12 „
rozniesie tyk chmielowych	5—6 „
obierze chmielu	8—12 ćwiatek
naładuje w wańtuchy chmielu	1.5—2.5 q.
zastruga kółków do drzewek	60—70 sztuk
ukopie dołków do drzewek	12—15 „
urąbie drzewa opałowego	2.0 m ³
ukopie gliny w cegielni	6—7 m ³

Roboty przy burakach.

11—12 wprawnych robotnic zasadzi buraków w roli dobrze uprawnej 1 ha.

Do zmotyczenia jednorazowego 1 ha buraków potrzeba 18—20 zręcznych robotników.

Do zgracowania 1 ha buraków wychodzi 4 ludzi w akordzie, nawet 3 wystarczy.

Wykopie dziennie robotnik buraków 20—30 q. t. z. do wykopania 1 ha potrzeba stosownie do wysokości i wielkości głębi 15—20 ludzi dziennie.

Przy pomocy wyorywacza konnego wykopie i oczyści dziennie robotnik 10 q. buraków cukrowych.

Przy plonie 300 q. z ha potrzeba do wykopania na hektar około 30 ludzi.

Od wykopania i oczyszczenia 1 q. buraków pastewnych płacą u nas 4—6 hal., od buraków cukrowych 10—16.

Naładuje buraków na wozy 30—45 cetn. metr.

Cen jednostkowych robót akordowych nie podajemy, należy je normować na podstawie prac wykonanych na dniówkę pod dobrym dozorem. Ceny jednostkowe przy poszczególnych pracach zmieniać się muszą w miarę plonu, np. przy ziemniakach, burakach, zbożu i t. d., nadto miejscowe warunki robocizny rozstrzygają o wysokości wynagrodzenia.

Roboty przy ziemniakach.

(Wszystkie prace odnoszą się do 12 godz. dnia roboczego).

Wybierze ziemniaków ręcznie w 12 godzinach kobieta	10 q.
Zasadzi za znacznikiem „ „ „ „	0.4 ha
za motyką z doniesieniem ziemn. 2 kobiety	0.4 ha
Naładuje ziemn. z kopca odkrytego 1 mężczyzna	100 q.
„ „ „ „ nieodkrytego	50 q.
Obsypie ziemniaków 1 kobieta w 12 godz.	0.13 ha
Wykopie motyką i naładuje na wozy 1 kobieta	3.3 q.
Uzbiera za pługiem wyorującym 1 kobieta	4 q.
Po kartoflarce uzbiera i naładuje na wozy 1 kobieta	6.6 q.
Zładuje ziemn. w kopce lub do piwnicy 1 mężcz.	100 q.
Ułoży w kopiec, przykryje słomą i 15 cm warstwą ziemi z obydwóch stron metrów bieżących	16 m.
Toż samo z przykryciem 30 cm warstwy ziemi	7 m.
Toż samo z warstwą ziemi 60 cm	5 m.
Wybierze i przygotuje do sadzenia 1 kobieta	8 q.

Różne prace.

Ostrzyże owiec matek 1 kob.	7 sztuk,	mężczyzna	13 sztuk.
„ baranów	4 „	„	7
„ jaguiąt	10 „	„	20
„ koni mężczyzna	3 sztuki		
„ wołów	4 „		
„ z pomocą maszyny mężczyzna	4 konie.		

Potrzebną ilość stałej ozeladzi łatwo obliczyć każdorazowo dla danego gospodarstwa. Znając liczbę inwentarza pociągowego i użytkowego oraz skład tegoż z łatwością wypośrodkować możemy liczbę stałych służących. Jako wskazówkę podajemy poniższe zestawienie:

Liczmy	Na jednego parobka przy żywieniu na stajni	Na pastwisku	Na jedną dziewczkę przy żywieniu na stajni
Wołów roboezych	12—16	—	—
„ opasowych	10—14	—	—

Liczmy	Na jednego parobka przy żywieniu na stajni	na pastwisku	na jedną dziewczę przy żywieniu na stajni
Krów mlecznych z dojeniem	12—15	—	10—12
„ „ bez dojenia	18—20	30—40	14—18
Jałownika	18—24	—	14—20
Qwiec	240—300	300—400	—
Świń rozpl. wych	12—18	—	12—15
„ opasowych	18—25	—	—
„ różnego wieku	30—40	80	—

Do każdych 4-ch koni roboczych wystarcza jeden parobek; do 8 wołów rob. jeden wolarz, (rataj).

Do usługi domowej na 2—12 osób prócz gospodyni lub kucharki jedna dziewczka do pomocy.

Potrzeba dni ręcznych roboczych przy różnych systemach gospodarowania.

Przy stałym pastwisku	na 1 hektar	4—8	dni rob.
„ łąkach średniej dobroci . . .	» 1 »	16—40	» »
W gospodarstwie zbożowym i przemienno pastwiskowym	» 1 »	48—80	» »
„ gospodarstwie płodozmiennem	» 1 »	120—200	» »
„ „ przemysłowem	» 1 »	240—520	» »

Potrzeba dni roboczych przy uprawie poniżej wymienionych grup roślin. (do siewu, uprawy i zbioru 1 hektara).

Rośliny okopowe	14—20 dni sprzężajnych	i 40—100 dni ręcz. rob.
„ pastewne	7—26 „	i 15—86 „ „ „
„ zbożowe	9—26 „	i 32—50* „ „ „
„ handl.	10—18 „	i 24—68 „ „ „
„ przemys.	15—21 „	i 70—180 „ „ „
„ strączk.	10—15 „	i 28—40 „ „ „

Zestawienie płacy i wymiaru robót drenarskich

według inż. Dr J. E. Blautha.

Rodzaj roboty	Cena jednostki			Wymiar roboty na dzień			Robotników średnio	Zarobek średnio dzienny	Koszta na morg hektar średnio odstep 12 m. 20% dren. zbierających				
	minim.	maxim.	średnio	minim.	maxim.	średnio			K.	K.	g.	K.	g.
	groszy			m. b.					K.	K.	g.	K.	g.
Wykop rowu odpływowego	m ³			m ³									
	16	24	20	3	12	6	16	1.20	—	—	—	—	

* Uwaga: kukurydza 26 dni sprzęż. i 105 dni ręcznych rob.

Rodzaj paszy	Cena jednostki			Wymiar roboty na dzień			Robotników średnio	Zarobek średni dzienny	Koszta na mórg hektar średnio odstęp 12 m. 20% dren. zbierających		
	minim.	maxim.	średnio	minim.	maxim.	średnio			K.	K. g.	K. g.
	groszy			m. b.							
Wykop drenów zbierających	jeden m. b.			m. b.			20	2.80	9 60	16 60	
	7	14	10	16	50	28					
Wykop drenów ssących	jeden m. b.			m. b.			20	2.21	24 96	43 18	
	3	14	6.5	20	160	34					
Ułożenie drenu zbierającego	jeden m. b.			m. b.			1	2.40	2 88	4 98	
	1.5	4	3	40	200	80					
Ułożenie drenu ssącego	jeden m. b.			m. b.			3	3.28	7 68	13 28	
	1.5	3	2	60	480	164					
Zasypanie drenów zbier. i ssących	jeden m. b.			m. b.			8	0.90	4 80	8 30	
	$\frac{2}{3}$	1.5	1	25	200	90					
Dniówka pieszka	za dzień						5	0.70	49 92	86 34	
	30	200	70	—	—	—					

Ładunek na wóz fornalcki

zależy od wielkości i wytrzymałości wozu, względnie od siły pociągowej i stanu drogi. Na t. z. wóz średniej wielkości przyjmujemy następujące ładunki:

zboża różnego w ziarnie	od	6—10 q.
mąki, szrotu i t. p.	»	10 q.
buraków, ziemniaków i t. p.	»	8—10 q.
nawozu stajennego	»	5—8 q.
ziemi, stawarki	»	8—10 q.
gnojówki	»	9—10 q.
gontów	»	50—70 kóp.
cegły palonej	»	200—300 sztuk.
drzewa opał. metr. kubicznych	»	2 m ³ .
węgla	»	12—18 q.
siana	»	6—8 q.
zboża w snopie zależnie od więźby	»	100—180 snopów.

Według Reinhardta potrzeba siły do pociągnięcia wozu wagi 1051 kg., obciążonego ładunkiem 1680 kg.:

	na szosie 112 kg.	na ścieżni 368 kg.
ciężar na przedniej osi	100 ⁰ / ₀	100 ⁰ / ₀
» równo rozłożony	96.8 ⁰ / ₀	81.2 ⁰ / ₀
» na tylnej osi	82.4 ⁰ / ₀	89.2 ⁰ / ₀
zaprzężenie:		
pod dyszlem krótkie postronki	89.6 ⁰ / ₀	96.0 ⁰ / ₀
» » długie »	100.0 ⁰ / ₀	100.0 ⁰ / ₀
za koniec dyszla	—	109.0 ⁰ / ₀

Objętość ładunku i wagonu (10.000 kg.) niektórych materiałów.

1 wagon	zajmuje przestrzeni
Cegiel zwykłych	6.7—7.3 m. ³
» mocno wypalonych	5.6—6.3 »
Ilu suchego	5.6 »
Ilu mokrego	5.0 »
Koksu	18.9—30.3 »
Piasku rzeczno-wilgotnego	5.7 »
Torfu wysuszonego na powietrzu	24.4—30.8 »
» mokrego	15.4—18.2 »
Węgla brunatnego	12.8—15.1 »
» kamiennego	11.8—14.3 »
» z miękkiego drzewa	66.7 »
» z twardego drzewa	45.5 »
Żwiru rzeczno suchego	3.7—4.3 »
» » mokrego	3.5—4.0 »

Koszta naprawy i amortyzacja narzędzi i machin.

Zależą od swego przeznaczenia, rodzaju i sposobu obsługi i użycia, częstszego lub rzadszego stosowania, (dla wozów od stanu dróg i dojazdów wewnątrz majątku), starania w utrzymywaniu i przechowywaniu i od materiału i wykonania narzędzi lub maszyny. Poniżej podajemy przeciętne liczby w procentach od wartości nowych narzędzi i t. p.

Z ceny kupna nowego narz. lub mach. wynoszą.	Koszta na- prawy w 0/0	Amor- tyzacja w 0/0
Dla siewników	10	6
» obsypników, pielników itp.	10	6
» maszyn żniwnych	12	10
» młócarń kieratowych	15	6
» młynków do czyszczenia zboża i t. p.	10	6
» narzędzi dla inwent. roboczego	20—30	7—8
» » stajennych (w krowiarniach)	25—30	10
» » przy młódzieży	25	8
» » owczarskich	20	6
» » ręcznych	15—30	35—50

Naprawy, utrzymanie i amortyzacja budynków gospodarskich.

Wszystkie budynki gospodarskie należy tak urządzić, by przy jak najmniejszym koszcie jak najdokładniej odpowiadały celowi, do którego są przeznaczone. Uwzględnić wygodę i piękność wewnętrzną i zewnętrzną budowli o tyle, o ile takowa nie wymaga większych nakładów i kosztów utrzymania. Starać się należy utrzymać jak największą trwałość, a stąd i najmniejsze koszta utrzymania przez staranny dobór materiałów, dobre wykonanie, dobre rozpołożenie i t. p. Zastosować rozmiary budynków do rzeczywistej potrzeby. O rozmiarach poucza tabelka na str. 135. Koszta ogółem zabudowań składają się z następujących pozycji: 1) procentu od kapitału budowlanego, 2) ryzyka względnie asekuracji od ognia, 3) amortyzacji (w stosunku do trwania budynków) i 4) kosztów utrzymania, naprawy i t. p. Te ostatnie wynoszą: dla budynków trwałych mieszkalnych i spichrzów $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}\%$ wartości do ubez. od ognia podanej, dla budynków lekkich mieszkaln. i spichrzów $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}\%$ wartości do ubez. od ognia podanej, dla stajen trwałych 1 — $1\frac{1}{2}\%$ wart. do ubez. od ognia podanej, „ „ „ lekkich $1\frac{1}{2}$ — 2% „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Amortyzacja wynosi stosownie do przeznaczenia budynku i materiału i t. p. od 5 — 10% .

Do szczegółowego obliczenia raty amortyzacyjnej budynku (R) służy wzór następujący:

$$R = \frac{K(q-1)}{q(q^n-1)}$$

K oznacza kapitał budowlany;

n liczba lat trwałości budynku;

q — $(1+p)$, w czem p oznacza stopę procentową w setnych.

Używając powyższego wzoru, przy przyjęciu 5% od kapitału w budynkach, obrachowano następujące raty amortyzacyjne:

Budynek trwa	Roczna amortyzacja wynosi w % od kap. bud.
100 lat	0.0365
90 „	0.0597
80 „	0.0981
70 „	0.1618
60 „	0.2694
50 „	0.4549
40 „	0.7888
30 „	1.4335
20 „	2.8803
10 „	7.5757

Fundusz amortyzacyjny wzrasta według wzoru:

$$F = \frac{Rq(q^n-1)}{q-1}$$

po 10 latach wynosi fundusz amortyzacyjny w % od kap.	
20	1.27
30	2.55
40	4.63
50	8.02
60	13.55
70	22.55
80	37.22
90	61.11
100	100.—

Rocznie potrzeba wody do picia (pojenia) i mycia i t. p.

Dla dorosłej osoby	około 3—4 m.
Na 1 średniej miary konia	12—18 »
Na 1 sztukę bydła rogatego przy żywieniu suchą karmą	11—18 »
Na 1 szt. bydła rogat. przy żyw. zieloną karmą »	5—6 »
Na 1 owcę przy suchej karmie	1 ¹ / ₂ —1 »
Na 1 » » zielonej »	1 ¹ / ₃ —2 ² / ₃ »
Na 1 sztukę nierogacizny stosownie do sposobu żywienia.	

Potrzeba soli:

Dla konia	7—16 gr. dziennie	2.5—5.5 kg. rocznie
» krowy	15—30 »	5.5—11.0 »
» owcy	4—8 »	1.5—3.0 »
» świni	4—8 »	1.5—3.0 »
Na 100 kg. masła potrzeba		2—6 kg.
» 100 » sera »		2—3 »

Potrzeba oliwy dziennie:

Przy żniwiarce	1 kg.
» 8-konnej lokomobili	2 »
» siewniku	0.05—0.1 kg.

Amortyzacja inwentarza żywego wynosi przeciętnie:

Przy koniach roboczych	12—15%
» wołach »	2—6%
» » » rob. 1 rok pracując. (przeznacz. dla opasu)	0%
» krowach mlecznych	6—8%
» buhajach	15%
» ogierach	10—12%

Strata produktów gospodarskich przy przechowywaniu.

Przy przechowywaniu niżej podanych produktów przez 9 miesięcy do 1 roku strata wynosiła następujący procent:

Buraki (nasienie)	4—5 %	Pszenvica	1%
Jęczmień	1 »	Rzepak	12—15 »
Owies	1 »	Siano	8—10 »
Strączkowe	2—5 »	Spirytus	4—5 »
Potraw	8—10 »	Żyto	1 »

Strata na wadze przy przechowywaniu ziemniaków w piwnicy.

100 kilogramów przechowywanych w piwnicy traci od końca Października na wadze przez wyschnięcie:

		w miesiącu:
Do końca Listopada	0.595 kg.	0.595 kg.
» » Grudnia	3.500 »	2.905 »
» » Stycznia	4.620 »	1.120 »
» » Lutego	6.160 »	1.540 »
» » Marca	7.350 »	1.190 »
» » Kwietnia	8.990 »	1.610 »
» » Maja (silnie kielkujące) .	11.200 »	2.240 »
» » Czerwca (zwiędłe)	30.240 »	7.840 »

Zmiana zawartości skrobi przy przechowywaniu ziemniaków.

W 100 kilogramach ziemniaków było:

W Sierpniu	10 kg. skr.	W Styczniu	17 kg. skr.
We Wrześniu	14 » »	W Lutym	16 » »
W Październiku	15 » »	W Marcu	15 » »
W Listopadzie	16 » »	W Kwietniu	13 » »
W Grudniu	17 » »	W Maju	10 » »

Wydatek mąki.

Ze 100 cz. ziarna	Otrzymuje się		
	mąki	otrąb	strata
Pszenica	80	18.5	1.5
Żyto	75	23.5	1.5
Jęczmień	83	12	1.0

Waga 1 m.³

Siana drobnego*)	65—60	kg.
Siana trzciniaстого	50—65	»
Potrąwu	70—85	»
Słomy ozimej	60—70	»
Słomy jarej	50—60	»
Sieczki 1 m. ³	99—100	»
Słomy z roślin groszkowych	54—62	»
Nawozu silnie rozłożonego	840	»
» wprost od bydła	1210	»
Drzewa bukowego, dębowego, grabowego, wiązowego	670—700	»
Drzewa sosnowego, świerkowego, brzoźowego, osikowego, modrzewiowego	350—470	»
Plew	200—250	»
Betonu z gruzu ceglanego	1800	»
Cegiel zwykłych	1400—1500	»
Cegiel mocno wypalonych	1600—1800	»
Iłu suchego	1800	»
Iłu mokrego	2000	»
Koksu	330—530	»
Piasku suchego	1600	»
Piasku mokrego	2000	»
Śniegu świeżo spadłego	80—190	»
Śniegu mokrego	200—800	»
Torfu wysuszonego na powietrzu	325—410	»
Torfu mokrego	550—650	»
Węgla brunatnego	650—750	»
Węgla kamiennego	700—850	»
Węgla z drzewa miękkiego	150	»
Węgla z drzewa twardego	220	»

*) W dolnych częściach stogu lub szopy w stanie ubitym półtora raza tyle. Na furę wagi 6 q potrzeba liczyć 6—11 m.³ przestrzeni.

Zaprawy wapiennej	1600—1800 kg.
Ziemi suchej	1600 „
Ziemi mokrej	2000 „
Żwiru	1800 „

Wymiary dróg bitych.

	Łącznie z drogą letnią metrów					Bez letniej drogi metrów					
Droga bita szutrow.	5.0	4.5	4.5	4.0	4.0	5.6	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5
Droga letnia	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	—	—	—	—	—	—
Bankiet dla mater. . .	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	1.8	1.5	1.8	1.5	1.5
Bankiet dla pieszych	1.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.4	1.2	1.0	1.2	1.5	1.0
Szerok. ogółem metr.	11.5	10.0	9.5	9.0	9.0	9.0	8.0	7.5	7.5	7.5	7.0

Zakręty poniżej 75 m wymagają rozszerzenia drogi.

Najwyższe spadki: w górskich okolicach 50‰, w pagórkowatym terenie 40‰, w nizinie 25‰.

Budowa dróg horyzontalnych możliwa jedynie w bardzo dobrych odwodnionym terenie. Wysokość grzebienia drogi bitej, musi być ponad 0.6 m znanego najwyższego stanu wody.

Ilość materiału opałowego, potrzebnego dziennie do pędzenia gorzelnii, jest zależną od 3 warunków:

- 1) Od jakości materiału opałowego t. j. siły cieplikowej.
- 2) Od ilości sporządzanych dziennie zacierów.
- 3) Od urządzenia gorzelnii.

W dobrze urządzonej gorzelnii potrzebnego dziennie węgla kamiennego o wartości opałowej 6500 ciepłostek.

Przy produkcji spirytusu z jednego zacieru		1 zacier		2 zacieru		3 zacieru		4 zacieru	
D Z I E N N I E									
Hektolitrów	Wiader	Kg.	Pudów	Kg.	Pudów	Kg.	Pudów	Kg.	Pudów
1	10	220	17	320	25	450	34,5	500	38,5
1,5	15	300	23	450	34,5	650	49,5	700	53,5
2	20	360	27	560	42	730	55	860	65
2,5	25	400	30,5	650	49,5	830	63	1020	77,5
3,	30	450	34,5	750	56,5	1000	75,5	1200	91,5
3,5	35	520	39,5	850	64,5	1150	87	1475	114,5
4	40	580	44,5	950	73	1300	100	1550	119
5	50	700	53,5	1200	91,5	1600	122,5	1950	131

Na podstawie powyższych dwóch tabelki można obliczyć potrzebną ilość dowolnego materiału opałowego w każdej gorzelnii.

Ilość paliwa, potrzebna do pędzenia dobrego kotła parowego.

Na godzinę zużywa:

Stopień napięcia kotła	Ilość pary z 1 kg. opalu	1 metr kwadr. powierzchni ogrzewalnej		I os. kwadr. pow. powierzchni zużywa opalu	Rodzaj paliwa
		zużywa opalu	daje pary		
	Kilogr.	Kilogr.	Kilogr.	Kilogr.	
Łagodny	8	2	16,6	70) dobre węgle kamiennie śląskie
Średnio napięty	7	3,3	23,3	90	
Silnie napięty	6	5	30	110	
Łagodny	3,3	8,3	10	150) dobry torf prasowany i drzewo
Średnio napięty	2,7	8,7	23,3	250	
Silnie napięty	2,3	12,8	30	400	

Woda: Wody w gorzelnii potrzeba zawsze bardzo wiele; na każdy hektolitr (wiadro) zacieru należy liczyć około 10 hektolitrów (wiader) wody. Nietylko jednak ilość, ale także i jakość wody jest również ważna.

Woda przeznaczona do przyrządzenia przycierków, rozcieńczenia zacieru, rozrabiania słoju i mycia naczyń gorzelnianych powinna być pod względem biologicznym jak najczystsza; ma być zatem wolną od substancji gnijących, jakoteż organizmów, powodujących te rozkłady i gnicia.

Dla celów słodowniczych powinna być wolną od substancji gnijących, większych osadów, jakoteż większych ilości chlorków i azotanów, które powodują nienormalny rozwój siodu.

Woda służąca do enłodzenia ma być zimną i wolną od znaczniejszych ilości substancji, będących w zawieszeniu, jakoteż kwaśnych węglanów.

Wreszcie woda przeznaczona do kotła powinna być miękka, nie zawierać większych ilości soli wapiennych i magnowych, które powodują tworzenie się na ścianach kotła osadu, zwanego kamieniem kotłowym. Kamień ten przyczynia się do zużycia większej ilości opału (nieraz do 40%), a nadto grozi niebezpieczeństwem eksplozyi kotła.

Ogólnie można przyjąć, że woda o ciepłocie niżej 10°C (8°R), posiadająca własności dobrej do picia, niezbyt twarda, a przede wszystkim wolna od substancji gnijących i to gnicie powodujących, jest zupełnie odpowiednia dla celów gorzelniczych. Woda nie odpowiadająca tym warunkom, powoduje trudności w prowadzeniu gorzelnii, obniża wydatki spirytusu i utrudnia należyte wyzyskanie materyałów surowych.

Ilość wody potrzebna w gorzelnii.

Pzy produkcji spirytusu z jednego zacieru.		1 zacier		2 zacier		3 zacier		4 zacier		skuteczność pompy w godzinie	
hektolitrow	wiader	m ³	wiader	m ³	wiader	m ³	wiader	m ³	wiader	m ³	wiader
1	10	10	1000	15	1500	20	2000	25	2500	3	300
1.5	15	15	1500	22	2200	30	3000	37	3700	4.5	450
2	20	20	2000	30	3000	40	4000	50	5000	6	600
2.5	25	25	2500	37	3700	50	5000	62	6200	7.5	750
3	30	30	3000	45	4500	60	6000	75	7500	9	900
3.5	35	35	3500	52	5200	70	7000	87	8700	10.5	1050
4	40	40	4000	60	6000	80	8000	100	10000	12	1200
5	50	48	4800	72	7200	96	9600	120	12000	15	1500

Produkty surowe. a) Ziemiaki zawierają od 9 do 29% skrobi (zawartość pozostałych składników, p. str. 20).

Oznaczenie skrobi najlepiej wykonywać na wadze dziesiętnej Reimana, używając do oznaczenia wody miękkiej, destylowanej, deszczowej lub wygotowanej stawowej, przy temperaturze ściśle 17.5° C = 10° R; dokładność ± 1%. Ziemiaki uszkodzone, zgnite lub zmarznięte dają wyniki niepewne.

b) Ziarna zbożowe. Dane co do składników na str. 17 i 22 należy uzupełnić zawartością skrobi: *jęczmień* 48.5—68.0% *średnio* 60.0%; *proso* z łuską 54%, bez łuski 64%; *żyto* 49.5—68.0% *średnio* 60.0%; *owies* 40.0—60.0% *średnio* 50.0%; *pszenica* 49.0—70.0% *średnio* 65.0%; *kukurudza* świeża 50.0—62.0% *średnio* 58.0%, stara 55.0—68.0% *średnio* 62.0%.

Słodownia. Ze względu na konieczność utrzymania wzorowej czystości, słodownia powinna być widna, a posadzce, sporządzonej z wielkich płyt kamiennych, albo betonu, wreszcie z cegły ostro palonej, stawianej na kant i spajanej cementem, ze spadkiem ku kanałowi. Ściany wyprawione na gładko, mają

Tablica

do oznaczenia z ciężaru właściwego suchej substancji i skrobi w ziemniakach, zapomocą wagi Reimanna według Behrenda, Maerckera i Morgena (1879), poprawiona i uzupełniona przez G. Fohta (1907).

5 kg ziemnia- ków waży pod wodą gr.	Ciężar wła- ściwy	Suchej sub- stancji %	Skrobi %	5 kg ziemnia- ków waży pod wodą gr.	Ciężar wła- ściwy	Suchej sub- stancji %	Skrobi %
290	1.062	15.7	10.0	495	1.110	26.1	20.9
295	1.063	16.0	10.2	500	1.111	26.3	20.6
300	1.064	16.2	10.5	505	1.112	26.6	20.8
305	1.065	16.5	10.7	510	1.114	26.9	21.1
310	1.066	16.7	11.0	515	1.115	27.1	21.4
315	1.067	16.9	11.2	520	1.116	27.4	21.7
320	1.068	17.2	11.5	525	1.117	27.7	21.9
325	1.070	17.4	11.7	530	1.119	27.9	22.2
330	1.071	17.7	11.9	535	1.120	28.2	22.5
335	1.072	17.9	12.2	540	1.121	28.5	22.7
340	1.073	18.2	12.4	545	1.122	28.8	23.0
345	1.074	18.4	12.7	550	1.124	29.0	23.3
350	1.075	18.7	12.9	555	1.125	29.3	23.5
355	1.076	18.9	13.2	560	1.126	29.6	23.8
360	1.078	19.2	13.4	565	1.127	29.8	24.1
365	1.079	19.4	13.7	570	1.129	30.1	24.3
370	1.080	19.7	13.9	575	1.130	30.4	24.6
375	1.081	19.9	14.2	580	1.131	30.6	24.9
380	1.082	20.2	14.4	585	1.133	30.9	25.2
385	1.083	20.4	14.7	590	1.134	31.2	25.4
390	1.085	20.7	14.9	595	1.135	31.5	25.7
395	1.086	20.9	15.2	600	1.136	31.8	26.0
400	1.087	21.2	15.4	605	1.138	32.0	26.3
405	1.088	21.4	15.7	610	1.139	32.3	26.6
410	1.089	21.7	15.9	615	1.140	32.6	26.8
415	1.091	21.9	16.2	620	1.142	32.9	27.1
420	1.092	22.2	16.4	625	1.143	33.1	27.4
425	1.093	22.4	16.7	630	1.144	33.4	27.7
430	1.094	22.7	17.0	635	1.146	33.7	28.0
435	1.095	23.0	17.2	640	1.147	34.0	28.2
440	1.097	23.2	17.5	645	1.148	34.3	28.5
445	1.098	23.5	17.7	650	1.149	34.5	28.8
450	1.099	23.7	18.0	655	1.151	34.8	29.1
455	1.100	24.0	18.2	660	1.152	35.1	29.4
460	1.101	24.2	18.5	665	1.153	35.4	29.6
465	1.103	24.5	18.7	670	1.155	35.7	29.9
470	1.104	24.8	19.0	675	1.156	36.0	30.2
475	1.105	25.0	19.3	680	1.157	36.2	30.5
480	1.106	25.3	19.5	685	1.159	36.5	30.8
485	1.107	25.5	19.8	690	1.160	36.8	31.1
490	1.109	22.8	20.1				

być pomalowane farbą olejną, albo smołowcem, t. j. 2 części mazi pogazowej i $2\frac{1}{2}$ części asfaltu, albo wapnem zwyczajnem.

Przy posadzce, jako też przy sklepieniu powinny znajdować się kanały, wychodzące na zewnątrz, z których dolny służy do wyprowadzania bezwodnika węglowego, górny pary wodnej.

Ciepłota słodowni powinna wynosić 6—10° C. i być niezależną od wpływów zewnętrznych. Wielkość słodowni ma być tak znaczną, aby zezwalała na prowadzenie długiego słołu, zatem na każdy hektolitr spirytusu 30 m² powierzchni, t. j. na każde wiadro spirytusu 10 łokci kwadratowych powierzchni.

W lokalu słodowni, albo w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zalewnia, która może być murowana o ścianach cementem gładko wypalonych, albo też żelazna. Doprowadzenie wodne do zalewni powinno być od dołu, zaś wyprowadzenie wody od góry i dołu. Dobrze urządzone większe zalewnie posiadają obok wody także i doprowadzenie powietrza. Wielkość zalewni powinna odpowiadać na każde 100 kg. zalewanego zboża 300 litrów przestrzeni, czyli na każde 10 pudów zboża 40 wiader przestrzeni.

Słodowanie. Zboże, przeznaczone na słoł, powinno wykazywać wysoką zdolność i energię kielkowania, im ona jest wyższą i zbliża się do cyfry 100 tem zboże dla tych celów jest odpowiedniejsze. Zboże, któreby wykazywało mniej jak 90 ziarn kielkujących, (co można stwierdzić przez próbnę kielkowanie w wilgotnej bibule, albo piasku) jest dla celów słodowniczych zupełnie nieprzydatne. Ziarna, nie kielkujące ulegają pleśnieniu i gniciu, przeto powodują zakażenia zacieru i zmniejszają wydatki; nadto słoł taki nigdy nie posiada należytej siły enzymatycznej. Obok tego zboże powinno być czyste, wolne od ziarn uszkodzonych, lub obcych, gdyż te łatwo pleśnieją i zakażają słoł. Wreszcie powinno być jednolite, zatem jednej odmiany, pochodzić z jednego pola i być równe co do wielkości ziarna. Zboża rozmaitych odmian lub pochodzenia należy trzymać i przerabiać oddzielnie, a przed użyciem rozdzielić je na trzierze stosownie do wielkości ziarn. Świeże zboże wykazuje zawsze słabą zdolność i energię kielkowania; dopiero po odpowiedniem odleżeniu, które ma wynosić conajmniej 6 tygodni licząc od czasu zbioru, jest odpowiednie do słodowania. Zboże starsze jak dwuletnie, jest również ze względu na słabą zdolność kielkowania dla celów słodowniczych nie przydatne. Co się tyczy wielkości, to dla celów słodowniczych zboże o drobnem ziarnie, a wielkim zarodku, zatem zboże o wysokiej zawartości ciał białkowych, a stosunkowo mniejszej ilości skrobi, dają najsilniejszy słoł.

Aby ziarno mogło kielkować, muszą zostać dostarczone trzy warunki: wilgoć, odpowiednia ciepłota i tlen powietrza.

Wilgoć otrzymuje ziarno przez namoczenie w zalewni, które ma się odbywać w dostępie tlenu powietrza. Do zalewni z wodą wsypuje się zboże cienkim strumieniem, mięsza energicznie i pozostawia 6—8 godzin w spokoju. Po upływie tego czasu odpuszcza się wodę zupełnie, a zboże pozostawia tyleż godzin na sucho. Następnie napuszcza świeżej wody i postępuje tak naprzemian, pozostawiając zboże raz bez wody, to znowu z wodą, aż ziarno dostatecznie namoknie. Przy wodzie gorszej jakości, albo też uszkodzonem zbożu, należy do wody moczącej dodać środka odkażającego. Z różnych antyseptyków najlepszym jest

wapno chlorowe, które do drugiej, względnie pierwszej wody, należy dodać w ilości 100 gr. na każde 100 kg. zalewanego zboża, czyli na 10 pudów $\frac{1}{2}$ funta. Zamiast wapna chlorowego można użyć zwyczajnego wapna palonego, biorąc na każde 100 kg. zboża $\frac{1}{2}$ —1 kg. Ca O, t. j. na 10 funtów 2—4 funtów. Przy każdym odpuszczeniu względnie napuszczeniu świeżej wody, należy zboże dobrze przemieszać, aby odmokłe cząsteczki brudu z ziarna odeszły.

Namoczenie ziarna poznaje się przy jęczmieniu i t. p. po tem, że jego plewka nie kluje, łatwo odchodzi, a pod paznokciem zagina się: przy życie i podobnych, ziarno przegina się, jednak mlecza nie wypuszcza; przegryzione wykazuje w środku biały punkt skrobi nienamoczonej. Ziarno, nie wykazujące białego punktu, jest przemoczone i więcej nie kielkuje.

Czas namoczenia jest zależny od ciepłoty wody, lokalu i jakości zboża, przyczem żyto i pszenica wymagają czasu moczenia najkrótszego 20—36 godzin. Kukurudza, owies, proso 36 do 60 godzin. Najdłuższego moczenia wymaga jęczmień, bo 48 do 120 godzin.

Wogóle należy pamiętać, że lepiej ziarno niedomoczyć, a brukującą wodę uzupełnić przez zraszanie podczas słodowania, aniżeli przemoczyć, gdyż ziarno takie już więcej kielkować nie może.

Ziarno namoczone układa się na posadzce słodowni w grzędy wysokości 30—60 cm., t. j. $\frac{1}{2}$ —1 łokcia. Po upływie 12—36 godzin grzęda poczyna się zagrzewać, występuje pot (pod wierzchnią warstwą rosa), równocześnie następuje właściwy proces kielkowania i z tą chwilą należy grzędy przerabiać. Przerabianie grzędy polega na przewracaniu i obniżaniu warstwy ziarna. Ukutecznia się to zazwyczaj, biorąc dwoma razami łopatą w ten sposób, że część środkowa grzędy dostaje się na spód i górę; zaś spód i górę grzędy dajemy do środka, równocześnie obniżając jej grubość. O potrzebie przerabiania decyduje jej ciepłota i pot. Ciepłota przy obfitym pocie nie powinna przechodzić 15° C. (12° R.), zaś przy forsownem prowadzeniu 17 $\frac{1}{2}$ ° C. (14° R.). Im grzęda silniej się zagrzewa, tym częściej trzeba ją przerabiać (4—12 godzin), obniżając równocześnie grubość warstwy, aż do 6 cm. (2 $\frac{1}{2}$ cala), przyczem w miarę potrzeby, gdy pot jest słaby, a ciepłota dochodzi do 15° C. (12° R.), należy grzędę lekko zrosić wodą.

Słodowanie należy prowadzić przy jęczmieniu 18—24 dni; — życie, pszenicy, prosie i owsie 16—22 dni; — kukurudzy 12—16 dni, przyczem korzonki (kielki) mają wynosić 2—3 długości ziarna; piórka (huzary) 1 $\frac{1}{2}$ długości ziarna.

Gotowy sód rozsypuje się w cienkiej warstwie i nie daje więcej wody, tak aby lekko zawiadł i przestał dalej się rozwijać. Sód przez to staje się jeszcze lepszy, gdyż jego siła cukrująca wzrasta.

Stosunek siły cukrującej rozmaitych sódów jest następujący:

Sód jęczmienny . . .	100
» żytni	100
» pszeniczny	110
» owsa	65
» prosa	75
» kukurudzy	50

100 kg. (100 pudów) zboża twardego daje 130—170 kg. (130 do 170 pud.), przecięciowo 150 kg. (150 pudów). 100 litrów (100 wiader) daje 200—250 litrów (200—250 wiader) przecięciowo 220 litrów (220 wiader) słoðu.

Stratę podczas wyrobu słoðu wynoszą przy długo prowadzonym słodzic 15—20% skrobi, liczone w suchem ziarnie.

Gniecenie słoðu. Słód w gorzelni ma jako zadanie przeprowadzić skrobię materiału zacierowego na cukier; prócz tego służy jako bardzo dobra pożywka dla drożdży. Aby uczynić słód energicznie czynnym, należy go dobrze rozgnieść i poszarpać. Rozdrabnianie słoðu skuteczniejszą się na przyrządach zwanych gniotownikami, których dobroć polega na szybkim i bardzo dokładnem rozdrobieniu ziarn. Słód, spleśniały lub też w jakikolwiek sposób uszkodzony, należy przed zgnieceniem przemycić wodą o ciepłocie 40° C. (32° R).

Ilość słoðu potrzebna do zacieru oblicza się według surowych materiałów, albo też przerabianej skrobi, prztem przyjmuje się 2—3% ziarna twardego w formie słoðu (t. j. 3—5% słoðu), licząc na ziemniaki, zaś 10—14% ziarna twardego, czyli 15—20% słoðu, licząc na zacierane zboże, albo 16% ziarna twardego, t. j. 25% słoðu, licząc na zatartą skrobię.

Słód zgnieciony służy częścią do przyrządzania przycierku, a głównie do cukrowania zacieru. Ostatnią ilość daje się do zacierni, zarabia małą ilością wody i puszcza mieszało zacierni w ruch celem uzyskania jak najdelikatniejszej brai słodowej.

Gotowanie ziemniaków. Ziemniaki gotuje się w aparatach, zwanych parnikami, których kształt powinien być konieczny, względnie konieczno-cylindryczny.

Ziemniaki, nim przyjdą do parnika, muszą zostać należycie obmyte w płucez, długości co najmniej 2 metrów (4 łokci). Należyte obmycie ziemniaków, zatem dobra płuczka, wpływa na szanowanie wszystkich aparatów i lepsze wydatki, jest przeto operacją bardzo ważną. Obmyte ziemniaki zapomocą łańcucha z koszami czerpakowymi zostają podniesione do góry i wrzucane do parnika.

Gotowanie ziemniaków jest operacją ważną, gdyż od stopnia ich rozgotowania zależy łatwość cukrowania a tem samem i wydatki. Sposób gotowania zależy od jakości ziemniaków, t. j. od ich skrobiowości i ewentualnego stopnia uszkodzenia.

Po zamknięciu wjazdu puszcza się parę górnym dopływem tak długo, aż ukaże się przy wentylu dolnym. To podgrzanie parnika i podparzenie ziemniaków trwa zależnie od wielkości parnika, jakości ziemniaków i kotła 20—45 minut, rzadko dłużej. W ciągu tego czasu splywa dolnym wentylem wopa kondensacyjna i sokowa, t. zw. lura. Skoro tutaj ukaże się para, zamykamy wentyl odpuszczający wodę sokową, jakoteż dostęp pary od góry, a puszczaemy dopływ dolny i tą dolną parą gotuje się dalej w ten sposób, że w przeciągu 30—40 minut dochodzimy do ciśnienia 3 atmosfer, t. j. 45 funtów. Po dojściu do tego ciśnienia ziemniaki z reguły są ugotowane o czem przekonujemy się z polranej, z parnika, próbki. Ugotowane ziemniaki powinny przedstawiać jednolitą masę, wolną od grudek, lub też nierozgotowanej lupy. W ten sposób postępuje się przy ziemniakach zdrowych, o skrobiowości 15—20%.

Ziemniaki nisko-procentowe (niżej 15%) względnie skłonne do fermentacyi pienistej, należy wolno podparzać, a to w tym

celu, by woda sokowa jak najdokładniej ściekała. Ciśnienie, przy nisko-skrobiowych ziemniakach, pozostaje normalne, przy skłonnych do fermentacyi pienistej, podnosi się do $3\frac{1}{4}$ — $3\frac{1}{2}$ atmosfer, t. j. 48—52 funtów.

Ziemniaki zgnite, zaparzone, zmarzniete, lub wyrosniete, wogóle nienormalne, należy wolno podparzać. Wodę sokową odpuszcza się tutaj tylko częściowo, zaś pozostałą resztę, która zawiera wiele skrobi, nagromadza się w parniku i odpuszcza do kadzi zaciernej dopiero po pół godzinnem gotowaniu. Po zamknięciu górnej pary gotuje się wolno dalej dolną parą przy częściowo otwartym kurku powietrznym, tak, by ciśnienie tylko powoli wzrastało, a cała masa w parniku doprze chodziła. Ciśnienie końcowe przyjmuje się na $3\frac{1}{4}$ — $3\frac{1}{2}$ atmosfer.

Ziemniaki wysokoprocentowe gotuje się podobnie jak uszkodzone, tylko czas podgrzewania, rozparzania, może być krótszy, a końcowe ciśnienie trochę niższe. Cała operacya gotowania trwa w normalnych warunkach 1— $1\frac{1}{4}$ god. przy trudnogotujących się, albo też uszkodzonych do $1\frac{1}{2}$ godz. a nawet i dłużej.

Gotowanie zboża. Do parnika wlewa się wodę w ilości 130 do 200 litrów, średnio 150 litrów na każde 100 kg. zboża, czyli na pud 2—3 wiader wody, średnio $2\frac{1}{2}$ wiadra wody. Ilość użytej wody jest zależną od skrobiowości zboża i gęstości przyrządzanych zacierów. Na wodę zimną, względnie gotującą się, sypie się zboże wolno, równocześnie mieszając i puszczać parę gotującą. Przy otwartym wlaźcie, albo zamkniętym wlaźcie, ale otwartym kurku powietrznym gotuje się przez $1\frac{1}{2}$ godz. do ciśnienia 1— $1\frac{1}{2}$ atm. (15—22 funtów), następnie podnosi ciśnienie na 2— $2\frac{1}{2}$ atm. i gotuje $\frac{1}{2}$ —1 godz., poczem przynika wentyl powietrzny i gotuje do $3\frac{1}{2}$, a nawet 4 atmosfer przez $\frac{1}{2}$ godz. do 45 minut. Cała operacya gotowania trwa 2—3 godzin, przy czem należy pamiętać, aby gotowanie przy niskim ciśnieniu, zatem podparzanie, trwało długo, zaś właściwe gotowanie przy wysokim ciśnieniu krótko; im zboże trudniej się gotuje, tem dłużej należy zatrzymać niskie ciśnienie.

Skoro ciśnienie dojdzie do $3\frac{1}{2}$ atmosfer (52 funtów) należy pobrać próbkę i przekonać się, czy masa jest należycie rozgotowana, t. j. czy przy rozgniataniu pod palcami nie daje się odczuć żadnych grubszych części ani grudek, a ziarna rozcierają się na jednolitą równą masę.

Przy zbożu uszkodzonym należy proces podgrzewania, zatem gotowania przy niskim ciśnieniu prowadzić dłużej, zaś końcowe ciśnienie przy zbożu zrosnietem przyjąć niższe, niż zwyczajnie, więc do 3 atm., a nawet i niżej, zaś przy zbożu zaparzonem, stęchlem i t. p. dojść z ciśnieniem końcowem do 4 atmosfer (60 funt.).

Zacieranie. Ugotowany materiał zacierany wyciska się do kadzi zaciernej, do której dodano poprzednio zgniecionego siodu. Z chwilą, kiedy przystępujemy do wyciskania, należy puścić mięszadło kadzi zaciernej w ruch, a to w tym celu, by wyciskana masa nie sparzyła (zniszczyła) siodu i aby została z nim jak najlepiej zmieszana. Wyciskanie prowadzi się w ten sposób, że temperatura kadzi zaciernej rychło podnosi się na 50° C. (40° R.), poczem prawie całą masę wyciska się przy ciepocie 53°—58° C. (43°—46° R.). Pod koniec wyciska się w ten sposób, że temperatura końcowa, zatarcia wynosi przy dobrym materiale 60° C. (48° R.), przy złym materiale, względnie gestych zacie-

rach 62°—64° C. (50—51° R.). Po wyciśnięciu masy mięsza się jeszcze zacier przez 10—15 minut, poczem pozostawia w spokoju dla dalszego cukrowania do 1 godziny. Po upływie tego czasu, bierze się trochę zacieru, chłodzi, sączy i bada jodem na zeukrzenie. Dobrze zeukrzony zacier daje z jodem tylko słabo żółte zabarwienie. Barwa niebieska, fioletowa, czerwono-brunatna świadczy o niedostatecznym zeukrzeniu.

Przy zacieraniu należy uważać, aby sól nie został sparzony, co może nastąpić przy szybkim wyciskaniu masy z parnika, przy złych mięszadłach i termometrach, wskazujących wadliwie ciepłotę.

Cała operacja przyrządzenia zacieru, t. j. wyciskania i cukrowania trwa 75—90 minut.

Zeukrzony zacier schładza się na ciepłotę zadania drożdży, która leży między 20°—30° C. (10—18° R.), poczem zacier przepompowuje się do kadzi fermentacyjnych.

Po skończonym zacierze należy każdą dobrze zszurować i splukać, a przewody do kadzi fermentacyjnej przemyć.

Przyrządzanie przycierku drożdżowego. Przyrządzenie przycierku wykonuje się w izbie, zwanej drożdżarnią, która nie powinna być zbyt wielką, jednak dostatecznie obszerną, aby można wszelkie operacje wykonywać wygodnie. Ściany powinny być gładkie, pomalowane olejno, albo smółcem. Posadzka betonowa ze spadkiem ku kanałowi. Wreszcie rury doprowadzające wodę i parę. Celem utrzymania wysokiej ciepłoty jest potrzebny kociołek wodny, albo dobry piec. Lokal powinien być widny i panować w nim wzorowa czystość.

Do przyrządzenia przycierków służą kadki drewniane, najlepsze z drzewa dębowego, które przed każdym użyciem należy wyparzyć, albo też wymyć gorącą wodą z dodatkiem wapna chlorowego, lub podobnego silnego środka odkażającego.

Przyrządzanie przycierku jest zależne od sposobu ukwaszenia i stosownie do tego dzielimy: na metody kwaszenia bakteriami kwasu mlekowego i metody kwasu siarczanego.

Bakterye kwasu mlekowego. Skoro zacier w kadzi zaciernej częściowo zeukruje, odbiera się go na przycierek w ilości $\frac{1}{20}$ do $\frac{1}{10}$ zacieru, uwalnia przez sączenie od grubszych lup i wlewa do kadki drożdżowej. Celem podniesienia pożywności przycierku i zeukrzenia reszty skrobi zacieru, dodaje się na każdy hektolitr przycierku 10—20 kg. słodu, t. j. na każde 10 wiader $\frac{3}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$ puda słodu, mięsza dokładnie, podnosi ciepłotę na 65° C. (52° R.) i trzyma w tej ciepłocie celem zeukrzenia 1—2 godzin. Po upływie tego czasu, schładza na 52° C. (42° R.) i zadaje czystej kultury bakteryi kwasu mlekowego. Ciepłotę 50—55° C. (40—44° R.) utrzymuje się około 20 godzin, w którym to czasie bakterye rozmnażają się i ukwaszają przycierek. Drugiego dnia odbiera się z ukwaszonego przycierku $\frac{1}{2}$ —4 litrów na każdy hektolitr, t. j. 1—5 kwart na każde 10 wiader przycierku, które służą jako zakwasek. Po odebraniu tego zakwasu, podgrzewa się ukwaszony przycierek do 75° C. (60° R.), celem zabicia już zupełnie zbytecznych bakteryi kwasu mlekowego i schadza się na ciepłotę zadania drożdży.

Przy sporządzaniu dalszych przycierków odebrany zakwasek pierwszego przycierku służy jako kultura bakteryi wysiewnych i może być zadana w ciepłocie 50°—60° C. (40—48° R.),

Kwaszenie prowadzi się w ciepłocie leżącej między 50°—60° C. (40—48° R.).

Stopień ukwaszenia jest zależny od gęstości zacieru i dobroci surowych materyałów. Przy niskoprocentowych zacierach i zdrowych materyałach należy ukwaszać słabo 1,6—2,0° K. Im gorszy materyał i zacier gęstszy, tem kwaszenie musi być silniejsze.

Przez użycie większej ilości zakwaszku, a powtóre przez obniżanie lub podnoszenie ciepłoty, kwaszenie można dowolnie regulować.

Silne ukwaszenie chroni przed zakażeniem, wpływa jednak osłabiająco na drożdże, które łatwo degenerują. Z tego powodu stopień ukwaszenia powinien być tak utrafiiony, aby drożdże fermentowały a były przed zakażeniem należycie chronione.

Ukwaszenie kwasem siarczanym. (Metoda Büchelera, Bauera, Kuesa i Chrzászcza).

a) Metoda Büchelera. Zacier częściowo lub zupełnie zczu-krzony, odbiera się na przycierek w ilości, jak podano wyżej, zadaje słodem i cukruje w temperaturze 65° C. (52° R.), co najmniej 2 godziny. Następnie podgrzewa celem wyjalowienia na 75° C. (60° R.), schładza poniżej 45° C. (36° R.) i zadaje kwasu siarczanego w takiej ilości, aby kwasowość przycierku ziemniaczanego wynosiła 1,1—1,5°, średnio 1,2—1,4° kwasu; przy zacierach zbożowych 0,9—1,3°, — poczem schładza na ciepłotę zadania drożdży.

Kwas siarczany, przed zadaniem, należy rozcieńczyć. W tym celu do naczynia drewnianego, albo glinianego bierze się około dwukrotnej ilości wody i wlewa do niej kwas siarczany, a po rozmieszaniu dolewa się kilka lub kilkanaście kwart przycierku; poczem w ten sposób rozcieńczony kwas, wlewa cienkim strumieniem do przycierku, który równocześnie energicznie mieszamy.

Gęstość kwasu.		Na 100 litrów przycierku drożdżowego potrzeba w przybliżeniu kwasu	Na 100 wlań przycierku drożdżowego potrzeba w przybliżeniu kwasu
Stopnie Baumé'go	CieŜar właściwy	w cm ³	w cm ³
68°	1,84	160	200
65°	1,82	180	225
60°	1,72	210	260
55°	1,62	250	310
50°	1,53	300	375
45°	1,45	370	460
40°	1,38	450	560
35°	1,32	550	680
30°	1,26	700	875
25°	1,21	900	1125
20°	1,16	1200	1500
15°	1,11	1700	2525
10°	1,07	2600	3250

b) Metody Bauera, Kuesa i Chrzászcza. Zacier zupełnie zczu-krzony odbiera się na przycierek, jak wyżej, trzyma w ciepłocie

cie około 62° C. (50° R.) przez 1—2 godzin i dodaje ekstraktu Bauera i Kuesa w ilości 400 gr. na 1 hektolitr przycierku, t. j. 1 funt na 10 wiader, albo drożdży odpadkowych browarnianych (Chrzaszcz) w ilości 2—3 litrów na 1 hektolitr, 3—4 kwarty na 10 wiader i wyjalawia jak wyżej. Ekstrakta, względnie drożdże browarniane należy przed zadaniem rozdrobnić i w małej ilości zacieru gotować przez 10—30 minut, poczem dopiero dodać do przycierku. Wyjalowiony, po zadaniu ekstraktów przycierrek, schładza się na ciepłość zadania kwasu i postępuje jak wyżej:

Sporządzanie drożdży. Do zcukrzonogo i ukwaszonego przycierku zadaje się drożdże w ciepłocie 20—30° C. (16—24 R.), poczem schładza na ciepłość nastawienia 12—29° C. (12—16° R.) i poddaje fermentacji, która trwa około 20 godzin. Po upływie wspomnianego czasu, drożdże się rozmnożyły i są dostatecznie dojrzałe. Dojrzałość drożdży poznaje się po stopniu odfermentowania, albo mikroskopowo. Stopień odfermentowania zależy od sposobu prowadzenia drożdży i gęstości przycierku. Im silniejszy kwas, tem drożdże prędzej dojrzewają. Drożdże dojrzałe rozbiera się w ten sposób, że część drożdży, odpowiadająca $\frac{1}{12}$ — $\frac{1}{5}$ całej ilości drożdży odbiera się jako tak zwana matkę, która służy do zadania nowych ukwaszonych przycierków, zaś resztę zadaje się do schłodzonego zacieru do kadzi zaciernej.

Drożdże należy więc rozbierać przy kwasie siarczanym między 7—8° B. cukru, przy bakterjach 5—6° B. cukru. Przy bardzo słabych przycierkach nawet znacznie poniżej 5° B. Siłę drożdży poznaje się po dobrem odfermentowaniu i zagrzewaniu się, które podczas fermentacji powinno dojść do 28—30° C. (22 do 24 R.).

Przy sporządzeniu drożdży jest bardzo ważnem, unikanie tak zwanych martwych punktów, t. j. trzymanie i przechowanie drożdży przez dłuższy czas w tak zwanych matecznikach. Przy bakterjach kwasu mlekowego należy robotę tak regulować, aby drożdże stale pracowały i były przenoszone z jednego przycierku do drugiego, bez trzymania w matecznikach.

Przyrządzenie pierwszego przycierku. Do wyparzonej kadki wysypuje się w połowie mąki żytniej, w połowie słodu słabo wyrośniętego, dobrze rozgniecionego i zarabia wodą na masę możliwie gęstą (na 1 hektolitr wody około 25 kg. mąki żytniej i 25 kg. słabo wyrośniętego słodu, t. j. na 10 wiader 2 pudy mąki i 2 pudy słodu). Mieszaninę tę podgrzewa się na 70° C. (56° R.), trzyma przez pół godziny, poczem dodaje na każdy hektolitr około 10 kg. słodu dobrze wyrośniętego, na każde 10 wiader 1 pud, w ten sposób, aby ciepłota po dodaniu wynosiła około 65° C. (52° R.), i w tej ciepłocie trzymać przez 2 godziny celem zupełnego zcukrzienia. Po zcukrzieniu schładza na ciepłość kwaszenia, zadaje czystą kulturą bakterji kwasu mlekowego, które można otrzymać ze Stacji Gorzelniczej Dublany pod Lwowem, albo w Warszawie, Podwale 4. Po ukwaszeniu zadaje drożdżami, licząc $\frac{1}{2}$ —1 kg. na każde 100 litrów przycierku, drożdży prasowanych, czyli na 10 wiader 2—3 funtów. Kto zamierza prowadzić czystą kulturę drożdży ten po odpowiedniem rozmnożeniu powinien je wprowadzić do przycierku dnia następnego.

8) **Fermentacja.** Sala fermentacyjna powinna mieć podłogę

betonową lub z cegieł ostro palonych, stawianych na kant i spajanych cementem, o należytym spadku, ściany pomalowane olejno lub smolą, możliwie stałą temp. 10—12° R. i świeże czyste powietrze (wentylacja dolna). Kadzie fermentacyjne po każdorazowym użyciu, należy starannie wyszorować szczotką, potem wysmarować wapnem gaszonym, a od czasu do czasu lub w miarę potrzeby wapnem chlorowem.

W przebiegu fermentacji odróżniamy trzy okresy: I zafermentowanie (rozmnożenie się drożdży), II fermentacja właściwa (przerób cukru maltozy), III defermentowanie (przeróbka dekstryn). Okres początkowy, w którym chodzi o wytworzenie największej ilości drożdży, powinien trwać możliwie długo (a więc około 30 godz.), co się osiąga: przez łączenie słodkiego zacieru z drożdżami przy ciepłocie 20—30° C. = 16—24° R. i przez następne ochłodzenie do ciepłoty 12—20° C. = 10—16° R.

W okresie głównym należy zwracać uwagę na nieprzekroczenie (ciepl. 30° C. = 24° R.), najkorzystniejszej dla działania drożdży.

Przekroczenie ciepłoty 30° C. = 24° R. wpływa na słabszy przebieg fermentacji końcowej, żywszy rozwój bakterii (przyrost kwasu), a także większe straty na wyparowaniu alkoholu.

W razie więc przekraczania wspomnianej ciepłoty, należy ją obniżyć przez dołanie czystej zimnej wody — co ma nastąpić drugiego dnia wieczorem.

Fermentacja pienista, o ile nie wynika z właściwości użytych surowych produktów, jest dowodem energicznej pracy drożdży. Gdy chodzi o opanowanie zbyt silnego pienienia się kadzi, należy stosować następujące środki: 1) Odpuszczanie wody sokowej i parzenie przy wyższej temperaturze. 2) Dodatek trochę płynnego tłuszczu do kadzi zaciernej. 3) Użycie siodu owsianego w ilości 1/3. 4) Silne odfermentowanie drożdży. 5) Smarowanie ścian kadzi płynnym tłuszczem.

Okres końcowy fermentacji powinien być otoczony szczególną pieczą, gdyż od jego przebiegu w największym stopniu jest zależny wydatek alkoholu. Dekstryny muszą tutaj zmienić się pod wpływem amylazy w cukier, a ten ma być przez drożdże przerobiony na alkohol. Niezbędnym jest więc utrzymanie ciepłoty 26—28° C (21—23° R) jako najkorzystniejszej dla końcowej fermentacji wpływa na dobre odfermentowanie i niski przyrost kwasu. Dobroć roboty poznaje się po przyroście kwasu i odfermentowaniu; im te cyfry są niższe, tem wyniki w gorzelni są lepsze.

Odpęd. Wypędzenie alkoholu z zacieru dokonuje się w aparatach, które dzielimy na perjodyczne i ciągłe; ostatnie mogą być jedno lub dwusłupowe. Porównanie tych systemów wykazuje, że aparaty perjodyczne, o ile ich kotły są sporządzone z drzewa, są tańsze, łatwe do pędzenia i nie wymagają szczególniejszej obsługi. Ich stroną ujemną jest zużycie większej ilości opału, potrzeba częstych napraw; nadto wymagają dłuższego czasu pędzenia, a wywar z nich otrzymany wyjątkowo jest wolny od alkoholu, zaś stosunkowo często zawiera go nawet w znacznej ilości. Aparaty do roboty ciągłej są droższe, wymagają starannej, inteligentnej obsługi, natomiast odpęd prowadzą szybko, a przy dobrej robocie wywar jest zupełnie czysty. Aparaty ciągłe, dwusłupowe są drogie, odpędzają

wywar nie czysto i są nieekonomiczne. Tak więc najlepsze są aparata jednosłupowe do roboty ciągłej.

Ilość otrzymanego wywaru jest zależną od sposobu gotowania. 100 litrów (wiader) dostarcza 110—125 średnio 115 litrów (wiader) wywaru.

Do chłodzenia aparatu potrzeba wody na każde 100 litrów (wiader) zacieru 75 litrów (wiader) wody, o ciepłocie 10° C (8° R).

Babania przebiegu roboty. a) Sachrometria. Cukromierz Ballinga wskazuje gęstość gęstość płynu, t. j. ilość substancji, będącej w rozpuszczeniu. Wskazanie cukromierza jest dokładne tylko przy ciepłocie 17 $\frac{1}{2}$ ° C (14° R) i do tej ciepłoty należy zawsze ochłodzić badaną ciecz. Dokładne cukromierze posiadają skale redukcyjne, które zezwalają na odczytywanie gęstości w dowolnej ciepłocie. Cukromierz przy użyciu powinien być czysty, suchy, a do cieczy badanej ma być zanurzany powoli. Sucha substancja, wykazana przez cukromierz, nie jest li tylko cukrem, ale mieszaniną najrozmaitszych ciał, znajdujących się w roztworze. 100 części suchej substancji wykazane przez cukromierz, składa się tylko w części z substancji ulegającej fermentacji i tak: w zacierach sporządzonych z wysokoskrobiowych ziemniaków, znajduje się 88 części cukru, w granicach 84—92. Średnioskrobiowych ziemniaków 82, w granicach 78—84. W zacierach kukurydzianych około 90 części, żytnich 82—86 części cukru. Ten stosunek ciał ulegających fermentacji do nie fermentujących, czyli cukrów do niecukrów, nazywa się współczynnikiem czystości danego zacieru. Np. jeżeli cukromierz wskazuje 10° Bal., to przyjmując współczynnik czystości 85%, należy przyjąć, że w każdym 100 kg (funt) badanego zacieru jest 18 kg (funt) ekstraktu i z tego ekstraktu tylko 85%, t. j. 16.3 kg (funt) jako cukier, może sfermentować, reszta zaś 1.7 kg (funt) stanowią ciała niezdolne do fermentacji. Uwzględniając współczynnik czystości zacierów, możemy naprzód obliczyć możliwy wydatek alkoholu, mając jako dane podanie cukromierza i ilość zacieru.

b) Oznaczenie zczukrzenia. Zczukrzenie bada się za pomocą wodnego roztworu jodu. Zacier przesączony i schłodzony bierze się do probówki szklanej, dolewa kroplami jodu i obserwuje występujące zabarwienie. Następnie dolewa tyle mniej więcej jodu, ile wzięto zacieru, rozcieńcza wodą i po chwili bada zabarwienie. Kolor niebieski, fioletowy, czerwono-brunatny, wskazuje na niedostateczne zczukrzenie.

c) Oznaczenie kwasowości skuteczniejsza się za pomocą normalnego ługu żrącego. Do 20 cm³ przesączonego zacieru, lub przycierku drożdżowego, mieszanego przecikiem szklanym, dopuszcza się z biurety kwasomierza kroplami ługu normalnego tak długo, aż kropla badanego płynu nie będzie wywoływać zmiany barwy na papierku lokmusowym. Ilość kubików ługu zużytych do zupełnego zobojętnienia badanej cieczy podaje bezpośrednio stopień kwasowości.

Kwasowość zacieru słodkiego waha w granicach 0, 2—0, 8°; zacier dojrzały, odfermentowany, powinien wykazać przyrost, nie przekraczający przy bakterjach kwasu mlekowego 0, 4, przy kwasie siarczynowym 0.3. Kwasowość dochodząca do 0.5 wskazuje na zakażenie i nie czystą robotę, tem samym wpływa na gorsze odfermentowanie i wydatki. Im przyrost kwasu jest

mniej, tem wydatki są lepsze. Z ilości przyrostu kwasu poznaje się zatem dobroć roboty, a przeto kwasowość powinna być oznaczona codziennie i to tak w zacierze słodkim, jak odfermentowanym, jakoteż w przycierkach.

c) Oznaczenie alkoholu w odfermentowanym zacierze. 100 cm³ przedzalonego zacieru miesza się ze 100 cm³ wody, wlewa do kolbki na $\frac{1}{2}$ l. łączy kolbkę z chłodnicą, oddestylowuje dokładnie 100 cm³ i w nich przy pomocy małego dokładnego alkoholometru oznacza zawartość alkoholu.

11) Obliczanie wydatku alkoholu. Według teorii z 1 kg. skrobi powinno się otrzymać 71.61 l. $\frac{0}{0}$ = 716.1 cm³ alkoholu, z 1 funt. skrobi 2, 382⁰ wiadrowego. W praktyce otrzymuje się z 1 kg. skrobi: przy znośnej robocie 56 $\frac{0}{0}$ (= 78 $\frac{0}{0}$ wydatku teoretycznego), przy dobrej 58 $\frac{0}{0}$ (81 $\frac{0}{0}$), przy doskonałej 60 l. $\frac{0}{0}$ (84 $\frac{0}{0}$), 2.100⁰ w. z funta; w wyjątkowych wypadkach 62 l. $\frac{0}{0}$ alkoholu (86 $\frac{0}{0}$). Wydatek oblicza się w stosunku do ilości zartartej skrobi, do czego niezbędnym jest codzienne oznaczanie skrobi w zacieranym surowym produkcie. Np. zartarto 2000 kg. ziemniaków o zawartości 18 $\frac{0}{0}$ skrobi tj. 360 kg. skrobi i 80 kg. siodu (o przeciętnej zawartości 35 $\frac{0}{0}$ skrobi) tj. 28 kg. skrobi, razem 388 kg. skrobi; otrzymano 23280 l. $\frac{0}{0}$ absolutnego alkoholu, wydatek zatem wynosi $\frac{23280}{388} = 60$ l. $\frac{0}{0}$ z 1 kg. skrobi. Wydatek

alkoholu można też obliczać z ilości odfermentowanych stopni saccharometrycznych, jak to uwidacznia następujący przykład: początkowa zawartość cukru = 18.5⁰ B., po odfermentowaniu w przesączonym zacierze = 1.5⁰ B., ilość odfermentowanych stopni zatem = 17.0⁰ B. Według niżej podanego zestawienia (Tabl. I.) od-

I. TABLICA.

100 L. przesączonego zacieru zawierają:		100 L. przesączonego zacieru zawierają:	
Przy sfermentowanych stopniach Bal.	Litrów 100 $\frac{0}{0}$ alkoholu	Przy sfermentowanych stopniach Bal.	Litrów 100 $\frac{0}{0}$ alkoholu
20	10,96	14,5	7,74
19,5	10,65	14	7,45
19	10,35	13,5	7,17
18,5	10,06	13	6,89
18	9,77	12,5	6,60
17,5	9,47	12	6,32
17	9,18	11,5	6,05
16,5	8,88	11	5,78
16	8,59	10,5	5,50
15,5	8,31	10	5,22
15	8,03		

fermentowaniu 17.0⁰ B. odpowiada zawartość 9 18 $\frac{0}{0}$ alkoholu. Jeżeli mamy 2400 l. zacieru, to przedewszystkiem od tej objętości należy odciągnąć objętość łupin (2 $\frac{0}{0}$ dla wysokoprocentowych ziemniaków lub kukurudzy o cienkiej łusce, 3 $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{0}$ dla średnio-procentowych ziemniaków lub kukurudzy o grubej łusce i 5 $\frac{0}{0}$

dla niskoprocentowych ziemniaków, jęczmienia itp.); odejmijmy np. $3\frac{1}{2} : 2400 - 84 = 2316$ l. $2316 \times 9 \cdot 18 = 21260$ l. $\%$ alkoholu.

II. TABLICA.

Przy podaniu cukromierza	W 100 L. przecedzonego zacieru znajduje się skrobi kilogramów:		
	Współczynnik czystości 90 $\%$	Współczynnik czystości 85 $\%$	Współczynnik czystości 80 $\%$
22	19,46	18,38	17,30
21	18,51	17,48	16,45
20	17,54	16,57	15,59
19	16,61	15,68	14,76
18	15,65	14,78	13,91
17	14,72	13,90	13,08
16	13,81	13,05	12,28
15	12,90	12,18	11,46
14	11,99	11,32	10,66
13	11,09	10,47	9,86
12	10,19	9,62	9,06

Przykład: Mamy 2400 L. zacieru na 18 $^{\circ}$ Bal. Jaki może być z tego wydatek alkoholu?

Odliczywszy 3,5 $\%$ na lupiny, otrzymamy $2400 - 84 = 2316$ L. zacieru.

Przy 18 $^{\circ}$ Bal. i współczynniki czystości 85 $\%$ w 100 litrach przecedzonego zacieru znajduje się 14,78 kg. skrobi, a więc

$$\frac{14,78 \cdot 2316}{100} = 342,9 \text{ kg.}$$

zatartej skrobi. Jeżeli spodziewamy się otrzymać 60 litrostopni z 1 kg. skrobi, to $342,360 = 20538$ litrostopni, jeżeli 58 litrostopni to $342,358 = 19853$ litrostopni.

III. TABLICA

oczekiwanych wydatków z produktów surowych.

100 kilogramów		daje z 1 kg. skrobi przy wydatku		
		60 L ⁰ / ₀ *	58 L ⁰ / ₀ *	56 L ⁰ / ₀ *
		L %	L %	L %
Ziemniaków o 15 ⁰ / ₀ skrobi		900	887	840
„ 18 ⁰ / ₀ „		1080	1044	1008
„ 20 ⁰ / ₀ „		1200	1160	1120
„ 22 ⁰ / ₀ „		1320	1276	1232
„ 24 ⁰ / ₀ „		1440	1392	1344
Słodu jęczmiennego:				
krótkiego 40 ⁰ / ₀ „		2400	2320	2240
długiego 35 ⁰ / ₀ „		2100	2030	1960
Kukurudzy 60 ⁰ / ₀ „		3600	3480	3360
„ 55 ⁰ / ₀ „		3300	3190	3080
Żyta 56 ⁰ / ₀ „		3360	3248	3136
„ 50 ⁰ / ₀ „		3000	2900	2800

*) 1 L⁰/₀ = 10 cm³, czyli 1/100 litra absolutnego alkoholu.

IV. TABELA PORÓWNAWCZA

skali cukromierza Ballinga w zestawieniu z ciężarem właściwym płynu przy 14° R.

° Ballinga	Ciężar właściwy	° Ballinga	Ciężar właściwy	° Ballinga	Ciężar właściwy	° Ballinga	Ciężar właściwy
0,0	1.000	6,2	1.025	12,2	1.050	18,2	1.075
0,2	1.001	6,4	1.026	12,4	1.051	18,4	1.076
0,4	1.002	6,6	1.026	12,6	1.051	18,6	1.077
0,6	1.002	6,8	1.027	12,8	1.052	18,8	1.078
0,8	1.003	7,0	1.028	13,0	1.053	19,0	1.079
1,0	1.004	7,2	1.029	13,2	1.054	19,2	1.080
1,2	1.005	7,4	1.030	13,4	1.055	19,4	1.081
1,4	1.006	7,6	1.031	13,6	1.056	19,6	1.081
1,6	1.006	7,8	1.031	13,8	1.056	19,8	1.082
1,8	1.007	8,0	1.032	14,0	1.057	20,0	1.083
2,0	1.008	8,2	1.033	14,2	1.058	20,2	1.084
2,2	1.009	8,4	1.034	14,4	1.059	20,4	1.085
2,4	1.010	8,6	1.035	14,6	1.060	20,6	1.086
2,6	1.010	8,8	1.036	14,8	1.061	20,8	1.087
2,8	1.011	9,0	1.036	15,0	1.061	21,0	1.088
3,0	1.012	9,2	1.037	15,2	1.062	21,2	1.089
3,2	1.013	9,4	1.038	15,4	1.063	21,4	1.090
3,4	1.014	9,6	1.039	15,6	1.064	21,6	1.090
3,6	1.014	9,8	1.040	15,8	1.065	21,8	1.091
3,8	1.015	10,0	1.040	16,0	1.066	22,0	1.092
4,0	1.016	10,2	1.041	16,2	1.067	22,2	1.093
4,2	1.017	10,4	1.042	16,4	1.067	22,4	1.094
4,4	1.018	10,6	1.043	16,6	1.068	22,6	1.095
4,6	1.018	10,8	1.044	16,8	1.069	22,8	1.096
4,8	1.019	11,0	1.045	17,0	1.070	23,0	1.097
5,0	1.020	11,2	1.046	17,2	1.071	23,2	1.098
5,2	1.021	11,4	1.046	17,4	1.072	23,4	1.099
5,4	1.022	11,6	1.047	17,6	1.073	23,6	1.100
5,6	1.022	11,8	1.048	17,8	1.074	23,8	1.100
5,8	1.023	12,0	1.049	18,0	1.074	24,0	1.101
6,0	1.024						

V. Tabela do dokładnego obliczenia procentów spirytusu.

Ciepłota podług Reaumur.		Alkoholometr wskazuje procentów:																								
		71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
		77.5	78.5	79.5	80.5	81.5	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.0	94.0	95.0	95.5	96.5	97.5	98.0	99.0
	— 5	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.0	94.0	95.0	95.5	96.5	97.5	98.0	99.0
	4	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.0	94.0	95.0	95.5	96.5	97.5	98.0	99.0
	3	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.0	94.0	95.0	95.5	96.5	97.5	98.0	99.0
	2	76.5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.0	94.0	95.0	95.5	96.5	97.5	98.5
	1	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.0	94.0	95.0	95.5	96.5	97.5	98.5
	0	75.8	76.7	77.7	78.6	79.6	80.5	81.5	82.4	83.4	84.3	85.3	86.3	87.2	88.1	89.0	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	95.5	96.5	97.5	98.5
	+ 1	75.4	76.4	77.3	78.3	79.2	80.2	81.1	82.1	83.1	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	95.5	96.5	97.5	98.8
	2	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	95.5	96.5	97.5	98.8
	3	74.7	75.6	76.6	77.5	78.5	79.5	80.4	81.4	82.4	83.3	84.3	85.3	86.2	87.2	88.1	89.1	90.1	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	95.5	96.5	97.8
	4	74.3	75.2	76.2	77.2	78.2	79.1	80.1	81.1	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	95.5	96.5	97.8
	5	73.9	74.9	75.8	76.8	77.8	78.7	79.7	80.7	81.7	82.7	83.6	84.6	85.6	86.5	87.5	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.5	94.5	95.5	96.5	97.8
	6	73.5	74.5	75.5	76.4	77.4	78.4	79.4	80.4	81.3	82.3	83.3	84.3	85.2	86.2	87.2	88.1	89.1	90.1	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	95.5	96.7
	7	73.1	74.1	75.1	76.1	77.1	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	95.5	96.7
	8	72.8	73.7	74.7	75.7	76.7	77.7	78.6	79.6	80.6	81.6	82.6	83.6	84.6	85.5	86.5	87.5	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.5	94.5	95.5	96.8
	9	72.4	73.4	74.4	75.4	76.4	77.4	78.3	79.3	80.3	81.3	82.3	83.3	84.3	85.2	86.2	87.2	88.1	89.1	90.1	91.1	92.0	93.0	94.0	95.0	96.9
	10	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	96.6
	11	71.6	72.6	73.6	74.6	75.6	76.5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5	82.5	83.5	84.5	85.5	86.5	87.5	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.5	94.5	96.4
	12	71.2	72.2	73.2	74.2	75.2	76.2	77.2	78.2	79.2	80.2	81.2	82.2	83.2	84.2	85.2	86.1	87.1	88.1	89.1	90.1	91.1	92.1	93.1	94.1	95.4
	13	70.8	71.8	72.8	73.8	74.8	75.8	76.8	77.8	78.8	79.8	80.8	81.8	82.8	83.8	84.8	85.8	86.8	87.8	88.8	89.8	90.8	91.8	92.8	93.8	94.8
	14	70.4	71.4	72.4	73.4	74.4	75.4	76.4	77.4	78.4	79.4	80.4	81.4	82.4	83.4	84.4	85.4	86.4	87.5	88.5	89.5	90.5	91.5	92.5	93.5	94.6
	15	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.1	81.1	82.1	83.1	84.1	85.1	86.1	87.1	88.2	89.2	90.2	91.2	92.2	93.2	94.3
	16	69.6	70.6	71.6	72.6	73.6	74.6	75.6	76.6	77.7	78.7	79.7	80.7	81.7	82.7	83.7	84.8	85.8	86.8	87.8	88.8	89.9	90.9	91.9	93.0	94.0
	17	69.2	70.2	71.2	72.2	73.2	74.2	75.2	76.3	77.3	78.3	79.3	80.3	81.3	82.4	83.4	84.4	85.4	86.4	87.5	88.5	89.5	90.6	91.6	92.7	93.7
	18	68.7	69.8	70.8	71.8	72.8	73.8	74.9	75.9	76.9	78.0	79.0	80.0	81.0	82.0	83.0	84.1	85.1	86.1	87.1	88.2	89.2	90.3	91.3	92.4	93.4
	19	68.3	69.3	70.4	71.4	72.4	73.4	74.5	75.5	76.5	77.5	78.6	79.6	80.6	81.6	82.7	83.7	84.7	85.8	86.8	87.8	88.9	89.9	91.0	92.1	93.1
	20	67.9	68.9	70.0	71.0	72.0	73.1	74.1	75.1	76.1	77.1	78.2	79.2	80.2	81.3	82.3	83.4	84.4	85.4	86.4	87.5	88.5	89.6	90.7	91.7	92.8

Rzezywista siła w procentach

VI. Tabela do oblicz. zawartości czystego alkoholu (litrop.) podług nettowagi i wykazanej rzec. siły okowity

W kg.	69 ⁰ / ₀	69.5 ⁰ / ₀	70 ⁰ / ₀	70.5 ⁰ / ₀	71 ⁰ / ₀	71.5 ⁰ / ₀	72 ⁰ / ₀	72.5 ⁰ / ₀
0.5	38.73	39.07	39.40	39.74	40.08	40.42	40.76	41.10
1	77.47	78.14	78.81	79.48	80.16	80.84	81.52	82.20
2	154.94	156.28	157.62	158.96	160.32	161.68	163.04	164.40
3	232.11	234.42	236.43	238.44	240.48	242.52	244.56	246.60
4	309.88	312.56	315.24	317.92	320.64	323.36	326.08	328.80
5	387.35	390.70	394.05	397.40	400.80	404.20	407.60	411.00
6	464.82	468.84	472.86	476.88	480.96	485.04	489.12	493.20
7	542.29	546.98	551.67	556.36	561.12	565.88	570.64	575.40
8	619.76	625.12	630.48	635.84	641.28	646.72	652.16	657.60
9	697.23	703.26	709.29	715.32	721.44	727.56	733.68	739.80
W kg.	73 ⁰ / ₀	73.5 ⁰ / ₀	74 ⁰ / ₀	74.5 ⁰ / ₀	75 ⁰ / ₀	75.5 ⁰ / ₀	76 ⁰ / ₀	76.5 ⁰ / ₀
0.5	41.44	41.79	42.13	42.48	42.83	43.18	43.53	43.88
1	82.89	83.58	84.27	84.97	85.66	86.36	87.07	87.77
2	165.78	167.16	168.54	169.94	171.32	172.72	174.14	175.54
3	248.67	250.74	252.81	254.91	256.98	259.08	261.21	263.31
4	331.56	334.32	337.08	339.88	342.64	345.44	348.28	351.08
5	414.45	417.90	421.35	424.85	428.30	431.80	435.35	438.85
6	497.34	501.48	505.62	509.82	513.96	518.16	522.42	526.64
7	580.23	585.06	589.89	594.79	599.62	604.52	609.49	614.39
8	663.12	668.64	674.16	679.76	685.28	690.88	696.56	702.16
9	746.01	752.22	758.43	764.73	770.94	777.24	783.63	789.93
W kg.	77 ⁰ / ₀	77.5 ⁰ / ₀	78 ⁰ / ₀	78.5 ⁰ / ₀	79 ⁰ / ₀	79.5 ⁰ / ₀	80 ⁰ / ₀	80.5 ⁰ / ₀
0.5	44.24	44.59	44.95	45.31	45.67	46.03	46.40	46.76
1	88.48	89.19	89.91	90.63	91.35	92.07	92.80	93.53
2	176.96	178.38	179.82	181.26	182.70	184.14	185.60	187.06
3	265.44	267.57	269.73	271.89	274.05	276.21	278.40	280.59
4	353.92	356.76	359.64	362.52	365.40	368.28	371.20	374.12
5	442.40	445.95	449.55	453.15	456.75	460.35	464.00	467.65
6	530.88	535.14	539.46	543.78	548.10	552.42	556.80	561.18
7	619.36	624.33	629.37	634.41	639.45	644.49	649.60	654.71
8	707.84	713.52	719.28	725.04	730.80	736.56	742.40	748.24
9	796.32	802.71	809.19	815.67	822.15	828.63	835.20	841.77
W kg.	81 ⁰ / ₀	81.5 ⁰ / ₀	82 ⁰ / ₀	82.5 ⁰ / ₀	83 ⁰ / ₀	83.5 ⁰ / ₀	84 ⁰ / ₀	84.5 ⁰ / ₀
0.5	47.13	47.50	47.87	48.24	48.61	48.99	49.37	49.75
1	94.26	95.00	95.74	96.49	97.23	97.99	98.74	99.50
2	188.52	190.00	191.48	192.98	194.46	195.98	197.48	199.00
3	282.78	285.00	287.22	289.47	291.69	293.97	296.22	298.50
4	377.04	380.00	382.96	385.96	388.92	391.96	394.96	398.00
5	471.30	475.00	478.70	482.45	486.15	489.95	493.70	497.50
6	565.56	570.00	574.44	578.94	583.38	587.94	592.44	597.00
7	659.82	665.00	670.18	675.43	680.61	685.93	691.18	696.50
8	754.08	760.00	765.92	771.92	777.84	783.92	789.92	796.00
9	848.34	855.00	861.66	868.41	875.07	881.91	888.68	895.80

VI. Tabela do oblicz. zawartości czystego alkoholu (litrop.) podług nettowagi i wykazan. rzecz. siły okowity.

W kg.	85 ^o / _o	85.5 ^o / _o	86 ^o / _o	86.5 ^o / _o	87 ^o / _o	87.5 ^o / _o	88 ^o / _o	88.5 ^o / _o
0.5	50.13	50.51	50.90	51.29	51.68	52.07	52.47	52.86
1	100.26	101.03	101.81	102.58	103.36	104.15	104.94	105.73
2	200.52	202.06	203.62	205.16	206.72	208.30	209.88	211.46
3	300.78	303.09	305.43	307.74	310.08	312.45	314.82	317.19
4	401.04	404.12	407.24	410.32	413.44	416.60	419.76	422.92
5	501.30	505.15	509.05	512.90	516.80	520.75	524.70	528.65
6	601.56	606.18	610.86	615.48	620.16	624.90	629.64	634.38
7	701.82	707.21	712.67	718.06	723.52	729.05	734.58	740.11
8	802.08	808.24	814.48	820.64	826.88	833.20	839.52	845.84
9	902.34	909.27	916.20	923.22	930.24	937.35	944.46	951.57

W kg.	89 ^o / _o	89.5 ^o / _o	90 ^o / _o	90.5 ^o / _o	91 ^o / _o	91.5 ^o / _o	92 ^o / _o	92.5 ^o / _o
0.5	53.26	53.67	54.07	54.48	54.90	55.31	55.73	56.15
1	106.53	107.34	108.15	108.97	109.80	110.63	111.46	112.31
2	213.06	214.68	216.30	217.94	219.60	221.26	222.92	224.62
3	319.59	322.02	324.45	326.91	329.40	331.89	334.38	336.93
4	426.12	429.36	432.60	435.88	439.20	442.52	445.84	449.21
5	532.65	536.70	540.75	544.85	549.00	553.15	557.30	561.55
6	639.18	644.04	648.90	653.82	658.80	663.78	668.76	673.86
7	745.71	751.38	757.05	762.79	768.60	774.41	780.22	786.17
8	852.24	858.72	865.20	871.76	878.40	885.04	891.68	898.48
9	958.77	966.06	973.35	980.73	988.20	995.67	1003.14	1010.79

W kg.	93 ^o / _o	93.5 ^o / _o	94 ^o / _o	94.5 ^o / _o	95 ^o / _o	95.5 ^o / _o	96 ^o / _o	96.5 ^o / _o
0.5	56.58	57.01	57.44	57.88	58.33	58.78	59.23	59.69
1	113.16	114.02	114.89	115.77	116.66	117.56	118.47	119.39
2	226.32	228.04	229.78	231.54	233.32	235.12	236.94	238.78
3	339.48	342.06	344.67	347.31	349.98	352.68	355.41	358.17
4	452.64	456.08	459.56	463.08	466.64	470.24	473.88	477.56
5	565.80	570.10	574.45	578.85	583.30	587.80	592.35	596.95
6	678.96	684.12	689.34	694.62	699.96	705.36	710.82	716.34
7	792.12	798.14	804.23	810.39	816.62	822.92	829.29	835.73
8	905.28	912.16	919.12	926.16	933.28	940.48	947.76	955.12
9	1018.44	1026.18	1034.01	1041.93	1049.94	1058.04	1066.23	1074.61

W kg.	97 ^o / _o	97.5 ^o / _o	98 ^o / _o	98.5 ^o / _o	99 ^o / _o	99.5 ^o / _o
0.5	60.16	60.63	61.11	61.60	62.10	62.60
1	120.32	121.27	122.03	123.21	124.20	125.21
2	240.64	242.54	244.46	246.42	248.40	250.42
3	360.96	363.81	366.69	369.63	372.60	375.63
4	481.28	485.08	488.92	492.84	496.80	500.84
5	601.60	606.35	611.15	616.05	621.00	626.05
6	721.92	727.62	733.38	739.26	745.20	751.26
7	842.24	848.89	855.61	862.47	869.40	876.47
8	962.56	970.16	977.84	985.68	993.60	1001.68
9	1082.88	1091.43	1100.07	1108.89	1117.80	1126.89

Sposób obliczenia
podany na str. 151.

KONTROLA RUCHU W GORZELNI.

I. Słodownia:

Ma być czysta, jasna, bez śladów pleśni na ścianach lub słodzie. Grzędy słołu równo ułożone, o ciepłocie nie przenoszącej $12^{\circ} R = 15^{\circ} C$. Celem kontrolowania ciepłoty powinien się znajdować w każdej grzędzie w conajmniej jeden ciepłomierz. Słód powinien być długo prowadzony t. j. najmniej 16 dni, mimo to nie powinien wykazywać ziarn spleśniałych.

II. Kotłownia.

Materyał opalowy jest jednym z najpoważniejszych wydatków gorzelni, stąd też umiejętne i oszczędne palenie będzie wywierać korzystny wpływ na prowadzenie gorzelni. Sprawa ta jest tem ważniejszą, im materyał opalowy droższy. Należy przeto zwrócić szczególniejszą uwagę na sposób palenia.

Ruszt ma być dobrze i równo obłożony węglem. Przy otwieraniu drzwiczek paleniska, należy spuścić zasuwę kominową, aby świeże, zimne powietrze nie miało bezpośredniego dostępu. Należy zbadać, ile węgla zostaje dziennie spalone w stosunku do dnia kontrolnego. W końcu należy zwrócić uwagę, w jaki sposób jest kocioł zasilany (nie zinną wodą), i jaki stan wody i ciśnienia.

Drzwi od podworca, jakoteż i łączące z gorzelnią mają być stale przamykane.

III. Magazyn ziemniaczany i parzenie.

Ziemniaki mają być dobrze obmywane, gdyż zle mycie pociąga za sobą silne zużycie aparatów i przeszkadza fermentowaniu. Ilość zacieranych ziemniaków, względnie zboża ma być dokładnie znaną, również często powinna być kontrolowaną procentowa zawartość skrobi. Znając dokładnie ilość wagową i %-wą zawartość skrobi zacieranych materyałów, można obliczyć wydatki, a temsamem zdać sobie sprawę z korzyści pędzenia gorzelni.

Parzenie powinno być tak prowadzone, by próbka ugotowanego materyału skrobiowego przy rozcieraniu w palcach, nie dawała odczuwać grudek nierozgotowanego materyału. Ciśnienie przy ziemniakach nie ma być wyższe jak 3 atmosfery, przy zbożu 4 atm., a nie niższe w pierwszym wypadku jak 2 atm., w drugim $3\frac{1}{2}$ atm.

IV. Zacieranie.

Słód rozarty 2—3 razy na gniotowniku, należy dodać do zacierni zaraz z początku i zarobić z wodą na gęstą braję. Ilość jego wynosi na każde 100 kg. (pudów) zacieranej skrobi 20—25 kg. (pudów), czyli 2.5—3.5 kg. na 100 litrów zacieru względnie 6—10 na 10 wiader.

Wyciskanie z parnika ugotowanej masy ziemniaczanej ma się odbywać wolno i ostrożnie, aby słołu nie sparzyć. Temperatura zacierania powinna wynosić $55-57^{\circ} C$, = $44-46^{\circ} R$ zaś pod koniec zacierania należy ją podnieść na $48-51^{\circ} R$ = $60-63^{\circ} C$. Zacier zczukrzony nie powinien wykazywać reakcyi jodowej, smak powinien być słodki, przyjemny, barwa jasna, kwasowość około 0.4. Gęstość 18—20° B.

RAPORT DZIENNY

z dnia

I. Kontrola

ZUŻYTE MATERIAŁ SUROWY						
Numer kadzi	dano do parnika			zużyto na stół		Razem zużyto skrobi kg.
	produkt		Ilość	zboża twardego kilogramów	o zawartości skrobi %	
	gatunku	jakości				

II. Kontrola

PRZYGOTOWYWANIE ZACIERU													
parzono		zaoierano		dodano sładzu		zaoier sładki							
godzin i minut	przy ciśnieniu	godzin i minut	przy temperaturze °C	kg.	o jakości	ilość hektolitrów	zawartość stopni				spuszczono		
							cukru na cukro- mierzu	kwasu na kwa- somier.	chłodzona	gonzin i minut	przy temp.	do kadzi Nr	

Uwagi: 1) Rubryki raportu mają być wypełnione w miarę postępu roboty i raport codziennie po ukończeniu pracy dziennej doręczany administracji lub właścicielowi.
2) Rubrykę wydatku wypełnia administracja według raportu odnośnej kadzi.

GORZELNICZY Nr.

wydatku.

REZULTAT ODPEŁDU							Z 1 kg. skrobi otrzymano alkoholu %/o	Zużyto paliwa
odpe- dzono kadź Nr.	otrzymano alkoholu					litrów		
	Wskaźówka zegara po odpędzie	przy tempe- raturze °C	o sile stopni	tj. 100 Tr. litrów				

ruchu.

DROŹDŹE				ZACIER DOJRZAŁY							
Zawartość stopni na cukromierzu		Ilość i jakość ekstraktu lub słoðu	Zawartość stopni w go- towym przycierku		W kadzi Nr.	Ilość dolanej wody hektolitrów	Stopień odferment. (cukromierz)	Kwasowość stopni na kwasomierzu	Temperatura przed odpeędem	Fermentował godz.	UWAGI
przy od- biorze matki	przy łą- czeniu z zacier.		na kwaso- mierzu nn- ukwasz.	na cukro- mierzu							

Podpis prowadzącego gorzelnię:

Wzór układu Tadeusza Chruszcza, kierownika szkoły go-
rzelniczej w Dublinach.

Nakładem Biura rachunkowo-rolniczego K. Turskiego we
Lwowie.

V. Drożdżownia.

Drożdżownia, jakoteż i wszystkie znajdujące się tam aparaty i przyrządy, powinny się oznaczać szczególniejszą czystością.

Przycierek przyrządza się z zacieru, uwolnionego przez cedzenie od grubych lup, z dodatkiem 10—20 kg. ($\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ pud.) słodu na każdy 1 hl (10 wiader) przycierku. Przycierek słodki nie powinien wykazywać reakcyi jodowej. W razie prowadzenia na kwasie mlekowym — kwaszenie powinno się odbywać za pośrednictwem czystych bakteryi kwasu mlekowego i to w ciepłocie 50—55° C = 40—44° R. Przycierek dojrzaly powinien wykazywać 1.5—2.6^o, średnia 1.8 kwasu. Smak czysto kwaśny.

Przycierek zadany drożdżami powinien odfermentować najmniej $\frac{2}{3}$ najwyżej $\frac{4}{5}$ znajdującego się w nim cukru, poczem odbiera się t. z. matkę drożdżową, która ma być natychmiast zadana do nowego już przygotowanego przycierku. Należy uważać, aby w przyrządzaniu drożdży nie było żadnych przerw, t. zw. martwych punktów.

VI. Izba fermentacyjna.

Podobnież i tu powinna panować czystość bez zarzutu. Kadzie powinny być często wapnione i szczotką szorowane. Najwyższa ciepłota fermentacyi nie przekraczająca 30° C. = 24° R.

Zacier dojrzaly powinien wykazywać odfermentowanie 0.5—1.5° B, przy zbożu 0—0.5° B. Kwasowość powinna się tylko nie wiele podnieść, o jakie 0.1—0.4° K.

VII. Aparat odpędowy.

Alkohol powinien płynąć równym strumieniem i wykazywać jednakową gęstość i ciepłotę.

Wywar ma być wolny od alkoholu.

Aparat powinien być ogrzewany parą zwrotną.

VIII. Maszyna parowa.

Maszyna powinna być czysta, ma lekko i spokojnie chodzić i być dobrze naoliwioną. Pary zwrotnej należy użyć do gotowania zacieru w aparacie odpędowym i ogrzewania drożdżowni. Należy zwrócić uwagę, czy wszystkie panewki i łożyska są dobrze nasmarowane i czy kurki (upustowe i bezpieczeństwa) są czyste i dobrze funkcyonują.

IX. Wydajność.

Przy obliczaniu wydatków alkoholu ze zużytego materiału należy przedewszystkiem skontrolować, czy ilość materiałów podawana w zapiskach, względnie %-owa zawartość skrobi odpowiada rzeczywistości.

Przy liczeniu słodu należy pamiętać, że $1\frac{1}{2}$ kg. (puda) słodu powstało z 1 kg. (puda) jęczmienia, a jego zawartość skrobiową oblicza się w ten sposób, że z wartości skrobiowej jęczmienia 60% strąca się przy sładzie

	7 dniowym	10%
	10	12%
	16	15%
	wyżej 20	20%

Zatem jęczmień, zależnie od czasu prowadzenia słodu, oblicza się, jak gdyby zawierał 50—35% skrobi i tę wartość stawia się w rachunek.

Ponieważ codzienna kontrola jako krótkotrwała ma tylko szybko oryentować o sposobie prowadzenia gorzelnii, nie ma i nie może mieć pretensyi do zupełnej dokładności, przeto każdego roku, przynajmniej raz jeden, należy przeprowadzić osobiście zupełnie dokładne i szczegółowe badania, połączone z własnoręcznym ważeniem i mierzeniem. Dopiero w ten sposób przeprowadzona kontrola da prawdziwy obraz stanu gorzelnii i robót w niej wykonanych.

Ogólnie jednak można powiedzieć, że gorzelnia, która jest czysta, gdzie na każdym kroku widzi się dbałość i czystość, z pewnością jest dobrze prowadzona i ma dobre wydatki.

Maszyny i narzędzia rolnicze

ustawił prof. K. Ajdukiewicz.

Rodzaj maszyny, lub narzędzia	Robo- cza sze- rokość	Dzienna (10 godz.) dzielność	Potrzeba do ruchu		Cena
	cm.	ha.	robot.	koni	koron
Plug 1-skib. (15 cm głębokości orki)	22	0.45—0.55	1	2	56—89
Plug 1-skib. (20 cm głębokości orki)	30	0.4—0.5	1	2	60—92
Plug 2-skib. (18 cm głębokości orki)	50	0.8—1.0	1—2	3—4	110—160
Plug 3-skibowy	60	1.1—1.5	2	4	140—250
Brona lekka (3—5 cm zagłębienia)	200	4.0—5.0	1	1	50—80
Brona średnio ciężka (4 do 8 cm zagłębienia)	200	3.5—4.0	1	2	60—100
Brona ciężka (8—15 cm zagłębienia)	150	1.7—2.3	1	2	90—120
Walec gładki	200	4.0—5.0	1	2	100—250
» pierścien. pojed.	200	4.0—5.0	1	2	150—200
» » podwój.	200	5.0—6.0	1	4	200—350
» Croskilla	200	3.0—3.5	1	4	300—450
Siewnik rzutowy	250—350	7.0—10.0	1—2	1	280—350
» rzęd., lub kupk.	125—200	3.0—5.0	2—3	2	480—550
» » »	200—350	5.0—10.0	3	3—4	550—650
» do nawozów	200—400	5.0—11.0	1—3	2—3	350—500
Plewnik rzędowy	150—300	3.5—8.0	2—3	1—3	100—350
Kosiarka	120—150	3.0—5.0	1—2	2—4	450—550
Żniwiarka	130—180	4.0—6.0	1—2	2—4	650—720
» wiązalka	130—160	3.0—5.0	1—2	4	1100—1250
Grabarka	200—300	5.0—9.0	1	1	150—200
Przetrzęsacz do siana	130—220	5.5—7.0	1	1—2	320—450
Masz. do kopania ziemn.	1-rzęd.	0.8—1.2	2	3—4	270—350
» » » burak.	2-rzęd.	1.2—2.0	2	4	280—350

Rodzaj maszyny, lub narzędzia	Robo- cza sze- rokość	Dzienna (10 godz.) dzielność	Potrzeba do ruchu		Cena
	cm.	centn.metr.	robot	koni	Koron
Prasa do siana i słomy ręczna	—	Centn. metr.			
Prasa do siana i słomy masz.	—	40—50	5	—	500—600
Młocarnia ręczna	40—50	150—300	3—4	4—8HP*	2000—2500
» kier. palcowa	45—60	6.0—13.0	7—8	—	100—200
» » cepowa	75—175	20.0—40.0	10—12	2—4	150—600
» parowa »	100—170	25.0—65.0	10—15	4—6	350—2000
Trieur pojedynczy	—	70.0—170.0	16—25	8—18HP	2400—5000
» podwójny	—	8.0—50.0	2—3	—	—
Młynek (wiałnia z sitami)	40—70	7.0—45.0	2—4	—	—
Masz. do krajania burak.	—	80.0—160.0	2—3	—	—
Sieczkarnia ręczna	20—30	50.0—150.0	2—3	—	40—250
» kieratowa	30—40	5.0—10.0	3—4	—	67—157
Sieczkarnia motorowa	35—40	30.0—70.0	1—2	2—4	180—500
Gniotownik ręczny	8—10	200.0—250.0	2	8—10HP	250—700
» » kieratowy	8—15	3.0—5.0	2—3	—	100—200
Śrótownik wałc. ręczny	10—25	13.0—50.0	1	1—2	200—450
» » kieratowy	30—40	4.0—10.0	2—3	—	110—280
Śrótownik tarczowy kier.	średnica 15—25	20.0—50.0	1	2—3	250—600
» » motor.	25—40	5.0—25.0	1	2—4	150—420
		20.0—50.0	1	2—5HP	300—600

Kieraty:

Ilość przyprzeg. koni: . . .	1—2,	2—3,	4,	6,
Przenosi na masz. roboczą .	$\frac{1}{2}$ —1,	1—1.5,	2,	3,
Cena kieratu w koronach .	300—500,	500—600,	600—1000	1200

Lokomobile parowe:

Dzielność nomin.	HP 5,	7,	8,	10,	12
» rzeczywista	HP 10,	14,	16,	19,	22
Cena w koronach	5900,	7000,	8070,	9500,	10600

Motorv wybuchowe:

Dzielność nomin.	HP = 3,	4,	6,	8,	10,	12
» rzeczyw.	HP = 3.5.	5,	6.7,	9.5,	11,	13
Cena w koronach	2200,	2800	3700	4500	5300	5700
		do	do	do	do	do
		4600	5500,	6000,	7600,	8900

Wiatraki:

Średnica w metr.	3.8,	4.75,	5.25,	5.80,	6.30,	7.11,	7.8,	8.2
Dzieln. w HP przy 6 m pręd. wiatru	0.86,	1.45,	1.80,	2.07,	2.40,	3.11,	3.7,	4.8
Cena w kor. wiatr.	800,	1200,	1400,	2000,	2400,	2600,	3200,	3600
Cena wieży 10 m wys.	550,	580,	640,	720,	780,	840,	1100,	1200

Taran hydrauliczny:

Dla ilości wody w ltr. na minutę.	3—7,	6—15,	11—26,	22—53,	45—94
Cena w koronach	45,	52,	75,	90,	170

*) HP = Koń parowy = 76 klgr mtr. $\approx 1\frac{1}{2}$ konia formal.

Budynki gospodarcze.

Zestawił prof. K. Ajdukiewicz.

a) Dla koni.

I. Stajnie.

Stanowisko: dla koni ras szlachejnych, ogierów i t. p.: ustawionych w klatkach 3.3—3.5 dl., 1.9—2.3 szer.

Dla koni wyjazdowych, oddzielonych przeworami 3.0—3.3 dl., 1.6—2.0 sz.; dla koni roboczych 2.5—3.0 dl., 1.3—1.5 sz. Klatki: dla koni wierzchowych 10—12 m² powierzchni, o szer. 3 m; dla klaczy ze źrebięciem 12—16 m² powierzchni, o szer. 3.5 m.

Jedno źrebię wolno chodzące potrzebuje 10 m², zaś kilka źrebiąt wspólnie zamkniętych po 5 m². Szerokość chodnika za jednym rzędem koni 1.8—2.2 m; zaś między dwoma rzędami koni 2.8—3.8 m.

Ustawienie koni wszerz lub wzdłuż stajni. Najczęściej w kierunku długości w dwóch rzędach.

Wysokość stajni: w małych stajniach 2.8—3.0, w stajniach dla 10—30 koni 3.0—3.5 m, dla więcej jak 30 koni 3.5—4.0 m. Posadzka wytrzymała, nieprzepuszczalna, nie gładka, w $\frac{2}{3}$ od żłobu pozioma, a w $\frac{1}{3}$ od ścieku ze spadkiem 4—5 cm. Drzwi wchodowe w stajniach: dla koni roboczych 1.2—1.14 m szer., 2.2—2.4 m. wys.; dla koni wyjazdowych 1.3—1.6 sz.; dla wyjazdu wierzchem 2.5 szer., 3.0 wys. — Okna: możliwie wysoko nad podłogą o powierzchni równej $\frac{1}{15}$ części powierzchni rzutu poziomego budynku. — Żłoby: drewniane 0.3—0.4 m. szer. 0.25 gł. brzeg żłobu nad posadzką 1.1—1.3 m, lepsze żelazne emalowane, lub kamionkowe. — Drabiny 0.3—0.5 m. nad żłobem, drewniane lub żelazne, lepiej umieszczać w wysokości żłobów.

Przewory w tych łatwe do podnoszenia, okrągłe, wygładzone, zawieszane około 1 m nad posadzką, drewniane 8—10 cm gr. lub z rur żelaznych. — Klatki o ścianach stałych 1.5—1.75 m. wysokich, przy żłobie podwyższonych do 2.3 m. — Komórka na sieżkę o powierzchni 0.6 m² na konia, często nie potrzebna. Strych, jako skład karmy, powinien mieścić — licząc na 1 konia — 3—5 m³ siana, 6 m³ słomy na sieżkę i 8—10 m³ słomy na ściółkę. — Przewietrzanie stajni powinno być wykonane zawsze rurami pionowymi od sufitu na dach systemu Hoffmanna, jako od- i doprowadzającymi powietrze. Dla silnego przewietrzania w lecie, należy okna robić częściowo do otwierania.

b) Dla bydła.

Stanowisko: dla buhaja lub wielkiego wołu (bez żłobu i ścieku) 2.8 m dl., 1.5 m sz.; dla średniej krowy 2.5 m dl. 1.25 m sz.; dla krowy małej 2.3 m dl., 1.1 m sz.; dla 1—2 rocz. cielęcia 2.2 m dl., 0.95 m sz.; na cielę młodsze liczy się 1.5 m² przestrzeni. — Chodnik: za 1 rzędem bydła 1.2—1.5 m. szer. (wraz ze ściekiem); między 2 rzędami bydła 1.8—2.2 m sz. — Chodnik do zadawania karmy, z 1 żłobem 1.4—1.6 m sz.; z 2 żłobami 1.8—2.0 m szer. — Wysokość stajni, jeżeli nawóz codziennie wynosiny, robi się 2.8—3.1 m, dla ilości bydła do 12 sztuk; zaś 3.1—3.8 m dla 30 sztuk; wyżej nad 4.5 m stajni nie wykonują w praktyce. Ustawienie bydła wzdłuż lub wszerz rzędami, ostatnie lepsze. — Posadzka powinna być nieprzepu-

szczalna; zatem beton bez wygładzenia cementem, aby nie była gładka; również można robić z cegły lub klinkierów. Spadek tylko w tylnej $\frac{1}{8}$ części stanowiska 3—5 cm. — Żłoby 0.4—0.45 szer. 0.25—0.30 głęb. Krawędzią 0.2—0.7 m nad posadzką wzniesione. Przy żłobach niskich długość stanowiska mniejsza o szerokość żłobu. — Przewietrzanie jak w stajniach końskich. — Drzwi wchodowe 1.5—1.6 m szer., a co najjużej 2.2 m wys. Bramy wjazdowe 3 m szerokie a 2.5—3 m wysokie. Okna 1.0 do 2.0 m szer., 0.8—1.0 m sz. jak najwyżej nad posadzką. Stajnie, w których bydło stoi na nawozie, powinny mieć ściany do wysokości wznoszącego nawozu, nieprzepuszczalne, a więc cementem wyprawione. Posadzka ze spadkiem do zbiornika gnojówki nieprzepuszczalna. Żłoby nastawialne. — Na 1 sztukę bydła potrzeba około 8 m² powierzchni. — W stajniach, w których bydło nie uwiązane, liczy się na sztukę 6—7 m² powierzchni. Bramy wjazdowe 3 m szer. i 3 m wys. Jeżeli stajnie są bez strychu należy dla ciepła dach wykonać z warstwą izolacyjną. Niejśce do przyrządzenia karmy odgródzone tylko niską ścianką od stanowisk, o powierzchni od 0.5—1.0 m na sztukę bydła. — Strych do przechowywania karmy pojemności około 20 m³ na sztukę, z wejściem tak urządzonym, aby wylewy ze stajni nie dochodziły. — Przyrządy do pojenia: jako kupki dla każdej sztuki, lub rynny otwarte przed i pod żłobem powinny posiadać kurki do zamykania dopływu i do wypuszczania.

c) Dla owiec.

Potrzeba powierzchni dla: owcy, przeciętnie 0.6—0.7 m², rocznego jagn. 0.5—0.6 m², skopa 0.6—0.7 m², owcy z jagnięciem 0.7—0.8 m², barana w klatce 1.3 m²; dla owiec na mięso 0.8—0.9 do 1.0 m². Długość żłobków dla: jagnięcia 1—4 miesiąc. 0.2 m, 1-roczn. 0.3 m, owcy dorosłej 0.4 m, dla ras wielkich z rogami 0.5 m.

Wysokość stajni: 3.0—3.5 m do 500 sztuk, 3.5—4.0 m nad 500 sztuk. Mury do wys. 1.0 m z kamienia lub cegiel, wewnątrz cementem wyprawione. Słupy drewniane na kamiennych lub murowanych 1 m wysokich podstawach. Części drewniane wewnętrzne do wys. 1.2 m gładko obrobione. — Posadzka: warstwa piasku na 0.2—0.3 m. — Bramy wjazdowe 3.0 m szer. i 3.0 m wys. najdogodniej w ścianach szczytowych. Drzwi wchodowe 1.0 m szer., a 2 m wys., otwierane na zewnątrz. Ilość bram i drzwi odpowiednia do ilości owiec. Okna w stronie południowej 1.2—1.3 m szer., a 1.0—1.2 m wys., w południowej 1.0 m szer., a 0.8 m wys. w ilości dostatecznej nad podłogą 2 m wzniesione.

W stajniach bez strychu krokwie dachowe od dołu zasalować, wytrzcinać i wyprawić, a przestrzeń między szalowaniami wypełnić złym przewodnikiem ciepła (torf i t. p.).

d) Dla świń.

Potrzeba powierzchni dla: prosięcia 0.4—0.6 m², dorosłej świni 0.8—1.0 m², świni na opas 1.4—2.0 m², maciory 3.9 m², knura 3.5—4.0 m². — Wysokość stajni zależnie od ilości świń 2.2—2.8 m. — Posadzka nieprzepuszczalna, zatem beton lub cegły na kant w cementcie. Spad posadzki ku rynnie otwartej prowadzonej przy zbiorniku. Ścianki ograniczające klatki na

pół cegły cementem wyprawione, lub drewniane do wyjmowania w celu dezynfekcyi. Żelazne nie dobre, gdyż szybko rdzewieją. Chodniki między kłatkami 1.2—1.6 m szer. Kłatek nie urządzać przy ścianach zewnętrznych, gdyż żużle. Koryta drewniane, kamienne, murowane, żelazne, a najlepsze kamionkowe 0.4 m szer., 0.2 m głęb., 0.4—0.5 m dl. Drzwiczki do kłatek 0.6—0.8 m szer. otwier. na zewnątrz. Drzwi do stajni 1.2 do 1.4 m szer. Okna wysoko nad podłogą o powierzchni około 1.0 m².

e) Dla drobin.

Potrzeba powierzchni dla: Indyka 0.3 m², gęsi 0.25 m², kaczki 0.2 m², koguta 0.15 m². — Posadzka 0.3 m nad okalającym terenem z betonu ubijanego na warstwie tłuczonego szkła. — Okna i drzwi od strony południowej. Drzwi 0.6 m szer., Drzwiczki dla kur 0.2 szer. 0.3 wys. — Gniazda 0.4 szer., dl. i wys. w miejscu przyciemnionem. — Podwórze dla kur o powierzchni 0.15 m² na sztukę. — Dla gołębi: zużyć górną, jasną przestrzeń stajni. Otwory do wylotu 1.0 m nad podłogą.

2. Stodoly.

Pojemność: na 1 ha uprawnej powierzchni 50—70 m³. Wysokość składania zboża max. 9 m. W zasiękach ubita glina. Tok: z gliny, wapna i żużli tłuczonych w stos. 1:3, z betonu pokrytego asfaltem, z gliny i gipsu; wzniesiony 0.3 m nad okalającym terenem, od zasięków ścianką drewnianą — 1.5 m wys. odgradzony. — Ściany stodoly: murowane, ryglowe, wypełnione murem, lub szalowane. — Dach: przy dachach płaskich 6.0—7.0 m, przy stromych 4.0—5.0 m wys. Słoma, gonty, dachówka, papa lub lupek sztuczny i naturalny. Dachy płaskie ułatwiają składanie zboża i dają większą pojemność. — Szerokość stodoly od 12 m. Dla oszczędzenia pracy ręcznej przy składaniu zboża urządzać: zasięki szerokie obustronnie dostępne, lub przyrządy mechaniczne do podnoszenia i przenoszenia ładunków wozowych.

3. Spichrze.

Powierzchnia potrzebna: na 1 hl. zboża liczy się 0.25—0.30 m² z przejściami. Wysokość sypanego zboża około 0.6 m. — Wysokość od podłogi do podciągu 2.0 m. — Okna: 0.8 szer. 1.0 m wys. 0.6 m wzniesiona nad podłogą, zamykane okiennicami wewnątrz, opatrzone siatką zewnątrz. — Schody: wygodne, silne, proste, 1.2 m szer., wyprowadzane w oddzielnej klatce schodowej. Do podnoszenia i spuszczenia worów ze zbożem wyciąg.

4. Szopa na wozy i narzędzia.

Powierzchnia potrzebna: wóz z dyszlem 6.5—7.0 m dl., bez dyszla 3.8—5.0 m dl., a 2.0—2.2 m szer., sanie 2.0—2.5 m dług., 1.2—1.4 m szer., pług 2.6—3.0 m dl., a 1.5 m szer., brona prosto-

padle ustawiona około 0.5 m², siewnik rzędowy 2.0—3.0 szer. 3.0 m dl., rzutowy 4.0 m szer., 4.0 m dl., żniwiarka 3.5 m szer., 6.0 m dl., lokomobila 2.0 m szer., 3.0 m dl. — Posadzka ubita z gliny i żwiru ze spadkiem na zewnątrz do ścieku. — Ściany ryglowe szalowane, lub łatowane. — Dach płaski z okapem 3.0 m wzniesionym nad terenem.

5. Lodownie.

Wkopane w ziemi tylko tam, gdzie głęboki stan wody zakórnej, a ziemia przepuszczalna. Kopce lodowe na podkładzie z desek, gałęzi, słomy. Przykrycie słomą i 1.0 m warstwą ziemi. Murowane lodownie: ściany z warstwą izolacyjną powietrza, przykrycie słomą na 0.6 m gr. lub sklepieniem, na którym 0.5 m warstwa ziemi. Drewniane: ściany z dylów podwójne, w oddaleniu 1.0 m między nie: sieczka, torf, mech i t. p. Przykrycie podwójne, jak ściany. Dach słomiany. — Wejście o drzwiach podwójnych w stronie północnej. Ocienione krzakami i drzewami.

6. Gnojownie.

Powierzchnia: przy wywożeniu co 4 miesiące, na sztukę bydła 3—4 m² dla ściółki słomianej, 2 m² dla ściółki torfowej. Zagłębienie 0.5—0.6 m. Z ziemi wybranej dookoła wał usypać. Kształt prostokątny lub półkolisty. Posadzka nieprzepuszczalna, ubity il w 0.3 m warstwie, beton 0.15 m gr., spadek 1—30 ku zbiornikowi gnojówki. Zbiorniki: w połowie boku dłuższego gnojowni, w środku u kolistej; 1.8—2.2 m głęb., w nieprzepuszczalnej ziemi z betonu, cegiel, na cemencie; w przepuszczalnej mur podwójny z warstwą izolacyjną asfaltową; powierzchnia około $\frac{1}{25}$ gnojowni.

7. Potrzeba materiałów budowlanych bo robót murarskich.

Na 1 m³ muru z kamienia łamanego potrzeba 1.2—1.3 m³ kamieni i 0.33 m³ zaprawy. Na 1 m³ muru ceglanego potrzeba 290 cegieł i 0.3 m³ zaprawy. Wymiar cegieł 29 cm × 14 cm × 6.5 cm.

Na 1 m² posadzki z cegieł, ułożonych na płasko potrzeba 25 cegieł, na kant 50 cegieł. Na 1 m² wyprawy 1.5—2.0 cm gr. potrzeba 0.017—0.02 m³ zaprawy.

1 część wapna i 2 części piasku dają 2 części zaprawy mur.
1 „ „ i 2 „ „ „ 2.4 cz. zaprawy cement.
1 beczka cementu portlandzkiego = 170 kg = 0.136 m³.

Tablica dla obliczenia objętości budulca okrągłego.

D = średnica przeciętna w cm. Mn — mnożnik.

D	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Mn	28	38	50	64	78	95	113	133	154	177	201	227
D	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Mn	254	284	314	346	380	415	452	491	531	573	616	661
D	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Mn	707	755	804	855	908	962	1018	1075	1134	1195	1257	1320
D	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Mn	1385	1452	1521	1590	1662	1735	1810	1886	1964	2043	2174	2006
D	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
Mn	2290	2376	2463	2552	2642	2734	2827	2923	3019	3117	3217	3318
D	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
Mn	3421	3526	3632	3739	3849	3959	4072	4185	4301	4418	4537	4657
D	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
Mn	4778	4902	5027	5153	5281	5411	5542	5675	5809	5945	6082	6221
D	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
Mn	6362	6504	6648	6793	6940	7088	7238	7390	7543	7698	7854	8012

Sposób obliczania. W każdej działce poprzecznej szereg pierwszy (liczb pochyłych D) oznacza przeciętną średnicę w cm. (zmierzoną pośrodku długości sztuki budulca) L , szereg drugi (liczb pionowych Mn) oznacza mnożniki, odnoszące się do danych średnic. Objętość oznacza się według wzoru $Obj. = \frac{L + Mn}{1000}$ t. j. przez mnożenie długości sztuki w metrach przez mnożnik, odpowiadający danej jego średnicy w centymetrach i przez podzie-

lenie otrzymanego iloczynu przez 10.000. Przykład: okrągłak ma 8 metrów długości i przeciętną średnicę 47 cm. W tablicy średnicy 47 cm. odpowiada mnożnik 1735, stąd $1735 \times 8 = 13880$; $13880 : 10.000 = 1.388$ metrów sześciennych.

Powierzchnia i obwody kół

dla średnic od 1 do 50 dla obliczania objętości okrągłego drzewa.

Średn. cm.	Powierz- chnia cm. ²	Obwód cm.	Średn. cm.	Powierz- chnia cm. ²	Obwód cm.
1	0.79	3.14	26	530.93	81.68
2	3.14	6.28	27	572.56	84.82
3	7.07	9.42	28	615.75	87.96
4	12.57	12.57	29	660.52	91.11
5	19.63	15.71	30	706.86	94.25
6	28.27	18.85	31	754.77	97.39
7	38.48	21.99	32	804.25	100.53
8	50.27	25.13	33	855.30	103.67
9	63.62	28.27	34	907.92	106.81
10	78.54	31.42	35	962.11	109.96
11	95.03	34.56	36	1017.88	113.10
12	113.10	37.70	37	1075.21	116.24
13	132.73	40.84	38	1134.11	119.38
14	153.94	43.98	39	1194.59	122.52
15	176.71	47.12	40	1256.64	125.66
16	201.06	50.27	41	1320.25	128.81
17	226.98	53.41	42	1385.44	131.95
18	254.47	56.55	43	1452.20	135.09
19	283.53	59.69	44	1520.53	138.23
20	314.16	62.83	45	1590.43	141.37
21	346.36	65.97	46	1661.90	144.51
22	380.13	69.12	47	1734.94	147.65
23	415.48	72.26	48	1809.56	150.80
24	452.39	75.40	49	1885.74	153.94
25	490.87	78.54	50	1963.50	157.08

Tablica ta służy do obliczenia objętości drzewa okrągłego. Biorąc w połowie ściętego drzewa średnicę i mnożąc znalezionej dla danej średnicy powierzchnię przecięcia przez długość kłosa, otrzymuje się objętość drzewa; np. średnica drzewa wynosi 40 cm., a długość 25 metr., objętość wynosi $1256.6 \times 25 = 3.14$ m.³


Kubatura rzniętego materiału drzewnego.

1 łąta	$\frac{3}{4}'' \times 2''$	— 6 metr. długa	= 0.006 mtr. kub.
1 rygiel	$2'' \times 4''$	— 6 „ „	= 0.033 „ „
1 „	$2'' \times 6''$	— 6 „ „	= 0.050 „ „
1 „	$2'' \times 8''$	— 6 „ „	= 0.067 „ „
1 deska	$\frac{3}{4}'' \times 8''$	— 6 „ „	= 0.025 „ „
1 „	$1'' \times 10''$	— 6 „ „	= 0.041 „ „
1 „	$2\frac{1}{2}'' \times 10''$	— 6 „ „	= 0.087 „ „

1 belka	8'' × 8''	— 6 metr. długa	= 0.267 mtr. kub.
1 „	10'' × 10''	— 6 „	= 0.415 „
1 „	12'' × 12''	— 6 „	= 0.599 „
1 „	10'' × 16''	— 6 „	= 0.664 „
1 „	14'' × 18''	— 6 „	= 1.049 „

Wzory dla obliczania powierzchni i objętości.


1. Trójkąt.



podstawa = p ; wysokość = w
 powierzchnia = $\frac{\text{podst.} \times \text{wysok.}}{2}$

$$\text{np. } \frac{5 \cdot 2}{2} = 5 \text{ m.}^2$$


2. Równoległobok.



powierzchnia = podstawa \times wysokość

$$\text{np. } 4 \times 2 = 8 \text{ m.}^2$$


3. Trapez.



Powierzchnia = sumie boków równoległych \times przez połowę wysokości

$$\text{np. } 5 + 4 = 9; 9 \times \frac{2}{2} = 9 \text{ m.}^2$$

7. Piramida.



Objętość = powierzchnia podstawy $\times \frac{1}{3}$ wysokości;

$$\text{np. } 4 \times \frac{6}{3} = 8 \text{ m.}^3$$


4. Kolo.




Obwód = średnicy $\times 3.14$.

Powierzchnia = $\frac{1}{2}$ średnicy $\times \frac{1}{2}$ średnicy $\times 3.14$; np. $2 \times 2 \times 3.14 = 12.56 \text{ m.}^2$ ma powierzchnię koło o średnicy 4 m.

8. Stożek.




Objętość = $\frac{1}{3}$ średnicy podst. $\times \frac{1}{2}$ średnicy podst. $\times 3.14 \times \frac{1}{3}$ wysokości.

5. **Pryzmat.**


Objętość = powierzchnia podstawy \times wysokość

np. $5 \times 4 = 20 \text{ m.}^3$



9. Objętość ściętej piramidy = połowie sumy płaszczyzn równoległych \times przez wysokość

np. $\frac{8 + 12}{2} = 10$; $10 \times 6 = 60 \text{ m.}^3$

6. **Cylinder (wał).**

Objętość = powierzchnia podstawy \times wysokość = $\frac{1}{2}$ średnicy \times średnicy \times $\frac{1}{2}$ średnicy \times 3.14 \times wysokość;

np. $4 \times 4 \times 3.14 \times 8 = 100.48 \text{ m.}^3$


10. Objętość kuli = $0.524 \times$ średnicy \times średnicy \times średnicy.

11. Objętość beczki (w przybliżeniu): Średnica beczki w środku \times średnica beczki w środku \times 2, do tego dodać średnicę beczki w dnie \times średnicę beczki w dnie i sumę pomnożyć przez 0.262, a ten iloczyn znów pomnożyć przez wysokość beczki.

$6 \times 6 \times 2 = 72$

$4 \times 4 = 16$

88 ; $88 \times 0.262 = 23.076 \times 8 = 184.6 \text{ m.}^3$



Miary i wagi metryczne.

I. **Miara długości.** Jednostką jest *metr* (m) = 0.527916 sążniom = 3 stopom 1 calowi 11.58 liniom = 1.286077 lokciom.

10 metrów = 1 Dekametrowi (dkm)

100 „ = 1 Hektometrowi (hm)

1000 „ = 1 Kilometrowi (km)

$\frac{1}{10}$ metra = 1 decimetrowi (dm)

$\frac{1}{100}$ „ = 1 centimetrowi (cm)

$\frac{1}{1000}$ „ = 1 milimetrowi (mm).

II. **Miara powierzchni.** Jednostką jest *metr kwadratowy* (m²). Jako miara powierzchni pól i łąk służy dekametr kwadratowy czyli *Ar* (a) i hektometr kwadratowy czyli *hektar* (ha).

1 a = 100 m. kw., 1 ha = 100 a = 10.000 m. kw.

III. **Miara objętości.** Jednostkę tworzy *litr* (l) = 0.7068515 garnca = 0.01626355 mierzyc.

100 litrów = 1 hektolitrowi (hl) = 1.769129 wiadr. Litr służy jako miara objętości dla płynów, hektolitr dla materij stałych.

IV. **Waga metryczna.** Jednostką jest *kilogram* (kg) = 1.785523 funt. austr. = 2.442 funt. ros. = 2 funt. celn.

1000 kilogramów = 1 tonnie (t) = 2000 funt. celn.

100 „ = 1 centnarowi metryczn. (q).

Tabela porównawcza miar i wag

francuskich, polskich i rosyjskich, oraz dawnych austriackich i pruskich.

	Milim.	Cale austr.	Cale rosyjs.	Cale prusk.	Cale polskie
I. Miary długości. a) drobniejsze:					
Austria. Stopa wiedeń. = 12 calom = 144 liniom	316.08	12.—	12.55	12.10	13.17
Francya. Metr = 10 decimetrom = 100 centimetrom = 1000 milimetrom	1000.—	37.96	39.37	38.28	41.66
Polska. Stopa = 12 calom = 144 liniom	288.—	10.94	11.34	11.03	12.—
Prusy. Stopa = 12 calom = 144 liniom	313.85	11.92	12.36	12.—	13.07
Rosya. Arszyń = 28 cal. = 16 werszkom	711.19	22.51	28.—	27.26	29.67
b) droższe:					
Austria. Mila austr. = 4.000 sążniom	7585.9	4000.—	3550.—	2014.—	4388.—
Francya. Kilometr = 1000 metrom	1000.—	527.2	468.7	265.6	531.8
Polska. Dawna mila polska	8534.2	4497.8	—	2268.8	4938.—
Prusy. Mila = 24.000 stopom = 2.000 prętom	7532.5	3936.5	3530.—	2000.—	4356.—
Rosya. Wiorsta = 500 sążniom	1066.8	562.2	500.—	283.3	617.2
Anglia. Mila ang. = 1.760 yardom	1609.3	848.5	754.1	427.5	931.3
Mila morska (włoska) = $\frac{1}{60}$ stopnia równikowego	1855.1	978.4	869.5	492.7	1073.5
Mila geograficzna = $\frac{1}{10}$ stopnia równ.	7420.4	3913.—	3479.—	1971.—	4294.—
II. Miary powierzchni.					
Austria. Morg wied. = 1.600 sążniom kw.	0.5755	1.000	0.528	2.254	1.028
Francya. Hektar = 100 arom	1.000	1.738	0.915	3.917	1.786
Polska. Morg nowopolski = 300 prętom kw.	0.5599	0.973	0.512	2.192	1.000
Prusy. Morg magdeb. (pruski) = 180 prętom kw.	0.2553	0.444	2.233	1.000	0.456
Rosya. Desiatyna praw. = 2.400 sążniom kw.	1.0925	1.898	1.000	4.279	1.951
Anglia. Akr = 160 kw. prętom	0.4047	1.422	2.705	0.630	1.384
III. Miary objętości. a) płynów:					
Austria. Wiadro (Eimer) = 40 garncom (Maas) = 80 półgarnc. Halb. = 160 Seidel = 925 Pfiff.	56.589	1.000	4.610	0.824	14.150
Francya. Hektolitr = 100 litrom	100.—	1.767	8.130	1.458	25.—
Polska. Garniec = 4 kwartom = 16 kwaterkom	4.—	0.072	0.325	0.056	1.—
Prusy. Wiadro (Eimer) = ankrom = 60 kwartom	68.702	1.215	5.584	1.—	17.175
Rosya. Wiadro = 10 sztofom = 100 krużkom = 1000 czarkom	12.299	0.230	1.—	0.179	3.073

b) *zboża:*

	Hektoltry	Mierzyc austr.	Czetw. rosyjs.	Szeffe pruskie	Korce polskie
Austria. Mierzyc (Metzen) = 4 ćwierciom (Viertel) = 16 garncom (Masset)	0.694	1.—	0.292	1.116	0.483
Francya. Hektolitr = 100 litrom	1.—	1.623	0.476	1.819	0.781
Polska. Korzec = 4 ćwierciom = 32 garncom	1.280	2.085	0.610	2.329	1.—
Prusy. Szeffe = 4 virtelom = 16 massom	0.550	0.897	0.262	1.—	0.423
Rosya. Czetwert' = 2 ośminom = 8 czetwerykom = 64 garncom	2.099	3.410	1.—	3.817	1.640
Anglia. Quarter = 8 bushel = 8 gallons. bushel	0.363	1.692	5.787	1.517	3.526

IV. *W a g i.*

	Kilogr.	Funt austr.	Funt rosyjs.	Funt pruski	Funt polski
Austria. Funt wied. = 32 lutom = 128 kwintlom	0.560	1.—	1.367	1.120	1.380
Francya. Kilogram = 10 Hektogramom = 100 Dekagramom = 1.000 gramom	1.000	1.786	2.442	2.—	2.469
Polska. Funt = 32 lutom	0.405	0.720	0.999	0.810	1.—
Prusy. Funt = 32 lutom	0.500	0.893	1.221	1.—	1.235
Rosya. Funt = 32 lutom = 96 złotnikom = 9216 dolom	0.409	0.731	1.000	0.818	1.010
Anglia. Funt = 16 uncyi	0.454	0.810	1.039	0.851	0.894

1 pud = 16.48 kg. 100 kg. = 6 pudów 4 f.

Tabela porównawcza monet obcych z monetami waluty koronowej według kursu pocztowego.

M O N E T Y											
francuskie = walucie koronowej				niemieckie = walucie koronowej				rosyjskie = walucie koronowej			
franki	cen.	kor.	gr.	m.	fen.	kor.	gr.	rub.	kop.	kor.	gr.
—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3
—	10	—	10	—	10	—	12	—	10	—	26
1	—	—	96	1	—	1	18	1	—	2	55
10	—	9	55	10	—	11	78	10	—	25	49
100	—	95	50	100	—	117	80	100	—	254	50
1000	—	955	—	1000	—	1178	—	1000	—	2545	—

M O N E T Y								
angielskie = waluta koronowej				amerykańskie = waluta koronowej				
funt szt.	szyl.	pen.	kor.	gr.	dol.	cen.	kor.	gr.
—	—	1	—	10	—	1	—	5
—	—	10	1	—	—	10	—	50
—	1	—	1	20	1	—	4	96
—	10	—	12	—	10	—	49	60
1	—	—	24	06	100	—	496	—
10	—	—	240	60	1000	—	4960	—

Tablica do obliczania $\%$ za rok.

Kapitał	Przystopie $\%$															
	2 $\%$		2 $\frac{1}{2}\%$		3 $\%$		3 $\frac{1}{2}\%$		4 $\%$		5 $\%$		5 $\frac{1}{2}\%$		6 $\%$	
	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.
1000	20	—	25	—	30	—	35	—	40	—	50	—	55	—	60	—
900	18	—	22	50	27	—	31	50	36	—	45	—	49	50	54	—
800	16	—	20	—	24	—	28	—	32	—	40	—	44	—	48	—
700	14	—	17	50	21	—	24	50	28	—	35	—	38	50	42	—
600	12	—	15	—	18	—	21	—	24	—	30	—	33	—	36	—
500	10	—	12	50	15	—	17	50	20	—	25	—	27	50	30	—
400	8	—	10	—	12	—	14	—	16	—	20	—	22	—	24	—
300	6	—	7	50	9	—	10	50	12	—	15	—	16	50	18	—
200	4	—	5	—	6	—	7	—	8	—	10	—	11	—	12	—
100	2	—	2	50	3	—	3	50	4	—	5	—	5	50	6	—
90	1	80	2	25	2	70	3	15	3	60	4	50	4	95	5	40
80	1	60	2	—	2	40	2	80	3	20	4	—	4	40	4	80
70	1	40	1	75	2	10	2	45	2	80	3	50	3	85	4	20
60	1	20	1	50	—	80	2	10	2	40	3	—	3	30	3	60
50	1	—	1	25	1	50	1	75	2	—	2	50	2	75	3	—
40	—	80	1	—	1	20	1	40	1	60	2	—	2	20	2	40
30	—	60	—	75	—	90	1	5	1	20	1	50	1	75	1	80
20	—	40	—	50	—	60	—	70	—	80	1	—	1	10	1	20
10	—	20	—	25	—	30	—	35	—	40	—	50	—	55	—	60
9	—	18	—	23	—	27	—	32	—	36	—	45	—	50	—	54
8	—	16	—	20	—	24	—	28	—	32	—	40	—	44	—	48
7	—	14	—	18	—	21	—	24	—	28	—	35	—	39	—	42
6	—	12	—	15	—	18	—	21	—	24	—	30	—	33	—	36
5	—	10	—	13	—	15	—	17	—	20	—	25	—	28	—	30
4	—	8	—	10	—	12	—	15	—	16	—	20	—	22	—	24
3	—	6	—	8	—	9	—	11	—	12	—	15	—	18	—	18
2	—	4	—	5	—	6	—	7	—	8	—	10	—	11	—	12
1	—	2	—	3	—	3	—	4	—	4	—	5	—	6	—	6

Tablica do obliczania % za miesiąc (= 30 dniom).

Kapitał	Przy stopie %															
	2 ⁰ / ₀		2 ¹ / ₂ ⁰ / ₀		3 ⁰ / ₀		3 ¹ / ₂ ⁰ / ₀		4 ⁰ / ₀		5 ⁰ / ₀		5 ¹ / ₂ ⁰ / ₀		6 ⁰ / ₀	
	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.
1000	1	67	2	8	2	50	2	92	3	33	4	17	4	58	5	—
900	1	50	1	88	2	25	2	63	3	—	3	75	4	13	4	50
800	1	33	1	67	2	—	2	33	2	67	3	33	3	67	4	—
700	1	17	1	46	1	75	2	4	2	33	2	92	3	21	3	50
600	1	—	1	25	1	50	1	75	2	—	2	50	2	75	3	—
500	—	83	1	4	1	25	1	46	1	67	2	8	2	29	2	50
400	—	67	—	83	1	—	1	17	1	33	1	67	1	83	2	—
300	—	50	—	63	—	75	—	88	1	—	1	25	1	38	1	50
200	—	33	—	42	—	50	—	58	—	67	—	83	—	92	1	—
100	—	17	—	21	—	25	—	29	—	33	—	42	—	46	—	50
90	—	15	—	19	—	23	—	26	—	30	—	37	—	41	—	45
80	—	13	—	17	—	20	—	23	—	27	—	33	—	37	—	40
70	—	12	—	15	—	18	—	20	—	23	—	29	—	32	—	35
60	—	10	—	13	—	15	—	18	—	20	—	25	—	28	—	30
50	—	8	—	10	—	13	—	15	—	17	—	21	—	23	—	29
40	—	7	—	8	—	10	—	12	—	13	—	17	—	18	—	20
30	—	5	—	6	—	8	—	9	—	10	—	13	—	14	—	15
20	—	3	—	4	—	5	—	6	—	7	—	8	—	9	—	10
10	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3	—	4	—	5	—	5
9	—	1	—	2	—	2	—	3	—	3	—	4	—	4	—	4
8	—	1	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	4	—	4
7	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3
6	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3
5	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2
4	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2
3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Przykład: Obliczyć procent za rok i 140 dni od kapitału 320 K. przy stopie % 5. Znajdujemy w odpowiednich liniach od 320 K.: za rok $15 + 1 = 16$ K., za 4 miesiące $1.25 + 8 = 1.33 \times 4 = 5.32$ K. i za 20 dni $\frac{1.33}{3} \times 2 = 88$ gr. W sumie więc $16 + 5.32 + 88 = 22.20$ koron.

Tablice składanych procentów.

I. Tablica.

Wykazuje do jakiej kwoty wzrasta 1 K. złożona na procent składany po upływie pewnej liczby lat. Aby dojść, wiele wynosić będzie pewna kwota po jakimś czasie, wystarczy wyszukać

w tej tabeli liczbę z odpowiedniego roku i pomnożyć przez sumę, o którą chodzi.

Np.: Jeżeli ktoś chce wiedzieć, wiele uczyni 10 K. po upływie 28 lat złożone na procent składany 4, niech weźmie z 28-ej linii tej tabeli liczbę w rubryce 4^o zamieszczoną, a więc 3 K.⁹ i pomnoży przez 10.

II. T a b l i c a.

Wykazuje jaką sumę otrzyma po pewnej ilości lat ten, kto przez cały ten czas co roku oddawać będzie na procent składany po 1 K. Aby oznaczyć, jaki kapitał otrzyma po pewnej liczbie lat ten, kto co roku składać będzie pewną sumę, wystarczy w tej tabeli wyszukać liczbę odpowiadającą ilości lat i pomnożyć przez sumę, o którą chodzi.

Jeżeli np. ktoś chce wiedzieć, ile będzie miał po 30 latach, jeżeli przez 30 lat co roku składać będzie 10 K. na procent składany 5, niech weźmie w 30-ej linii tabelki liczbę w rubryce 5^o umieszczoną i pomnoży przez 10.

Tablica I. patrz str. 183.

» II. » » 184.

Tablica I.

+	po 3 ⁰ / ₀		po 4 ¹ / ₂ ⁰ / ₀		po 5 ⁰ / ₀		po 5 ¹ / ₂ ⁰ / ₀		po 6 ⁰ / ₀		=		-		po 3 ⁰ / ₀		po 4 ⁰ / ₀		po 4 ¹ / ₂ ⁰ / ₀		po 5 ⁰ / ₀		po 5 ¹ / ₂ ⁰ / ₀		po 6 ⁰ / ₀		
	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.
1	1	3	1	4	1	5	1	5 ¹ / ₂	1	6	26	2	16	2	78	3	14	3	56	4	2	4	2	4	2	4	52
2	1	6	1	8	1	10	1	11	1	12	27	2	22	2	88	3	28	3	73	4	26	4	26	4	4	84	
3	1	9	1	12	1	16	1	17	1	19	28	2	29	2	—	3	43	3	92	4	48	4	48	5	5	18	
4	1	13	1	17	1	22	1	24	1	26	29	2	36	3	12	3	58	4	12	4	71	4	71	5	5	42	
5	1	16	1	22	1	28	1	31	1	34	30	2	43	3	24	3	75	4	32	4	99	4	99	5	5	74	
6	1	19	1	27	1	34	1	38	1	42	31	2	50	3	37	3	91	4	54	5	21	5	21	6	6	2	
7	1	23	1	32	1	41	1	45	1	50	32	2	58	3	51	4	9	4	76	6	48	6	48	6	6	31	
8	1	27	1	37	1	48	1	53	1	59	33	2	65	3	65	4	27	5	—	5	72	5	72	6	6	78	
9	1	30	1	42	1	55	1	62	1	69	34	2	73	3	79	4	46	5	25	6	12	6	12	7	7	32	
10	1	34	1	48	1	63	1	71	1	79	35	2	81	3	95	4	67	5	52	6	51	6	51	7	7	69	
11	1	38	1	54	1	71	1	80	1	89	35	2	90	4	10	4	87	5	79	6	80	6	80	8	8	23	
12	1	43	1	60	1	80	1	90	1	98	37	2	99	4	27	5	10	6	8	7	22	7	22	8	8	78	
13	1	47	1	67	1	89	2	1	2	13	38	3	7	4	44	5	33	6	39	7	53	7	53	9	9	15	
14	1	51	1	73	1	99	2	11	2	25	39	3	17	4	62	5	57	6	70	6	95	6	95	9	9	72	
15	1	55	1	80	1	9	2	22	2	40	40	3	26	4	80	6	82	7	4	8	51	8	51	10	10	29	
16	1	61	1	88	2	20	2	36	2	56	41	3	36	4	99	6	8	7	39	9	9	9	9	10	10	99	
17	1	66	1	96	2	31	2	51	2	72	42	3	46	5	19	6	35	7	76	9	61	9	61	11	11	54	
18	1	71	2	4	2	42	2	66	2	88	43	3	56	5	40	6	64	8	15	10	33	10	33	12	12	20	
19	1	76	2	12	2	54	2	81	2	5	44	3	67	5	62	6	94	8	56	10	65	10	65	12	12	88	
20	1	81	2	19	2	65	2	92	2	3	45	3	78	5	84	7	25	8	99	11	12	11	12	13	13	76	
21	1	83	2	28	2	78	3	7	3	42	46	4	90	6	7	7	57	9	43	11	90	11	90	14	14	54	
22	1	86	2	37	2	93	3	23	3	63	47	4	—	6	32	7	92	9	91	12	60	12	60	15	15	62	
23	1	91	2	46	2	8	3	40	3	84	48	4	13	6	57	8	27	10	40	13	80	13	80	16	16	74	
24	1	99	2	56	2	25	3	60	4	6	49	4	26	6	83	8	64	10	92	14	—	14	—	17	17	79	
25	2	9	2	67	3	39	3	81	4	29	50	4	38	4	11	9	3	11	47	14	54	14	54	18	18	42	

Tablica II.

+ =	po 3%		po 3½%		po 4%		po 4½%		po 5%		+ =	po 3%		po 3½%		po 4%		po 4½%		po 5%	
	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.		K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.	K.	gr.
1	03.00	1	03.50	1	04.00	1	04.50	1	05.00	26	39	70.96	42	75.90	46	08.42	49	71.13	53	66.91	
2	09.09	2	10.62	2	12.16	2	13.70	2	15.25	27	41	03.69	45	29.06	48	96.75	52	99.33	57	40.25	
3	18.36	3	21.49	3	24.64	3	27.81	3	31.01	28	44	21.88	47	91.07	51	96.62	56	42.30	61	32.27	
4	30.91	4	36.24	4	41.63	4	47.07	4	52.19	29	46	57.54	50	62.26	55	08.49	60	00.70	65	43.88	
5	46.84	5	55.01	5	63.29	5	71.68	5	80.56	30	49	00.26	53	42.94	58	32.83	63	75.23	69	76.07	
6	66.24	6	77.94	6	89.82	7	01.91	7	14.20	31	51	50.27	56	33.45	61	70.14	67	66.62	74	29.88	
7	89.23	8	05.16	8	21.42	8	38.00	8	54.91	32	54	07.78	59	44.12	65	20.95	71	75.62	79	06.37	
8	15.91	9	36.84	9	58.27	9	80.21	10	02.65	33	56	73.01	62	45.31	68	85.79	76	03.02	84	06.69	
9	46.38	10	73.13	11	00.61	11	28.82	11	57.78	34	59	46.20	65	67.40	72	65.22	80	49.66	89	32.03	
10	80.77	12	14.19	12	48.63	12	81.11	13	20.67	35	62	27.59	69	00.76	76	59.83	85	16.39	94	83.63	
11	13.20	13	60.19	14	02.58	14	46.40	14	91.71	36	65	17.42	72	45.77	80	70.22	90	04.13	100	62.81	
12	61.77	15	11.30	15	62.68	16	15.99	16	71.29	37	68	16.94	76	02.88	84	97.03	95	13.82	106	70.96	
13	08.63	16	67.69	17	29.19	17	93.21	18	59.86	38	71	23.42	79	72.49	89	40.91	100	46.44	113	09.50	
14	59.89	18	29.56	19	02.35	19	78.40	20	57.85	39	74	40.12	83	55.02	94	02.56	106	03.03	119	79.97	
15	15.68	19	97.10	20	82.45	21	71.93	22	65.74	40	77	66.32	87	50.95	98	82.65	111	84.66	126	83.97	
16	76.15	21	70.50	22	69.75	23	74.17	24	84.03	41	81	02.31	91	60.73	103	81.95	117	92.47	134	23.17	
17	41.44	23	49.96	24	64.64	25	85.50	27	13.23	42	84	48.38	95	84.86	109	01.23	124	27.64	141	99.33	
18	11.68	25	35.71	26	77.12	28	06.35	29	53.90	43	88	04.84	100	23.83	114	41.28	130	91.38	150	14.30	
19	87.03	27	27.96	28	67.80	30	87.14	32	06.59	44	91	71.98	104	78.16	120	02.93	137	81.99	158	70.01	
20	57.61	29	26.91	30	96.92	32	78.31	34	71.92	45	95	50.14	109	48.40	125	87.05	146	09.82	167	68.51	
21	53.67	31	32.89	33	24.79	35	30.33	37	50.52	46	99	39.65	114	35.09	131	94.53	152	67.26	177	11.94	
22	45.28	33	46.04	35	61.78	37	93.70	40	43.04	47	103	40.83	119	38.82	138	26.32	160	58.79	187	02.53	
23	42.61	35	66.65	38	08.26	40	68.91	43	50.19	48	107	64.06	124	60.18	144	83.37	168	85.93	197	42.66	
24	45.92	37	94.98	40	64.59	43	56.52	46	72.70	49	111	79.68	129	99.79	151	66.70	177	50.30	208	34.79	
25	55.30	40	31.31	43	31.17	46	57.06	50	11.34	50	116	18.07	135	58.28	158	77.37	186	53.56	219	81.53	

Najważniejsze wyjątki z ustaw, dotyczących gospodarstwa wiejskiego *).

Ustawa polowa z dnia 17 lipca 1876.

I. O własności polnej i przestępstwie polowem.

§ 1. Własnością polną są wszelkie przedmioty, które z prowadzeniem gospodarstwa wiejskiego w najobszerniejszym słowa tego znaczeniu w pośrednim lub bezpośrednim zostają stosunku, a to jak długo znajdują się na otwartem polu.

§ 2. Wszelkie uszkodzenie własności polnej oraz przekroczenie zakazów, zawartych w niniejszej ustawie lub wydanych na jej podstawie przez władzę do tego powołaną, uznaje się za przestępstwa polowe i mają być jako takie karane, jeżeli nie podpadają pod przepisy ogólnej ustawy karnej lub innych szczegółowych ustaw.

II. Postanowienia karne.

§ 13. Kto jeździ wierzchem lub zaprzęgiem po cudzym gruncie (ogrodach, rolach, łąkach itd.), podlega grzywnie po 2 kor. od sztuki bydła.

§ 14. Kto chodzi po gruntach lub wstępuje na drogi polne, według § 3 lit. b. wzbronione (zamknięte lub tablicami z zakazem lub innymi znakami opatrzone), podlega grzywnie 1 k.

§ 15. Kto nie zachowuje przepisów objętych w § 5—15 (o dozorze przy pasaniu bydła, o nocnem pasaniu, o ostrożnościach przed szkodą i t. p.), podlega grzywnie według następującej taksy: od sztuki nierogacizny 2 k., od sztuki bydła rogatego 1 k. 20 gr., od sztuki konia, muła lub osła 1 k., od sztuki kozy 80 gr., od sztuki owcy 40 gr., od sztuki prosięcia ssącego 20 gr., od sztuki gęsi lub indyka 20 gr., od sztuki innego drobiu 10 gr.

§ 16. Grzywna paragrafem poprzednim dla przestępstw §§ 5—10 postanowiona, będzie podwójna, jeżeli przestępstwo popełnione zostało:

a) z umysłu;

b) pod okolicznościami utrudniającymi wykrycie sprawcy, a w szczególności porą nocną;

c) na rolach uprawionych lub obsianych, w ogrodach, na łąkach wilgotnych lub grzęskich, tudzież na gruntach ogrodzonych lub też tablicami ostrzegającymi, albo w inny w okolicy używany sposób jako zamknięte oznaczonych;

d) jeżeli szkodnik już raz za przestępstwo polowe w ciągu roku ukarany został.

§ 17. Kto niszczy lub uszkadza cudze drzewa i krzewy na pniu, czy to na gruntach prywatnych, czy publicznych, np. przy drogach, podlega grzywnie po 4 kor. od jednej sztuki.

§ 18. Kto bezprawnie łamie lub uszkadza gałęzie, obrywa owoce, kwiaty lub liście, psuje kosze, albo wyciąga lub psuje znajdujące się przy drzewkach pale ochronne, podlega grzywnie po 4 k. od sztuki drzewa, krzewu, pala lub kosza.

*) Szan. Czytelnikom polecamy dzieło 2 t. Wiktora Dzerowicza Podręcznik prawny w sprawach lasowych, polowych, łowieckich i o rybołóstwie. Lwów 1898.

A. Ustawa o tępieniu kianianki i szkodliwych ostów z d. 17 lutego 1885.

§ 1. Każdy właściciel, posiadacz, dzierżawca lub zawiadowca gruntu obowiązany jest tępić kianiankę, także wylubem zwaną, i wszelkie szkodliwe osty, znajdujące się na gruntach w jego posiadaniu, dzierżeniu lub pod jego zarządem będące, a to w takim czasie, zanim rośliny te zaczną kwitnąć lub dojrzewać.

§ 2. Gdyby ktokolwiek powyższego obowiązku swego w przepisany czas nie wypełnił, winien naczelnik gminy, względnie przełożony obszaru dworskiego, wezwać go do tego i stosowny wyznaczyć mu termin, a po bezskutecznym tegoż upływie zarządzić tępienie kianianki i ostów na koszt opieszalego.

§ 3. W ostatnim wypadku ulegnie opieszaly grzywnie od 1 do 4 k., a w razie powtórnej opieszalności do wysokości 10 k.; w przypadku niemożliwości płacenia, aresztowi od 1 do 3 dni.

Grzywny wpływają do funduszu ubogich odnośnej gminy.

B. Rozporządzenie o. k. namiestnictwa z 20. sierpnia 1885 względem wykonania powyższej ustawy.**a) O tępieniu kianianki.**

§ 2. W miejscach, gdzie okaże się kianianka, należy wszystkie tam znajdujące się rośliny, niemniej rośliny miejsca te okalające, a to w promieniu przynajmniej 30 centymetrowym od miejsc kianianką zagrożonych, przy samej ziemi sierpem zżynać i w kupy układać. Następnie pokrywa się takie miejsca grubą warstwą słomy, na długość jednej stopy pociętej, lub w braku tejże dostateczną ilością wiórów lub chrustu i w ten sposób pali zżętą kianiankę i koniczynę, poczem mają być dotyczące miejsca starannie przekopane.

b) O tępieniu szkodliwych ostów.

§ 6. Obok starannej uprawy roli i użycia czystego nasienia jedynym środkiem tępienia ostów jest wypłewienie ich z korzeniem.

Z początkiem wiosny, gdy osty są jeszcze małe, należy je niszczyć przez dosyć głębokie wykopywanie za pomocą motyki; skoro jednak podrosną, wykopywanie ich byłoby często bardziej szkodliwym, aniżeli pożytecznym, gdyż w ten sposób osty nie dadzą się usunąć z korzeniem, i w takim razie wskazanem jest wyrywanie ostów z korzeniem, która to czynność zaraz po obfitym deszczu bez wielkiej trudności rękami wykonaną być może.

§ 10. Jeżeliby pomimo to na gruntach ornych znajdowały się w czasie żniw osty szkodliwe w większej ilości, naczelnik gminy względnie przełożony obszaru dworskiego ma baczenie czuwać nad tem, aby po zżęciu lub skoszeniu zboża zostały osty na polu pozostawione i tamże spalone.

W żadnym razie nie wolno pozostające na polu osty wyrzucać na drogi polne, sogłówki lub miedze, gdyż stąd mogłoby nasienie tej szkodliwej rośliny wszędzie być zawleczone przez wozy, którymi zboże z pola bywa zwożone.

Zwraca się uwagę: na rozporz. c. k. namiestn. z d. 17/4 1896 o przymusowem tępieniu myszy polnych, oraz na pouczenie o postępowaniu, jakie należy zastosować przy tępieniu myszy polnych;

na ustawę łowiecką z d. 1/4 1898 (Dz. u. kr. nr 21);

na ustawę z d. 21/12 1874 (Dz. u. kr. nr 10 z r. 1875), wydaną w celu ochrony zwierząt pożytecznych;

na *ustawę o rybołówstwie* z dnia 31/10 1887 (Dz. u. kr. nr 37 z r. 1890);

na przepisy prawne, dotyczące *zbierania i sprzedaży grzybów* (Dz. u. p. nr 250 z r. 1850);

na ustawy i przepisy *w sprawach lasowych* (pat. ces. z dnia 3 grudnia 1852);

na ustawy i rozporządzenia *drogowe* (w opracowaniu M. Lotoszyńskiego, Lwów 1898);

na nową *ustawę budowlaną* dla wsi i miasteczek obowiązującą od 1 stycznia 1908.

na zmianę ustawy z d. 20/6 1888 o ciele od plynów wysokowych pędzonych, o opodatkowaniu *wódki*, jakoteż *wyrobu drożdży*, z wyrobem wódki połączonego. Rozp. ces. z d. 17/7 1899 (Dz. u. p. z 20/7 1899);

na *ustawę* z d. 25/10 1896 (Dz. u. p. nr 220) o *bezpośrednich podatkach osobistych* wraz z rozporz. wykonawczemi (w opracowaniu Fr. Szymusika, Lwów 1897).



»CONFIDENTIA«

Jedyne galicyjskie

**C. k. konces. Biuro informacyjne
i inkasowe**

we Lwowie, ulica Karola Ludwika L. 5 i ulica Sykstuska L. 9

Telefon 914. Konto poczt. kasy oszcz. 74.157

udziela wiarogodnych i dokładnych informacji
o zdolności kredytowej firm i osób prywatnych.

Specjalny dział dla inkasa kupieckiego

(ściągnięcie długów wątpliwych).

PROSPEKTA BEZPŁATNIE I FRANCO.

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH.

1. Przy ratowaniu **wisielców, topielców, porażonych słońcem, zmarzniętych** i t. d. zastosowuje się *sztuczne oddychanie*. Jeśli oddychanie ustaje, t. j. jeśli klatka piersiowa przestaje regularnie się podnosić i opadać, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie i to tak: 1. Położyć chorego poziomo na podłodze lub stole, rozpiąć na nim ubranie i podłożyć mu pod plecy surdut zwinięty w walek; 2. wyciągnąć mu język i przywiązać na brodzie chustką; 3. stanąć z tyłu poza chorym, chwycić go obiema rękami za przedramiona poniżej łokcia i ciągnąć je ku sobie poza głowę chorego tak daleko, aż się jego dłonie zetkną. Następnie odprowadzić ramiona chorego tą samą drogą i przycisnąć je mocno, ale ostrożnie, do obu boków klatki piersiowej. Jeśli jest ktoś do pomocy, uciska podczas sztucznego wydechu brzuch obiema dłońmi, przez co wydech staje się silniejszym. Powtarzać te czynności mniej więcej 15 razy na minutę.

2. **Powieszenie lub uduszenie.** Ostrożnie odciąć wisielca, by nie padł na podłogę, usunąć z ciała stryczek (lub inny przedmiot duszący) i zastosować sztuczne oddychanie. Gdy oddech wraca, rozpiąć ubranie i wynieść na świeże powietrze. Użyć środków drażniących skórę, a mianowicie spryskać lub zmywać twarz zimną wodą, octem, wodą kolońską, dawać amoniak do wachania, nacierać lydki. Gdy do przytomności wraca, podawać rum, koniak, wino, herbatę, kawę i t. d. Gdyby oddechy ustały, znowu rozpocząć sztuczne oddychanie. Nieprzytomnemu nie podawać nic do picia.

3. **Utonięcie.** Rozebrać chorego i wyczyścić mu usta i gardło palcem wskazującym zawiniętym w szmatkę, Ułożyć w poprzek kolan, bić w plecy, by woda wylała się z płuc, zastosować sztuczne oddychanie i nacieranie skóry. Po powrocie do przytomności ciepło przykryć i dać do picia ciepłe napoje, jak herbatę z rumem, kawę, koniak.

4. **Zmarznięcie.** Należy uważać, by zmarzniętego nie przenieść z zimna wprost do ciepła, dalej uważać bardzo przy braniu do ręki kruchych kończyn. Rozebrać na mrozie i nacierać śniegiem lub zimnemi chustami, przenieść do zimnej izby, wykopać w zimnej wodzie; jeśli oddechy ustają, zastosować sztuczne oddychanie, włożyć do zimnego łóżka, dawać zimne napoje n. p. czarną kawę, rum. Po pewnym czasie dopiero przenieść do ciepłego pokoju i podawać ciepłe napoje. Opatrunek ran z odmrożenia jak ran z poparzenia. Nagłe ogrzanie może wywołać natychmiastową śmierć.

5. **Udar słoneczny.** Położyć chorego w cieniu, podeprzeć plecy, zlewać wodą, dawać zimną wodę do picia. Sztuczne oddychanie.

6. **Poparzenie.** Ogarnięty płomieniem nie uciekać, lecz rzucić się na ziemię i tarzać się. Jeśli zobaczysz człowieka w płomieniach, rzucić go na ziemię, przykryj poduszkami, ubraniami, kocami, co masz pod ręką, i tarzać go po ziemi, następnie należy oblać go obficie wodą, ubranie i buty porozcinać, a nie zsuwać, potem opatrzyć go, a mianowicie maścią jodoformową, borową, wazeliną, oliwą, a na to watę i chustkę; w razie potrzeby pęcherze przebić igłą, którą przedtem w ogniu rozżarzone i ostudzone, a następnie daje się na rany opatrunek przeciwnilny. Jeśli brak

opatrunku przeciwnilnego, wystarcza pokryć ranę watą i związać czystą chustką, a nie zanieczyszczać rany mąką, ziemniakami, gliną i t. p. przedmiotami.

7. **Ukąszenie przez psy wściekłe, żmije i t. p.** Przy ukąszeniu przez psy wściekłe lub żmije należy szybko ściągnąć sznurem lub t. p. zranioną część ciała powyżej rany, t. j. między raną a sercem, aby jad nie dostał się do obiegu krwi, nacierać w kierunku od miejsca ściągniętego sznurem ku ranie (by wycisnąć jad), wypalić ranę rozżarzonymi metalami, n. p. gwoździem, drutem lub zapalonem cygarem albo kwasami żrącymi jak siarkowym, azotowym, solnym. Przy ukąszeniu przez żmiję najlepiej wypalić amoniakiem. Po wypaleniu zdjąć opaskę. Podawać napoje wyskokowe. Po ukąszeniu przez owady najlepiej puścić kroplę amoniaku na ranę.

8. **Złamanie kości i zwichnięcie.** Opatrunek tymczasowy: owinąć kończynę miękkimi materjami jak watą, konopiami, trawą, mchem, sianem, szmatami; założyć jedną szynę na wewnątrz, drugą na zewnątrz. Szyny należy wysłać miękkim materiałem; za szyny mogą służyć deszczulki, linie, oprawki z książek, tektura, pudełka, laski, parasole, gałęzie, kora z drzew i t. p.; przywiązać szyny opaskami, chustkami, szpagatem, szelkami i t. p.; ustawić spokojnie złamaną kończynę. Przy zwichnięciach zimne okłady jak i przy złamaniu.

9. **Krwotoki.** Rany nie przemywać, lecz ją silnie ścisnąć. Jeśli to nie wystarcza, przywiązać zwierzchu mocno jakiś naciskający przedmiot (guzik, czysty kamyk). Lub związać około krwawiącej kończyny chustkę, włożyć laskę lub patyk i silnie skrecić. Przy krwotokach z żołądka zimne okłady, spokój, pozycya leżąca.

10. **Rany.** Zatamować przedewszystkiem **krwotok** (patrz Nr. 9). Umyć sobie ręce wodą ciepłą, mydłem i szczotką, następnie płynem przeciwnilnym (antiseptycznym). Oczyścić okolicę rany watą zamoczną w płynie przeciwnilnym. Oblać ranę tymże płynem. Posypać ranę cieniutką warstwą proszku przeciwnilnego (jodoform, dermatol). Pokryć ranę przezworną warstwą gazy przeciwnilnej (jodoformowej, dermatolowej). Nie wolno usuwać skrzepów z ran. Płyny przeciwnilne są: 1% woda lysolowa, 3% woda karbolowa, i $\frac{1}{10}$ woda sublimatowa, od biedy czysta gotowana lub studzienna woda. Nie zanieczyszczać rany. W braku materji przeciwnilnych można użyć zupełnie czystej chustki do pokrycia rany.

11. **Otrucia** Wzbudzać sztucznie wymioty przez lechtanie podniebienia, picie letniej wody z solą, masłem, musztardą. Następnie dawać pić mleko i dawać w razie zatrucia **jadowitemi roślinami** grzybami, morfiną, opium — kawę czarną bardzo mocną. Wstrząsać chorym, by mu nie dawać omdleć. Głowę zlewać zimną wodą. Synapizmy (chrzan, gorczycę) kłaść na serce i żołądek. W razie potrzeby sztuczne oddychanie. **Fosforem** (zapalkami) magnezja palona, stara terpentyna z wodą (nigdy tłuszczel). **Kwasami** soda, potaż, magnezja, woda wapienna.

SPIS RZECZY

CZĘŚCI DRUGIEJ.

Str

Uwagi i wskazówki co do uprawy gleby i roślin	1
Żyzność gleb	2
Mechaniczna uprawa gleby	2
Nawożenie	4
Przeciętny skład chemiczny nawozów	5
Gospodarstwo obornikowe	7
Nawozy zielone	11
Wapnowanie i marglowanie	11
Nawozy pomocnicze	12
Charakterystyka głównych nawozów pomocniczych	14
Przeciętny skład chemiczny produktów gospodarstwa wiejskiego według E. Wolffa	17
Podstawy do oceny nasienia	24
Ilość wysiewu nasion roślin gospodarskich	26
Tabliczka do zamiany ilości wysiewu, itp. na miary polskie i rosyj.	29
Charakterystyka roślin pastewnych i łakowych	30
Ilość roślin potrzebnych do zasadzenia morga austr.	32
Mieszanki pastewne	35
Łąki	39
Co się dzieje z roślinami, które uszkodził grad?	44
Niszczenie chwastów	45
Zapobieganie chorobom roślinnym. Ochrona roślin przed szkodnikami	47
Uwagi i lezby dotyczące hodawli	50
Wartość pokarmowa główniejszych materiałów pastewn.	52
Zawartość składników pokarmowych pasz	66
Normy żywienia	76
Przykłady dawek dziennych	77
Waga rzeźna w stosunku do żywej.	85
Udział poszczegół. części ciała w wadze żywej zwierząt	86
Skład mięsa z różnych części ciała.	86
Grzanie się (latowanie) samiec	87
Kalendarz do obliczania terminów porodu	87
Trwanie ssania przy chowie	89
Wskazówki z zakresu mleczarstwa	90
Zapłata dostawcom za mleko	92
Zufałaszowanie mleka	93
Kalkulacye	98
Oznaczenie wagi bydłęcia za pomocą mierzenia	101
Tablica Presslera	103
Weterynaryja. Odrażanie	104

Środki przeczyszczające	109
> powstrzymujące rozwolnienie	109
Uwagi i daty z adminiŝtr. gosp. wiejsk.	121
> o pomiarze i podziale pól	124
Wskazówki dla obliczania robót	128
Roboty akordowe. Roboty przy burakach	132
> przy ziemniakach	133
Różne prace	133
Zestawienie płacy i wyniaru robót drenaŝskich	134
Ładunek na wóz fornałski	135
Objętość ładunku i wagonu	136
Koszta naprawy i amortyzacyi narzędzi i machin	136
Naprawy, utrzymanie i amortyzacya budynków gosp.	137
Waga 1 m ³	139
Wymiary dróg bitych	140
Uwagi i wskazówki z zakresu gorzelnictwa	141
Ilość paliwa, potrzebna do pędzenia dobrego kotła parow.	142
> wody potrzebna w gorzelni	143
Tablica do obliczenia z ciężaru właściwego suchej substancyi i skrobi w ziemniakach	144
I. Tablica	154
II.	155
III.	156
IV. Tabela porównawcza skali saccharometru Ballinga	157
V.	158
VI.	160
> do obliczania zawartości czystego alkoholu w okowicie	160
Kontrola ruchu gorzelni	161
Raport dzienny gorzelniczy	162
Maszyny i narzędzia rolnicze	165
Budynki gospodarcze	167
Tablica dla obliczania objętości budulca okrągłego	171
Powierzchnia i obwody kół. Kubatura rzniętego materiału drzewnego	172
Wzory do obliczeń powierzchni i objętości	173
Miary i wagi metryczne	174
Tabela porównawcza miar i wag	175
> porównawcza monet obcych	176
Tablica do obliczania % na rok i miesiąc	177
Tablice składanych procentów	178
Najważniejsze wyjątki z ustaw	182
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach	185
Spis rzeczy	187

ZATRUCIA ZWIERZĄT DOMOWYCH

podał prof. Mag. Stanisław Królikowski.

Zatrucia mogą powstać nagle i przebiegać szybko — nazywamy je wtedy ostremi, lub mogą rozwijać się powoli — nazywamy je wtedy przewlekłymi (chronicznymi). I jedno i drugie, gdy środek trujący zaprzestanie być przyjmowanym, — mogą się kończyć wyleczeniem, lecz niejednokrotnie kończą się i w tym razie śmiercią.

Bywają trucizny mineralne i organiczne. Jedne jady działają głównie miejscowo, inne ogólnie, lub jednocześnie i miejscowo i ogólnie.

Leki, których używamy dla zubożenia trucizny, nazywamy odtrutkami (antidota).

Trucizny mineralne.

1) **Alkalia żrące:** ług, amoniak, wapno niegaszone żrące. Otrucenie nimi zdarza się zwykle wtedy, gdy są zadawane do wewnątrz w zbyt wielkiej ilości lub w nienależytem rozcieńczeniu. Objawy: wywołują nadżerki błon śluzowych, oparzenia w pysku i gardle, zapalenie żołądka i kiszek (ślinienie, kolki, rozwolnienie). Zapobieganie: — przy zadawaniu ługu i amoniaku rozcieńczać je dużą ilością wody (amoniak co najmniej 50 częściami zimnej wody). Leczenie: zalewać rozwodnionym octem kuchennym (1:10 wody); tłuszcze (olej lniany, oliwa i t. p.); odwary klejki (z siemienia lnianego, korzenia ślazowego); gdy wystąpi zapaść — wódka w małych a częstych dawkach, mocna kawa.

2) **Antymon (Sb.).** Sól antymonowa zwana emetykiem
 $\frac{K}{(Sb. O)} C_4H_4O_6 + \frac{1}{2}H_2O$. Winian potasowo-antymonowy
Tartarus stibiatus. Objawy: posiada żrące własno-

ści i może stać się powodem otrucia, gdy sól tę zadaje się zwierzęciu nierozpuszczoną, w proszku lub w pigułkach albo w zbyt wielkiej dawce. Wywołuje nadżerki w pysku, żołądku i kiszkiach, silne zapalenie tych narządów; u świń i psów powoduje wymioty. **Zapobieganie:** Nie zadawać emetyku w proszku, przy zadawaniu zaś w pigułkach — pierwszej rozpuścić emetyk w ciepłej wodzie; przy podawaniu go z wodą, jako napoju, nie pierwszej pozwolić zwierzęciu pić go, aż zupełnie się rozpuści i na dnie naczynia proszku białego już nie będzie. Do rozpuszczania emetyku używać naczynia z ciemnym dnem, aby można było łatwo dostrzedz nierozpuszczony proszek. **Leczenie:** garbnik (tanina) lub odwary garbnik zawierające (odwar z kory dębowej, koniom i bydłu 25 do 50.0 na pół litra wody, świniom 5 do 10.0, psom 1 do 5.0 gm); tanina rozpuszczona w wodzie) koniom 5 do 15.0 gm. bydłu 10 do 25.0, świniom 1—2.0, psom 0.1—0.5 gm); mocna kawa, mocna herbata, potem środki kleiste (odwar siemienia lnianego, korzenia ślazowego), białko surowe, mleko, magnezja.

3) **Arsen (As).** Trującymi są różne przetwory arsenu; najczęstszą jednak przyczyną otrucia jest t. z. **biały arszénik, bezwodnik arsenawy, bezwodnik kwasu arsenawego** (As_2O_3). Otrucia nim bywają zwykle spowodowane przez złość, przez zjedzenie trutki na szczury lub lisy, wskutek zadawania do wewnątrz lekarstwa zwanego **roztworem arszénikowym Fowler'a** (Liquor kali arsenicosi). **Objawy:** Działanie arszéniku jest silnie żrące na błony śluzowe: wywołuje on przeto silne zapalenie żołądka i kiszki, wymioty, silną biegunkę; śmierć może nastąpić już wciągu paru godzin. **Zapobieganie:** wystrzegać się obudzać złość ludzka, nie dawać koniom arszéniku w celu nadawania im przed sprzedażą pięknego wyglądu i nie dawać płynu Fowler'a bez dokładnego wskazania ze strony lekarza weterynaryjnego. **Leczenie:** w aptekach znajduje się zawsze gotowa odtrutka zwana «Antidotum Arsenici» (Liquor. Ferri sulfurici oxydati 100 cz., wody 250 cz. Magnesiae ustae 15 cz. rozcieńczonej 250 częściami wody), mieszaninę tę dawać koniom i bydłu po $\frac{1}{4}$ —1 litra

co kwadrans, mniejszym zwierzętom łyżkami lub kieliszkami. Zanim lekarstwo to apteka wyda, zadawać zwykłą paloną magnezję z wodą (bydłu 10—20.0 gm, koniom 5—10.0, dla psów i trzody chlewnej 0.5—2.00 gm). W razie braku powyższych środków, można zadawać tłuczoną siarkę, koperwas żelazny (dla koni i bydła 10—25.0, dla psów i świń 0.1—1.0 gm), wreszcie zalewać zimną wodą, w której kowal studził żelazo, wodę z cukrem, białko, odwary klejkie (lniany i ślazowy) a nie dawać tłuszczów.

4) **Cynk. Siarkan cynku** ($Zn SO_4$). Zincum sulfuricum. Działa podobnie jak sole miedzi i żelaza; **tlenek cynku** ($Zn O$) (Zincum oxydatum, biel cynkowa) używany do robienia białej olejnej farby. Objawy: działa podobnie, lecz jest mniej niebezpieczny niżeli biel ołowio-wa (p. l. 9). Zapobieganie: strzedz od lizania świeżej farby. Leczenie: jak przy solach miedzi, — oprócz tego podawanie do wewnątrz wody ocukrzonej, magnezji palonej (p. l. 8).

5) **Fosfor** (Ph). Zwykły żółty fosfor jest zjadliwą trucizną. Otrucia nim zdarzają się przypadkowo (rozrzucona nieostrożnie trutka na szczury) i przez złośliwość. Objawy: zatrucie charakteryzuje się przez napady kolkowe, wymioty (u świń), silne osłabienie, krwawą biegunkę. Pysk i odchody zwierzęcia otrutego fosforem świecą w ciemności. Zdarzało się, że węglik brano za otrucie fosforem, więc trzeba być ostrożnym przy rozpoznawaniu. Zapobieganie: ostrożne postępowanie z trutką na szczury. Leczenie: proszek sinego kamienia (siarkan miedziowy — koperwas miedziany) (koniowi i bydłeciu 2—10.0 gm, świni 0.5—1.0 gm, psu 0.1—0.5 gm), stary olejek terpentynowy (bydłeciu 25—250.0 gm, koniowi 10—100.00 gm, owcy i świni 5—10.0 gm, psu 0.2—2.0 gm). Nie dawać ani tłuszczów ani mleka, gdyż te przyspieszają wessanie się fosforu!!

6) **Jod** (J.). Zatrucia zdarzają się nalewką jodową (jodyna) t. j. roztworem jodu metalicznego w spirytusie, jodkiem potasowym (kalium jodatum — KJ) i jodoformem (CHJ_3). Objawy: nalewka jodowa działa żrąco, zadana omyłkowo do wewnątrz wywołuje ostro

zapalenie jamy pyskowej, żołądka i kiszek, wymioty, kolki, zatkanie i zapaść (ogólną nieczulość); śmierć może nastąpić już w ciągu kilku godzin. Jodek potasowy wywołuje częściej zatrucia przewlekłe, cechujące się silnem ślinieniem, wypływem z błon śluzowych, wychudnieniem; otrucie nim zdarza się przy zbyt dużych dawkach i zbyt długo zadawanych. Jodoform wywołuje zatrucie najczęściej u psów i kotów, przy zbyt obfitem sypaniu go na świeże, duże, nie mające zabezpieczonego odpływu rany lub gdy zwierzę zlizuje jodoform z rany. Objawy: wywołuje wymioty, krwawą biegunkę, kurcze i zapaść. Leczenie: u świń, psów i kotów dać na wymioty (0.35—1.0 emetyku na 100—150 ciepłej wody, co 10 minut łyżkę do skutku), rzadki, surowy klajster ze skrobi (krochmal) lub maki, łyżeczkami dwuwęglan sodowy (Natrium bicarbonicum — soda proszków szumiących) z wodą.

7) **Kwasy.** Zarówno mineralnego, jak i organicznego pochodzenia kwasy mogą wywołać zatrucie. Z kwasów mineralnych najsilniej działa kwas **siarkowy** (H_2SO_4), słabiej **saletrzan** ($Na H_2O$), jeszcze słabiej **solny** (HCl). Objawy. W stanie steżonym wywołują zniszczenie tkanek organicznych: przełknięte powodują oparzenie jamy pyska, przelyku, żołądka z następowem gwałtownem zapaleniem tych narządów. Zapobieganie: nie dawać kwasów do wewnątrz bez wskazania weterynarza i tylko w stanie silnie rozcieńczonym (1 część kwasu na 100—150 wody). Leczenie polega na szybkim zobojetnieniu i rozcieńczeniu kwasu — należy więc spiesźnie nalać znaczną ilość wody z rozrobionem mydłem, bardzo rozcieńczony ług z popiołu, krede lub magnezye paloną zmieszane z wodą, później środki klejkie (odwar siewienia lnianego, korzenia ślazowego) i oleje (oliwa, olej lniany, masło roztopione lub smalec; podczas zapaści wódka w małych a częstych dawkach).

7a) **Kwas octowy** lub **ocet.** Objawy: wywołuje kolkę, rozwolnienie, osłabienie, odurzenie i zapad. Zapobieganie i leczenie jak przy kwasach mineralnych.

7b) **Kwas karbolowy** (fenol). Otrucie kwasem karbolowym zdarza się zarówno przez zażycie stężonego do wewnątrz jak i przez oblanie nim powierzchni skóry. Mocny, stężony kwas karbolowy może spowodować śmierć nagłą, piorunującą; po wypiciu większej ilości rozcieńzonego kwasu występuje ślinienie, wymioty, rozwolnienie, kolki, mocz jest barwy zielonkawo-brunatnej, występują porażenia mięśni całego ciała, kurecze, zapaść. **Zapobieganie:** pamiętając, iż otrucie może nastąpić i przez oblanie skóry kwasem karbolowym, nie należy go powierzać osobom mało ostrożnym lub nie inteligentnym; do wewnątrz można stosować go tylko według dokładnych wskazówek weterynarza. **Leczenie:** najlepszą odtrutką jest sól glauberska, która tworzy z fenolem połączenie nieszkodliwe. — $\frac{1}{2}$ — 1% roztwór wodny nadmanganianu potasowego (kali hypermanganicum), woda mydlana; podczas zapaści wódka, wdychanie eteru i podawanie go z wódką, lub kawa czarna do wewnątrz.

8) **Miedź i żelazo** (Cu_1Fe). Zdarzają się otrucia solami tych metali, w szczególności siarkanem miedziowym (CuSO_4 , Cuprum sulfuricum, koperwas miedziowy, siny kamień) i siarkanem żelazowym (FeSO_4 , Ferrum sulfuricum, koperwas żelazny). **Objawy:** sole te działają żrąco i wywołują silne zapalenie żołądka i kiszek; wymiociny, które zwierzę oddaje, zabarwione są na niebiesko (siarkan miedziowy) lub zielono (siarkan żelazowy). **Zapobieganie:** nie dawać tych środków jako leków bez porady lekarza weterynaryjnego; nie gotować karmy w kotłach miedzianych, z których zesza pobiała. **Leczenie:** białko z jaj, odwary klejki (Iniany, ślazowy), klej stolarski, mleko, magnezyna palona — wszystkie w dużych ilościach i powtarzać w krótkich odstępach czasu (co kwadrans); cukier gronowy i mleczny, opilki żelazne; unikać tłuszczów, zwłaszcza zgorzkniałych.

9) **Ołów** (Pb). Najmniejsze nawet ilości ołowiu są dla ustroju szkodliwe. Zatrucia ołowiem następują skutkiem zlizywania farb ołowianych (minia — PbO_4 — czerwień ołowiowa; bleiweis — PbCO_3 — biel ołowio-

wa) lub t. n. cukru ołowiowego (octan ołowiowy $Pb(C_2H_3O_2)$) używanego do pudrowania chorych miejsc na skórze lub do okładów. Ołowiane rury wodociągowe mogą być przyczyną ciężkiego zatrucia, jeżeli prowadzą wodę bardzo miękką, lub gdy przez część dnia nie są wypełnione wodą. Objawy: zatruciom ostrym towarzyszą objawy zapalenia żołądka i kiszek, ślinienie, wymioty, bolesność brzucha, kolki, zatkanie, zatrzymanie moczu, u bydła wzdecie; drgania mięśni, kurcze, niedowład mięśni; przy przewlekłym zatruciu — zatkanie, kolki, wycieńczenie, poronienie, owrzodzenie w pysku. Zapobieganie: nie wprowadzać zwierząt do stajen, których ściany były świeżo olejno malowane na biało, lub gdy użyta była czerwona miniowa farba, zapobiedz lizaniu maści ołowiowych i proszków przeciw odparzeniom a zawierających sole ołowiane, wody gulardowej i t. d. Leczenie: sole siarczane np. sól glauberska (siarczan sodowy) sól gorzka (siarczan magnezyi), środki wymiotne, białko z jaj, odwary klejkie (z lnu, korzenia ślazowego), mleko; wreszcie, w braku tych, zadać garbnik lub środki go zawierające (odwar kory dębowej, mocną kawę, herbatę).

10) **Rtęć** (Hg). Jej sole (sublimat, jodek rtęci i t. d.) szczególnie zjadliwie działają na bydło rogate, mniej na konie, jeszcze mniej na świnię. U bydłęcia wtarcie 50 gm szarej maści (Unguentum cinereum, maść rtęciowa) może spowodować śmierć, — to też maści szarej z zasady u bydła rogatego się nie stosuje. Objawy: przy otruciu szarą maścią występuje silne świerzbiecie skóry, szczególnie w miejscach smarowanych nią, chęć do lizania tych miejsc, silne ślinienie, smrodliwy wpływ z nosa, rozwolnienie z cuchnącymi odchodami, ogólna słabość, drżenie mięśni, odurzenie. Choroba trwa kilka (ostry przebieg), kilkanaście a nawet kilkadziesiąt dni (przewlekły przebieg), Sublimat rtęciowy (Hg. Cl₂, dwuchlorek rtęci) dwujodek rtęci (Hg J₂) działają na tkanki organiczne żrąco; otrucia nimi zdarzają się jużto wskutek zlizywania maści, jużto przez niewłaściwe użycie ich do wewnątrz. (Z pastylkami sublimatowemi trzeba być bardzo ostrożnym, gdyż wyglądając jak cukierki,

łatwo mogą stać się powodem otrucia u ludzi). Z apobieganie: nie używać roztworu sublimatu do przemywań pochwy, do ławatyw; — przy stosowaniu maści szarej lub z soli rteciowych uwiązać zwierzę krótko, aby nie mogło lizać miejsc nasmarowanych. Leczenie: opilki żelazne i siarka sproszkowana, razem lub oddzielnie, garściami; jaja, mleko w dużych ilościach; nie dawać wcale soli kuchennej.

11) **Sód i potas** (Natrium — Na, kalium — K.). Zdarzają się zatrucia solami tych metaloidów:

11a) **Sól kuchenna** (Natrium muriaticum Na Cl). Objawy: zapalenie żołądka i kiszek, wymioty (u świń i psów), kolki, biegunka, ogólne osłabienie, odurzenie, niedowład tyłu, drżenie mięśni, drgawki. Zatrucie zdarza się albo skutkiem zbyt obfitego zlania karmi ropą solną, albo wrzucenia do żłoba dużej ilości soli zwierzęciu, które do niej nie było przyzwyczajone. Z apobieganie: zaczynać zadawanie soli od małych ilości i nie przekraczać granicy. Leczenie: duże ilości wody, odwary klejkie; gdy występuje odurzenie i zapad — dawać wódkę w małych ilościach lecz często (koniom i bydłu 50–1500 gm świniom 20–50.0, psom 5–15.0).

11b) **Sól Glauberska** (Na_2SO_4 , Natrium sulfuricum. Siarkan sodowy). Objawy. Działa jak sól kuchenna. Z apobieganie. Nie przekraczać w zadawaniu jej maksymalnych dawek, które wynoszą na raz dla bydła 250–500.0, dla świń 25–50.0, dla psów 10–250 gm. Leczenie: jak przy otruciu solą kuchenną.

11c) **Saletra** KNO_3 , Kali nitricum — Azotan potasowy) i NaNO_3 — Azotan sodowy (Natrium nitricum). Objawy: ślinienie, zapalenie kiszek i żołądka, (wymioty, kolki, rozwolnienie, wzdęcie u bydła), ogólna słabość, drżenie mięśni, porażenie serca. Z apobieganie: chować worki po saletrze, aby zwierzęta nie mogły ich lizać, nie prowadzić owiec przez pola saletrowane. Leczenie: do wewnątrz odwary klejkie (z białego siemienia lub korzenia ślazowego), białko surowe z jaj; gdy wystąpi zapaść — wódka w małych ilościach a często, mocna kawa.

11d) **Kainit** (K_2SO_4 Mg SO_4 Mg Cl_2 + 6H₂O). Objawy:

wywołuje podobne skutki jak saletra; zatrucie nim, zdarzające się najczęściej u owiec, w podobnych następuje warunkach. Zapobieganie i leczenie jak przy saletrze (P. l. 11c).

12) **Strychnina**, $C_{20}H_{22}NO$ $\begin{matrix} \diagup \text{CO} \\ \diagdown \text{N} \end{matrix}$ 1. Gwałtowną tę tru-

ciznę otrzymuje się z owocu rośliny *Strychnos nux vomica* (wronie oko). Otrucia mogą powstać przy nieostrożnem stosowaniu trucizny strychninowej na lisy i szczury. Objawy: gwałtowne wyprężające kurcze mięśni całego ciała. Śmierć może nastąpić już po kilku minutach. Trzoda chlewna i mięsożerne są czulsze na tę truciznę niż roślinożerne. Zapobieganie: ostrożność przy użyciu trucizny ze strychniny. Leczenie: garbnik, odwary kory dębowej, czarna kawa, mocny napar herbaty; chloralhydrat i wdychania chloroformu. Dwa ostatnie środki wydadzą z apteki tylko na zlecenie weterynarza.

13) **Żelazo p. Miedź**, l. 8.

Gazy trujące.

Gazy rzadko stają się powodem zatrucia u zwierząt i to zawsze w zamkniętem stanowisku; przypisywanie trujących własności gazom i mgłom miejscowości błotnistych sprowadza się do zakażeń drobnoustrojami chorotwórczymi; nie mamy tu więc wcale do czynienia z otruciami gazem.

Najdzielniejszym środkiem ratunku osobników zatrutych gazami jest dostarczenie im świeżego powietrza, a gdy już zwierzęta przestały oddychać, urządzenie sztucznego oddechania, które to ostatnie daje się ze skutkiem zastosować tylko u małych zwierząt a polega na przemian na rozchylaniu energicznem nóg przednich i uciskaniu brzucha (rozchylanie nóg wprowadza do płuc powietrze, naciskanie na brzuch wyprowadza je).

Bezwodnik węglowy i amoniak, które obficie w zadusznych stajniach stale przepełniają powietrze, należy uważać za szkodliwe, gdyż spowodowują

choroby, zwykle przewlekłego charakteru, gwałtownie trującymi gazami, którymi zatrucia już się u zwierząt zdarzały, są:

14) **Tlenek węgla** (CO). Nagromadzać się może w stajni podczas tlenia się w niej wilgotnej słomy i in. przedmiotów. Otrucie łatwo występuje, jeżeli wprowadzi się zbyt wczesnie zwierzęta do stajni po częściowym jej pożarze, lub tam, gdzie się umieściło siano lub słomę uratowane z pogorzeli a przeniknięte dymem. Zaczadzenie się gazem świetlnym w stajniach nim oświetlanych, zdarzało się już, choć rzadko, a to wskutek niezatkania palników lub nieszczelności rur gazowych. Objawy: rozszerzenie źrenic, przyśpieszenie oddechu, kończące się uduszeniem, mierna gorączka; śluzawica sucha, wypływ śluzowy z nosa; drżenie na całym ciele, osłabienie, odurzenie, poronienie. Zapobieganie: wynika ze sposobu, w jaki zatrucie może nastąpić. Leczenie: polega na dostarczeniu świeżego powietrza, wyniesieniu zwierzęcia ze stajni pod gołe niebo, poroztwieraniu w stajni na przestrzał drzwi i okien; zlewanie głowy zimną wodą, rozcieranie ciała, wdychanie (na chwilę) amoniaku; gdy zwierzę może jeszcze przelykać, zadawanie czarnej kawy, garbniku, odwarów zawierających garbnik (kora dębowa).

15) **Chlor** (Cl). Zatrucia zdarzają się przy użyciu tego gazu dla odkażenia stajen, gdy uskuteczniamy je podczas bytności zwierząt w stanowiskach lub gdy do stajni odkażonej chlorem a jeszcze nie przewietrzonej, wprowadzi się zwierzęta. Objawy: już przy mieszce 0.04–0.06% chloru do powietrza wywołuje groźne dla życia objawy, mianowicie ostre, wybroczynowe zapalenie płuc i obrzęk płuc; łzawienie z ócz i silny kaszel występują zaraz po wprowadzeniu zwierzęcia w atmosferę chlorem nasyconą. Zapobieganie: tylko po bardzo dokładnem, przynajmniej 24 godzinnem przewietrzeniu stajni, odkażonej chlorem, można wprowadzać do niej zwierzęta. Leczenie: wyprowadzenie zwierzęcia na wolne powietrze.

16) **Formaldehyd** (HC HO). W handlu znajduje się jako 35% roztwór w wodzie i znany jest pod nazwą

formalu lub formaliny. Używa się dla odkażania stajen. Dotychczas zatrucia tym gazem nie zdarzały się, ponieważ jednak dla odkażania coraz szersze zyskuje upowszechnienie, przeto należy się wystrzegać go, gdyż może być szkodliwym. Zapobieganie i leczenie jak przy zatruciu chlorem (l. 15).

Zatrucia roślinami.

Zatrucia roślinami zdarzają się najczęściej na pastwisku, mogą jednak mieć miejsce i w stajni. Rośliny trujące działają, na różne gatunki zwierząt, nie zawsze z jednakową siłą, nadto jedne z nich działają miejscowo drażniaco na błonę śluzową kanału pokarmowego, wywołując ostre jego zapalenie, inne działają głównie na narząd płciowo moczowy, jeszcze inne na narząd nerwowy, inne wreszcie wywołują całą grupę objawów ze strony kilku na raz narządów a nawet całego ustroju. Roślin trujących jest tak ogromna ilość gatunków, że tu tylko wyliczymy te, które najczęściej powodują otrucie.

Rośliny trujące, działające drażniaco na błony śluzowe pyska, żołądka i kiszek.

Gryzione wywołują palenie w pysku i obfite ślinienie — przełknięte sprowadzają bole żołądka i kiszek, kolki, wzdecie, wymioty u świni, niekiedy u koni, silne rozwolnienie, nawet krwawą biegunkę. W następstwie mogą się przyłączyć i objawy ze strony narządu nerwowego i gorączka. Tutaj należą:

17) **Buk** (*Fagus silvatica*). Istota trująca «fagina» znajduje się w ziarnach bukowych, więc i w wytłokach buczynowych. Najczulsze na nie są konie, u których powodują kolki, często śmiertelne: pół kg makuchów bukowych wystarcza do zabicia konia; kolkom towarzyszą kurcze, potem niedowład. Bydło jest znacznie mniej czule na buczynę, świnię znoszą ją bezkarnie. Śmierć może nastąpić już po paru godzinach. Leczenie: zasada się na dawaniu garbnika (taniny) lub mocnego odwaru kory dębowej lub kawy.

18) **Bukszpan** (*Buxus sempervivens*). P. niżej, l. 74.

19) **Ciemierzycza** (*Veratrum, album, viride, nigrum, sabadilla*). Istota, działająca «weratryna». Objawy: wymioty, ślinienie, podniecenie, kurcze, bezwład. Leczenie: odwary klejkie i garbnik.

20) **Cis** (*Taxus baccata*). P. niżej l. 77.

21) **Chrzan** (*Cochlearia arnorica*). Objawy: zapalenie żołądka, biegunka, ogólna słabość, kurcze. Leczenie: odwary klejkie.

22) **Ciemiernik** (*Helleborus niger, viridis, foetidus*). Istota działająca «helleboryna». Objawy: wymioty, (u świń) kolka, krwawa biegunka, odurzenie, osłabienie, kurcze. Leczenie: garbnik i odwary garbnik zawierające (kora dębowa), czarna kawa, przy osłabieniu kamfora.

23) **Gorczycznik** drobnokwiatowy (*Erysimum cheiranthoides*) i gorczyca świerzopa (*Sinapis arvensis*). Objawy: kolka, kataru kiszek, zapalenie kiszek, które występuje szczególnie u jagniąt. Olejek gorczyczny, otrzymany z nasion tej rośliny, wywołuje zapalenie żołądka i kiszek, z zatkaniem, rozwolnieniem, krwawymi odchodami, nadto objawy podrażnienia serca i mózgu, poronienie, wreszcie ogólną słabość i ociężałość. Istotą działającą jest «erysymina» glikozyd, łatwo rozpuszczalny w wodzie i alkoholu. Leczenie: odwary klejkie.

24) **Jaskry** (*Ranunculus sceleratus, R. acer, R. arvensis* i inne mniej szkodliwe). **Zawilce** (*Z. sasanka, Anemone pulsatilla* i *Zawilec łąkowy A. pratensis*). Istotą działającą jest t. zw. olejek jaskrowy i olejek zawilcowy, znajdujące się w rosnących i świeżo ściętych jaskrach i zawilcach, a rozpadające się po wysuszeniu roślin. Zatem w sianie rośliny te mogą być spasane bezkarnie, nawet w wielkich ilościach. Na pastwisku zwierzęta nie wygłodniałe instynktowo je omijają. Objawy: ślinienie, kolki, zapalenie żołądka i kiszek, wymioty, rozwolnienie, pędzenie na mocz, niekiedy obecność krwi w mleku. Leczenie: odwary klejkie, odwar z kory dębowej, garbnik, czarna kawa.

25) **Iglaste rośliny**. Patrz niżej l. 56.

26) **Kąkol** (*Agrostemma Githago*). Istota działająca

«gitagina» mieści się w ziarnach. Najslabiej działa na świnie, które przyuczone z początku małymi dawkami ziarn kakolu, mogą znosić go dość łatwo, jednakże w ilościach umiarkowanych. Placki wypiekane z mąki, zawierającej przymieszkę kakolu znacznie mniej są szkodliwe, niż mąka surowa. Objawy: ślinienie, wymioty, kolki, biegunka, osłabienie, kurcze, niedowład. Leczenie: zmiana karmi, odwary klejkie, środki rozwalniające (w razie zatkania), podczas osłabienia — czarna kawa, wódka w małych ilościach.

27) **Knieć błotna** (*Caltha palustris*). Botanicznie bliska jaskrowatym (p. l. 24), zawiera istotę drażniącą w działaniu podobna do olejku zawilcowego. Objawy i leczenie p. l. 24.

28) **Koniczyna** *Tripholium* i choroba koniczynowa p. l. 49.

29) **Len siewny** (*Linum usitatissimum*). Objawy: u bydła rogatego i u świń objawy kolkowe, wzdęcie, biegunka i odurzenie. Przyczyna działania nieznana, ponieważ szczególniej szkodzi len wyrwany i źle zebrany — jest więc prawdopodobieństwo działania czynników zakaźnych. Leczenie: łagodne środki przeczyszczające (oleje), odwar kory dębowej, garbnik. Len przeczyszczający (*L. catharticum*) zawiera w ziele swem «lininę», istotę gorzką, szkodliwie działającą.

30) **Łubin** (*Lupinum*). Choroba łubinowa, p. l. ...

31) **Mak polny** (*Papaver rhoeas*). Działają tu liczne szkodliwe składniki. Zatrucie następuje zwykle na pastwisku, gdy źle wyrosły jęczmień lub żyto spasa się; także przy karmieniu koniczyną, gdy ta zawiera wielką ilość maku. Objawy: ślinienie, kolki, wzdęcie, biegunka, krwawe odchody, u bydła występują nadto objawy szału. Leczenie: garbnik, odwar dębowy, czarna kawa. Gdy występuje upadek sił i zapasć: wódka w małych, a częstych dawkach.

32) **Naparstnica** (*Digitalis*). Istotę trującą stanowi «digitalina» i «digitoksyna» mieszcząca się w całym ziele. Objawy: ślinienie, wymioty, kolki, rozwolnienie; z początku obfite moczenie, później zatrzymanie

moczu; bezwład dolnej wargi, kurcze; obok tego działa jako silny jad sercowy. Leczenie: odwar kory dębowej, garbnik, klejkie, spokój.

33) **Narcyz** (*Narcissus poeticus* et *N. pseudonarcissus*). Zatrucie występowało u bydła i świń. Objawy: silne zapalenie żołądka i kiszek, słabość, następnie objawy nerwowe. Leczenie: odwary klejkie, garbnik lub odwar z kory dębowej.

34) **Oleander** (*Nerium Oleander*). Substancją trującą jest glikozyd «*Oleander-digitalina*». Widziano zatrucie u koni i bydła; 30—40 zjedzonych liści wystarcza do zatrucia. Objawy: ślinienie, kolki, biegunka, wzdęcie, drżenie mięśni, kurcze, osłabienie, zapaść. Leczenie: odwary klejkie, a podczas zapaści małe lecz częste dawki wódki, czarnej kawy.

35) **Óstromlecze** (*Euphorbiaceae*). *O. piłkowany*, (*E. helioscopia*). Istota szkodliwa znajduje się w całej roślinie, zarówno w świeżej jak i wysuszonej; trujący szczególnie dla bydła, mniej dla koni, dość słabo działa na owce i kozy. Objawy: ślinienie, bolesność gardła, kolki, wzdęcie, zatkanie, biegunka (niekiedy z krwią), krwawy mocz, odurzenie. Leczenie: odwary klejkie, opium.

36) **Rzepak** (*Brassica Napus*) i **gorczyca świerzopa** (*Sinapis arvensis*) skarmione w dużych ilościach, zwłaszcza w pierwszym kwiecie, wywołują wzdęcie, kolki, biegunkę szczególnie u jagniąt. Makucho rzepakowe zawierają szkodliwe glikozydy, z których wytwarza się olejek gorzyczyny, szkodliwie działający na konie, szczególnie młode, na bydło, wywołując już to ostre zapalenie żołądka i kiszek, krwawy mocz, poronienia, lub przewlekłe niezłyty jelit. Leczenie: odwary klejkie, zimne okłady na lędźwie, zmiana karmi!

37) **Rzodkiew łopucha** (*Raphanus Raphanistrum*) — p. jak l. 23.

38) **Szczyr trwał** (*Mercurialis perennis*) i **S. roczny** (*M. annua*) — działają jak l. 23. Szczególnie młode konie są nań czule; dla świń wprawdzie nie jest trujący, jednak źle działa na ich zdrowie.

39) **Tojad** (*Aconitum Napellus*). P. niżej l.

40. **Tytoń** (*Nicotiana tabacum*). P. niżej l. 91.
41. **Wilcza jagoda** (*Atropa Belladonna*). P. niżej l. 92.
42. **Zawilec** (*Anemone pulsatilla*). P. l. 24.
43. **Z. łakowy** (*A. pratensis*). Istota szkodliwa mieści się w całym ziele. Objawy: kolki, wzdęcie, krwawa biegunka, mocz krwawy, poronienie. Leczenie: zmiana karmi! Odwary klejkie, okłady zimne na lędźwie.
- 44) **Zimowit** (*Colchicum autumnale*). Istoty trujące to «kolchicyna» i «kolchiceina», znajdują się w całym ziele, w kwiatach i w nasieniu. Otrucia zdarzają się zwykle w lecie. Kozy mogą zjadać bezkarnie bardzo dużo zimowita, lecz pomimo to mleko ich może być trującym dla ludzi, zwłaszcza dla dzieci. Bydło rогate również mało jest wrażliwe. Objawy: wymioty, kolki, wzdęcie, krwawa biegunka, krwawy mocz, bezmocz, odurzenie, osłabienie ogólne, drgawki. Leczenie: odwary klejkie, garbnik lub odwary garbnik zawierające (z kory dębowej).

Rośliny pasorzytnicze, działające wybitnie miejscowo na narząd pokarmowy.

Należą one do najniższych tworów roślinnych, pasorzytują na roślinach pastewnych i wraz z nimi spasionie, działają szkodliwie w rozmaity sposób: a) same przez się mogą zwierzęciu nie szkodzić, ale przez przyspieszenie gnicia paszy (grzybki zarazy kartoflowej), b) wydzielają pierwiastki trujące, t. zw. toksalbuminy i t. p., c) zawierają we własnym swym fizyologicznym składzie istoty trujące — alkaloidy (np. sporysz). Wszystkie one wywołują, między innymi, zapalenie błony śluzowej pyska, żołądka i jelit tak nazwane pleśniowe, mykotyczne. Objawy: często już w pysku występują opryszczenia, wskutek drażniącego działania tych pasorzytów, zjawiają się objawy kolkowe, wzdęcie, zatkanie, później ciężkie biegunki, moczzenie krwią, poronienie, nieczułość, bezwład, śmierć. **Zapobieganie:** przeszkadzanie rozmnażaniu się grzybków, usuwanie ich z karmi przez wytrząsanie, lub wymłacanie słomy i siana, szufłowanie ziarna, sparzanie ukropem, gotowanie.

45) **Grzybnicowate zatrucie.** Istotami działającymi są składniki i wytwory chemiczne różnego rodzaju pleśni i bakteryj; noszą one chemiczne nazwy «ptomain, toksyn, sepsyn, jądów trupich, jądów metabolicznych» i t. d. Wprowadzone już gotowe do żołądka wraz z karmią, np. u mięsożernych i trzody chlewnej, z mięsem zepsutem (zatrucie mięsne), z kielbasą (zatrucie kielbasiane — botulismus), z rybami, u roślinożernych wraz ze zbutwiałą przez zimę trawą, z zepsutem, spleśniałym sianem, bobikiem, chlebem, makuchami i t. d. Objawy: choroba występuje nagle, bardzo prędko po przyjęciu pokarmu i przebiega szybko albo kończąc się śmiercią, albo prędkim wyzdrowieniem i tem głównie zatrucie gotowymi jadami różni się od zakażenia temi samymi pleśniami i bakteriami, przez które jady są wytworzone, (zakażenia dają powód do chorób o różnym czasie trwania — krótko lub długotrwałych).

U mięsożernych i trzody chlewnej występują: gwałtowna, często krwawa biegunka, w innych wypadkach zatkanie, wymioty, wysoka gorączka, bóle w brzuchu, wielkie osłabienie, opadanie powiek, obwisanie warg, skoszenie oczu, rozszerzenie źrenic, kurcze, zapaść. Leczenie: energiczne przeczyszczenie (kalomel — dla świni 1–4 gm, psu 0·03–0·1, dla kota 0·03–0·1 gm) duże dozy oleju rycynowego, podczas zapaści czarna kawa, wódka, wino, kamfora.

U roślinożernych: choroba występuje nagle, utrata apetytu, silne zatkanie lub gwałtowna biegunka, odchody cuchnące, często krwawe, bolesność brzucha, objawy kolkowe, często wzdęcie; bicie serca, ciężki i częsty oddech; gorączka, ogólne osłabienie, ogłuszenie, niedowłady mięśni. Leczenie: energiczne przeczyszczenie nawet przy biegunce, najlepiej kalomel (koniowi 2–8·0, bydłociu 1–5·0 gr.), potentylgarbnik, czarna kawa, przy zapaści — wódka, czarna kawa, kamfora.

46) **Czerń rzepakowa** (*Pleospora Napi*), pojawia się w postaci czarnego pyłu na różnych odmianach rzepaku. Objawy: ślinienie, opryszczenie w pysku, zaczerwienienie błony śluzowej nosa i łącznicy oka

opryszczenie szpary międzyrącznej u bydła, — stać podobieństwo do zarazy pyska i racie (pryszczycyca) zapalenie żołądka i kiszek, krwawy mocz, niedowład tylnej części ciała. Leczenie: przemywanie pyska odwarami klejkimi, i zmywanie 2% kwasem bornym wypryszczenie między rączkami zalewać 3% roztworem wodnym kreoliny lub siarkanu miedzi.

47) **Rdza trawna** (*Puccinia graminis*), napastująca zboża i inne trawy. Objawy: u koni, które zjadły owies nią pokryty wywołuje kolkę, biegunkę, kurcze bezwładność; u mięsożernych i królików wywołuje obraz zatrucia zepsutem mięsem. Leczenie: środki przeczyszczające j. t.: olej lniany, kleszczowinowy (rycinowy), sól glauberska. Zmiana karmi. Owies pokryty rdzą dobrze przesiać.

48) **Rdza trzcinowa** (*P. arundinacea*), wywołuje u bydła ostre zapalenie żołądka i kiszek z krwawą biegunką. Objawy i leczenie jak l. 47.

48) **Rdza koniczynowa** (*Uromyces trifolii* v. *U. apiculatus*), wywołuje zespół objawów zwanych «chorobą koniczynową». Choroba ta powstaje wskutek wyłącznego karmienia koniczyną, mianowicie szwedzką (*Trifolium hybridum*), częściej u koni rzadziej u bydła. Przyczyna choroby zdaje się leżeć nie w koniczynie lecz w pasorzytce na niej rosnącym, t. j. w rdzy koniczynowej. Objawy: zapalenie błony śluzowej pyska, wrzody na niej i w kątach ust; na skórze głowy i nóg w miejscach pokrytych białą sierścią tworzą się bolesne wrzodziki, które pokrywają się suchym strupami obumarłej skóry; żółtaczką: napady kolek osłabienie, senność, ciążoty, napady szału, konwulsje, odurzenie, porażenie, oślepienie; u koni przebieg zwykle gwałtowny i kończy się śmiercią. Leczenie: konieczne zaprzestanie dawania szkodzącej koniczyny, zresztą leczenie stosowne do objawów — a zwykle zawodne: Owrzodzenia leczy się środkami odkażającymi (1% roztwór lysolu, 2% roztwór kreoliny); środki przeczyszczające, spokój.

50) **Rdza grochowa** (*U. pisi*), **R. końskiego zębu**. (*U. apiculatus*), **R. lucerny** (*U. striatus*), **R. łubinowa** (*U. lupini*) jak l. 47.

51. **Rdza mączna na trawach** (*Erysiphe graminis*). Objawy: kolki, wzdęcia, zatkanie, biegunka, krwawy mocz, poronienie. Leczenie: jak l. 49.

52) **Śniec pyłkowa** cz. głównia (*Ustilago Carbo*), rosnąca na zbożach i innych trawach, przedstawia się w postaci czarnego pyłku pokrywającego kwiatostan, łodygę i liście. Dużo znaleźć jej można w mące, otrębach, zgoninach i na sianie. Najszkodliwsze gatunki są: *S. kamienna* cz. murz pszeniczny (*Tillecia laevis*, *T. caries*) i *S. ziarnowa żyta* (*T. secalis* z *U. secalis*). Objawy i leczenie: jak l. 49

53) **Sporyszowa choroba**. Powstaje wskutek przymieszki do karmi — sporyszu (*secale cornutum*) t. j. przetrwałek pleśniaka — bulawinki szkarłatnej (*Claviceps purpurea*), rosnącego głównie na żytcie, rzadziej na owsie, pszenicy, jęczmieniu i innych trawach. Najobficiej zawierają sporysz zgoniny, często, przez oszukaństwo, w mące pastewnej. Istotami działającymi są: kwas ergotynowy, kwas sfacelinowy i kornutina. Objawy. Zatrucie zdarza się w dwóch postaciach — ostrej i przewlekłej. — Zatrucie ostre: ślinienie, wymioty, kolki, biegunka, owrzodzenie w pysku, poronienie, odurzenie, nieczulość, niedowład, kurcze mięśni. Zatruciu chronicznemu mogą towarzyszyć takie same objawy, a nadto jeszcze powstaje obumarcie (uschnienie) uszu, ogona, dolnych części kończyn. Leczenie: zgonin, zawierających dużo sporyszu, nie skarmiać, mąkę podejrzaną dać do rozbioru chemicznego; energiczne środki przeczyszczające (kalomel), garbnik.

Jako środki zapobiegawcze rozmnożeniu się grzyba zalecają siał zboże naprzemian z sadzeniem okopowych; łąki, na których trawach rośnie szporysz, kosić, zanim trawy zakwitną; drenowanie gruntów.

54) **Zaraza kartofli** (*Phytophthora infestans*). Grzybek sam przez się, zdaje się, niewinny, lecz sprzyja gniciu kartofli, które właśnie wtedy działają trująco. Objawy: zaburzenie w trawieniu szczególnie u prosiąt. Zapobieganie: kartofle spasać wcześniej, zanim się gnicie rozpocznie, lub też, gdy to możebne, pozwolić ziemniakom zaraz z początku zimy dobrze

zamarznąć w dołach, i z zamarzniętych już brać codziennie odpowiednią ilość, szybko odtajać, zgotować i skarmić. Leczenie: środki przeczyszczające, garbnik.

Rośliny trujące, działające na narządy moczopłciowe.

Rośliny te najwybitniej działają na narządy moczopłciowe, wywołując ich zapalenie, jakkolwiek i inne narządy od nich cierpią. Objawy: zwiększona ilość moczu, mocz krwawy, następnie bezmocz, bardzo często zaraz z samego początku występuje poronienie. Zapobieganie: zależy na zmianie karmi lub pozbawieniu jej istot działających szkodliwie, — okładach chłodnych na lędźwie, i zadawaniu do wewnątrz odwarów klejkich.

55) **Gorczycznik** (*Erysimum heiranthoides*), P. l. 23.

56) **Iglaste rośliny** i wogóle rośliny smoliste, zawierające w sobie wiele olejku terpentynowego lub dużo garbniku; szczególnie szkodzą pączki i młode pędy tych drzew, zwłaszcza na wiosnę, gdy zwierzęta mało znajdują innej karmi na pastwisku. Tutaj należą: sosna, świerk, jodła, jałowiec, sawina, brzoza, olcha i in. Stąd choroba, z zatrucia istotami smolistymi powstała, nazywają «leśną», zwią ją też «krwawym moczem».

Trzeba tu jednak zwrócić uwagę, że w ostatnich latach odkryto, iż jedną z wielu przyczyn krwawego moczu mogą być zarazki zwane «Piroplasma», które zaszczepiają się bydłu za pośrednictwem znanych, pasorzytujących na bydło, kleszczy (*Ixodes*), przyczem powstaje ciężka, w wielkiej ilości wypadków śmiertelna choroba, w przebiegu swym bardzo podobna do choroby leśnej. Badanie krwi może specjalistę przekonać, iż w danym wypadku z tem właśnie zarażeniem mamy do czynienia. Objawy: z początku występują głównie zaburzenia w narządzie trawienia: kolki, zatkanie, biegunka, często krwawa, później wielomocz, mocz krwawy, bezmocz, poronienie, osłabienie. Leczenie: przede wszystkim zupełne usunięcie szkodliwej karmi; podkarmianie

w domu, co czyni zwierzę wybredniejszem na karmę pastwiskową, (podkarmianie otrębami pszennemi); odwary klejkie lub zawierające garbnik, zimne okłady na lędźwie.

57) **Jaskier** (*Ranunculus*). P. l. 24.

58) **Knieć błotna** (*Caltha palustris*). P. l. 27.

59) **Naparstnica** (*Digitalis*). P. l. 32.

60) **Rzepak** (*Brassica Napus*). P. l. 36.

61) **Rzodkiew łopucha** (*Raphanum Raphanistrum*). P. l. 36.

62) **Sawina**, jałowiec sabina (*Juniperus savina*). Istotą działającą jest olejek lotny, zawarty w całej roślinie. Objawy: miejscowo drażni błony śluzowe, ślinienie, krwawa biegunka, moczenie krwią, poronienie, kurcze, nieprzytomność. Leczenie: u świni dać na wymioty (weratryna, emetyk), odwary klejkie, okłady zimne na lędźwie i brzuch.

63) **Szczyr trwały** (*Mercurialis perennis*). P. l. 38.

64) **Zawilec łąkowy i sasanka** (*Anemone pratensis*, *A. pulsatilla*). P. l. 24.

65) **Ziemowit** (*Colchicum autumnale*). P. l. 44.

Rośliny pasorzytnicze, działające na narząd płciowo-moczowy.

66) **Rdza koniczynowa** (*Uromyces trifolii*). P. wyżej l. 49.

67) **Rdza mączna** (*Erysiphe graminis*). P. wyżej l. 51.

68) **Śnieć pyłkowa** (*Ustilago carbo*). P. wyżej l. 52.

69) **Sporysz** (*Secale cornutum*) P. l. 53.

Rośliny trujące, działające na narządy nerwowe.

70) **Akacja biała** (*Robinia pseudoacacia*). Istota trująca znajduje się w liściach (głównie); zdarzały się zatrucia u koni i bydła. Objawy: w pysku wywołuje zapalenie błony śluzowej, zatkanie, słabość tyłu aż do zupełnego bezwładu nóg tylnych. Leczenie: środki przeczyszczające, garbnik, czarna kawa.

71) **Bielun dziedzierzawa** (*Datura stramonium*). Istotą działającą — alkaloid «daturyna», znajduje się w ca-

łej roślinie, nie wyłączając nasion. Objawy: u koni wzdęcie, kolki, napady szału. Leczenie: środki przeczyszczające, garbnik, czarna kawa.

72) **Blekot v. lulek** (*Hyoscyamus niger*). Istotą działającą «alkaloidy», «hyoscyamina» i «skopolamina», znajdują się w całej roślinie. Otrucia na pastwiskach zdarzają się rzadko, gdyż zwierzęta mają wstret do blekotu; w sianie równie szkodliwy, jak w świeżej roślinie. Objawy: rozszerzenie źrenic, zaburzenie w działalności serca, względnie do ilości spożytej trucizny, napady szału, senność. Leczenie: p. l. 71.

73) **Buk** (*Fagus*). Kurcze, niedowład. P. l. 17.

74) **Bukszpan** (*Buxus sempervivens*). Istoty działające: «buksyna», «parabuksyna», «buksynina» i «parabuksynina», są alkaloidami. Objawy: rozwolnienie, zawrót głowy, ogłuszenie, odurzenie, drgawki. Leczenie: garbnik.

75) **Ciemniak** (*Helleborus niger, viridis, foetidus*). Objawy: odurzenie, kurcze. P. l. 22.

76) **Ciemierzycza** (*Veratrum album*). Objawy: podniecenie, kurcze. P. l. 19.

77) **Cis pospolity** (*Taxus baccata*). Istota trująca mieści się w igłach i jagodach. Objawy: przy zatruciu ostrem, do którego wystarcza dla koni 250 gm igieł, występują: odurzenie, drgawki, śmierć (już nawet w ciągu godziny); gdy sprawa się przewleka, powstaje zapalenie żołądka i kiszek. Leczenie: przy ostrem otruciu zwykle bez dodatniego wyniku — czarna kawa; przy przewlekających się objawach — środki przeczyszczające.

78) **Łubinowa choroba** powstaje wskutek spasanania łubinu, szczególnie żółtego. Istota trująca «lupinotoksyna v. «iktrogen», mieści się we wszystkich częściach rośliny, także w ziarnach. Suszenie jej nie niszczy. Chorują przeważnie owce, lecz także kozy; świnie, bydło i konie. Objawy: zmniejszone łaknienie, gorączka, żółtaczka, osłabienie, nieprawidłowe ruchy głową, opieranie jej o przedmioty, poruszanie zuchwą, kurcz mięśni zuchwowych, zatkanie, mocz jest żółtej barwy, oddechanie utrudnione, wychudnie-

nie, upadek sił, śmierć między drugim, a trzecim dniem. Leczenie; przede wszystkim zapobieganie przez tak nazwane odgoryczenie łubinu, środki oczyszczające (olej lniany, drożdże, a nie dawać soli glauberskiej); podtrzymanie sił przez pilne karmienie; nie dawać żadnych środków o zasadowym odczynie (alkalicznym) szczególnie wody alkalicznej (zasady przyspieszają rozpuszczenie się łupinotoksyny, więc sprzyjają jej wessaniu); wodę zakwaszać kwasem solnym.

Odgoryczanie łubinu dokonać można różnymi sposobami. Odgoryczanie ziarna:

I. Parogodzinne parzenie w parniku pod ciśnieniem trzech atmosfer, poniżej 140° C.

II. Sposób Kellner'a; a) moczyć w wodzie przez dobę, b) godzinę parować w parniku, c) moczyć w wodzie przez 48 godzin.

III. Sposób Schürra i Löhnerta: a) gotowanie b) moczenie w wodzie.

IV. Sposób Schürra: a) gotowanie, b) moczenie w koszach w rzece przez 48 godzin.

V. Sposób Löhnerta; a) wsypanie do wrzącej wody i gotowanie przez $1\frac{1}{2}$ godziny w zamkniętych naczyniach (3 cz. wody na 1 cz. ziarn), b) zanurzenie koszów z ziarnami w rzece na 10 godzin, c) suszenie przy $30-45^{\circ}$ R. Dla polepszenia smaku dodać 1 kg soli kuchennej na 1 cetnar metr. ziarn.

VI. Sposób Seelinga: a) namoczenie wodą gorącą z dodatkiem (jeśli naczynia pierwszy raz do tego użyto) trochy zakwasu chlebowego, b) po 10 godzinach ziarno odcedzić, przemyć czystą wodą i nalać wodę na całą noc, c) gotować w parowniku przez 3 kwadransy, d) odcedzić i nalać świeżą wodą z dodatkiem soli kuchennej (5 gm na litr wody), e) gotować w tem $1\frac{1}{2}$ g., f) odcedzić, g) przemyć, h) gniotownik, i) posypać taką samą ilością soli i spasać.

VII. Dr Graf rozpoczyna fermentację zaraz po pierwszym przemyciu wodą; soli nie dodaje.

VIII. Sposób Simpson'a; łubin niebieski: a) na 1 q. łubinu daje 5 kl kwasu solnego (33—34%), 112 gm soli amoniackiej i 10 litrów wody, b) przeraabia łopatą aż do wessania płynu, c) nalewa wodą aż

ponad łubin, *d)* znowu przerabianie aż do wessania wody i powtarza to zalewanie póki ziarno wodę ssie, *e)* pozostawienie w spokoju na 2 $\frac{1}{2}$ g., *f)* przepłukanie ziarna, nalanie wodą i dodanie 1 $\frac{1}{2}$ kg dwuwęglanu sodu, *g)* spokój na 24 g., *h)* zcedzenie, przemycie wodą i zalanie wodą na 24 g., *i)* wypłukać, zgnieść i spasać. Można suszyć i srurowany dawać. Łubin żółty: bierze się 6 kg kwasu solnego, 100 gm soli amoniackiej i 12 litrów wody na tę samą ilość łubinu.

Siano łubinowe wylugowuje się na deszczu układając je w niewielkie kupki.

79) **Kartofel** (*Solanum tuberosum*). P. niżej: Psianka l. 31.

80) **Mak polny** (*Papaver rhoeas*). Objawy: szal. P. l. 31.

81) **Naparstnica** (*Digitalis*). Objawy: zaburzenia w działalności serca, kurcze, niedowład... P. l. 32.

82) **Narcyz** (*Narcissus poeticus*). Objawy: odurzenie, ogólna słabość, drgawki, kurcze. P. l. 33.

83) **Oleander** (*Nerium Oleander*). Objawy: drżenie mięśni, osłabienie, kurcze, zapasć... P. l. 34.

84) **Pietrasznik plamisty** (*Conium maculatum*). Istotami działającymi są «koniiny» bardzo różnego składu, które mieszczą się we wszystkich częściach rośliny. Objawy: jagnięta są silnie wrażliwe na te trucizne, — dość wrażliwe są konie, mniej bydło: ślinienie, nudności, wymioty, rozwolnienie; odurzenie, ogluszenie, niedowład, rozszerzenie źrenic, drgawki, zapasć. Leczenie: garbnik, a gdy zapasć — kamfora.

85) **Psianka — słodkogorz**. (*Solanum dulcamare*). Rzadko wywołuje otrucie; szkodzi bydłu i świniom.

86) **Psianka ziemniak** (*Solanum tuberosum*). Istotą trującą jest solanina, mieszcząca się w owocach ziemniaka, w łodygach nie zawierających zieleni (ziemniaków wyrosłych w ciemności), w bulwach ziemniaczanych tuż pod łuską, wreszcie wewnątrz ziemniaków w czarnych plamach i to w dużej ilości gdy ziemniaki długo leżały w piwnicy. Roślina szkodliwa tylko w pewnych warunkach: w niektórych latach szkodliwe są ziemniaki (bulwy), gdyż wywołują t. z. grudę brązaną u bydła, także szkodzą bulwy ziemniaczane wyrosnięte

w kopcach. W tych ostatnich ziemniakach istotą trującą jest glikozyd — «solanina», która szkodzi bydłu, kozom, kurom... Objawy: wymioty u świń, zapalenie żołądka i kiszek, napady szału, odurzenie, drgawki, niedowład kończyn. Leczenie: Przedewszystkiem ważne jest zapobieganie zatruciu, przez usuwanie karmi zawierającej solaninę. Przeciwno ostrym otruciom podawać do wewnątrz garbnik, czarną kawę. Przy zapaleniu żołądka i kiszek — odwary klejkie i łagodne środki przeczyszczające — (oleje, sól Glauberska). Grude brązową należy leczyć zewnętrznymi środkami (puder złożony z bieli cynkowej 1 cz., alunu i kredy po 5 cz.).

87) **Skrzypowa choroba** wywołana zostaje przez różne gatunki skrzypów (*Equisetum*, *arvense*, *palustre*, *limosum*, *hiemale*). Istota trująca, która jest alkaloid «ekwisetyna» nie znajduje się stale w jednej i tej samej ilości, nawet w tym samym gatunku skrzypu, — stąd raz on jest więcej drugi raz mniej jadowity. Objawy: choroba występuje już to nagle już to powoli i trwa 2 do 8 dni, niekiedy kilka tygodni; chód niepewny, chwiejny, odurzenie, niedowład tylnej części ciała, utrata czucia, śpiączka. Leczenie: pastwisko i siano zawierające wiele skrzypów należy wypróbować na jadowitość, karmić niem z początku zwierzęta mało warte; w danym razie konieczne zmiana karmi; środki przeczyszczające: podniecające (czarna kawa, kamfora).

88) **Szale jadowity** (*Cicuta virosa*). Istota trująca «cykutoksyna» mieści się w całej roślinie, najobficiej jednak w korzeniu; szkodliwa dla wszystkich gatunków zwierząt. Objawy: brak łaknienia, kolki, wzdęcie, odurzenie, rozszerzenie źrenic, bicie serca, kurcze mięśni szczęk i kończyn, śmierć. Leczenie: Energetyczne środki przeczyszczające, potem odwary klejkie, odwary z kory dębowej garbnik, czarna kawa.

89) **Szczodrzenica** (*Cytisus*). Istota działająca «cytisina» znajduje się w całej tej pięknie kwitnącej roślinie, zdobiącej powszechnie ogrody nasze. Objawy: ślinienie, nudności, wymioty u świń, wzdęcie, kolki, biegunka; rozszerzenie źrenic, senność, niedowład

szczególnej kończyn przednich (u bydła), odurzenie, kurcze. Leczenie: środki wymiotne (u świń), garbnik.

90) **Tojad** (*Aconitum Napellus*). Istota trująca — alkaloid «akonityna», znajduje się w całej roślinie. Najczęściej podlegają zatruciu: bydło rogate, owce, kozy na górskich pastwiskach. Objawy: zapalenie błony śluzowej pyska, ślinienie, ciagoty, odbijanie, wymioty, zgrzytanie zębami, jęki, zatkanie lub biegunka, kolki, wzdęcie, zaprzestanie wydzielania się mleka; rozszerzenie źrenic, odurzenie, drżenie, drgawki, kurcze, zapaść. Leczenie: środki wymiotne, (u świń) przeczyszczenie, garbnik; przy zapaści — kamfora,

91) **Tytuń** (*Nicotiana Tabacum*). Istotą trującą jest alkaloid — «nikotyina», która działa zabójczo na wszystkie zwierzęta domowe. Zatrucia na pastwisku zdarzają się rzadko (zjadanie trawy, na której suszono tytoń); najczęściej zatrucia powstawały przy stosowaniu tytoniu jako leku, w postaci odwaru czy to wewnętrznie w postaci lewatyw, czy to zewnętrznie przy zmywaniach skóry, przeciwko pasorzytom i t. d. Objawy: odbijanie się, ślinienie, wymioty (u świń), kolki, wzdęcie, biegunka, duszność, bicie serca, drżenie ciała, porażenie, kurcze, ośpienie, odurzenie, śmierć. Leczenie: garbnik, czarna kawa.

92) **Wilcza jagoda** (*Atropa Belladonna*). Istota trująca, alkaloid «atropina», znajduje się we wszystkich częściach tej rośliny i w jagodach. Objawy: drgawki, kurcze, napady szału, rozszerzenie źrenicy, wzdęcie, kolki. Leczenie: środki wymiotne (u świń), przeczyszczające, garbnik, odwar kory dębowej.

93) **Zimowit** (*Colchicum autumnale*). Odurzenie, nieprzytomność, drgawki. P. l. 44.

Rośliny pasorzytne.

94) **Czerń rzepakowa** (*Pleospora Napi*). P. l. 46.

95) **Rdza trawna** (*Puccinia graminis*). Objawy: kurcze, niedowład i t. d. P. l. 47.

96) **Rdza trzciniowa** (*Puccinia arundinacea*) P. l. 48.

97) **Śnieć pyłkowa** (*Ustilago carbo*). Objawy: odu-

rzenie, chwianie się na nogach, niedowład różnych części ciała i t. d. P. 1. 52.

98) **Sporysz** (*Secale cornutum*). Objawy: ogólne osłabienie, kurcze. P. 1. 53.

Jady zwierzęce.

99) **Ukąszenia przez żmije** (*Vipera*). Jad żmij jest zabójczy dla wszystkich naszych zwierząt domowych, świnie jednak znoszą go najłatwiej. Objawy: po ukąszeniu zjawia się znaczny obrzęk rozszerzający się coraz bardziej i na coraz dalsze przestrzenie. Wkrótce występuje odurzenie, niepokój, dreszcze, chwiejność w zadzie, niedowład. Leczenie: jeżeli zwierzę ukąszone zostało w kończynę lub w wargę — należy przewiązać ją mocno rurką gumową lub grubym sznurkiem ponad miejscem ukąszenia, aby przeszkodzić prędkiemu wysaniu się jadu, lecz nie na dłużej jak na pół godziny; postawienie na miejscu ukąszonym bańki, aby jad został wyssany; przemycie dokładne ranki wodą chlorową (*Aqua chlori*) lub roztworem wapna chlorowego, wodą Javella (*Liquor kali hypochlorosi*), 3% wodnym roztworem nadmanganianu potasowego (*Kalium hypermanganicum*), 3% dwuchromianem potasowym (*Kalium bichromicum*), amoniakiem, nalewką jodową, przypalić ranę głęboko rozpalonym żelazem, kwasem solnym, a to w celu zniszczenia w ranie jadu. Do wewnątrz zadawać środki podniecające j. t.: wódkę w małych a częstych dawkach, czarną kawę.

100) **Kantarydy** (*Litta vesicatoria* — Mucha hiszpańska). Istotą działającą jest «kantarydyna». Starte na proszek kantarydy używają się do maści ostrych; zwierzę, zlizując miejsca nią nasmarowane, rozprowadza maść w swym pysku i połyka. Objawy: nadżerki w pysku (oparzenie pyska), ślinienie, wymioty, kolki, biegunka, często krwawy mocz, osłabienie, chwiejny chód, drgawki. Zapobieganie: zwierzę, które smarowano maścią kantarydową krótko uwiązać, aby nie mogło sięgnąć językiem do miejsca nią pokrytego; do wewnątrz nie zadawać ani samych kantaryd, ani nalewki z nich bez wskazówki wetery-

narza. Leczenie: odwary klejkie (z siemienia lnianego, korzenia ślazowego), białko z jaj; nie dawać żadnych tłuszczów, gdyż te ułatwiają zatrucie.

101) **Pokąsania od pszczoł.** Zdarzają się zwykle podczas pożarów, od os przy przypadkowym rozoraniu gniazda. Groźne objawy rzadko kiedy występują po ukąszeniach tych, zdarzyć się jednak może zaduszenie, jeżeli pokąsaną zostanie okolica noźdrzy i pyska, — a to wskutek znacznego obrzęku; w miejscach ukąszenia może powstać obumarcie skóry; — z objawów ogólnych występuje odurzenie, niepewność chodu, nawet niedowład, mocz krwawy. Leczenie: zmywanie miejsc ukąszonych amoniakiem, okłady z octu i kwasnej wody (woda Burow'a), z gliny.

102) **Pokąsania przez muchy i komary** — mogą spowodować ciężkie objawy chorobowe nawet śmierć; czynnikiem działającym jednak, jest w tych razach nie jad chemiczny lecz jakiś zakaźnik, który zanieczyszczony owad przez ukąszenie zaszczepia i powoduje chorobę np. węglik, posocznice. Zapobieganie: trupy zwierząt padłych na choroby zaraźliwe głęboko zakopywać a miejsca, na których leżały, zlewać mocnymi środkami odkażającymi (5% kwas karbolowy, 1% roztwór sublimatu i t. d.) lub, gdy można, wypalić to miejsce słomą. Leczenie: ranę wymyć jednym z powyższych, mocnym środkiem odkażającym lub wypalić rozpalonem żelazem.

103) **Pokąsanie przez zwierzęta wściekłe.** Szkodliwość jego polega nie na wprowadzeniu do ranki jadu chemicznego, lecz zakaźnika wścieklizny. Zapobieganie: szczególne ostrożności zachować względem psów przybłąkanych; pilnie zwracać uwagę na zachowanie się psów i w razie jakiegokolwiek zmiany w nich poradzić się weterynarza. Leczenie miejscowe jak przy l. 102. Leczenie ogólne nie daje wyników dodatnich. Ludzi pokąsanych przez zwierzęta wściekłe po opatrzeniu ranek jak l. 102, odesłać do jednego z Instytutów szczepień pasterowskich, które są w Warszawie, Wilnie, Krakowie.

Dawki i sposób użycia środków wskazanych przy powyższych otruciach.

(Dawki podane są w gramach lub litrach).

Alkohol. W postaci spirytusu rozcieńczonego do połowy wodą, wódki, z dodatkiem $\frac{1}{3}$ wody, piwa mocnego, wina, zadaje się jako środek podniecający przy wielkiem osłabieniu i zapaści, w dawkach małych, ale częstych.

Dawka:	koń i bydło:	cielęta, owce:	świnie:
Czysty spirytus	25—50 gr.	5—10 gr.	10—20 gr.
Wódka	50—150	20—50	25—75
Wino	$\frac{1}{2}$ —1 l.	$\frac{1}{4}$ l.	$\frac{1}{4}$ l.
Piwo	2—3 l.	$\frac{1}{2}$ l.	$\frac{1}{2}$ l.

Amoniak (Ammonium liquidum). Do wdychiwania, jako środek podniecający przy omdleniach, także przy zaczadzeniu i zatruciu gazem świetlnym; do wewnątrz jako silnie podniecający przy gwałtownych osłabieniach; jako środek zobojętniający przy zatruciu kwasami. Zadaje się tylko w znacznem rozcieńczeniu (1 część amoniaku na 50 części wody ciepłej).

Dawka:	konie:	bydło:	cielęta i owce:	świnie:
	8—15	10—30	1—2	1—2

Antidotum Arsenici. Odtrutka na arsenik; znajduje się gotowa w aptekach.

Dawka:	konie i bydło:	świnie, cielęta i owce:
	$\frac{1}{4}$ l. co kwadrans	2 łyżki co kwadrans.

Białko jajeczne. Zewnętrznie przy oparzeniach żrącymi środkami; wewnętrznie daje się w stanie surowym, oddzielone od żółtka, z butelki; przy zatruciach preparatami rtęciowymi, ołowiem i solami żrącymi metali.

Dawka stosuje się do ilości połkniętej trucizny, nadmiar białka nie szkodzi.

Chloralhydrat (Chloralum hydratum). Daje się roztworzony w wodzie lub odwarze lnianym przy otruciach strychniną i innych truciznach wywołujących drgawki.

Dawka:	konie i bydło:	świnie, cielęta i owce:
	25—100 gr.	5—10 gr.

Ciemierzycza (korzeń ciemierzycy — Radix Veratri albi). Patrz «Weratryna».

Cukier (Saccharum) mleczny *S. lactis*), zadaje się w postaci wody ocukrzonej przy otruciach solami cynku i miedzi.

Dawka w górę dowolna, stosuje się do ilości przyjętej trucizny; nadmiar nie szkodzi.

Dwuwęglan sodowy (Natrium bicarbonicum). Stosuje się przy otruciach kwasami, jodem i jodoformem, rozpuszczony w wodzie.

Dawka: konie: bydło: cielęta: świnie i owce:
 25—50 50—100 2—5 5—10

Emetyk (Tartarus stibiatus). Środek wymiotny uświń w wypadku zatrucia, przy którym spodziewamy się, że trucizna znajduje się jeszcze w żołądku. Dawać zupełnie rozpuszczonym w 50-cio krotnej ilości wody.

Dawka dla świni 1—2 gm.

Eter (Aether sulfuricus) Do wdychiwań przy omdleniach, do wewnątrz przy gwałtownem osłabieniu i przy zapaści z potrójną ilością spirytusu i trocha ciepłej wody.

Dawka: konie i bydło: cielęta, owce i świnie:
 10—25 5—10

Garbnik (Tanina, Acidum tannicum). Odtrutka na alkaloidy lub na rośliny alkaloidy zawierające, na sole metali i na emetyk, z którymi tworzy trudno rozpuszczalne połączenia. Stosuje się w postaci proszku rozpuszczonego w wodzie. Zawiera się on w dużej ilości w korze dębowej, w kawie, w herbacie, których odwary można stosować w braku garbniku.

Dawka: konie: bydło: cielęta i owce: świnie:
 5—15 10—20 2—5 1—2

(Dawki kory dębowej, kawy i herbaty, patrz niżej).

Herbata (*Thea chinensis*). Stosuje się w tych samych wypadkach, co garbnik, pod postacią przeciągniętego (mocnego) naparu: konie i bydło: cielęta owce i świnie:

30—100 10—20

Jaja kurze. — patrz — «Białko z jaj».

Kawa (*Coffea arabica*) Palone ziarna kawy stosuje się w tych samych wypadkach co garbnik. Dawka dwa razy większa jak herbaty.

Kalomel (Hydrargyrum chloratum mite). Stosuje się jako środek przeczyszczający — działający szybko.

Koniom zadaje się jednorazowo w pigułkach, lub powidelkach i w postaci lekkiego ciasta z mąki zrobionej wodą; bydłu i owcom w cieście; świńom zrobiony syropem cukrowym.

Dawka: konie: bydło: cielęta i owce: świnie:
2—8 1—5 0.25—0.5 1—4

Kamfora (Camphora) przy wielkim upadku sił, przy zapasce — rozpuszczona w spirytusie, jako spirytus kamforowy.

Dawka: konie i bydło: cielęta, owce i świnie:
1—5 0.5—2

Klajster ze skrobi (krochmal) i z mąki. Zadaje się przygotowany na surowo przy zatruciach jodem i preparatami jod zawierającymi, — dawka dowolnie duża.

Klejkie odwary: przy zatruciach środkami silnie drażniącymi miejscowo. Używa się do ich robienia: siemę lniane (p. w.) i korzeń ślazowy (p. w.), w ich braku otręby pszenne, krupy jęczmienne, owies. Gotowanie z 10—20 krotną ilością wody trwać winno około pół godziny. Przed zadaniem precedzić. Dawka dowolnie duża.

Klej stolarski rozpuszczony w 50-cio krotnej ilości wody daje się w tychże wypadkach, co odwary klejkie; dawka dowolnie duża.

Kora dębowa (Cortex Quercus) patrz — «Garbnik».

Krochmal. Patrz «klajster ze skrobi».

Kwas solny rozcieńczony (Acidum hydrochloricum dilutum). Jako środek zobojętniający działanie środków zasadniczych (alkalicznych). Stosuje się stokrotnie rozcieńczony wodą.

Dawka: konie: bydło: cielęta, owce i świnie:
10—20 15—30 1—5

Lniane siemę (Semen Lini). Stosuje się w postaci odwaru tam, gdzie «klejkie odwary»; należy gotować je nie tłuczone przez 1/2 godziny z 20 krotną ilością wody. **Dawka:** konie i bydło: owce: świnie:

50—100 25—50 10—25

Ług z popiołu, bardzo słaby (garstka popiołu na litr gorącej wody), jest odtrutką na kwasy, a to dla tego, że je zobojętnia; zamiast ługu z popiołu, lepiej będzie (gdy ma się pod ręką) potas gryzący (Kalium

causticum) rozpuszczony w wodzie, (1 część potasu na 100 cz. wody).

Dawka. Ilość tych roztworów winna być ustosunkowana do ilości przelkniętego kwasu i mniej więcej 50 razy od niej większa.

Magnezya palona (Magnesia usta) i **węglan magnezyi** (M. carbonica). Odtrutka na kwasy, na arszenik, na sole, miedź i żelazo. Zadaje się rozkluconą z wodą.

Dawka: konie i bydło: cielęta i owce: świnie:
10—25 5—10 2—5

Mąka pszena, żytnia, kartoflana, działa i stosuje się jak «klajster» (p. w.).

Mleko stosuje się przy otruciach związkami rtęci, arsenu i innych metali i wszędzie tam, gdzie stosuje się białko z jaj. Nie dawać mleka przy zatruciach fosforem i kantarydami. Zadawać je ciepłe w wielkich ilościach.

Mydło zwykle i **mydło szare** (Sapo kalinus) rozpuszczone w 10 krotnej ilości wody przy otruciach kwasami mineralnymi i fenolem (kwas karbolowy).

Dawka: konie i bydło: cielęta i owce: świnie:
50—100 10—25 3—5

Nadmanganian potasowy (Kalium hypermanganicum). W $\frac{1}{2}$ —1% roztworze wodnym, stosuje się przy otruciach solami żelaza, kwasem siarczanym, kwasem karbolowym. Okładły na miejsce ukąszone przez żmiję.

Dawka. Ilość soli manganowej winna być kilkakroć (3—5) razy większą od ilości trucizny.

Ocet kuchenny (Acetum) i **kwas octowy** (Acidum aceticum). Przy otruciach zasadami (alkaliami) gryzącymi, rozcieńczony trzykrotną ilością wody.

Dawka octu kuchennego:

konie i bydło: cielęta, owce i świnie:
100—200 25 50

Ilość kwasu octowego winna być dziesięć razy mniejsza, a zadana w 50-cio krotnej ilości wody.

Odtrutka przeciw arszenikowi — patrz «Antidotum Arsenici».

Odvary klejkie — patrz «Lniane siemę». Odvary zawierające garbnik — patrz «Garbnik».

Olej lniany. Przy zatruciach solami metali, gryzą-

cemi zasadami i kwasami i jako środek przeczyszczający.

Dawka: konie: bydło: cielęta i owce: świnię:
100—500 500—1000 50—250 50—100

Olej rącznikowy cz. rycinowy (Oleum Ricini) — Użycie i dawka: jak olej lniany.

Olejek terpentynowy (Oleum Terebinthinae) jest odtrutką na fosfor, powinien być jednak do tego celu starym. Daje się go zmieszany z jakimś odwarem klejkim, z gęstą gumą arabską lub z klajstrem mącznym (ale nie z tłuszczami).

Dawka: konie: bydło: cielęta, i owce: świnię:
10—100 25—250 5—25 5—10

Oliwa. Stosuje się jak olej lniany.

Opilki żelazne (Limatura Ferri). Odtrutka na arsenik i sole metali (miedź!). Zadają się zarobione z mąką z siemienia lnianego na rzadkie powidelka lub gęsty płyn.

Dawka: konie i bydło: cielęta, owce i świnię:
1—5 0.5—1

Siarka (Sulfur). Przy otruciach związkami metali — daje się w postaci proszku skłuczonego z odwarem klejkim, gumą arabską lub z wodą.

Dawka: konie i bydło: cielęta, owce i świnię:
2—5 0.5—1

Siarkan miedziowy (Cuprum sulfuricum). Przy otruciach fosforem, a u świń jako środek wymiotny. Daje się w 50-cio krotnem rozcieńczeniu wodą.

Dawka: konie i bydło: cielęta, owce i świnię:
2—10 0.1—0.0
(jako wymiotny) — 0.5—1.0

Siarkan żelazny (koperwas żelazny, Ferrum sulfuricum). Odtrutka na arsenik (w razie braku pewniejszych środków). Zadaje się w 50-cio krotnem rozcieńczeniu wodą.

Dawka: konie i bydło: cielęta, owce i świnię:
10—25 0.1—1

Skrobia. — Patrz «klajster».

Slazowy korzeń (Radix Altheae). Patrz «Odvary klejkie». Stosuje się jako nastój (1 na 20 cz. wody).

Dawka: konie i bydło: cieleta, owce i świnie:
50 250 10 -50

Sól glauberska (Natrium sulfuricum). Odtrutka na kwas karbolowy i jako środek przeczyszczający. Daje się z butelki, rozpuszczoną w wodzie.

Dawka: konie: bydło: cieleta i owce: świnie:
250—500 500—1000 50—100 25—50

Sól gorzka (Magnesia sulfurica). — Stosuje się jako środek przeczyszczający. **Dawka:** jak soli glauberskiej.

Sól kuchenna (Natrium chloratum). Odtrutka na lapis (azotan srebrowy), i jako środek wymiotny (dla świń). Zadaje się w roztworze wodnym.

Dawka: konie: bydło: cieleta i owce: świnie:
25—50 50—100 2—10 1—2
(jako wymiotny) — — — 10—50

Weratryna (Veratrinum) i korzeń ciemierzycy. (Radix Veratri albi) daje się dla świń jako środek wymiotny.

Dawka — weratryny 0·02—0·03 z wódką
ciemierzycy 0·5—2·0 w wodnym odwarze.

Wódka. — Patrz — «alkohol».

Żalatyna. — Patrz — «klej stolarski».

Zelazne opilki. — Patrz — «opilki żelazne».

wacy budynku, natenczas budynek zawalony zostanie przez Zarząd dóbr wydzierżawiającego przesypanym, względnie nanowo wymurowanym i urządzonym, w wymiarach zawalonego budynku, na wyłączny koszt W. dzierżawcy. W obydwóch wypadkach W. dzierżawca nie może sobie rościć do wydzierżawiającego jakiegokolwiek pretensyi, jeżeli musi się obejść dłuższy czas bez dotyczącego budynku. Jeżeli W. p. dzierżawca żąda przesypania, względnie na nowo wymurowania budynku, ponieważ twierdzi, że budynek z powodu starości albo elementarnego wypadku, nie kwalifikuje się już do reparacyi, albo do utrzymania za pomocą podstemplowania i t. p., a Zarząd dóbr wydzierżawiającego ma uzasadnione przekonanie, że stan budynku nie jest jeszcze tak groźny, i da się jeszcze utrzymać, natenczas komisya fachowa, składająca się z trzech członków, a mianowicie: dwóch rzeczoznawców wybranych i powołanych, jeden ze strony W. dzierżawcy, drugi ze strony Zarządu dóbr wydzierżawiającego, oraz przez tych dwóch wybrany i powołany superarbiter, mają sprawę rozstrzygnąć, a wyrokowi tejże komisyi obie strony mają się poddać bezwarunkowo.

11. W. p. dzierżawca obowiązuje się przez cały czas trwania niniejszej dzierżawy uiszczać w kasie prowentowej w co rok równocześnie z zaplaceniem raty lipcowej premię asekuracyjną od ognia za policą Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych ubezpieczeń po straceniu dywidendy (zwrotu) za ostatni rok, albo jeżeli będzie istnieć własna asekuracja wydzierżawiającego, tejże według dotychczasowej wysokości premii, stosunkowo do wartości pojedynczych budynków i urządzeń tychże, a to starych budynków w wartości takiej, w jakiej dotąd zostały asekurowane, nowych zaś budynków w wartości kosztów ich postawienia, i to na cały rok z góry. Gdyby asekurowany budynek, lub urządzenie tegoż pogorzwały nie z winy W. p. dzierżawcy albo jego domowników i sług, natenczas Zarząd dóbr wydzierżawiającego, w możliwie krótkim czasie, taki budynek i takie same urządzenie dostarczyć obowiązany będzie.

W. p. dzierżawca zaś niema żadnego prawa do jakichkolwiek pretensyi o wynagrodzenie szkody, mogącej powstać przez to, że wydzierżawiający — z przyczyn dziś przewidzieć się nie dających — nie podolał dostarczyć nowego budynku, albo urządzenia w czasie, gdy W. p. dzierżawca tegoż wymagać będzie. Stanowi się przytem, że W. dzierżawca ma prawo do żądania obejrzenia dotyczących polic przy zaplaceniu premii w lipcu każdego roku, a Zarząd dóbr wydzierżawiającego ma obowiązek temuż żądaniu uczynić zadość — jeżeli ubezpieczenie nie zostało uskutecznione we własnej asekuracyi. W razie zaś skonstatowania pożaru z winy W. dzierżawcy, albo tegoż domowników i sług odpowiada tenże za szkody swą kaucyą i całym swym majątkiem. Wymiatanie raz na miesiąc wszystkich kominów jest obowiązkiem W-go dzierżawcy, zaniechanie zaś tego stanowić będzie powód przypisania winy możliwego pożaru W. dzierżawcy.

12. W. dzierżawca będzie obowiązany w roku expiracyjnym, albo też w razie rozwiązania kontraktu niniejszego, pod kontrolą delegowanej do tej czynności przez Zarząd dóbr wydzierżawiającego, osoby, obsiać czystem i zdrowem ziarnem, takiej samej ilości zasiewy, jakie według inwentarza zasiewów z dniago 19..... odebrał i oborniki wszystkie, jakie do dnia expiracyi, lub też rozwiązania niniejszego kontraktu w folwarku i stajniach znajdować się będą, na pole wyznaczone przez Zarząd dóbr wydzierżawiającego wywieść, starannie rozrzucić i podorać — a to w tej ilości na każde pole, w jakiej ten Zarząd dóbr żądać tego będzie. Wydzierżawiający zastrzega sobie wyraźnie prawo wyznaczenia miejsca i jakości uprawy pod zasiew ozimy i jary w roku expiracyjnym, albo też przy rozwiązaniu niniejszego kontraktu, czemu, gdyby się W. dzierżawca sprzeciwił, Zarząd dóbr w uczyni to na koszt kaucyi W. p. dzierżawcy, a W. dzierżawca już dziś z góry zrzeka się wszelkich zarzutów co do wysokości kosztów w rachunkach Zarządu dóbr wydzierżawiającego policzonych, — mających zupełną moc

dowodową przeciw W. dzierżawcy. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo, — jeżeli to za potrzebne uzna — robienia własnym kosztem większych zasiewów, tak ozimych, jak i jarych w roku ekspiracyjnym lub przy rozwiązaniu niniejszego kontraktu, a również prawo wyboru pola pod tenże. Siew ozimy ma być ukończony w roku ekspiracyjnym, albo przy rozwiązaniu niniejszego kontraktu, najdalej do końca września, a siew jary nie później, niż to skarb

na folwarkach we własnej administracyi uskutecznia. Waga jednego hektolitru ziarna na zasiew przeznaczanego wynosić ma najmniej tyle kilogramów, ile spis inwentarza z dnia go

19 — wykazuje. Zasiewy, w ostatnim roku dzierżawy wykonane, obowiązuje się W. p. dzierżawca pielęgnować i chronić od wszelkich szkód tak, jak gdyby je miał sam jeszcze zbierać, a przedewszystkiem nie wolno w roku ekspiracyjnym W. dzierżawcy pędzić koni albo bydła, celem paszenia na zasłanych parcelach, albo innym pasć dozwolić. Wydzierżawiający zastrzega sobie, ażeby W. dzierżawca ani urzędnikom skarbowym ani innym z Zarządu dóbr w

organom, przeznaczonym na nadzorowanie rzeczonych pól, nie tylko w tem nadzorowaniu żadnej tamy nie kładł, lecz owszem tychże, wszelką materialną i moralną pomocą, wspierał. Tak samo przechodzą w ostatnim roku łąki i pola zasiane koniczyną albo inną paszą, pod wyłączny nadzór organów zarządu dóbr

albo nowego dzierżawcy. Również nie może W. dzierżawca wzbraniać wydzierżawiającemu lub nowemu dzierżawcy prowadzenia robót wiosennych w polach, jak to plewienia, ogartywania i pielęgnowania plodów polnych i różnych robót w polach obsianych, obsadzonych albo i nieuprawionych, kośby traw na łąkach i zbioru koniczyny i innych pasz na polach, jakie należą już w roku ekspiracyjnym do wyłącznego użytku Zarządu dóbr wydzierżawiającego, albo nowego dzierżawcy, choćby takowe przed dniem ekspiracyi dzierżawcy przypadły, jako też zezwala W. dzierżawca już dziś na pomieszczenie siana i paszy z powyższych zbiorów w obrębie wydzierżawionego

folwarku, w którym to celu odstępuje na ten czas potrzebne ubikacye, według uznania Zarządu dóbr w albo też nowego dzierżawcy, i ku temu użyć się mające przedmioty dzierżawne, na wiosnę 19... roku z dzierżawy, wylacza. Za niedopełnienie tych warunków i stąd wyniknąć mogące szkody, odpowiada W. dzierżawca całym swoim majątkiem wedle jednostronnego uznania Zarządu dóbr klucza

13. W. p. dzierżawca przyjmuje obowiązek strzeżenia granic wszystkich jemu oddanych gruntów tak, że przy każdym naruszeniu granicy winien będzie pod rygorem rozwiązania niniejszego kontraktu bezwzględnie przełożonego obszarów dworskich w pisemnie za potwierdzeniem pisemnem odbioru dotyczącego pisma uwiadomić, w przeciwnym razie stanie się odpowiedzialnym za szkody, jakieby stąd dla właściciela wyniknąć mogły. Taki sam obowiązek ma Wny dzierżawca wobec powstać mogących praw używania i serwitutów jakiegokolwiek rodzaju ze strony nieuprawnionych obecnie do tego.

14. Nie wolno W. p. dzierżawcy przerabiać łąk, pastwisk i ogrodów na orne pola.

15. Na zapewnienie dotrzymania wszelkich niniejszym kontraktem objętych warunków, w którym każdy punkt jest głównym składa W. p. kaucyę w papierach wartościowych rzeczywistej wartości koron koron z talonami i kuponami bieżącymi i zapisuje na te papiery wartościowe wydzierżawiającemu prawo zastawu, od których to papierów każdoczśnie zapadłe kupony będą W. dzierżawcy regularnie przy płaceniu raty dzierżawnej wydawane. Gdyby wartość tych papierów spadła, natenczas W. p. dzierżawca ma obowiązek w każdym czasie, w terminie ośmiodniowym, wartość kaucyi uzupełnić do stanu pierwotnego przez złożenie do kasy prowentowej dóbr w brakującej kwoty pieniężnej w gotówce. Jeżeli jakikolwiek warunek kontraktu przez W. dzierżawcę dotrzymany nie będzie, przepada kaucya ta stanowczo i bezwarunkowo na rzecz wydzier-

zawiającego w części odpowiedniej do zrządzonej niedopełnieniem odnośnego obowiązku szkody. Jeżeli mimo to niniejszy kontrakt pozostaje prawomocnym, natenczas W. dzierżawca ma obowiązek pod rygorem bezwłocznego rozwiązania niniejszego kontraktu uzupełnić wartość uszczuplonej kaucyi do pierwotnej wysokości w ciągu dni ośmiu.

16. Ponieważ cały przedmiot dzierżawny W. dzierżawcy, dokładnie jest znanym, przeto bierze on dzierżawę folwarku ryczałtowo i zupełnie na swoje ryzyko, a tylko W. dzierżawca ponosi szkody i skutki klęsk elementarnych, nawet nadzwyczajnych jak to: ulew, stoty, posuchy, gradobicia, burz, nieurodzaju, szkody wyrządzonej przez myszy, owady, albo inne szkodniki, przez rdzę, śnieć, grzyby, bakterye, — następnie strejki, wojnę, powstanie rozruchy polityczne, agrarne i robotnicze, a w szczególności także przez wylew rzek i potoków. — W dzierżawca ma obowiązek ubezpieczać swoje ziemioplody w każdym roku przed dniem 15-go maja od gradobicia, a bezwłocznie po żniwie ubezpieczać zboże i po zbiorach siano i wszystkie inne ziemioplody od ognia — a w razie gradobicia albo pożaru winien za całe wynagrodzenie otrzymane za słomę i paszę, zakupić słomy i paszy, i takowe na tymże folwarku na spasienie względnie na ściółkę dla bydła użyć — w wysokości rzeczywistej wartości odpowiedniej w Krakowskiem Towarzystwie Wzajemnych ubezpieczeń i na żądanie Zarządu dóbr w

wykazać się z dotycząca policą zapłaconą. Gdyby W. dzierżawca tego ubezpieczenia od gradu i ognia w odpowiedniej wysokości zaniechał natenczas Zarząd dóbr ma prawo to uczynić na koszt W. dzierżawcy z kaucyi w myśl punktu 15 i 26 niniejszego kontraktu.

17. Gdyby c. k. rząd lub też inna władza wzięła pojedyncze parcele gruntowe większe lub mniejsze w dzierżawę (czyto dla celów wojskowych, czy kolejowych, komunikacyjnych lub jakiegokolwiek innych na krótszy lub dłuższy czas) w takim razie poddzierżawienie tych parcel należy do W. dzierżawcy na podstawie niniejszego kontraktu i jeżeliliby "dzierżawia

władza żądała zawarcia kontraktu na dłuższy czas, niż niniejszy kontrakt trwa, albo wprost z wydzierżawiającym, albo tegoż Zarządem dóbr, w takim razie W. dzierżawca otrzymuje czynsz zapłacony przez władzę do kasy procentowej w zwrócony, nie uwłaczając zupełnie obowiązki W. dzierżawcy do zapłacenia całego czynszu w myśl 2-go punktu niniejszego kontraktu, a to przez cały czas prawomocności niniejszego kontraktu. Subarendowanie innym osobom prywatnym, korporacyom, towarzystwom, albo spółkom budynków domów mieszkalnych, stajen, stodół, ogrodzonych albo nieogrodzonych gruntów do folwarku należących, tak w większych jak i mniejszych parcelach, bez osobnego, wyraźnego, pisemnego, udzielonego zezwolenia ze strony Zarządu dóbr wydzierżawiającego ad hoc w każdym pojedynczym wypadku, jest zakazane, — kontrakt bowiem niniejszy dotyczy li tylko osoby W. p. i w razie usunięcia się tegoż bez względu na to czy subarenduje pojedynczy budynek albo parcelę, albo cały folwark, w myśl punktu 15 i 20-go niniejszego kontraktu, sam przez się ustaje.

18. W razie zgonu W. dzierżawcy wydzierżawiający ma zupełnie wolny wybór, albo rozwiązania niniejszego kontraktu i natychmiastowego zaprowadzenia sekwestracji, albo też pozostawienia wdowy lub sierot zmarłego w posiadaniu dzierżawy folwarku aż do ekspiracyi niniejszego kontraktu. W każdym razie usunięcie wdowy, sierot albo spadkobierców W. p. wraz ze sługami i domownikami z mieszkania w folwarku nastąpić może dopiero w dniu najbliższego 30 (trzydziestego) czerwca.

19. Obie strony działające, przyrzekają sobie nawzajem, żadnego sługi nie przyjąć do służby, który jest w służbie u drugiej strony.

20. Gdyby pojedyncze parcele folwarku zostały przez wydzierżawiającego sprzedane komukolwiek, albo na rzecz rządu lub na cele publiczne, lub też, gdyby takie parcele zostały według istnieją-

cych ustaw wywłaszczone, w takim razie W. dzierżawca nie ma prawa temu się sprzeciwić, ale za to ma otrzymać wynagrodzenie od W. właściciela corocznie po K. K. za każdy hektar sprzedany lub wywłaszczony.

21. Wszystkie punkty niniejszego kontraktu są głównymi punktami.

22. Do dzierżawy niniejszej nie należy i od takowej wyłącza się wszystkie karczmy z przynależnymi do nich budynkami i gruntami, jak takowe obecnie w używaniu szynkarzy się znajdują, następnie wszystkie grunta w spisie inwentarza w myśl punktu 3-go nie zapisane, prawo polowania, łowienia ryb i raków, prawo kopania szutru, piasku, gliny, wapna, albo jakichkolwiek mających nazwę płodów kopalnych, a przeto dozwolony jest W. dzierżawcy tylko rolniczy użytek ziemi.

23. Kontraktu niniejszego, ani praw z niego wypływających, ani na dobrach et attententia ani na innych dobrach, domach, albo na jakimkolwiek bądź innym majątku wydzierżawiającego ani intabulować, ani prenotować nie wolno.

24. Nie wolno W. dzierżawcy bez pisemnego zezwolenia żadnych zmian ani przeistoczeń w budynkach zrobić ni nowych budowli stawiać.

25. Z dniem 30 (trzydziestego) czerwca 19.....) tydzień dziewięćset) roku kończy się w mowie będąca dzierżawa i niniejszy kontrakt bez wszelkiego poprzedniego wypowiedzenia, ile że wydzierżawiający już obecnie W. dzierżawcy dzierżawę tę z dniem 30 czerwca roku 19..... wypowiada, a W. dzierżawca przyjmując to wypowiedzenie, zrzeka się prawa czynienia przeciw takowemu jakichkolwiek bądź zarzutów i obowiązuje się w dniu tym wydzierżawiony mu folwark opróżnić i wydzierżawiającemu w posiadanie oddać.

26. Stanowi się wyraźnie, że gdyby W. dzierżawca w którymkolwiek z wyżej oznaczonych terminów i na dniu oznaczonym raty całej czynszu dzierżawnego do rąk W. właściciela lub do odebrania czynszu dzierżawnego przez właściciela upoważnionego

nie wypłacił, czego jedynym dowodem może zostać uznany kwit kasy dóbr wydzierżawiającego albo samego właściciela, lub też wogóle któregośkolwiek obowiązku, niniejszym kontraktem określonego, nie dopełnił, wydzierżawiający mieć będzie prawo kontrakt niniejszy rozwiązać. folwark ze
wszystkiem, co do niego należy, W. dzierżawcy odebrać, W. dzierżawcę z folwarku
i mieszkania usunąć, sekwestrację sądową zaprowadzić, sekwestratora według własnego uznania, bez wszelkiej odpowiedzialności za jego czynności i bez obowiązku zdawania komukolwiek rachunków postanowić, kaucję na zaspokojenie czynszu dzierżawnego lub wogóle szkody z powodu niedotrzymywania kontraktu dla niego wynikłej, obrócić, dalej wszelki majątek W. dzierżawcy, znajdujący się na miejscu w na zabezpieczenie wynagrodzenia wszelkich możliwych szkód, jakie dla wydzierżawiającego wskutek niedotrzymania kontraktu dzierżawnego wyniknąć mogą, zając, a WPan
....., utracając tem samem wszelkie prawa z niniejszego kontraktu wynikające, nie będzie miał prawa żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego powodu od wydzierżawiającego.

27. Ponieważ rzeka będzie uregulowana, przeto W. dzierżawca zrzeka się wszelkich pretensyi do wydzierżawiającego, jeżeli z powodu tej regulacyi rzeki i jej dopływów pojedyncze parcele łąk albo roli będą przez krótszy lub dłuższy czas nieprzystępne, albo nie dadzą plonu. W razie zaś, gdyby wydzierżawiający uważał za stosowne nawodnić, albo odwodnić pola, łąki albo pastwiska do folwarku należące, W. dzierżawca nie ma prawa temu się sprzeciwić, albo żądać wynagrodzenia za zniszczenie plonu robotami drenarskimi spowodowane, albo też budową urządzenia nawodnienia. Odwrotnie zaś po wykonaniu i funkcyonowaniu nawodnienia, albo odwodnienia, W. dzierżawca od najbliższego dnia 1-go lipca ma zapłacić z góry, rocznie jako procent i amortyzację kosztów tych melioracyi 10% od kwoty na to wydanej.

28. W razie, gdyby w czasie trwania niniejszej dzierżawy waluta koronowa austryacka na inną walutę zmienioną została, obowiązuje się dzierżawca płacić ustanowiony niniejszem czynsz dzierżawny w tej nowej walucie, w tym stosunku, aby tą nową walutą wypłacona rata czynszu odpowiadała wysokości czynszu w walucie koronowej austryackiej ustanowionego.

29. Obydwie strony działające zrzekają się prawa zrobienia użytku z środka prawnego, o pokrzywdzenie ponad połowę wartości.

30. Obydwie strony działające postanawiają i zezwalają, ażeby akt niniejszy w myśl § 3. ustawy notaryalnej z dnia 25 lipca 1871. L. 75. Dz. u. p. co do wszelkich nim objętych wypłat pieniężnych i innych warunków był natychmiast wykonalny.

31. Wszelkie koszta niniejszego kontraktu i należytość stemplową od tegoż poniesie W. dzierżawca sam. — Tak opisany akt notaryalny został kontraktującym odczytany i przez nich, jako z ich wola zgodny, spisany, podpisany, i z tą uwagą, że wszelkie ustne zmiany warunków w niniejszym kontrakcie zawartych, nie mają żadnego prawnego znaczenia i są nieważne.

Z ważniejszych publikacyi o dzierżawie i kontraktach dzierżawnych, przytaczamy:

von Thumb, Handbuch ueber Pacht und Pachtvertraege. Wiesbaden 1822.

von Honstedt, Verpachtung der Landgueter. Hannover 1837.

Buddeus, Die Zeitpacht groesserer Landgueter. Magdeburg 1838.

Krafft, Die Verpachtung von Landguetern mit Gutsinventarien. 2 wyd. Altenburg 1853.

Pohl, Die Verpachtung der Privatdomaenen in Oesterreich-Ungarn. Tybinga 1860.

Kletke. Rechtsverhaeltnisse zwischen Verpaechtern und Pachtern. Berlin 1866.

Bertrand, Ueber landwirtschaftliche Pachtvertraege. Wroclaw 1870.

Drechsler, der Landwirtschaftliche Pachtvertrag. Halle 1871.

Blomeyer, Pachtrecht und Pachtvertraege. Berlin 1873.

Oelrichs, Die Domaenenverwaltung des preussischen Staates. Wroclaw 1883.

Freudenstein, der landwirtschaftliche Pachtvertrag nad den Rechtssystemen Deutschlands und der Schweiz. Minden 1884.

Stoeckhardts, angehender Paechter oder landwirtschaftlicher Betrieb in Pacht und Eigenbesitz. 8 wyd. Berlin, 1892.

Berger, Die Verpachtung der preussischen Staatsdomaenen. Stuttgart 1892.

Lassmann, Der oesterreichische Paechter. Wien 1892.

Schumacher, Das landwirtschaftliche Pachtrecht. Berlin 1901.

Busse, Anleitung zur Abfassung von Pachtvertraegen. Halle n. S 1906.

Krause, Die Pachtbedingungen der königlich preussischen Domaenen. Berlin 1908.

Skalweit, Pachtwesen und Pachtrecht in England. Berlin 1908.

Po polsku pisali o dzierżawie m. i. Ludwik Górski i Karol Filipowicz, nadto posiadamy tlómaczenie z niemieckiego pod tytułem: Dzierżawca początkujący. 2 t. Toruń 1860.

SŁÓW KILKA

O DZIERŻAWIE I KONTRAKTACH DZIERŻAWNYCH

Podał prof. Stefan Pawlik.

Dzierżawa odgrywa poważne bardzo znaczenie w gospodarce wiejskiej w Galicyi. Dokonany w r. 1902 spis przedsiębiorstw rolniczych, wykazuje powyżej 10% ogólnej liczby przedsiębiorstw, pozostających w stosunku dzierżawnym. 13199 gospodarstw było dzierżawami czystymi, a w 93074 gospodarstwach łączyła się dzierżawa z posiadaniem własnej ziemi.

W obec tego dostatecznie uzasadnionem będzie podanie kilku uwag o dzierżawie i kontraktach dzierżawnych, a w zakończeniu parę formularzy kontraktów dzierżawnych, rozpowszechnionych w naszym kraju.

Przez dzierżawę rozumie się przelanie użytkownika poszczególnych parcel gruntowych, lub całych dóbr na przedsiębiorcę (dzierżawcę) za pewnym ściśle określonym czynszem (czynsz dzierżawny) na pewien przeciąg czasu (okres trwania dzierżawy), po którym obiekt dzierżawny w niezmnieszonej wartości powinien oddać dzierżawca. Stosunek między wdzierżawiającym a dzierżawcą, normuje dobrowolna umowa, kontrakt dzierżawny.

Poniżej podajemy kilka ważniejszych paragrafów austriackiego kodeksu cywilnego, odnoszących się do kontraktów dzierżawnych.

I tak § 1090 wspomnianego kodeksu opiewa: Kontrakt, przez który dozwolonem jest komu używanie rzeczy niezużywalnej na czas oznaczony i za oznaczoną cenę, zowie się kontraktem dzierżawnym. Jeżeli strony (§ 1904) zawierające kontrakt zgodziły się na istotę dzierżawy, t. j. na rzecz i cenę, natenczas kontrakt jest zupełnym, a używanie rzeczy ma być uważanem za kupione.

Jeżeli kontrakt wpisany jest do ksiąg publicznych (§ 1095), natenczas prawo dzierżawy uważanem być ma za rzeczowe, które przyszedł posiadacz przez pozostający jeszcze czas jest obowiązany znosić.

Dalsze §§ 1096—1103 normują prawa: 1) ze względu na oddanie, utrzymanie, używanie; 2) ciężary i 3) czynsz. Tu między innymi jest wyraźnie mowa (§ 1098), iż dzierżawca może dalej poddzierżawiać, jeżeli to może się stać bez szkody właściciela, lub też wyraźnie w kontrakcie nie jest wzbronionem.

W sprawie ciężarów orzeka § 1099, iż w dzierżawach właściwych, jeżeli wzięte są na ogół, przyjmuje dzierżawca wszystkie ciężary, z wyjątkiem hipotecznych. A w sprawie czynszu (§ 1100): w razie, jeżeli strony nie umówiły się o czas płacenia, orzeka, iż płacić go należy (w dzierżawach rocznych lub na dłuższy czas zawartych) co pół roku.

Jeżeli dzierżawca zobowiązał się jednakże oddawać trzecią część lub połowę plodów, wówczas nie ma kontraktu dzierżawy, lecz jest kontrakt spółki.

Następne §§ określają bliżej przypadki i warunki uwolnienia od płacenia czynszu; a więc, gdy rzecz wydzierżawiona z powodu wojny, ognia lub zarazy, z powodu wielkiej powodzi, gradobicia lub zupełnego nieurodzaju wcale użyta być nie może, wówczas czynsz dzierżawny nie powinien być płaconym. Dzierżawcy przysługuje prawo żądania opuszczenia czynszu dzierżawnego, gdy przez nadzwyczajne przypadki, dochody z wydzierżawionych na jeden rok dóbr zmniejszyły się więcej niż o połowę. Dalsze §§ określają bliżej żądanie odszkodowania, względnie udowodnienia szkody.

O oddaniu: dzierżawca ma zwrócić rzecz wydzierżawioną podług inwentarza, jeśli był spisany, albo przynajmniej w takim stanie, w jakim ją odebrał; grunta zaś wydzierżawione, uprawione według zwyczaju gospodarskiego, z zachowaniem względu na porę roku, w której się dzierżawa skończyła.

Rozwiązanie kontraktu dzierżawy, określają §§ 1112—1121; a więc: a) przez zniszczenie rzeczy, b) przez

upływ czasu; gdy zaś nie ma odnowienia kontraktu;
 c) przez wypowiedzenie i d) pozbycie rzeczy.

Najważniejsze punkta kontraktu dzierżawnego.

A) Nazwisko właściciela i dzierżawcy.

B) Bliższe określenie obiektu dzierżawy i części składowych tegoż. Obszar ogólny gruntów oraz poszczególne kultury, wchodzących w skład majątku, opis zabudowań, drzew owocowych, względnie inwentarza martwego i żywego, upraw i zapasów i t. d.

C) Dokładne określenie czynszu dzierżawy, z wyraźnym zaznaczeniem terminów początku i końca dzierżawy.

D) Określenie wysokości rocznego czynszu dzierżawnego.

E) Inne punkta, odnoszące się do sposobu gospodarowania, utrzymywania budynków, wysokości kaucyi, odbioru i oddania obiektu i t. d. Nie należy się łudzić, że najlepiej ułożony kontrakt dzierżawny jest dostateczną rękojmią prawidłowego i korzystnego toku interesu tak dla właściciela jak i dla dzierżawcy. Słusznie też pisze Ludwik Górski: (Wybór pism. Wyd. Jubileuszowe. Warszawa 1908) «ani sprawiedliwe ekonomiczne zasady, ani najbiegłejsze prawne określenia nie zapobiegają złym skutkom umów dzierżawnych, bez poczciwej i dobrej wiary stron działających».

Od osoby dzierżawcy wymagają ogólnie by był:

1) pod względem fizycznym zdrowym, by mógł podjąć trudom gospodarskim, ponadto, by był człowiekiem rzetelnym, stałego charakteru.

2) ażeby posiadał wykształcenie zawodowe i praktyczne uzdolnienie, i

3) miał potrzebny kapitał do prawidłowego prowadzenia gospodarstwa.

Przymioty charakteru dzierżawcy stawiamy na pierwszym planie, wobec tego że na dzierżawcy ciąży surowa moralna odpowiedzialność za nadużycia, jakich z prawa posessyi, pomimo najdokładniejszej umowy dopuścić się może.

Często bardzo praktyczne uzdolnienie, przy wrodzonej bystrości umysłu i umiejętności oryentowania się w sytuacji, bierze w rzeczywistości górę u dzierżawców nad ludźmi zawodowo wykształconymi, ale nie zdolnymi do czynu.

W odniesieniu do potrzebnej siły finansowej dzierżawcy, zupełnie słusznem jest stwierdzenie ze strony właściciela, czy dzierżawca ma odpowiednie środki, konieczne do racjonalnej gospodarki, nawet w mniej sprzyjających warunkach. Zasób sił finansowych dzierżawcy chroni, w danych warunkach, obie strony od strat. Stosownie do większej lub mniejszej intensywności gospodarowania, liczymy wysokość kapitału obiegowego, potrzebnego do prawidłowego prowadzenia gospodarstwa, między 5 a 7 krotną rocznego czynszu dzierżawnego.

Ale dla korzystnego prowadzenia dzierżawy potrzeba, ażeby dzierżawca znalazł przede wszystkim dobrze przedmiot dzierżawy i był jak mówią «zorientowanym». Nadto przy wyborze obiektu dzierżawnego nie należy zwracać za wiele uwagi na wielkość tegoż i niski czynsz dzierżawny, gdyż te nie zapewniają rentowności przedsiębiorstwa, ale na bonitację majątku i wszelkich z nim związanych warunków przyrodniczych i ekonomicznych, oraz — co jest bardzo ważnem — brać pod rozwagę osobę i charakter wydzierżawiającego. Może bowiem kontrakt zawierać bardzo wiele, dosyć uciążliwych zastrzeżeń dla dzierżawcy, a mimo to z uwagi na charakter wydzierżawiającego, będą powyższe zastrzeżenia miały podzędne znaczenie.

W sprawie wysokości czynszu dzierżawnego istnieje ogólne przekonanie, że tak za niski, jakoteż i za wysoki czynsz dzierżawny mają swoje zalety, ale nie brak im wad. W jaki sposób ma dzierżawca wypośredkować wysokość czynszu w granicach możliwości? Wskazówkę problematycznej wartości co do spodziewanego dochodu, daje dzierżawcy znajomość dochodu katastralnego, ale to nie jest wystarczającym. Musi więc kalkulować i przy kombinacjach rachunkowych wziąć pod bliższą rozwagę stan zabudowań,

stosunki gleby, położenie gruntów i skład kultur, istniejące melioracje, stosunki zbytu, środki komunikacyjne, okres trwania dzierżawy, zagospodarowanie gruntów. Następnie ma rozważyć wysokość czynszu dzierżawnego i swoją siłę finansową i wreszcie zapewnienie przez czas trwania umowy, spokojnego posiadania i swobodnego zarządu i uprawy.

Za krótki okres dzierżawy i za wielkie ograniczenia w prowadzeniu gospodarstwa powstrzymują dzierżawcę w wysokim stopniu od racjonalnej gospodarki. Nie czyni on wkładów, gdyż nie jest pewnym, że z nich korzystać będzie mógł w pierwszym wypadku, w drugim zaś incytywę jego w ulepszeniach, krępują ograniczenia. I tak np. ograniczenia sprzedaży i wywozu siana i słomy mają tylko względną rację bytu. A obok tych zapomina się, że dzierżawca wywołując po za obręb gospodarstwa ziemniaki i buraki, zuboża ziemię w szereg składników ważnych. To też w nowożytniejszych kontraktach wkładają na dzierżawcę obowiązek odpowiedniego nawożenia w zamian za sprzedawaną słomę, siano i t. p.

Bardzo liberalną na punkcie swobodnego gospodarowania jest najnowsza ustawa o dzierżawie w Anglii (z r. 1906): mimo to chroni ona właściciela od strat, gdyż m. i. zawiera postanowienia następujące: dzierżawcy wolno sprzedawać słomę, siano, buraki, ziemniaki i t. p. płody rolne, ale w zamian za to, ma on utrzymać fermę w dobrym stanie i stosownie do ilości sprzedanych płodów musi zwrócić glebie zabrane składniki pokarmowe. Przy takim postępowaniu może dzierżawca lepiej wyzyskać koniunktury handlowe i stać się finansowo silniejszym, bez szkody dla wydzierżawiającego. To wreszcie pobudza dzierżawcę do lepszej uprawy i silniejszego nawożenia, za które jednakże przy oddawaniu obiektu dzierżawy nie ma prawa żądać odszkodowania.

Postanowienia, o których wyżej mowa, nie odnoszą się do ostatniego roku dzierżawy, a to z tej przyczyny, ażeby nowy dzierżawca nie znalazł się w położeniu bez wyjścia, w obec za małych zapasów siana

i słomy i t. p., oraz stanu pól, które dopiero po kilku latach możnaby do ładu doprowadzić.

Ustawa angielska, dozwalając na zupełną swobodę obróbki i uprawy pól, nie dopuszcza jednakże większych zmian kultur trwałych, np. przeorania pastwisk.

Dla zabezpieczenia praw właściciela jest we wspomnianej ustawie następujący paragraf: za każde zniszczenie stanu fermy z winy dzierżawcy, jużto z powodu zaniedbania, jużteż z powodu przekroczenia dozwolonego zakresu działania, właściciel ma prawo żądać odszkodowania. Wysokość tegoż oblicza się na podstawie wkładów potrzebnych do doprowadzenia fermy do poprzedniego stanu. Obowiązki obu stron w sprawie utrzymywania budynków, ogrodzeń, bram i t. p. normuje się na podstawie miejscowego zwyczaju.

Jeszcze jedno postanowienie godne wzmianki, odnoszące się do ochrony praw właściciela i dzierżawcy: na życzenie jednej ze stron, w ciągu trzech miesięcy, przed objęciem dzierżawy, przeprowadza się opis stanu zabudowań, ogrodzeń, dróg, drenowania, rówów, oraz stanu kultury fermy, w razie potrzeby przez uproszonego do tej misji urzędnika ministerstwa rolnictwa. Koszta tej komisji ponoszą obie strony interesowane po połowie wówczas, gdy nie było innej umowy.

Dzierżawa parcel. W danych warunkach, np. przy rozrzuconej posiadłości, jedynie racjonalnym sposobem użytkowania gruntów jest ich wydzierżawienie. Ale są obok tego jeszcze inne okoliczności, w których wydzierżawianie poszczególnych parcel jest ze względów gospodarskich wskazane. Np. jeśli chodzi o zabezpieczenie sobie siły roboczej ręcznej. Przez takie postępowanie osiedla się grupę robotników, lub też stawia się za warunek obejmującym dzierżawę, że w pewnych okresach muszą się stawić do roboty.

Czynsze dzierżawne poszczególnych parcel, przewyższają, rzecz prosta, czynsze z większych obszarów. Popyt bowiem za małymi parcelami jest znacznie większy. Czy robotnik fabryczny, czy też podmieśczanin wydzierżawia chętnie kawałek gruntu

pod warzywa. A i u włościan małorolnych napotykamy stale dążność do podzierżawiania gruntów, w ten sposób bowiem może włościanin lepiej wyzyskać prace inwentarza żywego, a i siły robocze ręczne znajdują odpowiedni wpływ.

Tu i owdzie bywają wydzierżawiane całe dobra ziemskie w parcelach poszczególnym gospodarzom lub spółkom dzierżawnym. W tym przypadku zachodzi jednakże pytanie, co zrobić z zabudowaniami folwarcznymi, inwentarzem martwym i żywym. Inwentarz można sprzedać, zwykle ze stratą, ale gorsza rzecz z budynkami. Trzeba je utrzymywać, co połączone jest z wydatkiem, ubezpieczać od ognia i t. p. Nadto stosunki z całym szeregiem dzierżawców, przy najostrożniejszym nawet postępowaniu nie należą do zbyt miłych. Nie wszyscy bowiem będą stosowali się do warunków kontraktu, a w razie gorszych lat, przy płaceniu czynszu, trzeba będzie nie jednemu coś opuścić. To wywołuje u reszty dzierżawców niezadowolenie.

Odbiór majątku ziemskiego od jednego dzierżawcy bywa połączony z kłopotami i nieprzyjemnościami, coż dopiero, gdy mamy do czynienia z całym zastępem jednostek. W ostatnim przypadku, doprowadzenie pól do kultury jest często trudnym zadaniem.

Czas trwania dzierżawy poszczególnych parcel bywa zwyczajnie krótkim, roczny lub najwyżej paroletni, dla przyczyn znanych. Czynsz pobiera się zwyczajnie w czterech lub dwóch ratach.

Załączamy jeden wzór kontraktu dla poszczególnych parcel, oraz dwa wzory dla większych obszarów, folwarków. Zastrzegamy się, iż wzory te nie mogą być wiernie kopiowane, ich zadaniem ułatwić sporządzenie kontraktu.

Dublany, we wrześniu 1908 r.

Umowa o dzierżawę.

Pomiędzy
.....
..... zawarty został w dniu dzisiejszym następujący kontrakt:

1. W dobrach na folwarku
 bierze w dzierżawę parcele, położone w niwie
 i wynoszące w przybliżeniu hektarów,
 na rok lub na lat, to jest od
 190 roku, do 190 roku.

2. Dzierżawa roczna wynosi za hektar koron
 i będzie płaconą w dwóch ratach półrocznych, a mia-
 nowicie: dnia i dnia
 każdego roku.

3. Dzierżawca obowiązuje się złożyć przy zawie-
 raniu niniejszego kontraktu kaucyę, wynoszącą
 koron. Od tejże kwoty otrzymywać będzie dzierżawca
 po Nowym Roku % (procent).

4. W razie, gdyby dzierżawca w oznaczonym ter-
 minie którejkolwiek raty dzierżawnej nie zapłacił,
 wolno właścicielowi wyżej wymienioną parcelę bez
 względu w jakim ona jest stanie, wydzierżawić komu
 innemu na czas umowa niniejsza objęty, na koszt
 i ryzyko pierwszego dzierżawcy. Nadto wolno właścicielowi
 poszukiwać dzierżawcę sądownie o zaległą
 ratę, koszta i straty. Jeśliby zachodziła obawa wy-
 płaty, wolno właścicielowi obłożyć żniwa aresztem,
 zebrać plon na koszt dzierżawcy, i albo sprzedać, albo
 też wziąć dla siebie i po potrąceniu czynszu nale-
 żnego i kosztów, pozostałość wypłacić dzierżawcy.

5. Dzierżawca obowiązuje się strzedz granic gruntu
 zadzierżawionego i pilnować wkopanych kamieni gra-
 nicznych (słupów). O naruszeniach granic winien dzier-
 żawca donieść właścicielowi najdalej w 24 godzinach.
 Dzierżawca obowiązany jest prowadzić gospodarstwo
 według zasad ogólnie uzuanych i nawozic obornikiem
 co najmniej trzecią część parceli wydzierżawionej.
 Właściciel, względnie jego zastępca, zastrzega sobie
 prawo obchodzenia i objazdu parceli.

7. Istniejące rowy należy utrzymywać w należy-
 tym stanie! toż samo odnosi się do wylotów dreno-
 wych, o ile znajdują się na wydzierżawionej parceli.
 Rowy graniczne mają być do spółki oczyszczane.
 Wszelkie prace, niewykonane we właściwej porze
 przez dzierżawcę, będą przez właściciela na koszt
 dzierżawcy przeprowadzone.

8. Dzierżawcy nie wolno zakładać kopalni, czy to gliny, piasku, czy też żwiru i nadto nie wolno wogóle sprzedawać substancji gruntowej.

9. Drzew nie wolno ani wycinać ani obcinać. Kamienie na gruncie się trafiające są własnością właściciela.

10. Właściciel zastrzega sobie prawo polowania na wydzierżawionych parcelach. Przy polowaniu z nagonką, w czasie gdy nie ma mrozu, właściciel porozumiewa się z dzierżawcą.

11. Dzierżawca jest obowiązany donieść właścicielowi lub jego zastępcy, jeśli zauważy, że dreny nie funkcjonują na jego parceli, oraz pozwala na każdorazową naprawę.

12. Zakładanie wszelkich kultur trwałych nie jest dozwolone, a mianowicie sadzenie drzew, zakładanie lucerników lub ogrodów chmielarskich, łązy koszykarskiej.

13. Praw dzierżawy, wynikających z niniejszej umowy nie wolno intabulować, ani też bez zezwolenia właściciela komu innemu poddzierżawiać.

14. Podatki gruntowe płaci właściciel z dodatkami, podatek z dochodów dzierżawy, gdyby takowy wymierzony został, opłacać będzie dzierżawca.

15. Dzierżawca obowiązany jest plody swoje ubezpieczyć od gradu.

16. W razie śmierci dzierżawcy umowa niniejsza rozwiązuje się z końcem tego roku dzierżawy, w którym dzierżawca umarł, z wyjątkiem gdyby właściciel wymagał od spadkobierców dotrzymania takowego.

17. W razie bankructwa lub konkursu dzierżawcy, umowa jest tem samem rozwiązana.

18. Obydwie strony zrzekają się prawa unieważnienia niniejszej umowy z powodu pokrzywdzenia ponad połowę wartości rzeczywistej,

19. Dzierżawca nie ma prawa w żadnym wypadku żądać opuszczenia z dzierżawy lub jakiegokolwiek bądź wynagrodzenia.

20. Dzierżawca w ostatnim roku dzierżawy może zgłosić się o jej przedłużenie, gdy atoli umowa o dal-

szą dzierżawę do dnia nie została zawarta, przysługiwać będzie właścicielowi prawo, zaraz tegoż roku po zebraniu plonu jesiennego, czynić do dalszej uprawy kroki, lub też komu innemu oddać grunt do użytkowania.

21. Za dotrzymanie wszystkich warunków, objętych niniejszą umową, porecza dzierżawca całym swoim majątkiem ruchomym i nieruchomym, w razie zaś sporu o zapłacenie czynszu poddaje się on bezwarunkowo jurysdykcyi c. k. Sądu w według procedury dla spraw drobiazgowych przepisanej, bez względu na wysokość sumy będącej przedmiotem pretensyi z tytułu niniejszej umowy.

Niniejszą umowę podpisują obie strony i z tą chwilą obowiązuje ona tak dzierżawcę jak właściciela.

m. n. 19.....

Kontrakt dzierżawy.

Między jako wydzierżawiającym z jednej, a, jako dzierżawcą z drugiej strony, mocą którego właściciel dóbr w powiecie położonych, wydzierżawia folwark do tychże dóbr należący, ze wszystkimi polami ornymi, ogrodami, łąkami i pastwiskami, ze wszystkimi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, tak jak sam te przedmioty posiada i posiadać ma prawo, z wyjątkiem jednak dwóch pasteczysk, na wydzierżawionych niniejszem gruntach się znajdujących, oraz prawo polowania, które z pod tej dzierżawy wyraźnie się ekscypuje, panu na dwanaście lat po sobie następujących, a to od dnia 1-o lipca do dnia 30-o czerwca roku (wyraźnie od dnia 1 lipca), na następujących dobrowolnie i zgodnie umowionych warunkach:

1) Dzierżawca obowiązuje się płacić wydzierżawiającemu obustronnie i zgodnie umówiony czynsz, a to

przez pierwsze trzy lata od pierwszego lipca r.
do dnia 30 czerwca r. w sumie po K.,
wyraźnie po K. przez następne 9 lat
od 1 lipca roku do 30 czerwca roku
po K. — wyraźnie K.
rocznie wynoszący.

2. Oznaczony czynsz dzierżawny obowiązany jest
dzierżawca opłacać punktualnie i całkowicie z góry
w półrocznych ratach, każda rata przez pierwsze trzy
lata od 1-o lipca do 30-o czerwca roku po
..... (wyraźnie) K. przez następne
dziewięć lat po (wyraźnie K.
a to każdego pierwszego lipca i pierwszego stycznia
każdego roku przez cały ciąg trwania niniejszej dzier-
żawy, za kwitami pisemnymi wydzierżawiającego, lub
ustanowionego przez tegoż zastępcy, a to pod rygorem
poniżej w tym kontrakcie ustanowionym. Wyłąc-
cznie kwit wydzierżawiającego, lub jego zastępcy, jest
dowodem, że ratę czynszu dzierżawnego w terminie i cał-
kowicie, zapłacono, wszelkie inne sposoby dowodu są
wykluczone i p. Dzierżawca na nie powoływać się nie
może.

3. P. Dzierżawcy nie wolno pod żadnym warun-
kiem bez wyraźnego pisemnego zezwolenia Wydzier-
żawiającego kompensować czynszu dzierżawnego ja-
kimikolwiekbaż swoimi pretensjami, nawet gdyby
one za słuszne uznane były. Nie wolno również p. dzier-
żawcy czynszu dzierżawnego z żadnego tytułu, ani
w trzecie ręce ani do depozytu sądowego składać, gdyż
taka kompensata lub złożenie raty czynszu w trzecie
ręce, lub do depozytu sądowego, uważanem byłoby
jako niezapłacenie raty i pociągnęłoby za sobą skutki
poniżej oznaczone. W razie gdyby p. dzierżawca miał
jaką pretensję i chciał uzyskać zezwolenie na kom-
pensatę takowej, odpowiednią kwotą raty czynszowej,
natenczas obowiązany będzie osiem tygodni przed ter-
minem płacenia raty, przedłożyć rachunek swych pre-
tensyj, każdorocznie, gdyż w przeciwnym razie ta-
kowe uwzględnione nie będą; nadto pretensye wszel-
kie, z lat dawniejszych pochodzące, będą uważane za
przedawnione i nie będą uwzględnione.

4) Podatki rządowe i krajowe, tudzież wszelkie pre-stacye autonomiczne, z tytułu własności tych dóbr opłacać się mające, opłaca Wydzierżawiający, podatki zaś z powodu tej dzierżawy należące się, zatem dochodowe i zarobkowe, opłacać ma p. dzierżawca z własnych funduszków, bez regresu do Wydzierżawiającego. Liwerunki w naturze, kwaterunki wojskowe, podwoły i wszelkie tym podobne ciężary mogące przypaść na wydzierżawione dobra, ponosić ma p. dzierżawca bezwarunkowo sam, bez żadnej pretensyi do Wydzierżawiającego o bonifikacyę; natomiast bonifikacya wyznaczona za takowe przez odnośne władze, należy do p. dzierżawcy.

5) Przy oddaniu przedmiotu dzierżawy p. dzierżawcy w fizyczne posiadanie, co ma nastąpić do trzech dni po podpisaniu niniejszego kontraktu, spisany zostanie dokładny inwentarz, wszystkich do dzierżawy należących budynków i maszyn, który tworzyć będzie integralną część niniejszego kontraktu, a p. dzierżawca obowiązany będzie takowy podpisać do dni czternastu, po zawezwaniu. Gdyby zaś tego nie uczynił, to inwentarz podpisany przez Wydzierżawiającego, lub jego ustanowionego zastępcę, oraz i przez dwóch świadków, będzie miał zupełny dowód przeciw p. dzierżawcy a p. dzierżawca zrzeka się już teraz wszystkich zarzutów przeciw takiemu jednostronnie podpisanemu inwentarzowi.

6) Ponieważ dzierżawa niniejsza co do świadczeń ze strony p. dzierżawcy rozpoczęła się już z d. 1 lipca roku, objęcie zaś takowej w fizyczne posiadanie przez p. dzierżawcę następuje później, przyjmuje tenże na siebie wszystkie wydatki zrobione przez Wydzierżawiającego na cele gospodarcze, w zadzierżawionych dobrach od dnia 1 lipca aż do dnia objęcia dzierżawy w fizyczne posiadanie przez dzierżawcę, i obowiązuje się takowe Wydzierżawiającemu zwrócić przy objęciu dzierżawy. Przedłożony przez Wydzierżawiającego lub jego zastępcę rachunek wydatków na ten cel, uważany będzie jako zupełny dowód, wykluczający wszelkie zarzuty ze strony p. dzierżawcy. W razie niedopełnienia tego warunku potrąci

sobie Wyzierżawiający odpowiednią kwotę z kaucyi p. dzierżawcy, którą tenże natychmiast obowiązany będzie uzupełnić.

7) Budynki mieszkalne i gospodarskie, niemniej wszelkie przyrządy gospodarcze, winien p. dzierżawca odebrać w takim stanie, w jakim takowe znajdować się będą, przy oddaniu mu tej dzierżawy. P. Dzierżawca obowiązany jest, przez cały czas trwania niniejszej dzierżawy, wszystkie budynki, płoty i ogrodzenia inwentarzem oddawczym objęte, niemniej i inne w czasie dzierżawy przybyłe, w dobrym i używalnym stanie utrzymywać, zle lub uszkodzone doprowadzić do należytego stanu i użytku własnym kosztem i staraniem, bez żadnego regresu do Wyzierżawiającego, przyczem jednakże dodaje Wyzierżawiający z materiałów budowlanych, potrzebny materiał drzewny, wapno i cegłę, które p. dzierżawca, obowiązany jest sprowadzić swemi fornalkami z miejsca nabycia na plac budowy. Dachy słomą kryte ma p. dzierżawca przez cały przeciąg dzierżawy, raz w całej powierzchni nową słomą poszyć tak, by wszystkie budynki, płoty i ogrodzenia oddane w dzierżawne posiadanie, przy expiracyi dzierżawy, znajdowały się w stanie do użytku zdolnym. W razie, gdyby p. dzierżawca zaniedbywał utrzymywania w dobrym i do użytku zdolnym stanie, wszystkich oddanych mu w dzierżawę budynków, ogrodzeń i przyrządów gorzelnianych i t. d. — a ocenienie tego stanu należy wyłącznie do Wyzierżawiającego lub jego zastępcy i to bez wszelkiego odwołania się w tej mierze do Sądu, — natenczas przysługuje Wyzierżawiającemu względnie Jego zastępcy prawo wykonać naprawy na koszt p. dzierżawcy, bez odwołania się do Sądu, a wydaną na ten cel kwotę z kaucyi potrącić. Wykaz wydatków na ten cel wyłożonych, przez Wyzierżawiającego lub jego zastępcę sporządzony, stanowić będzie zupełny dowód, wykluczający wszelkie zarzuty ze strony p. dzierżawcy. W szczególności, co do gorzelnii znajdującej się w dobrach zadzierżawionych postanawia się, że Wyzierżawiający oddaje p. dzierżawcy budynek gorzelniany z całym wewnętrznem urządzeniem i aparatem go-

rzelnianym w zupełnie dobrym i do użytku zdolnym stanie, jak to inwentarz oddawczy dokładnie i szczegółowo wykazuje. W czasie trwania dzierżawy obowiązany jest p. Dzierżawca wykonywać wszelkie potrzebne reperacye, tak kotlarskie jak blacharskie, ślusarskie, stolarskie, bednarskie, murarskie i ciesielskie z własnych funduszków bez regresu do Wydzierżawiającego. Celem zapobieżenia tworzeniu się w kotle parowym «osadu kotłowego», powodującego przepalenie się kotła, obowiązany jest p. dzierżawca podczas ruchu gorzelnianego, w odstępach dwutygodniowych, używać preparatu chemicznego przeciw osadowi kotłowemu (Antikesselstein) w przepisanej ilości, pod nadzorem i kontrolą ustanowionego zastępcy Wydzierżawiającego. Ponieważ na obecną kampanię gorzelnianą otrzyma p. dzierżawca gorzelnię gotową do ruchu, będzie obowiązany przy ekspiracyi kontraktu oddać ją w takim samym stanie. Czy gorzelnia w takim stanie przy ekspiracyi kontraktu znajdywać się będzie, oceni Wydzierżawiający sam, lub przez swego zastępcę, w ostatnich 10 (dziesięciu) dniach ruchu kampanii gorzelnianej w roku ekspiracyjnym dzierżawy a p. dzierżawca obowiązany będzie poczynić własnym kosztem wszelkie reperacye, jakie według opinii Wydzierżawiającego lub jego zastępcy okażą się potrzebne, przyczem postanawia się, że jedynie opinia Wydzierżawiającego lub jego zastępcy, w tym wypadku będzie miarodajną, a dzierżawca z góry obowiązuje się żadnych zarzutów nie czynić. Gdyby p. dzierżawca, wskazanych mu przez Wydzierżawiającego reperacyj, czy to w ciągu trwania dzierżawy, czy to przy ekspiracyi teŝe poczynić się wzbraniał, uskuteczni takowe na rachunek p. dzierżawcy Wydzierżawiający lub jego zastępcę, a poczynione wydatki potrąci sobie z kaucyi, przyczem obowiązują te same rygory, jak powyżej przy innych budynkach. Jeżeli po roku pędzenia gorzelnii, w którym to czasie Wydzierżawiający sam lub przez swego zastępcę ściśle sprawę badać będzie, okaże się, iż pędzenie przy dotychczasowem urządzeniu na cztery hektolitry dziennego wyrobu, jak to dzisiaj ma miejsce, pociąga za sobą znaczne straty w opale,

o czem opinia należy w pierwszym rzędzie do Wydzierżawiającego, i okaże się dalej na pewno, iż przemiana na urządzenie do pędzenia 7 (siedmiu) hektolitrów dziennie straty te usunie, natenczas Wydzierżawiający zezwoli na przemianę, według planów i kosztorysów jakie mu p. dzierżawca ma przedłożyć — a które Wydzierżawiający zatwierdzić może ze zmianą stosownie do swego uznania, lub bez takowej, oraz przyczyni się ze swej strony do kosztów tej przemiany kwota (wyraźnie) K., bez względu na wysokość kosztów. Nadwyżkę kosztów ponieść ma p. dzierżawca z własnych funduszków. Powyższą kwotę K. wyłoży początkowo p. dzierżawca z własnych funduszków. Wydzierżawiający zaś potrąci mu ją przy trzech następujących ratach czynszu dzierżawnego w równych kwotach po K. P. dzierżawca, objawwszy gorzelnię w dzierżawne posiadanie, przyjmuje wobec władz skarbowych całą odpowiedzialność za zdarzyć się mogące przekroczenia ustawy, lub niestosowanie się do takowej; wszelkie kary pieniężne, nałożone przez Władzę z tego tytułu, dotyczą osobiście p. dzierżawcy i z jego majątku mają być pokryte. Postanawia się wyraźnie, że wszelkie zmiany w aparatach i przyrządach gorzelnianych, spowodowane nowymi rozporządzeniami Władz skarbowych, lub nowo uchwaloną i sankcyonowaną ustawą o pędzeniu spirytusu, przeprowadza i dokonuje p. dzierżawca z własnych funduszków bez wszelkiego regresu do Wydzierżawiającego. P. dzierżawca obowiązany jest w zupełności wyrabiać przez cały czas trwania dzierżawy przyznany kontyngent gorzelniany corocznie. Niewyrobiony w którymkolwiek roku kontyngent gorzelniany, pociąga za sobą karę konwencyonalną po K. od każdego niewyrobionego hektolitru kontyngentu, którą to karę Wydzierżawiający ma prawo ściągnąć z kaucyi dzierżawnej, a p. dzierżawca obowiązany takową natychmiast uzupełnić. Nadto obowiązany jest p. dzierżawca w każdym roku, w którym cena okowity w czasie kampanii dosięgnie ceny K. (.....) za hektolitr okowity niekontyngentowanej w wypędzać sto hektolitrów okowity niekontyngentowa-

nej. P. dzierżawca obowiązuje się trzymać gorzelnika, posiadającego odpowiednie kwalifikacje, w wypadku zaś, gdyby Wydzierżawiający sam lub przez swego zastępcę przekonał się, że tenże jest nieodpowiedni, p. dzierżawca obowiązany jest do dni trzydziestu przyjąć innego gorzelnika.

8) Assekurację budynków uskutecznią Wydzierżawiający, jednakowoż p. dzierżawca obowiązany jest zwrócić wydaną na ten cel kwotę Wydzierżawiającemu przy uiszczeniu każdorazowej raty styczniowej. W razie niedotrzymania warunku tego przez dzierżawcę, uprawniony jest Wydzierżawiający kwotę na assekurację budynków wydaną potrącić sobie z najbliższej do zapłaty czynszu dzierżawnego przypadającej raty, w którym to razie rata dzierżawna, o tę potrąconą kwotę jako niezapłacona, i pod rygorem niniejszego kontraktu płatna uważaną będzie. Gdyby w ciągu tej dzierżawy jaki budynek zgorzał, obowiązany jest Wydzierżawiający budynek ten w takich samych rozmiarach, jak był dawniej, własnym kosztem i staraniem na nowo postawić, po otrzymaniu wynagrodzenia assekuracyjnego w jak najkrótszym czasie, względnie odrestaurować. P. dzierżawca obowiązany jest wtedy dostarczyć własnymi fornalkami materiału budowlanego na plac budowy, wyjąwszy gdyby, to miało wypaść w czasie siewów wiosennych lub jesiennych. Postanawia się, że pora od początku listopada do końca marca, jako do budowy niestosowna, w czas do odbudowania, względnie odrestaurowania budynku spalonego przeznaczony, wliczać się nie będzie. Za ubytek w używaniu budynku spalonego i wogóle za szkodę i stratę w gospodarstwie wynikłą przez czas i skutek odbudowania lub restaurowania tegoż, nie może p. dzierżawca żądać jakiegokolwiek odszkodowania. P. dzierżawca obowiązany jest, przynajmniej zboża ozime od gradu, a wszelkie zapasy zboża w słomie, słomę wymłóconą tudzież paszę ubezpieczać od ognia, — odnośne police gradowe mają być przedkładane co roku, najdalej do 15-o maja, ogniowe do 25 sierpnia, Wydzierżawiającemu lub Jego zastępcy. W razie spalenia się starych zapasów słomy,

nowej krescensyi wraz ze słomą, i wszelkiej paszy ubezpieczonej, ma p. dzierżawca zakupić, za kwotę tytułem premii za spaloną słomę przez Towarzystwo asekuracyjne wypłaconą słomy lub sztucznych nawozów, w takiej ilości i jakości, jak to Wydzierżawiający, ewentualnie jego zastępca wskaże, bez żadnej pretensyi o bonifikacyę za to, i użyć tych sztucznych nawozów do stercoryzacyi gruntów tak, jakby to miało miejsce zwykłym nawozem.

9. Bez wyraźnego pisemnego zezwolenia wydzierżawiającego, względnie jego zastępcy, nie wolno panu dzierżawcy istniejących budynków przekształcać, na co innego, jak są przeznaczone używać, ani też nowych budynków stawiać. W razie gdyby p. dzierżawca jaki nowy budynek bez zezwolenia i wiedzy wydzierżawiającego postawił, natenczas staje się tenże własnością wydzierżawiającego, i nie może być przez p. dzierżawcę rozebrany, a p. dzierżawca nie może żądać jakiegokolwiek bonifikacyi za taki budynek, przy ekspiracyi dzierżawy.

10. Grunta, winien p. dzierżawca zwrócić przy ekspiracyi dzierżawy w oddanych mu granicach. Każde naruszenie granic przez osoby trzecie, obowiązany jest p. dzierżawca najdalej do dni 8 podać do wiadomości wydzierżawiającego, względnie jego zastępcy, gdyż w przeciwnym razie, odpowiada za wszelkie stąd powstałe szkody. Rowów, znajdujących się obecnie na dzierżawnych gruntach, objętych inwentarzem oddawczym, nie wolno p. dzierżawcy bydlęm zasuwawać lub z umysłu zasypywać, przeciwnie p. dzierżawca jest obowiązany, utrzymywać takowe w dobrym stanie i regularnie je wyczyszczać. Gdyby p. dzierżawca obowiązku tego niedopełnił, natenczas przysługiwać będzie wydzierżawiającemu prawo przedsięwziąć tę poprawę rowów, tak jak wyżej w ustępie 7-mym co do budynków postanowiono, na koszt i rachunek p. dzierżawcy. Nowych rowów bez wyraźnego pisemnego zezwolenia wydzierżawiającego, ewentualnie jego zastępcy, nie wolno p. dzierżawcy kopać czyli wybiorać.

11. Na wypadek, gdyby jakakolwiekbażdz przestrzeń z gruntów ornych, sianożęci lub pastwisk, do tej dzier-

żawy należąca, wydana być musiała wskutek zarządzenia sądowego lub innej władzy, i tym sposobem usuniętą została z pod użytku p. dzierżawcy, lub też wogóle, ekspropyryacja jakiegś przestrzeni, musiała nastąpić, natenczas ma p. dzierżawca przestrzeń tą odstąpić, zaś wydzierżawiający opuści co roku z rat czynszu dzierżawnego tytułem odszkodowania po K. przez pierwsze trzy lata, a po K. przez następne dziewięć lat, za każdy hektar odjętego w ten sposób od dzierżawy gruntu. Do żadnego innego odszkodowania, bonifikacyi p. dzierżawca nie będzie uprawniony rościć sobie pretensyi. Ponieważ możliwym jest, że w celu komasacyi gruntów niektóre kawałki z gruntów obecnie wydzierżawionych zostaną zamienione lub sprzedane, w tym wypadku nie będzie p. dzierżawca robić żadnych przeszkód, przyjmie zamienione kawałki gruntów zamiast oddanych, bez żadnych trudności, a za sprzedane zadowolni się odszkodowaniem w wysokości wyżej postanowionej. Zamianę, ewentualnie sprzedaż przeprowadzi wydzierżawiający w odpowiednim czasie, tak aby p. dzierżawca nie był narażony na dotkliwą szkodę.

12. Do p. dzierżawcy należy użytek powierzchni ziemi, nie wolno mu zatem bez wyraźnego pisemnego zezwolenia wydzierżawiającego a względnie jego zastępcy, ani gliny kopać, celem wyrabiania z takowej cegły, ani innych produktów ziemnych jako to, torfu, kamienia budowlanego lub wapiennego i t. d. wydobywać, gdyż produkta te są wyłącznie własnością wydzierżawiającego. Gdyby zaś wydzierżawiający, chciał urządzić cegielnię na gruncie wydzierżawionym lub w inny sposób produkta ziemne eksploatować, albo też jakąś część gruntów na jaką budowlę, skład i t. d. użyć, natenczas obowiązuje się p. dzierżawca, gdyby ta potrzebna przestrzeń gruntu była nawet zasiana lub zabudowaną, takową wydzierżawiającemu bez przeszkód odstąpić, zaś wydzierżawiający zobowiązuje się w takim razie tytułem wynagrodzenia opuścić p. dzierżawcy co roku z rat czynszu dzierżawnego za odebrany hektar gruntu niezasianego kwotę, jak wyżej przy ustępie jedenastym niniejszego kontraktu; w wy-

padku zaś, gdyby przestrzeń odebrana była zasiana, zwróci mu koszt nasienia i uprawy, prócz opustu czynszu. Niemniej także, gdyby wydzierżawiający chciał, na wydzierżawionym gruncie, postawić jakiś budynek lub zakład fabryczny, obowiązany będzie p. dzierżawca odstąpić potrzebną do tego przestrzeń gruntu za powyżej oznaczonem wynagrodzeniem. W każdym z przewidzianych wypadków odstąpienia gruntów p. dzierżawca nie może żądać innego wynagrodzenia, jak tylko powyżej oznaczoną kwotę, od hektara odstąpionego gruntu. W wypadkach tym ustępem kontraktu przewidzianych przysługuje ocenienie, czy i ile gruntów wydzierżawiający do eksploatawania produktów ziemnych, lub pod mające się stawiać budowle lub do zmiany ewentualnie do sprzedaży potrzebuje, wyłącznie tylko wydzierżawiającemu bez odwołania się do c. k. Sądu.

P. dzierżawcy nie wolno, bez wyraźnego pisemnego zezwolenia wydzierżawiającego, względnie jego zastępcy, zmieniać rodzaju uprawy i użytkowania wydzierżawianego gruntu, a więc łąk i pastwisk zamieniać na grunta orne i odwrotnie; za każdy hektar zmienionej w ten sposób przestrzeni byłby zobowiązany p. dzierżawca zapłacić karę konwencyonalną K., które wydzierżawiający miałby prawo z kaucyi potrącić a p. dzierżawca byłby obowiązany uzupełnić natychmiast uszczuploną kaucyę.

14. P. dzierżawcy nie wolno, w czasie trwania dzierżawy słomy mierzwiastej ani okłociastej, ani siana, koniczyny, siewki, plewy i wogóle żadnej paszy, niemniej też nawozu ani sprzedawać, ani zamieniać, ani wywozić, ani palić. Wszelka pasza powinna być skarmiona na gruncie wydzierżawionym przez inwentarz p. dzierżawcy, wszelki zaś nawóz ma być użyty do stercoryzacyi pól wydzierżawionych. W razie przekroczenia tego postanowienia byłby obowiązany p. dzierżawca zapłacić za każdą wywiezioną furę słomy, paszy lub nawozu poza obręb wydzierżawionych gruntów, tytułem kary konwencyonalnej kwotę K., za każdy wóz plewy, trzyn lub siewki K. W razie, gdyby ilość nie mogła już być skonstatowaną, przysłuży wy-

dzierżawiającemu, względnie jego zastępcy, prawo nałożenia dowolnej kary konwencyjonalnej, jaką uzna za stosowną. W takim razie wydzierżawiający będzie uprawniony karę tę z kaucyi bez wszelkich procesów sądowych lub dochodzeń stracić, a p. dzierżawca zgadza się niniejszem na to i obowiązuje się tak uszczuploną kaucyę bezwłocznie uzupełnić. Temu samemu rygorowi ulegnie p. dzierżawca, gdyby słomę do palenia dla siebie używał, lub służbie folwarcznej do opalania mieszkań dawał, albo też palenie słomy w polu jako resztek ze stert zarządził. Wolno jest jednak p. dzierżawcy używać naci kartoflanej na zahaty do mieszkań dla służby folwarcznej.

15. P. dzierżawca obowiązuje się prowadzić na wydzierżawionych dobrach starannie gospodarstwo, dbać o utrzymanie czystości i siły nawozowej roli, przez utrzymywanie odpowiedniej ilości inwentarza roboczego i użytkowego; postanawia się niniejszem, iż p. dzierżawca obowiązany jest utrzymywać inwentarza roboczego jedną sztukę na hektarów inwentarza użytkowego jedną sztukę normalną (wagi kg.) na har. Wolno jest p. dzierżawcy utrzymywanie inwentarza użytkowego tak rozłożyć, aby w zimie utrzymywał więcej sztuk, skupując bydło na opas, w lecie zaś miał ilość mniejszą, rozchodzi się tylko o to, aby cała przestrzeń gruntów, przypadająca według planu gospodarstwa do nawożenia, rok rocznie wygnojoną być mogła. Do 1-go czerwca r. ma p. dzierżawca przedłożyć wydzierżawiającemu plan gospodarstwa na cały przeciąg dzierżawy, przyczem wydzierżawiający pozostawia sobie prawo poczynienia w tym planie zmian, jakie uzna za odpowiednie, a p. dzierżawca obowiązany jest plan zatwierdzony w życie wprowadzić. W wypadku, gdyby p. dzierżawca do oznaczonego terminu warunku tego nie dopełnił będzie obowiązany przyjąć i w życie wprowadzić plan, jaki wydzierżawiający, względnie jego zastępca uzna za stosowny. Plan ten stanowić będzie integralną część niniejszego kontraktu. Zmiana planu gospodarstwa, przedsięwzięta bez zezwolenia wydzierżawiającego lub jego zastępcy, lub niewyko-

nianie dokładne ustanowionego planu, pociągnąć ma za sobą natychmiastowe rozwiązanie kontraktu dzierżawnego, bezwarunkową utratę kaucyi i natychmiastowe eksposesyonowanie p. dzierżawcy z niniejszej dzierżawy, a oprócz tego, obowiązany będzie pan dzierżawca wszelką, z niedotrzymania tego warunku powstałą, szkodę wynagrodzić wydzierżawiającemu w taki sposób, że winien będzie zapłacić tytułem kary konwencyonalnej po k. za każdy hektar gruntu używanego, nie wedle przyjętego planu. W razie, gdyby ozimina lub jarzyna zniszczoną została wskutek klęski elementarnej, a zachodziła możność, w miejsce zniszczonych zasiewów poczynić nowe, natenczas obowiązany jest p. dzierżawca na nowo przestrzeń zniszczoną, zasiać w taki sposób i takim zbożem, jak to mu wydzierżawiający lub jego zastępca, po wzajemnem z nim porozumieniu się, wskaże.

16. Jako dowód, że p. dzierżawca nie prowadzi gospodarstwa rolnego wedle ustanowionego planu, tak co do sposobu gospodarstwa, jako też co do rozległości zagospodarowanej nie według planu przestrzeni, ma stanowić pisemne orzeczenie dwóch właścicieli ziemskich, którzy sami gospodarują lub dwóch fachowych gospodarzy. Wybór tych znawców przysługuje wyłącznie wydzierżawiającemu, ewentualnie jego zastępcy, a p. dzierżawca nie może przeciw temu wyborowi czynić żadnych zarzutów. Postanawia się również, że oględziny gospodarstwa, przez w mowie będących znawców, nie potrzebują być przedsiębrane, dopiero na podstawie sądowego orzeczenia, tylko na wezwanie wydzierżawiającego względnie jego zastępcy, a pisemne ich zeznanie ma stanowić zupełny dowód wobec c. k. Sądu. Pan dzierżawca nie może się sprzeciwiać lub przeszkadzać takim oględzinom.

17. Przy ekspiracyi dzierżawy, winien p. dzierżawca, pod nadzorem ustanowionym przez wydzierżawiającego, skutecznie zasiewy zdrowem i czystem, z ostatniego zbioru pochodzącem ziarnem. Sposób wysiewu i ilość każdego gatunku ziarna na hektar przestrzeni, stosownie do siły nawozowej, i sposobu uprawy przygotowanej pod zasiew roli, oznaczy wydzierża-

wiający względnie jego zastępca. Siew ozimin ma być uskuteczniiony najdalej do 20-go września, jarych ile można najwcześniej. Ilość zasiewów, jakie p. dzierżawca przy ekspiracyi dzierżawy na zadzierżawionych dobrach ma poczynić, stosować się ma, bez względu na ilość i jakość zasiewów przez p. dzierżawcę przy objęciu niniejszej dzierżawy odebranych, ściśle do mającego się ułożyć planu gospodarczego. Gdyby, według planu poczynić się mające, zasiewy miały być większe od tych, jakie p. dzierżawca przy objęciu dzierżawy odebrał, ma uskutecznić te zasiewy bez żadnych pretensyi do wydzierżawiającego. Za nieuskutecznienie tak postanowionych zasiewów, obowiązany będzie pan dzierżawca wynagrodzić wydzierżawiającemu szkodę, i to w ten sposób, że za każdy hektar nieobianego według planu zboża lub paszy, jakoteż niezasadzony hektar ziemniaków zapłaci tytułem kary konwencyonalnej po K. za każdy hektar nieuprawionej roli pod dalsze zasiewy po K. Postanawia się również wyraźnie, że gdyby p. dzierżawca nie przygotował należyście i w czas czystego i zdrowego ziarna do siewu, a ocena w tej mierze, przysługiwać będzie wyłącznie wydzierżawiającemu względnie jego zastępcy, wówczas wydzierżawiający, względnie jego zastępca, będzie miał prawo ziarno to odrzucić, i na koszt p. dzierżawcy odpowiednie ziarno zakupić, a wydatek ten z kaucyi dzierżawnej potrącić a p. dzierżawca obowiązuje się, tak uszczuploną kaucyę niezwłocznie uzupełnić. Tak nasienie koniczu jak i lucerny siać się mające ma być na miesiąc przed wysiewem wydzierżawiającemu ewentualnie jego zastępcy do zbadania przedstawiane i dopiero po uznaniu tego nasienia za czyste i wolne od kianiaki, będzie mogło być takowe do siewu użyte. Ugory wszystkie według planu gospodarstwa wypadające, obowiązany będzie p. dzierżawca przy ekspiracyi dzierżawy oddać wyorane i przynajmniej w połowie wyczyszczone i wynawożone. Za każdy hektar ugoru w ten sposób nieprzygotowanego odtrąci się p. dzierżawcy z kaucyi dzierżawy po K.

18. W ostatnim roku dzierżawy, nie wolno p. dzier-

żawcy inwentarzem swoim łąk, lucerny i koniczu spasać, pozwala się jednak p. dzierżawcy, a to w celu utrzymania jego inwentarza, z pierwszego pokosu lucerny lub konieczyny tyle kosić, ile na utrzymanie jego inwentarza, wedle zdania wdzierżawiającego lub jego zastępcy potrzebnem się okaże. Za każdy hektar ponad potrzebę spasionej lub wykoszonej łąki, koniczu lub lucerny, zapłacić będzie obowiązany p. dzierżawca

K.

19. Ogrody p. dzierżawcy inwentarzem oddane, obowiązany jest p. dzierżawca utrzymywać w dobrym stanie, nie wolno jest zatem drzew owocowych niszczyć, a przeciwnie obowiązany jest p. dzierżawca w miejsce drzewa owocowego, zniszczonego z jakiegokolwiek powodu, swoim kosztem i staraniem nowy szlachetny szcep zasadzić. Za każde zniszczone, a nie odsadzone drzewo owocowe, będzie p. dzierżawca obowiązany zapłacić tytułem odszkodowania

K.

20. Dzierżawa ta wypuszcza się ryczałtem, t. j. na zysk lub stratę, a wdzierżawiający, oddawszy p. dzierżawcy wdzierżawione przedmioty, nie ręczy ani odpowiada za ilość gruntów i jakość tychże, ani za żadną rubrykę dochodów, za szkody lub straty wynikłe z wypadków elementarnych, lub z powodu zarazy, wojny, oraz z powodu innych zwyczajnych lub nadzwyczajnych wypadków, wogóle nie ręczy i nie odpowiada za żaden ubytek w dochodach lub zyskach a p. dzierżawca nie będzie mieć żadnych w takich razach pretensyi do odszkodowania, bonifikacyi lub rozłożenia czynszu na raty albo do prolongaty terminów opłaty czynszu.

Jedynie gdyby c. k. rząd, wskutek klęsk elementarnych przyznał opust podatkowy, otrzyma p. dzierżawca taki sam opust z czynszu dzierżawnego.

21. Dzierżawa niniejsza kończy się, gdyby pierwiej nie ustała, z dniem 30 czerwca (wyraźnie) roku, bez żadnego sądowego lub pozasadowego wypowiedzenia lub rumacyi i nie może być mileząco przedłużana, oraz nie przechodzi w razie śmierci p. dzierżawcy w żadnym razie na sukcesorów.

22. W razie sprzedaży przedmiotu dzierżawy, obowiązuje się wydzierżawiający włożyć na nowonabywcę obowiązek ścisłego dotrzymania niniejszego kontraktu.

23. P. Dzierżawca obowiązany jest osobiście zarządzać gospodarstwem zadzierżawionego folwarku. W razie gdyby p. dzierżawca zadzierżawione dobra opuścił, lub przez sześć po sobie następujących miesięcy bez przerwy tam nie był, lub przez pełnomocnika dawał się zastępywać, natenczas przysługiwać będzie wydzierżawiającemu prawo żądać usunięcia p. dzierżawcy z dzierżawy i domagać się od niego wynagrodzenia wynikłej stąd szkody i straty.

24. Bez wyraźnego pisemnego zezwolenia wydzierżawiającego nie wolno p. dzierżawcy przedmiotu dzierżawnego, ani w całości, ani w części nikomu innemu odstępywać, ani subarendować, ani też pól na spółkę do obsiewu dawać.

25. Postanawia się wyraźnie, że ustnie zawarte umowy lub przyrzeczenia, odnoszące się do tej dzierżawy, nie mają żadnego znaczenia i nikogo nie obowiązują.

Wszelkie zmiany tego kontraktu nastąpić mogą tylko za pisemną umową.

26. P. dzierżawca obowiązany jest prowadzić zrozumiale i porządnie rachunki gospodarskie co do naturaliów, a mianowicie co do mierzwy, siana, paszy, wysiewów, zbioru i omlotu zboża i rachunki te, na każdorazowe żądanie wydzierżawiającego, względnie jego zastępcy, do przeglądu przedłożyć.

27. Wydzierżawiającemu, względnie jego zastępcy przysłuży prawo — osobiście lub przez trzecią osobę — kontrolowania każdej chwili wydzierżawionych niniejszem dóbr, oraz wpływanie na podniesienie wartości lub upiększenia tychże.

28. P. dzierżawca obowiązany jest w danym razie przyjmować w domu swoim bez żadnego wynagrodzenia ze strony wydzierżawiającego, wszelkie komisye dotyczące interesów dóbr wydzierżawionych.

29. Wszelkie warunki niniejszej umowy, uważają strony za główne, ważne i nierozzerwalne, a p. dzierżawca obowiązany jest takowe ściśle i najpункtualniej dopełnić, w razie niedotrzymania któregokolwiek

z nich, za szkody stąd dla wydzierżawiającego wynikłe, ręczy całym swoim ruchomym i nieruchomym majątkiem. W szczególności zaś co do rat czynszu dzierżawnego i kaucyi, postanawia się, że gdyby p. dzierżawca jakiegokolwiekbądź raty czynszu dzierżawnego, czy to całkowicie, czy w ściśle oznaczonym terminie nie zapłacił, lub też uszczuplanej przez wypadki, niniejszym kontraktem przewidziane, kaucyi dzierżawnej na wezwanie natychmiast nie uzupełnił, przysługuje wydzierżawiającemu prawo wedle własnego wyboru, w każdym jednak razie, przy żądaniu ścisłego dotrzymywania obowiązków niniejszym kontraktem przez p. dzierżawcę na siebie przyjętych, albo stosunek dzierżawy nadal utrzymać, albo uważać kontrakt niniejszy za rozwiązany, kaucyę zaś dzierżawną za przepadłą, i żądać oddania sobie przedmiotu dzierżawnego w posiadanie i używanie. Przy tem postanawia się wyraźnie, że mimo wniesionego pozwu o rozwiązanie kontraktu dzierżawy, p. dzierżawca aż do chwili ustąpienia z przedmiotu dzierżawy, względnie aż do egzekucyjnego wyrugowania go z takowego, obowiązany będzie dopełnić wszystkich niniejszym kontraktem na siebie przyjętych zobowiązań, a w szczególności uiszczać wszystkie raty czynszu dzierżawnego. Już na zasadzie wniesionego pozwu o rozwiązanie kontraktu dzierżawy, uprawniony będzie wydzierżawiający żądać zaprowadzenia sekwestracji przedmiotu dzierżawy, wraz z wszystkim co się na takowym znajduje będzie, bez poprzedniego przesłuchania p. dzierżawcy i bez złożenia kaucyi sekwestracyjnej, a p. dzierżawca zrzeka się niniejszem wyraźnie prawa wnoszenia jakichkolwiek zarzutów, tak przeciw zaprowadzeniu sekwestracji, jakoteż przeciw osobie sekwestra, przez wydzierżawiającego zaproponować się mającego, i zezwala, aby zaproponowany sekwestor w posiadanie wprowadzony został.

30. Na zabezpieczenie ścisłego dopełnienia wszystkich w kontrakcie niniejszym wymienionych zobowiązań i warunków, ustanawia się kaucyę dzierżawną w kwocie kor. (wyraźnie kor.).

Na poczet tej kaucyi składa p. dzierżawca przy podpisie niniejszego kontraktu weksel na kor., płatny dnia 1. Września roku, do którego to czasu zobowiązuje się całą kwotę kaucyi dzierżawnej złożyć wydzierżawiającemu do depozytu w książeczkach wkładkowych Kasy Oszczędności w lub kwitach kasowych Banku hipotecznego. P. dzierżawca obowiązuje się do czasu, dopóki nie złoży wydzierżawiającemu kaucyi dzierżawnej, nie przedsięwziąć żadnej sprzedaży produktów w zadzierżawionych dobrach i poddaje się w tym względzie pod kontrolę wydzierżawiającego względnie jego zastępcy. W wypadku nieuiszczenia kaucyi w terminie powyżej oznaczonym, podpada p. dzierżawca rygorom w ustępie 29. niniejszego kontraktu, przytoczonym. Procent od złożonej kaucyi w takiej wysokości, w jakiej przypadać będzie, zostanie p. dzierżawcy przy placeniu rat półrocznych czynszu dzierżawnego, przez wydzierżawiającego potrącony.

31. Przy ekspiracyi dzierżawy, skoro p. dzierżawca dopełni wszelkich zobowiązań niniejszym kontraktem na siebie przyjętych, zostanie mu kaucya dzierżawna przez wydzierżawiającego zwrócona.

32. Strony kontraktujące zrzekają się prawa nastawania na ważność niniejszego kontraktu dzierżawnego z jakiegokolwiek powodu, a w szczególności z powodu pokrzywdzenia ponad połowę wartości.

33. Kontraktu niniejszego nie wolno ani intabulować, ani prenotować na jakichkolwiek bądź dobrach wydzierżawiającego.

34. Koszta ze sporządzeniem tegoż kontraktu połączone, t. j. należytość stemplową, jakoteż należytość skarbową od tego interesu dzierżawnego, wymierzyć się mającą, ponosi p. dzierżawca.

35. Kontrakt niniejszy sporządza się w jednym egzemplarzu; oryginał zostaje w ręku wydzierżawiającego, zaś p. dzierżawca otrzymuje widymowany odpis takowego. Zaznacza się wreszcie, że p. dzierżawca złożył przy podpisie niniejszego kontraktu półroczną ratę czynszu dzierżawnego w kwocie kor. (wyraźnie kor.), w miejsce weksłu,

na kaucyę w całej wyżej przy § 30 wymienionej kwocie. Niniejszy kontrakt dzierżawny strony działające jako zgodnie z wolą swoją spisany i zupełnie zrozumiały uznają i w dowód tego własnoręcznie podpisują.

Kontrakt dzierżawny.

1., właściciel z przyległościami, działając przez swego pełnomocnika W Pana wypuszcza W-mu folwark z wszystkimi do tego folwarku należącymi gruntami ornymi, łąkami, ogrodami, pastwiskami, wawozami, brzegami, rowami, miedzami, nieużytkami, — jednym słowem, z wszystkimi gruntami w tej rozciągłości i w tych granicach, w jakich obecnie do wydzierżawionego folwarku należą, i które W-mu są zupełnie znane, ze wszystkimi budynkami mieszkalnymi i gospodarskimi, dziedzińcem i drogami, na lat od dnia pierwszego lipca tysiąc dziewięćset do końca czerwca tysiąc dziewięćset roku. Wydzierżawiający nie ręczy ani za ilość, ani za rozmiar, ani za jakość gruntów, budynków i innych przedmiotów dzierżawnych, a Wny podpisem niniejszego kontraktu oświadcza i potwierdza, że co do ilości, rozmiaru i jakości tychże przedmiotów dzierżawnych z jego strony zarzuty nie są dopuszczalnymi.

2. Czynsz dzierżawny, przez działające strony dobrowolnie omówiony, stanowi się po koron, wyraźnie koron rocznie, który to czynsz dzierżawny W Pan dzierżawca w równych ratach po koron, wyraźnie koron każdego pierwszego lipca, każdego pierwszego każdego roku dzierżawnego, począwszy od dnia pierwszego lipca tysiąc dziewięćset roku z góry, w kasie prowentowej dóbr gotówka, płacić się zobowiązuje. Spłata rat dzierżawnych ma się odbywać w gotówce, t. j. w banknotach austriackich, albo według życzenia w srebrze.

3. Przed oddaniem przedmiotów dzierżawnych, zrobi się spis inwentarza budynków z wewnętrznem urządzeniem, studzien, płotów, baryer i innych zagrożeń, mostów niniejszą umową dzierżawy bezpłatnie i bez obowiązków płacenia osobnych procentów od ich wartości oddanych, tudzież pól, łąk, pastwisk, ogrodów, dróg, rowów, miedz, szkarpów, brzegów, potoków, nieużytków, następnie drzew owocowych, ozdobnych i dzikich, na których to inwentarzach będzie wyszczególniony i spisany stan, w jakim się znajdują w czasie oddania W Panu i w którym to stanie W-ny dzierżawca obowiązany będzie przez cały czas trwania niniejszej dzierżawy takowe utrzymywać i przy ekspiracyi dzierżawy, albo w razie rozwiązania niniejszego kontraktu — uwzględniając normalne zużycie — Wydzierżawiającemu oddać. Inwentarze te, stanowią integralną część niniejszego kontraktu i zostaną przez obie strony wobec świadków podpisane, a W Panu dzierżawcy przedmiot nie będzie oddany w fizyczne posiadanie dopóty, dopóki spis inwentarza nie będzie przez W Pana dzierżawcę wobec dwóch świadków podpisany, jako dowód rzeczywistości opisu przedmiotów w tym spisie wyszczególnionych. A gdyby W-ny dzierżawca nie podpisał tego spisu inwentarza przed 1-szym lipca 19 .., natenczas podpis delegowanego i przez zarząd dóbr w upoważnionego urzędnika wydzierżawiającego, wobec dwóch świadków podpisanych i jednego sąsiada jako rzeczoznawcy, obowiązuje W-go dzierżawcę i czyni ten spis inwentarza tak prawomocnym, jakgdyby został podpisany przez samego p. dzierżawcę, na co W Pan zupełnie się zgadza. Wydzierżawiający zastrzega sobie wyraźnie wolność, przez delegowanego i przez zarząd dóbr w upoważnionego do tego urzędnika, kontrolowania budynków, ich urządzeń, ogrodzeń, pól, łąk, pastwisk, mostów, rowów, drenowań, drzew i wszystkich innych przedmiotów, należących do dzierżawy folwarku. W wypadku, gdyby tenże

spozstrzegł jakie najmniejsze zaniedbanie, będzie miał prawo W-go dzierżawcę do uskutecznienia odnośnej naprawy zaważać, a jeśliby W-ny dzierżawca do dni 14 (czternastu) do naprawy spostrzeżonej i skostatowanej dezelacyi albo zaniedbania nie przystąpił, natenczas przysługiwać będzie Administracyi dóbr wydzierżawiającego, uczynić to na koszt kaucyi W-go Pana dzierżawcy w myśl punktu 15 i 26 niniejszego kontraktu, a WPan dzierżawca będzie obowiązany tak uszczuploną kaucyę do 8 (ośmiu) dni uzupełnić.

4. WPan dzierżawca nie ma prawa pod żadnym pozorem, lub z powodu jakichkolwiek petensyi do wydzierżawiającego, wypłaty czynszu dzierżawnego w całości, lub części zatrzymywać, lub takowej kompensować, lub do depozytu sądowego, czy jakiegokolwiek innego składać, co gdyby nastąpiło, t. j. gdyby WPan dzierżawca czynszu na dniu i terminie do rąk właściciela lub przez Zarząd dóbr w upoważnionego do tego urzędnika, albo w kasie prowentowej w nie zapłacił, lub takową do rąk innych złożył, Właściciel wydzierżawiający będzie miał prawo uważać czynsz dzierżawny jako nie zapłacony i kontrakt niniejszy rozwiązać, WPana dzierżawcę z dzierżawy usunąć i folwark w mowie będący, we własny zarząd na korzyść swoją odebrać, albo kołnu innemu wydzierżawić, a to pod rygorem punktu 15 i 26 niniejszego kontraktu.

5. WPan dzierżawca zobowiązuje się:

- a) wszystek produkowany obornik, przez cały czas trwania niniejszego kontraktu, kolejno, na wszystkie pola do dzierżawy należące wywozić, i tak długo na żadne pola drugi raz nie wywozić obornika, dopóki wszystkie inne pola nie zostaną nawiezione;
- b) obchodzić się z nawozem stajennym i z gnojówką w stajniach na gnojarni i w polu oraz materiały nawozowe konserwować tak, jak to odpowiada przepisom racjonalnego gospodarstwa rolnego;
- c) mierzwy, słomy, plew, okłotów, zboża na pniu albo w snopie, siana albo innej paszy zielonej, albo suchej, ani sprzedawać, ani darować, ani wypożyczyć, ani wogóle z gruntu folwarku dokądkolwiek wydać,

wywozić, palić, ani też za inny produkt, albo nawet za nawóz wymieniać lub obornik z czemkolwiek kompensować. Wynajem łąk zaś dozwolonym jest za gotówkę, za robotę albo za udział, tylko pod warunkami określonymi w punkcie 17 niniejszego kontraktu. Wogóle W-ny dzierżawca ma obowiązek tak gospodarować, iż co do czystości pól i ich siły produkcyjnej i wogóle wartości nie powstanie deprecyacja i owszem obowiązkiem W-go dzierżawcy jest wydzierżawiony mu przedmiot w wartości podnieść i ochraniać przeciw jakimukolwiek uszkodzeniu.

6. Podatki, datki jakiegokolwiek nazwy mające, dziś istniejące i w przyszłości istnieć mające, a to gruntowe, domowo-klasowe, rządowe z dodatkami krajowymi, powiatowymi, gminnymi, tudzież kontrybucye wojenne, ciężary patronatu, konkurencyjne, drogowe, kościelne, szkolne i dla nauczycieli, dla regulacji rzek, zabezpieczenia brzegów z własnością gruntu związane ciężary, obowiązują się splancać i uiszczać wydzierżawiający sam, wszystkie zaś podatki zarobkowe, osobisto-dochodowe i inne ciężary tyżące się dzierżawy folwarku i wszelkich przedsiębiorstw z dzierżawą połączonych, lub osobę dzierżawcy, jego majątku, dochodów i interesów dotyczące, już istniejące lub też w przyszłości ustanowić się mające, jak nie mniej wszelkie ciężary i prestacye, które z mocy istniejących albo też w przyszłości obowiązujących ustaw, na przedmiot dzierżawcy spadają — jako to prestacye drogowe w robociznie lub okupie pieniężnym takowych, kwaterunek wojsk, dostawy i dostarczenie podwód, straże nocne i tym podobne, obowiązany jest WPan dzierżawca

ponosić sam i opłacać z własnego, bez regresu do Wydzierżawiającego. Gdyby WPan dzierżawca, nie dopełniwszy tych obowiązków, naraził Wydzierżawiającego na jakąkolwiek odpowiedzialność, obowiązany będzie, pod rygorem punktu 15-go niniejszego kontraktu, zwrócić temuż wszystkie koszta kary i poniesione z tego powodu straty.

7. W-ny dzierżawca obowiązują się c. k. rządowi dostarczyć wszelkich produktów, jakie się

na przedmiocie tej dzierżawy znajdują, jeżeli w czasie trwania tej dzierżawy przez c. k. Rząd na nie nałożone będą. Gdyby zaś c. k. Rząd za dostawione produkta przy odebraniu ich nie zapłacił, zobowiązuje się Wydzierżawiający zwrócić WPanu dzierżawcy za złożeniem jednakże w ręce Wydzierżawiającego odnośnych dowodów i dokumentów, wartość tychże według cen przez c. k. Rząd przeznaczonych, albo gdyby c. k. Rząd w chwili dostarczenia produktów żadnych cen nie postanowił, według cen takich, jakie istniały we Lwowie na targu w chwili dostawy, z potrąceniem kosztów odstawy do Lwowa. W takim razie, przyznane przez władzę wynagrodzenie za dostawy, których wartość Właściciel wydzierżawiający W-mu dzierżawcy zwróci, należec będzie do Właściciela, któremu też W-ny dzierżawca winien będzie wydać formalną cesę co do swych praw do wynagrodzenia za dostawy w przeciwnym bowiem razie, Wydzierżawiający nie będzie obowiązany zapłacić dzierżawcy wynagrodzenia za dostarczone produkta.

8) Wszelkie ustawy i przepisy, odnoszące się do przedsiębiorstw i wogóle do interesów W. dzierżawcy, obowiązany tenże ściśle dotrzymywać i przestrzegać, ponieważ za uchybienie przeciw tymże, będzie osobiście i całym swoim mieniem nie tylko wobec władz odpowiedzialnym, ale nadto winien będzie wydzierżawiającemu wynagrodzić wszelką szkodę, jakaby poniósł wydzierżawiający z powodu niestosowania się W-go dzierżawcy do tych przepisów.

9. Na utrzymanie budynków i ogrodzeń, studzien mostów krytych i murowanych, kanałów i drenowań, jakie według punktu trzeciego niniejszego kontraktu W-mu dzierżawcy zostaną oddane, i jakie ma konserwować W. dzierżawca na własny koszt, otrzyma W. dzierżawca przez cały czas dzierżawy tylko drzewo budowlane, w kragłym stanie, albo na pniu w lesie, do klucza należącym, albo na stacyi kolejowej , cegły, dachówki i dreny loco cegielnia, piasek w piaskowni, a to na podstawie, w pierwszej połowie miesiąca października ka-

żdego roku przedsięwziąć się mających, oględzin wspólnych, między delegatem Zarządu dóbr i Wnym dzierżawcą. Tylko w wyjątkowych nagłych wypadkach na żądanie W-go dzierżawcy, będą wydane w innym czasie, w ciągu roku dzierżawnego osobne asygnacye na materiały powyżej wspomniane. Inne materiały budowlane wyżej nie wspomniane i słomę na poszycie dachów w gotowych snopkach W. dzierżawca ma sam z własnego dostarczyć, a gdyby tego zaniechał, natenczas Zarząd dóbr wydzierżawiającego ma prawo dostarczenia potrzebnych materiałów budowlanych, jakich nie posiada, jak żelazo, gwoździe, drut, cement i t. p. na koszt W. dzierżawcy, a koszt kupna i dostawy tychże potrącić z kaucyi. Tak samo, jeżeli W. dzierżawca nie przywiezie, nie oprawi i nie dostawi potrzebnego drzewa budowlanego, dachówki, cegiel, drenów i piasku, oraz innego materiału budowlanego do konserwacyi budynków, ogrodzeń, studzien, rowów i t. p. i nie naprawi, mimo skonstatowanej potrzeby, wykona, w myśl punktu trzeciego niniejszego kontraktu, Zarząd dóbr wydzierżawiającego reparacyę na koszt W. dzierżawcy.

10. Jeżeliby budynkowi jakiemu groziło zawalenie, a skonstatowanem zostało, że to nie z winy W. dzierżawcy powstało, tak iż przesypanie lub wymurowanie na nowo tego budynku byłoby potrzebne, — o czem W. dzierżawca jest obowiązany na czas zawiadomić Zarząd dóbr wydzierżawiającego, w takim razie wydzierżawiający sam poniesie cały koszt tej rekonstrukcyi z własnego i W. dzierżawca ma uskutecznić tylko dowóz wszystkich materiałów w obrębie dóbr albo na stacyi kolejowej jemu asygnowanych. Jeżeli zaś dach budynku zburzonego jest słomiany, natenczas żytniej słomy prostej (okłotów) na snopki dachowe w wystarczającej ilości i dobrej jakości W. dzierżawca z własnego dostarczyć jest obowiązany. Gdyby W. p. dzierżawca nie uwiadomił na czas Zarządu dóbr wydzierżawiającego, iż budynek grozi zawaleniem, albo gdyby zawalenie się nastąpiło z winy W-go dzierżawcy, z powodu zaniedbania we właściwej porze odpowiedniej konser-