

Sprawozdanie Dyrektora


c. k.

Gimnazjum św. Józefa

w Krakowie

za rok szkolny

1890.



SPRAWOZDANIE DYREKTORA

C. K.

GIMNAZYUM ŚW. JACKA

W KRAKOWIE

za rok szkolny 1890.



KRAKÓW.

NAKŁADEM FUNDUSZU NAUKOWEGO.

Druk Wł. L. Anczyca i Spółki, pod zarządkiem Jana Gadowskiego.

1890.



400128

1890

Biblioteka Jagiellońska



1003046642

Stary kase'6
Progr. sakolne

Galicyskie pająki z rodziny Salticoidae.

Podał

Władysław Kulczyński.

W r. 1884 podałem wykaz galicyjskich pajaków, należących do wymienionej w napisie rodziny ¹⁾. Przez pracę tę chciałem przyszłym pracownikom na polu naszej arachnologii rzecz uprościć i ułatwić, wskazując w literaturze arachnologicznej źródła użyteczne i niezbędne, uzupełniając tę literaturę pod względem synonimicznym czy opisowym wszędzie, gdzie zauważyłem pewne braki lub błędy, wreszcie zbierając krytycznie w jedną całość wszystko to, co znaleźć można w pismach naszych i obcych o naszej faunie pajęczej. Zamierzoną i rozpoczętą w ten sposób rewizją całej arachnofauny galicyjskiej przerwać musiałem z powodu innych zajęć, o których jednak nie wątpię, że nadarzając mi sposobność poznania w naturze bardzo wielu obcych gatunków, znanych mi dawniej jedynie z opisów — mniej lub więcej niedokładnych — wyjdą témsamém na korzyść zamierzonej rewizyi, chociaż ją trochę opóźnią.

¹⁾ Przegląd krytyczny pajaków z rodziny *Attoidae* żyjących w Galicyi. (Rozprawy i Sprawozd. Wydź. matem.-przyr. Akad. umiej. w Krakowie, tom XII). — Nazwę rodziny *Attoidae* zmienił Prof. T. THORELL na *Salticoidae* w r. 1887 (*Trimo saggio sui ragni Birmani*) z powodu, że *Attoides* jest nazwą pewnego rodzaju pajaków, a dlatego forma „*Attoidae*“ nie może być używaną jako nazwa rodziny. Zmiana ta byłaby niepotrzebną, gdyby ogólnie przyjęto uchwalone w roku przeszłym przez międzynarodowy kongres zoologiczny w Paryżu prawidła nomenklatury — co jednak nie wydaje mi się prawdopodobném.

Przed przystąpieniem do dalszego ciągu owęj rewizyi chciałbym obecnie pierwszą jęj część, odnoszącą się do *Salticoidów*, uzupełnić, uwzględniając nietylko zmiany zaszłe w tym dziale arachnologii od r. 1884, ale także usterki prac dawniejszych, które przedtęm uszły męj uwagi. Na wstępie podaję kilka uwag nad arachnologiczną literaturą wogóle, które może nie będą całkiem bez użytku.

Niedostatki dotychczasowęj arachnologicznęj literatury poznałem dokładnięj niż przed rokiem 1884, układając tablice analityczne do oznaczania pajaków węgierskich, przeznaczone do pracy rozpoczętęj przez Dra K. CHYZERA w Satoralja Ujhely. Inaczęj ocenia się cudzą pracę, korzystając z nięj praktycznie i nie mając czasu na dochodzenia, czy autor dzieła, czy tęż posługujący się tęm dziełem winien, że trudno pogodzić rzeczy widziane z pisanyimi, — inaczęj znowu, kiedy chcąc pracować na danych w nauce podstawach, jest się zmuszonym krok za krokiem sprawdzać te dane, zanim się je wcieli we własną pracę, jako uznaną i ogólną własność nauki.

Ktokolwiek miał do czynienia z zoologią opisową, choćby tylko w zamiarze oznaczenia (czy „określenia“, jak się mówi w Warszawie) jakiegoś okazu, przyzna, że z trudnościami spotykał się na każdym kroku. Trudności takie przypisuje się n. p. niedostatkowi zebranego materiału, brakowi książek, „lepszych niż te, któryimi się rozporządza“, czasem przypuszcza się, że przedmiot jest trudny i głębszych wymaga studyów. Do tych rozmaitych, w naszych zwłaszcza stosunkach zbyt często rzeczywistych powodów dodać można jeszcze jeden: niski stan zoologii opisowęj wogóle.

Nie tu miejsce rozpisywać się nad tym stanem, jego przyczynami i skutkami; rozrosła się zresztą systematyka zoologiczna do tego stopnia, że o jęj niedostatkach mówiąc, nie pokusiłby się zapewne nikt o uwzględnienie całego przedmiotu, chyba by chciał wykazać w kilku ogólnikach, że jak jednostronnym był niezbyt dawny kierunek zoologii prawie wyłącznie opisowy, tak tęż pomiatanie tym kierunkiem, z jakim dziś zbyt często spotkać się można u powołanych i niepowołanych anatomów porównawczych, znowu do celu nie prowadzi, a ustąpić powinno harmonijnemu rozwojowi wszystkich gałęzi zoologii.

Pająki nie cieszą się szczególną sympatją zoologów, choć na nie zasługiwałyby z wielu względów. Niezupełnie łatwe do zbierania, trudniej się przechowują niż n. p. owady, a w zbiorach przedstawiają się tak, że ich nawet porównywać nie można z chrząszczami czy motylami. Dla tych, wprawdzie całkiem nie naukowych, ale — nie wątpię — rzetelnych powodów, liczba arachnologów czy arachnografów, rozrzuconych po wszystkich częściach świata, dochodzi zaledwie paru dziesiątek i długo zapewne jeszcze mierzyć się nie będzie mogła z zastępami zbierających i piszących koleoptero- lepidopterologów i t. d. Ubogą też stosunkowo okaże się literatura arachnologiczna, jeżeli ją oceniać będziemy nie podług liczby tytułów mniejszych i większych prac¹⁾, ale podług treści.

Dotkliwie daje się uczuć brak dzieł szerszego zakresu (monografij czy opisowych faun całych krajów), w którychby można znaleźć zestawione wiadomości dawniejsze, w dany zakres wchodzące, a przynajmniej w miarę możności krytycznie przerobione i do chwilowego stanu nauki dostosowane. Pod tym względem uczynili zadość słusznym wymaganiom czasu tylko szwedzi²⁾ i anglicy³⁾. Wskutek tego trzeba prawie przy każdej pracy oglądać się niemal na całą literaturę dawniejszą, przyczém kierować się tytułami rozpraw byłoby rzeczą nieporadną, w obecnym bowiem stanie literatury nie można być pewnym, czy n. p. w jakiej pracy o pająkach zebranych na Sumatrze nie znajdzie się wiadomości, że galicyjskie gatunki *Hasarius arcuatus*, *falcatus* i t. d. nie należą do rodzaju *Hasarius* ale *Ergane*. Utrudnia to rzecz bardzo, zwłaszcza, jeżeli nie ma się sposobności korzystania z bibliotek przynajmniej miernie zaopatrzonych w peryodyczne i zbiorowe pisma zoologiczne.

¹⁾ Spis prac z zakresu systematyki pajaków podał Prof. Dr. T. THORELL w dziełach: *On European Spiders*, Upsala 1869-70, str. I-XXII i 234—235, i *Remarks on Synonyms of european Spiders*, 1870-73, str. 584—589. Prace z lat 1861-80 zestawione są w Dra O. TASCHENBERGA *Bibliotheca zoologica II*; tytuły prac z ostatnich lat, od r. 1878, podaje lipski *Zoologischer Anzeiger*.

²⁾ T. THORELL, *Recensio critica aranearum, quas descripserunt Clerckius, Linnaeus, De Geerus*. Upsala 1855-56.

Id., *Om Clercks original-spindelsamling*. 1858.

Id., *Remarks on Synonyms &c.*

³⁾ O. P. CAMBRIDGE, *The Spiders of Dorset, with an Appendix containing short descriptions of those British species not yet found in Dorsetshire*. Sherborne 1879-81.

Pracujący nad systematyką czy geografią pajaków naraża się, nie uwzględniając całej dawniej literatury do ostatnich możliwych granic, na „odkrywanie“ dawno opisanych gatunków i dawno zapisanych faktów z geografii zwierząt. Z drugiej strony t. zw. korzystanie z téj dawniej literatury zbyt często nazwaćby należało nie korzystaniem, ale ciężkim mazołem, który dobrze jeszcze, jeżeli nie wyjdzie na prostą stratę czasu.

W przeciwieństwie do niektórych gałęzi zoologii, mazołających się — często bez należytego skutku — nad wyszukaniem i odpowiedniemi wyszukaniem cech t. zw. gatunkowych, arachnologia ma zadanie ograniczania gatunków stosunkowo nadzwyczaj ułatwione: łatwo jest jój poznać się na podrzędnych zmianach barw, kształtów, wielkości, gdy znajduje cechy pierwszorzędnego znaczenia w narzędziach rozrodczych nieskończenie urozmaiconych, a przecież w obrębie każdego gatunku stałych, jeżeli nie bezwzględnie, to przynajmniej w jasnych granicach. Po tych cechach odróżnia dziś arachnologia całe szeregi gatunków niepozornych, n. p. w rodzaju *Erigone*, o których obfitości dawniejsi pisarze pojęcia nawet nie mieli; w tych cechach znajdują się — zdaniem mojem, opartém na dość gruntownych, choć niedokończonych poszukiwaniach — znakomite skazówki co do rzeczywistego powinowactwa gatunków, rodzajów i t. d., chociaż to dzisiaj niektórym arachnologom wydaje się nieprawdopodobném. Nieuwzględnianie tych cech było głównym błędem dawniej arachnografii, niedostateczne ich uwzględnianie uważam stanowczo za najważniejszy niedostatek dzisiejszych prac ¹⁾.

Tak pod tym, jak i pod każdym innym względem w arachnologii za granicę pomiędzy czasami dawnymi a dzisiejszymi uważać trzeba lata 1869—1873, w których wydał Prof. TAMERLAN THORELL swoje: *On European Spiders* i *Remarks on Synonyms of European Spiders*. Nie chcę tymi słowami ubliżać autorom, którzy przed owym czasem pisali, są bowiem pomiędzy nimi pierwszorzędne znakomitości i z zasług i z poświęcenia; lekceważenie wszystkich dzieł zprzed roku 1869, dlatego tylko, że dawniejszą na sobie noszą datę, byłoby chyba dowodem nieznajomości rzeczy. Ale dowód na

¹⁾ Porówn: Przyczynek do tyrolskiej fauny pajęczaków, tom XVI Rozpraw i Sprawozd. Wydź. mat.-przyr. Akad. um., str. 246-9 i wyciągu niemieckiego str. 2—3.

to, że od wymienionych pism Thorella zaczęły się dla arachnologii nowe czasy, znajdzie każdy w pracach różnych arachnologów, nawet i takich, którzy poprawiając Thorella w drobnostkach, radziby światu okazali, że sobie, nie komu, postępowanie zawdzięczają.

Bałamatna nomenklatura, opisy gatunków nieraz trudnych do odróżnienia, a przecież także, że z nich czasem niewiele więcej dowiedzieć się można, jak, że autor miał przed sobą rzeczywiście pająka a nie roztocza n. p., rodzaje tak rozległe i nieokreślone, że od nich krok tylko jeden do zmieszania tysięcy gatunków w jedną stajnię Augiaszową pod nazwą *Aranea* L. czy *Araneus* Cl., to znowu drobne grupy gatunków łączonych w jeden rodzaj dlatego tylko, że autorowi wydawały się podobne, choć w rzeczywistości nie ze sobą wspólnego nie mają, i t. d. — oto szkopyły, o które rozbijają się zbyt często nietylko zamiary tego, kto bierze dawniejsze prace arachnologiczne w rękę w celu ich „wyzyskania“, ale i najlepsze chęci człowieka sięgającego do tych źródeł na to, aby uznać i uczyć pracę innych, ocenioną podług miary ich czasów i ich środków.

Od lat dwudziestu w arachnologii zaczęły się w ogólności nowe czasy; w ogólności tylko, bo nie brakło i później anatomów, którzy nie uważali za rzecz koniecznie potrzebną dowiedzieć się pierwój dokładnie nazwy zwierzęcia, zanim je rozebrali, ani nie brakło kompilatorów, zestawiających tablice analityczne dla szerszego użytku na podstawie prac dawniejszych, z pomiędzy których starannie wydzielili wszystko to, co właśnie zasługiwało na uwzględnienie. Komu zatem trzeba byłoby dowiedzieć się nazwy pająka jakiegoś, ten gdy weźmie za podstawę dzieła z ostatnich lat dwudziestu a dojdzie do zamierzonego celu, mniej więcej może przypuścić, że w błąd nie popadł, używając w razie potrzeby pism dawniejszych, pamiętać winien o wspomnianym wyżej przełomie w arachnologii. Że jednak pomiędzy przyrodnikami bywają zdolniejsi i mniej zdolni, lepsi i gorsi obserwatorowie, pilniejsi i mniej pilni, że dalej trafiają się bogate zbiory i muzea przystępne tylko miernym pracownikom i naodwrot znakomici pracownicy z ubogimi zbiorami, — nie dziwnego, że nie wszystko, co po roku 1870 wydrukowano, jest prawdziwem i dobrém.

Znakomicie postąpiła arachnologia ostatnimi czasy, między innymi, w rozdziale gatunków na rodzaje, to rozbijając zbyt obszerne dawne rodzaje złożone z form nadto różnorodnych, to określając ściślej inne, o których często powiedzieć można, że dawniejsi autorowie tworząc je, kierowali się chyba tylko przeczuciem. W rodzinie *Salticoidae*, złożonej z gatunków żyjących mniej skrycie niż wiele innych, stąd więcej w oko wpadających i zastąpionych w zbiorach podróżników stosunkowo najobficiej, zrzucali dawniejsi pisarze prawie wszystko w jeden rodzaj „*Attus*“ lub „*Salticus*“. C. L. KOCH podzielił tę rodzinę na dość znaczną liczbę rodzajów, ale nie doszedł do ich ścisłego określenia. Chociaż późniejsi mnóstwo tych „*Attusów*“ dokładniej zbadali i rozrzucili w rodzaje ściślej określone, cięży jeszcze na arachnologii pozostała czereda w liczbie 220 — podług mojego katalogu, niezupełnego, bo dotąd nie udało mi się jeszcze ani zakupić ani pożyczyć kilku dzieł większych, jak NICOLETA fauny chilijskiej i rozmaitych prac drobniejszych, n. p. BLACKWALLA, utopionych w nieprzystępnych dla mnie pismach zbiorowych.

W r. 1867 napisał EUG. SIMON w Paryżu monografią europejskich gatunków tej rodziny, a już w r. 1869 jej rewizyą. Skazówki do oceny tej pracy znajdzie czytelnik rozrzucone tu i ówdzie w pismach Prof. THORELLA; w każdym razie zaliczyć ją wypada do dawniejszego okresu arachnologii.

Prof. THORELL podał w *On European Spiders* podział *Salticoidów* europejskich na rodzaje, oświadczając wyraźnie, że wyniki swej pracy, oparte na niedostatecznym materiale, uważa tylko za tymczasowe. Nie pozostała bez skutku ta praca, która zresztą najsurowszego sędziego znalazła niewątpliwie w autorze samym.

Wspomniany wyżej monograf *Salticoidów* wystąpił w r. 1876 z nowym podziałem rodzajowym tej rodziny w III tomie dzieła *Les Arachnides de France*, któremu po Thorellowych pracach w nowszej arachnologii — w zakresie fauny europejskiej — bąć co bąć piérwsze trzeba przyznać miejsce. Podług autora (porówn. uwagę na str. 3, l. c.) należałoby pracę tę uważać niemal za powtórzenie tego, co znajdujemy w „Monografii“ i „Rewizyi“, ze zmianami pod względem formy tylko znacznymi, w treści drobnymi. Sądzę, że o tej sprawie znacznie odmienne zdanie wyrobi sobie każdy, kto nie cofnie się przed mozolnym śledzeniem wewnętrznego rozwoju arachnologii w latach ostatnich. — Drobne zmiany i do-

datki do wymienionego systemu E. SIMONA znaleźć można w innych pismach tegoż autora, który w przeciągu 26 lat wzbogacił literaturę arachnologiczną bardzo znaczną liczbą prac (znacznie ponad 100), odnoszących się do wszystkich prawie działów systematycznych i do fauny najrozmaitszych krajów.

Na długo zapewne pozostaną *Les Arachnides de France* najważniejszym podręcznikiem dla każdego zbierającego i oznaczającego pająki w Europie. Po tém dziele pojawiły się tylko jeszcze dwie ważniejsze prace, do których uciechy się można w sprawie rodzajowego oznaczenia europejskich *Salticoidów*: hr. EUG. KEYSERLINGA zestawienie analityczne australskich rodzajów téj rodziny w *Die Arachniden Australiens*¹⁾ i *On the Genera of the Family Attidae* G. W. i E. G. PECKHAMÓW (Milwaukee 1885).

Niewiele miałem sposobności do sprawdzenia, o ile praca hr. KEYSERLINGA odpowiada wymaganiom, jakie do tego rodzaju zestawień mieć można pod praktycznym względem; australskich pajaków bowiem wogóle widziałem niewiele, a między nimi *Salticoidów* stosunkowo bardzo mało. Nie wątpię przecież, że system *Salticoidów* — choćby tylko australskich — okaże się w naturze zawilszym, aniżeli przedstawia się w tablicy hr. KEYSERLINGA: rozcinając tę rodzinę zwierząt na 2, 4, 8 i t. d. części, a zawsze tylko na podstawie jednéj cechy, niepodobna chyba dojść do naturalnych rodzajów. Pomiędzy cechami użytymi w owej tablicy są téż i takie, które — zmienne nietylko w obrębie jednego rodzaju, ale nawet w obrębie niektórych europejskich gatunków (t. j. inaczej przedstawiające się u samców, inaczej u samic) — nie mogą same przez się, bez poparcia czy ograniczenia innymi cechami, służyć za stanowcze drogoskazy w powiklanym i krętym systemie *Salticoidów*. Zresztą dla galicyjskich *Salticoidów* tablica hr. KEYSERLINGA małe tylko może mieć praktyczne znaczenie: z 46 rodzajów, które

¹⁾ Dzieło to pozostało niedokończone. Rozpoczął je w r. 1871 Dr. L. KOCH w Norymberdze, pomiędzy niemieckimi arachnologami w zakresie szczegółowej systematyki pierwsza powaga; jego rozległej wiedzy i rzadkiej uczynności zawdzięcza także Galicya, że w zakresie jéj fauny pajęczéj dyletantyzm i dobre chęci nie zagłuszyły rzetelnéj wiedzy. Po Drze L. Kochu, gdy podobnie jak jego ojciec C. L. KOCH, autor dzieł *Die Arachniden* i *Deutschlands Crustaceen, Myriopoden und Arachniden*, oślepl prawie nad pajakami, podjął pracę w r. 1881 hr. KEYSERLING, znakomity znawca fauny amerykańskiej. Ostatni zeszyt wymienionego dzieła wyszedł w r. 1887. Hr. Keyserling zmarł w roku przeszłym.

zawiera, 7 tylko żyje w Galicyi; brak w niej 12-tu naszych rodzajów, a pomiędzy nimi najobfitszych w gatunki.

РЕСХАМÓВ praca jest przedewszystkiém kompilacją, sumienną i dokładną, dlatego użyteczną, ale jak kompilacja, w ogóle nie lepszą od pism, z których czerpie. Podaje ona tylko podział rodziny na rodzaje i dyagnozy rodzajów, gatunków nie uwzględnia; dla oznaczeń gatunkowych znajdzie się więc w téj pracy tylko skazówki, mniej lub więcej ogólne, ułatwiające w rozmaitym stopniu używanie pism dawniejszych, o które jednak ostatecznie oprzeć się trzeba.

Posługując się wyżej wymienioną pracą E. SIMONA, można w wielu przypadkach wyszukać prawdziwą nazwę gatunku, zwłaszcza, jeżeli skądinąd zna się już pewną ilość form. Początkującego jednak sprowadzi ta praca często na bezdroża, równie jak i tego, któryby znając już przedmiot mniej więcej, brał rzeczy ściśle tak, jak są napisane. Przypuszczam, że autor rozporządzający kolosalnymi zbiorami, bez trudu może wykrywać prawdziwe stósunki powinowactwa systematycznego tam, gdzie inny, mający do czynienia z materiałem niedostatecznym, nawet przy usilnej pracy żadnego wyjścia znaleźć nie może. Inna jednakże jest rzecz dostrzec, że pewna grupa gatunków należy do jednego naturalnego rodzaju, a inna rodzaj ten dokładnie określić i na wszystkich jego gatunkach sprawdzić, czy się stosują do napisanej dyagnozy rodzajowej. Z analitycznych tablic SIMONA odnosi się czasem takie wrażenie, jak żeby autor podzieliwszy gatunki na rodzaje, z każdego rodzaju wziął do ułożenia tablicy po jednym tylko gatunku. Niesłychane ułatwienie sobie pracy w ten sposób prowadziłoby jednak tak oczywiście do niedokładności i błędów, że nie mogę posądzać autora o podobną metodę. Przypuszczam raczej, że źródła błędów są inne, więcej przypadkowe, trudniejsze do przewidzenia¹⁾. Niejedno dałoby się

¹⁾ W „*Arachnides recueillis par M. Weyers à Sumatra*“, str. 5, podał E. SIMON, że u gatunków *Ergane arcuata*, *falcata*, *laetabunda*, *incunda*, i. i. uzbrojony jest piszczel 4tej pary nóg na grzbiecie u nasady kolcem. Tak jest rzeczywiście u samców wszystkich znanych mi gatunków w rodzaju *Ergane*, t. j. u wymienionych czterech i jeszcze jednego, nieopisanego, z Syberji wschodniej; ale kolca tego brak samicom wszystkich tych gatunków. Widocznie rozszerzył E. SIMON spostrzeżenie zrobione na samcach, także na samice, nie przypuszczając, żeby obie płci mogły się różnić w ubrojeniu tylnych nóg.

wytłumaczyć złudzeniem czy podmiotowymi błędami w zmysłowych spostrzeżeniach. Błędów takich często trudniej uniknąć, niżby się zdawało. Oceniając „na oko“ wymiary pola ocznego u *Salicoidów* otrzymywałem często wypadki niezgodne z podaniami SIMONA; gdy następnie zajął się tą rzeczą gruntowniej, przekonałem się zapomocą pomiarów mikrometrycznych, że własnym oczom dowierzać nie mogę; dla uniknięcia błędów obmyśleć trzeba było osobne środki. Ostatecznie okazało się jednak, że spostrzeżenia SIMONA w ogóle są jeszcze więcej błędne, niż były moje robione „na oko“, bez użycia owych środków ostrożności.

Zresztą błędy, choćby z najrozmaitszych źródeł płynące, na wartość pracy wpływają jednakowo. Błędów nie brak w *Les Arachnides de France*, przedewszystkiém w tablicach analitycznych do oznaczania rodzajów i gatunków, a zatém właśnie w tych częściach, w których błędy może najdotkliwiej dają się uczuć. Tablice takie nie wchodzą właściwie w zakres systematyki, w ściśłym znaczeniu słowa; zato téż wolno im posługiwać się cechami całkiem dowolnymi, nawet nie mającymi dla systematyki prawie żadnego znaczenia. Ich celem jedynym: temu, kto zwierzę jakieś chce oznaczyć, oszczędzić straty czasu połączonej z przeglądaniem setek czy tysięcy opisów gatunkowych, rodzajowych itd. Są tedy tablice analityczne jakby systemem sztucznym, któremu pozwala się chodzić drogami choćby najbardziej krzywymi, byle zawsze doprowadził do należytego punktu w systemie naturalnym. Każdy błąd w tablicy takiej wywołuje stratę czasu, w ogólności tém większą, im wyższe są kategorye systematyczne, do których tablica się odnosi: szkodliwsze są złe tablice do oznaczania rodzajów, niż mylne tablice do oznaczania gatunków itd. Niewdzięczném dlatego w wysokim stopniu jest układanie tablic analitycznych: każdy wyjątek, każda nieprawidłowość — o której w systematyce dość jest wspomnieć mimochodem — przedstawia tu osobną przeszkodę, często więcej trudności sprawiająca, aniżeli wyzyskanie dla tablicy zasadniczych wyników danych przez systematykę. Wobec tego niesprawiedliwością byłoby zapewne oceniać zasługi systematyków podług wartości tablic przez nich zestawionych.

Galicyjskie rodzaje Salticoidów.

Ponieważ wydaje mi się prawdopodobnym, że w dotychczasowej literaturze arachnologicznej nie ma dzieła, podług którego możnaby rodzaje galicyjskich *Salticoidów* oznaczać dość pewnie a przytém nie z większymi trudnościami, niż tego wymaga sama natura przedmiotu, podaję tutaj przegląd tych rodzajów, uwzględniający — z niewielu wyjątkami — tylko galicyjskie gatunki¹⁾.

1. Rodzaj *Salticus* odróżnia się od wszystkich innych naszych *Salticoidów* głową wyniesioną ponad tułów.

2. Z pozostałych 18-tu rodzajów dwa: *Leptorchestes* i *Synageles*, do poprzedniego podobne z powodu szczupłego ciała, óg — przynajmniej z wyjątkiem 1-jej pary — cienkich, odwłoku mniej lub więcej przewężonego (sąto formy określane zwykle, jako „podobne do mrówek“), różnią się od 16-tu innych rodzajów czworobokiem oczu dłuższym niż szerokim. U reszty jest ten czworobok, t. j. pole ograniczone stycznymi zewnętrznymi poprowadzonymi do widzianych z góry oczu przednich bocznych i oczu tylnych, — szerszy niż długi. W ten sposób, zdaje mi się, lepiej jest zacząć rozdział *Salticoidów* na rodzaje, aniżeli to zrobił E. SIMON. Zwłaszcza do cech wziętych przez tego autora z kształtu mostku (*sternum*, *plastron*) mało mam zaufania; przypuszczam nawet, że one okażą się często błędnymi, chociaż stanowczo tego powiedzieć nie mogę, a wnoszę tak tylko z licznych zawodów, jakie mnie spotkały w innych grupach przy sprawdzaniu opisywanych wymiarów mostku. Dla odróżnienia rodzajów: *Leptorchestes* i *Synageles* lepiej będzie w każdym razie oprzeć się — w dodatku do odmiennego kształtu

¹⁾ W przeglądzie tym, mającym na celu jedynie praktyczne rozpoznawanie rodzajów, grupują się te rodzaje w następujący sposób:

- 1. *Salticus*.
- 1:2. *Leptorchestes*, *Synageles*.
- 2:3. *Neon*, *Ballus*, *Oedipus*.
- 3:4. *Aelurillus*, *Ergane*, *Pellenes*.
- 4:5. *Epiblennum*.
- 5:6. *Marptusa*.
- 6:7. *Dendryphantes*, *Pseudicius*.
- 7:8. *Phlegra*.
- 8:9. *Philaeus*.
- 9:10. *Heliophanus*,
- 10:11. *Yllenus*.
- 11: *Attus*, *Euophrys*.

wargi dolnej — o kształt czworoboku ocznego (wyraźnie szerszego z tyłu niż na przedzie w rodzaju *Leptorchestes*, nie szerszego albo ledwie że szerszego w rodz. *Synageles*), aniżeli o szerokość mostku i bioder nóg średnich, które bez mikrometru i mikroskopu oceni się zapewne najczęściej mylnie.

3. Dzielać — za SIMONEM — dalszych 16 naszych rodzajów na dwie grupy podług długości głowy i tułowiu, nie napotyka się pospolicie na wątpliwości. Ale już dla węgierskich rodzajów dobrze jest określić rzecz wyraźniej: porównywać nie nieokreśloną „część głowową“ z „częścią tułowiową“, lecz długość czworoboku ocznego z długością dalszej części tułowia, obojga widzianych prosto z góry (pierwszy nie jest krótszy od drugiej w rodzaju *Ballus* itp., wyraźnie krótszy w rodz. *Attus* itp.), a nadto obwarować tę cechę, na przypadki wątpliwości, inną: w pierwszej grupie, piszczel III¹⁾ wraz z rzepką krótszy jest od odpowiednich członków IV-jej pary nóg, członek piętowy IV koleców wyraźnych nie posiada, chyba na końcu; w wątpliwych formach drugiej grupy albo wymienione członki III dłuższe są od IV, albo członek piętowy IV kolecami opatrzony jest nietylko na końcu. Z grupy pierwszej (*Ballus* itd.) znam z opisanych przez SIMONA tylko rodzaje *Ballus* i *Neon*, nie znam: *Eris* (obecnie *Ericulus*) i *Neera* (*Neaetha*). Mylna jest cecha służyć mająca podług SIMONA do odróżnienia tych dwu skupień (*Ballus-Neon* i *Eris-Neera*), przynajmniej o tyle, że w pierwszym z nich nie zawsze są nogi III całkiem bezbronne.

Neon, z którego znam 3 gatunki, różni się od rodzaju *Ballus*, jak SIMON podaje, czworobokiem oczu „nie rozszerzonym“ ku tyłowi; dla tych, którzy nie mieliby dosyć form do porównania, nie będzie zbyt cennym dodać, że w rodzaju *Neon* bywa wprawdzie tylny szereg oczu nieco szerszy od przedniego, ale różnica jest tak mała, że odległość zewnętrznych brzegów oczu przednich bocznych jest większa (w rodzaju *Ballus* mniejsza), aniżeli odległość wewnętrznych brzegów oczu tylnych. Podanych tutaj w *Les Arachn. de France* cech wziętych z szerokości mostku, nie tykam. — Rodzaj *Ballus* niezłe może będzie, za przykładem MENEGEGO, rozbić na dwa: *Ballus* i *Oedipus*; piszczel III bowiem jest u ostatniego na przedniej stronie koło środka długości uzbrojony kolcem (podo-

¹⁾ Liczbami I—IV oznaczam za przykładem SIMONA pary nóg od 1-jej do 4-jej.

bnie, jak bywa, a może i jest zawsze, w rodzaju *Neon*), u pierwszego bezbronny; oczy drugiego szeregu leżą u ostatniego ledwie o $\frac{1}{3}$ bliżej, u pierwszego zaś 2 razy bliżej oczu przednich bocznych aniżeli oczu tylnych. Mniejsze znaczenie ma obecność na ciele w rodzaju *Oedipus* łusek mieniających się, a brak ich w rodz. *Ballus*. Czy rozdział ten da się utrzymać dla form egzotycznych, nie wiem, znam bowiem z obydwu rodzajów tylko po jednym gatunku (*Ball. depressus* i *Oed. aenescens*).

4. Z trzynastu dalszych rodzajów oddziela E. SIMON od reszty drobną grupę (*Marptusa* i *Hycitia*, której u nas nie ma) na na tej podstawie, że u niej biodra przednie są do siebie całkiem zbliżone, u reszty zaś oddalone o szerokość wargi. W „Przeglądzie krytycznym“ (str. 67) zwróciłem uwagę na to, że z cechą tą trzeba być ostrożnym, ważną ona bowiem jest tylko dla okazów całkiem dorosłych; z niedorosłymi zajdzie się podług tablicy w *Les Arachn. de Fr.* na bezdroża. Później spostrzegłem, że w błąd popaść można także z rodzajem *Yllenus*, u którego biodra wspomniane są także więcéj do siebie zbliżone, niż bywa zwykle, choć nie w takim stopniu, jak w rodzaju *Marptusa*. Porzuciwszy tę cechę, albo raczej przyznając jęj tylko znaczenie mniejsze, zgodne prawdopodobnie z jęj rzeczywistą systematyczną wartością, staje się przed czeredą gatunków dość liczną, którą, chcąc dalej rozbić, trudno wiedzieć jak zacząć. Może jeszcze najlepiej oprzeć się, za wzorem SIMONA, o zmienną długość puszczela z rzepką III i IV pary nóg. Czyby się nie dał znaleźć lepszy punkt wyjścia, powiedzieć nie mogę; że ten najlepszym nie jest, dowiedziałem się w ciągu pracy nad węgierskimi pajakami, kiedy używszy tej cechy za SIMONEM w dobrej wierze, musiałem następnie przegląd rodzajów z trudem zbudowany, a rozpadający się ku mojemu zmartwieniu, ratować dodatkowo cechami innymi.

W rodzajach *Aelurillus*, *Ergane*, *Pellenes*, mieszczą się między innymi gatunki, u których puszczel z rzepką w III-jej parze nóg jest widocznie dłuższy aniżeli w IV-jej parze. Przeciwnie, wymienione członki są widocznie krótsze w III-jej parze aniżeli w IV-jej u przeważnej liczby gatunków z rodzajów: *Epiblemum*, *Marptusa*, *Pseudicius*, *Dendryphantes*, *Phlegra*, *Philaeus*, *Heliophanus*, *Yllenus*, *Attus*, *Euophrys*. Ale trafiają się formy — w rodzajach *Aelurillus*, *Philaeus*, *Ergane*, *Euophrys*, — z którymi zawsze porównać można, czy się owe długości oceniać będzie mniej dokła-

dnie czy nawet bardzo dokładnie. Przyjmując w zasadzie rzeczoną cechę — ściśle przeprowadzić podziału na jęj podstawie nie można, bez zmian systemu SIMONA dość znacznych, a niewątpliwie nieuzasadnionych — wydzielić trzeba owe dwuznaczne formy i zająć się nimi osobno. Ta drobna grupa, o ile ją znam, dałaby się rozdzielić pomiędzy rodzaje dwu innych oddziałów, wyraźnie różniących się pomiędzy sobą (piszczelami z rzepką III wyraźnie krótszymi, albo wyraźnie dłuższymi niż IV), w następujący sposób:

A) Członek piętowy I kolcami uzbrojony nietylko na dolnej stronie, ale także na boku przednim niedaleko od podstawy:

Piszczel IV na grzbietnej stronie z kolcami . . . *Aelurillus*

— — bez kolców na grzbiecie *Philaeus*

B) Członek piętowy I bez kolca na przednim boku niedaleko od nasady:

a) Piszczel IV z jednym kolcem na grzbiecie niedaleko nasady: *Ergane* (♂)

— — bez kolca na grzbiecie niedaleko nasady:

α) Rzepki nóg tylnych (III i IV) z kolcem po obydwu stronach: *Ergane* (♀)

Rzepki nóg tylnych przynajmniej na przodzie bez kolca¹⁾:
Euophrys.

W ten sposób nie przeskoczywszy, ale podszedłszy pod napotkaną przeszkodę, możemy w grupie: *Aelurillus*, *Ergane*, *Pelienes* (z piszczelą i rzepką III dłuższymi niż IV) za SIMONEM oddzielić rodzaj pierwszy od dwu drugich na podstawie odmiennego ustawienia oczu przednich: w nim styczna do górnego brzegu oczu średnich przecina oczy boczne w środku, albo trochę niżej. (Tułogłowie oglądać trzeba prosto z przodu, ustawiwszy jego boczne brzegi ściśle do poziomu; podług *Les Arachn. de Fr.* padałaby wspomniana styczna na podstawę oczu bocznych; może autor podaje rzecz tak, jak się przedstawia patrzącemu na twarz, t. j. przednią ścianę tułogłowia, tutaj nieco cofniętą, prostopadle do jęj powierzchni, a zatem nieco od dołu.). Wskutek takiego obniżenia oczu średnich nie widać ich albo wcale, albo tylko mało, w tułogłowiu oglądanym prosto z góry. — Znacznie mniej obniżone są

¹⁾ Podług *Les Arachn. de Fr.*, str. 5, rzepki w rodzaju *Euophrys* mają być zawsze bezbronne; bywają jednak kolce na nich u niektórych gatunków.

oczy środkowe i więcej wystają poza brzeg tułogłowia widzianego z góry w rodzajach *Pellenes* i *Ergane*.

Jakkolwiek znam tylko dwa europejskie gatunki z rodzaju *Pellenes*, nie wątpię, że różniacy pomiędzy tym rodzajem a *Ergane* — tj. *Hasarius* w *Les Arachn. de Fr.* w części — nie można szukać w długości członków nóg IV, wbrew bowiem podaniu w *Les Ar. de Fr.* bywa tu członek stopowy wraz z piętowym nietylko nie krótszy, ale nawet wyraźnie dłuższy, aniżeli piszczel z rzepką. Galicyjskie gatunki z tej grupy rozróżni się po czworoboku ocznym z tyłu nie szerszym, albo bardzo nieznacznie szerszym, niż z przodu w rodzaju *Ergane*, widocznie szerszym w rodzaju *Pellenes*. Nadto bywa w pierwszym rodzaju piszczel z rzepką III często mało co dłuższy albo i nie dłuższy niż IV, znacznie dłuższy w rodzaju drugim.

5. Zostaje nam rodzajów 10. *Les Ar. de Fr.* odróżniają w tej grupie rodzaj *Yllenus* od innych po krętarzach (*trochanter*) czwartej pary nóg bardzo długich i widzialnych z góry. Cecha to w niektórych przypadkach wprawdzie uderzająca, ale formami pośrednimi — z rodzaju *Attus* — zupełnie zatarta. Dowodzi tego i ta okoliczność, że SIMON z biegiem czasu zmieniał zapatrywanie na granicę pomiędzy dwoma wymienionymi rodzajami. Tę cechę biorąc za podstawę, gdyby się nawet udało znaleźć jakąś wyraźną granicę pomiędzy krętarzami równymi $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ itd. biodra, oderwałyby trzeba pewną część gatunków z rodzaju *Attus* i połączyć w nienaturalną grupę z rodzajem *Yllenus*.

Pewniejsza będzie droga następująca: rodzaj *Epiblemum* różni się od 9 innych piszczelami I na dolnej stronie bezbronnymi, członkiem piętowym I albo bezbronnym (u ♂), albo uzbrojonym tylko jednym kolcem na końcu z przedniej strony. Inne rodzaje mają kolce na dolnej stronie piszczela I, niekiedy wprawdzie bardzo krótkie; w tych niewielu przypadkach, gdy kolców tutaj wcale nie ma, członek piętowy I opatrzony jest dwiema parami kolców na dolnej stronie.

6. Teraz, oparszy się o wyżej wspomnianą cechę z ustawienia przednich bioder wziętą, rozdzielić możemy pozostałą grupę z 9-ciu rodzajów złożoną na dwie części: 1) *Marptusa*, 2) 8 rodzajów innych. Że cecha ta ważną jest tylko dla okazów dorosłych, nie znosi to jej wartości systematycznej. Praktycznie ważną będzie uwaga, ze względu na rodzaj *Yllenus*, że ciało w rodzaju *Marptusa*

jest zawsze wydłużone, zwłaszcza odwłok, nogi tylne niewielu tylko kolcami opatrzone, że wreszcie nogi III-jej pary wyprostowane i ukośnie wtył wyciągnięte dosięgają końca piszczeli IV-jej pary. Na to zwracając uwagę, nikt nie pomiesza z *Marptusami* jedyne go naszego gatunku z rodzaju *Yllenus*, u którego ciało jest krępe, nogi III-jej pary nie sięgają końca piszczeli IV, a nogi tylne posiadają kolców dużo i wielkich.

7. Na ważność systematyczną uzbrojenia członków piętowych IV zwrócił uwagę Prof. THORELL (*On Eur. Spid.*), a przed nim WESTRING (*Araneae suecicae*). Tą cechą posługując się przy podziale pozostających nam jeszcze rodzajów, zastrzegł się E. SIMON, że cecha ta nie jest ścisłą, gdyż wielkie okazy z rodzaju *Icius* i gatunek *Maevia Pavesii* miewają na owych członkach nietylko na końcu kolce, ale nadto także koło środka kolce 1 lub 2. Zastrzeżenie w zasadzie słuszne, ale w szczegółach nie przeprowadzone należyście. O rodzaju *Icius* niewiele mogę powiedzieć, znam bowiem tylko jeden gatunek dalmacki z kilku okazów: we wszystkich okazach gatunku *Maevia multipunctata* (*M. Pavesii*), jakie widziałem — wprawdzie niewielu, ale przecież kilkunastu — członki wymienione mają kolców, nielicząc wierzchołkowych, więcej niż jeden; dlatego zaliczam rodzaj *Maevia* do grupy, w której członek piętowy IV z reguły jest opatrzony kolcami nietylko na końcu. Ale i z innych powodów nie można wymienionej cechy użyć do odróżniania rodzajów bez zastrzeżeń: zastrzeżenia te wyrazić można w następujący sposób:

1) Członek piętowy IV tylko na końcu opatrzony kolcami; czasem znajdzie się także kolce jeden na krawędzi dolnej zewnętrznej, wówczas członek piętowy III uzbrojony jest kolcami tylko na końcu albo nadto jednym jeszcze tylko kolcem na dolnej stronie niedaleko nasady (rodzaje: *Pseudicius*, *Dendryphantes* i obcy *Icius*).

2) Członek piętowy IV między nasadą a końcem zwykle więcej niż jednym kolcem opatrzony; jeżeli zaś tylko jednym, wówczas członek piętowy III ma na dolnej stronie niedaleko podstawy 2 kolce (rodzaje: *Phlegra*, *Philaeus*, *Heliophanus*, *Yllenus*, *Attus*, *Euophrys* i obce: *Cyrba*, *Maevia*, *Menemerus*).

Czy te ostrożności, — do których doszedłem wyzyskując materiał, jakim rozporządzam, do ostatnich możebnych granic, — okażą się dostatecznymi, trudno powiedzieć: mozolną budowę wy-

wrócić może pierwszy lepszy gatunek, którego widzieć nie miałem dotąd sposobności. Dla galicyjskich gatunków jednak będą te ostrożności może nawet bez znaczenia, nie ma u nas bowiem rodzajów *Icius*, *Maevia*, *Menemerus*, dla których te zastrzeżenia są przedewszystkiem, jeżeli nie wyłącznie, potrzebne.

7. Rodzaje *Dendryphantes* i *Pseudicius* — w *Les Ar. de Fr.* od tamtego jeszcze nie oddzielony — odróżnić, u nas, łatwo po tém, że piszczel I opatrzony jest na dolnej stronie po obu brzegach kolcami u pierwszego, bezbronny zaś albo tylko na przednim brzegu kolcami uzbrojony u drugiego.

8. Dla odróżnienia pozostałych jeszcze sześciu rodzajów naszych, powiedziałbym, że wszystko, co podają *Les Ar. de Fr.* (na str. 5, Nr 21—26), jest albo mylne, albo niedokładne, albo wreszcie trudne do sprawdzenia. Np. przedni szereg oczu jest w rodzaju *Philaeus* — u samic — mniej w górę wygięty, niż w niektórych gatunkach rodzaju *Attus*; kształt piszczeli IV nie może bynajmniej służyć do odróżnienia rodzaju *Menemerus* od rodzaju *Euophrys* itp., owszem, wbrew twierdzeniu autora, członek ów jest wyraźniej rozszerzony ku końcowi w rodzaju *Menemerus*, niż np. w niektórych gatunkach rodz. *Euophrys*; rzepki w rodz. *Euophrys* nie są bynajmniej zawsze bezbronne itd. Zresztą przyznać trzeba, że łatwiej jest odróżniać te rodzaje z wejrzenia, aniżeli zestawić dokładnie ich cechy w ścisłą tablicę analityczną.

Ograniczając się do galicyjskich gatunków, może jeszcze najłatwiej będzie oddzielić od reszty jedyną naszą *Phlegrę* (*fasciata*). Dość będzie, prawdopodobnie, w tym celu zwrócić uwagę na to, że w jej tułogłowiu, widzianém z boku, z powodu niezwykłego wydłużenia części tułowiowej wydaje się pole oczne (mierzone od przedniego brzegu oczu średnich przednich po tylny brzeg oczu tylnych) wyraźnie krótszém, aniżeli leżąca za niém część grzbietu prawie pozioma. Granica pomiędzy tą częścią grzbietu a ścianą tułogłowia tylną, mocno pochylą, jest wprawdzie dość nieokreślona: obie widziane z boku łączą się nie w kąt o wyraźnym wierzchołku ale w krótki łuk; aby znaleźć tylną granicę owęj „prawie poziomej“ części grzbietu, trzeba w tym łuku wyszukać punkt oddzielający część grzbietu więcej zbliżoną do poziomu od części więcej zbliżonej do pionu. Trudności zwiększają się już przy uwzględnieniu dwu innych gatunków *Phlegry*, które znam; i znowu okazuje się potrzeba podparcia podanej cechy różnymi innymi, z uzbro-

jenia nóg kolcami, znacznej wysokości twarzy itd., które jednak tu pomijam, bo dla naszej fauny są prawdopodobnie bez znaczenia. — Tak długiej części poziomej grzbietu poza oczami leżącej, jak nasza *Phlegra*, nie ma żaden z pozostałych rodzajów.

Biol. lego 9. Z grupy rodzajów: *Philaeus*, *Heliophanus*, *Yllenus*, *Attus* i *Euophrys*, możemy znowu oderwać jeden, pierwszy mianowicie, u którego nogi III-jej pary mało co krótsze od nóg IV-jej pary, wyciągnięte ukośnie w tył sięgają końcem przynajmniej po koniec piszczeli IV albo i dalej. Cecha ta jednak nie wystarcza. Zwrócić uwagę trzeba jeszcze na to, że w tym rodzaju brzeg dolny oczu tylnych leży znacznie wyżej aniżeli górny brzeg oczu przednich bocznych (tułogłowie ustawić należy brzegami bocznymi dokładnie do poziomu a oglądać je najlepiej z boku); a nadto, że członek piętowy I oprócz kolców na dolnej stronie ma jeszcze przynajmniej na przednim boku po jednym kolcu niedaleko od podstawy i na końcu. Gatunki z krótszymi nogami III nie do tego rodzaju należą, również jak i formy o nogach III tej wprawdzie długości, jak w rodzaju *Philaeus*, ale bąc z oczami tylnymi niżej umieszczonymi, tj. tak, że ich brzeg dolny leży albo równo z górnym brzegiem oczu bocznych przednich, albo ledwie nieznacznie wyżej, — bąc z członkiem piętowym I na przedzie koło podstawy bezbronnym.

10. Z pozostałej reszty nietrudno wydzielić rodzaj *Heliophanus*. U tego podoczna część twarzy (*clypeus*) jest bardzo niska; jej wysokość dochodzi co najwięcej szóstej części średnicy oczu przednich środkowych. Pamiętać trzeba przytém, że chodzi tu o wysokość twarzy pod oczami średnimi — nie pod bocznymi, — a nadto, że do twarzy nie liczy się błony ciągnącej się od jej właściwego brzegu po nasadę szczękoroży, którato błona, ruchoma, w okazach zabitych alkoholem to wcale spostrzec się nie daje, to znowu widoczna na mniej lub więcej znacznej przestrzeni, tworzy pozorne przedłużenie twarzy ku dołowi. Właściwa twarz, twarda, pokryta bywa zwykle włosami lub łuskami, błona zaś, o której mowa, jest naga. W rodzaju *Heliophanus* sama ta różnica nie zawsze wystarczy do odgraniczenia twardej i błoniastej części twarzy, włosów bowiem na tamtej bywa mało. Granicę znajdzie się jednak zawsze w cienkiej, choć ostrzej wrzędze (*carina*), przechodzącej także na boki tułogłowia. Gatunki do tego rodzaju należące poznać zresztą łatwiej na oko, niż przez uwzględnianie cech systematycznych: samice, zwilżone np. alkoholem, ciało mają czarne, — tylko *Hel.*

patagiatus ma boki tułogłowia czerwone, — nogi żółte, mniej lub więcej czarno kréskowane w podłuż, czasem czarna barwa przeważa nad żółtą; na suchych okazach widać, że są pokryte łuskami metalicznie połyskującymi, a ozdobione niewielu krésami lub plamami utworzonymi z łusek białych lub żółtych. Samce odznaczają się udowym członkiem głaszczków ściśnionym i ku dołowi, w połowie długości lub ku wierzchołkowi, wyciągniętym w wielki wyrostek, to pojedynczy, to na szczycie rozwidlony.

11. Z rodzajów: *Yllenus*, *Attus*, *Euophrys*, różniących się od poprzedniego wyższą twarzą, dwa pierwsze zachodzą jeden w drugi tak, że trudno o granicę, któraby ściśle opisać się dała a zarazem odpowiadała rzeczywistym stosunkom powinowactwa. W roku przeszłym oderwał E. SIMON pewną ilość gatunków od rodzaju *Attus* i połączył z częścią rodzaju *Yllenus* w osobny rodzaj: *Attulus*¹⁾. Jakkolwiek z tego nowego rodzaju znam tylko niewiele gatunków, sądzę, że jest on jeszcze mniej naturalny, niż był dawny „*Attus*“ SIMONA, i dlatego zostają przy dawniejszym podziale. Zresztą jedyny nasz gatunek z rodzaju *Yllenus* dobrze się odznacza pewnem połączeniem cech: w przednim szeregu oczu, mocno w górę wygiętym, leżą środki oczu bocznych przynajmniej tak wysoko, jak górne brzegi oczu średnich, czworobok oczny szerszy jest z tyłu niż na przedzie, tułogłowie widziane z góry szersze jest w linii poprzecznej, na której leżą tylne oczy, aniżeli przedni szereg oczu, grzbiet jego spada od oczu tylnych po sam tylny brzeg tak szybko, że widziany z boku tworzy łuk bardzo płaski, albo kąt bardzo rozwarty, z wierzchołkiem zaokrąglonym, nie bardzo różny od linii prostej, w nogach IV-ój pary członek piętowy wraz ze stopowym nie jest dłuższy aniżeli piszczel sam (bez rzepki), nogi III-ój pary o wiele krótsze od nóg IV, wyciągnięte ukośnie w tył nie sięgają bynajmniej końca ich piszczeli, wreszcie u samca część udowa głaszczka zgrubiała tworzy na spodzie u nasady wydatny guz.

11. Każda prawie z tych cech z osobna znaleźć się może w rodzajach *Attus* i *Euophrys*, ale wszystkie razem nie schodzą się nigdy, przynajmniej, ile mi wiadomo. Pomiedzy sobą różnią się

¹⁾ *Arachnidae transcaspicae ab il. Dr. G. Radde, Dr. A. Walter et A. Conchin inventae annis 1886—1877, w Verhandl. d. k. k. Zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien, tom XXXIX.*

te dwa ostatnie rodzaje długością nóg III-jej pary, nie sięgających poza koniec piszczeli IV w rodzaju *Attus*, znacznie dłuższych w rodzaju *Euophrys*.

Nie jest celem powyższych uwag zaprowadzenie zmian czy ulepszeń w systemie *Salticoidów* przez SIMONA utworzonym. Aby nowe ustanawiać rodzaje lub ściągać dawniej utworzone, na to trzeba przedewszystkiē mieć zbiory o wiele bogatsze, niż jest mój. Na niedostatecznym materiale budując, łatwo ulēc złudzeniom. Pojęcie rodzaju (*genus*) jest o wiele mniej określone niż pojęcie gatunku. W praktyce kierować się można dwojakiē zapatrywaniem: albo wyszukuje się z pomiędzy znanych gatunków takie, które — podług osobistego zapatrywania systematyka — uważać można za typy udzielnych rodzajów, i gromadzi się koło tych typów wszystkie pozostałe gatunki podług przeważającego podobieństwa, a nie zważając na to, czy granice pomiędzy tak utworzonymi grupami są na pierwszy rzut oka jasne, czy też do opisania a nawet do znalezienia trudne, — albo przeciwnie, zwraca się uwagę przedewszystkiē na te granice, odstępując od dzielenia nawet obszernych i różnorodnych grup na działy drobniejsze, jeżeli do tego braknie wyraźnych i łatwo w praktyce zastosować się dających środków. Jeden i drugi sposób postępowania ma swoje zalety i wady; do rzetelnego postępu systematyki obydwa równie dobrze przyczynić się mogą, choć teoretycznie rzecz rozważając, sądzićby trzeba, że jedynie pierwszy zgadza się z dążeniem do systemu naturalnego, drugi prowadzi do systemów sztucznych. Do lichych wyników dojdzie systematyk postępujący czy w jednym czy w drugim kierunku, jeżeli radując się własnymi pomysłami, pozostawi ich wszechstronne zbadanie i uzasadnienie pracowitości innych.

W każdym zaś razie, jakakolwiek drogę się wybierze, nie można się spodziewać po własnej pracy — choćby sumiennē i rozważnēj — że ona doprowadzi do wypadków trwałego znaczenia dla nauki, jeżeli ze setek żyjących gatunków danej rodziny zna się zaledwie dziesiątki. Ciemne bowiem poczucie tego, co za typ rodzaju uważać można, a czego nie, przechodzi tylko z wolna, w miarę, jak się poznaje coraz więcj gatunków, w owę „wprawę“, przy którēj często na pierwszy rzut oka lepszego nabiera się wyobrażenia o systematycznē stanowisku gatunku, niż kiedy indziej przez

mozolne i szczegółowe zestawianie i porównywanie jego cech z cechami innych gatunków, znanych przeważnie tylko z opisów. Kto znowu dzieląc jakąś grupę zwierząt, wyzyskuje w tym celu przedewszystkiēm granice dostrzeżone, jasne i proste, ten może z całą pewnością liczyć na to, że każdy nowy gatunek, który mu się dostanie w ręce, przyczyni się nie do ustalenia owych granic, ale owszem do ich zawikłania, jeżeli nie do zupełnego ich zatarcia.

O tē m wszystkim wiedząc tak dobrze, jak każdy, komu systematyka zoologiczna znana jest nietylko z czytania rzeczy drukowanych, nie kuszę się o poprawki w podziale *Salticoidów* na rodzaje, przyjętym przez E. SIMONA, chociaż i w tym kierunku bę dźcie zapewne jeszcze nie jedno do zrobienia. Nie wdając się w krytykę planu sporządzonego przez tego autora, wskazuję tylko na to, że przeprowadzenie tego planu wypadło nie dość ściśle. Wykaz niedokładności, czy błędów byłby prawdopodobnie o wiele dłuższy, gdybym mógł zbadać w naturze przynajmniej tyle gatunków europejskich, ile ich opisał E. SIMON. I przy obecnē m ograniczeniu swojē m uwagi powyższe posłużyć mogą za dowód, że nam tu i ów dździe w zoologii opisowej jeszcze dość daleko do doskonałości.

Gatunki galicyjskie Salticoidów.

Z 46 gatunków Salticoidów, podanych w „Przeglądzie krytycznym“, jeden trzeba wykreślić, mianowicie: *Heliophanus flavipes*. Podalem tam ten gatunek z zastrzeżeniem, wyjaśniając zarazem, dlaczego oznaczenie uważam za wątpliwe. W ciągu pracy nad arachnofauną węgierską otrzymałem za pośrednictwem Dra CHYZERA do rewizyi dość znaczną ilość gatunków zgromadzonych przez O. HERMANA, autora dzieła *Magyarország pok-faunája*, a przechowanych w węgierskiē m Muzeum narodowē m i i. Między tymi gatunkami znalazły się także okazy gatunku *Heliophanus varians*, oznaczone przez E. SIMONA. Okazy te zgadzają się zupełnie z moim galicyjskim *Hel. flavipes*. Gdy więc w katalogu naszej fauny pomieszczony już został, na podstawie prac SIMONA, *Hel. varians* Sim., wykreślić z niego musimy gatunek *Hel. flavipes*, jako synonim. Nie można jednak jeszcze wiedzieć, czy nie wypadnie kiedy zastąpić w naszej faunie pajęczej nazwy „*Hel. varians* Sim.“ nazwą „*Hel. flavipes* Hahn“, nie ma bowiem dotychczas żadnych pewnych skazówek, po którychby dojść można, czy nazwa ostatnia

należy się temu gatunkowi, któremu ją przypisał SIMON, czy też temu, który pod tą nazwą przytaczany bywał — za przykładem Dra L. KOCHA — w naszej faunie.

W ogóle *Heliophanus* jest właśnie tym rodzajem, z którym w europejskiej faunie najwięcej jeszcze zostaje do zrobienia dla ostatecznego odróżnienia gatunków. Tak n. p. podejrzenie moje, że samice opisane przez SIMONA jako *Hel. cupreus*, nie do tego należą gatunku — podejrzenia tego przypadkiem nie zanotowałem w „Przeglądzie“ — jest według wszelkiego prawdopodobieństwa słuszne. Przynajmniej widziałem pomiędzy pajakami, które na moją prośbę przysłał mi Prof. THORELL do obejrzenia, szwedzkie okazy gatunku *Hel. dubius*, oznaczone przez E. SIMONA — zgodnie z tém, co znajdujemy w *Les Ar. de Fr.*, ale zdaniem mojem mylnie — jako *Hel. cupreus*. Błędnie nazwane okazy z tego rodzaju napotkałem także pomiędzy pajakami otrzymanymi od hr. E. KEYSERLINGA, a oznaczonymi przez E. SIMONA.

Przybyły do fauny naszej od r. 1884 dwa nowe gatunki: *Attus penicillatus* Sim.? i *Euophrys n. sp.* (∞ *erraticae*), obydwa odkryte — niestety — nie w polu, ale w moim zbiorze, gdzie były pomieszane z gatunkami *Attus saltator* Sim. i *Euophrys erratica* (Walck.). Ponieważ niepodobieństwem jest w zbiorach pajaków zaopatrzyć każdy okaz notatką, gdzie został znaleziony, jak się to dzieje w porządnym zbiorze owadów czy roślin, mogę o wymienionych dwu gatunkach tylko tyle powiedzieć, że pochodzą z bliższych okolic Krakowa.

Jeden gatunek podałem w „Przeglądzie“ pod mylnym nazwiskiem, mianowicie *Euophrys petrensis*. O tém, co w Galicyi nazywało się *Euophrys petrensis*, możnaby całą powieść napisać; że jednak cały materiał do tej powieści znajdzie się w moich dawniejszych pismach o arachnofaunie galicyjskiej, poprzestaję tu na podaniu do wiadomości, że w Galicyi nie znaleziono dotychczas okazu, któryby na pewno do tego gatunku można zaliczyć. Do pomyłek przyznaję się bez wyrzutów sumienia, dowodzą one bowiem jedynie, że dzisiejsza arachnografia może jeszcze w wielu przypadkach zaprowadzić na bezdroża nawet człowieka dość oględnego i pamiętającego o tém, że poprawianie własnych pomyłek nie należy do przyjemności.

Mamy tedy Salticoidów znalezionych w Galicyi, podług dotychczasowych wiadomości, gatunków 47, mianowicie:

Salticus formicarius (DE GEER).

Leptorchestes berolinensis (C. L. KOCH).

Synageles hilarulus (C. L. KOCH).

— *confusus* (KULCZ.).

Epiblemum scenicum (CLERCK).

— *cingulatum* (PANZ).

— *tenerum* (C. L. KOCH).

Heliophanus patagiatus (THOR.).

— *aeneus* (HAHN).

— *dubius* (C. L. KOCH).

— *cupreus* (WALCK.).

— *auratus* (C. L. KOCH).

— *varians* (E. SIM.). (*flavipes*? KULCZ. 1884).

Marptusa muscosa (CLERCK).

— *radiata* (GRUBE).

Dendryphantes hastatus (CLERCK).

— *rudis* (SUND.).

Pseudicius encarpatus (WALCK.). (*Dendryphantes enc.* KULCZ. 1884).

Philaeus chrysops (PODA).

— *bicolor* (WALCK.).

Ergane arcuata (CLERCK). (*Hasarius arcuatus* KULCZ. 1884).

— *falcata* (CLERCK). (*Hasarius falcatus* KULCZ. 1884).

— *laetabunda* (C. L. KOCH). (*Hasarius laetabundus* KULCZ. 1884).

Pellenes crucigerus (WALCK.).

Attus pubescens (FABR.).

— *terebratus* (CLERCK).

— *floricola* (C. L. KOCH).

— *rupicola* (C. L. KOCH).

— *suxicola* (C. L. KOCH).

— *Caricis* WESTR.

— *Dzieduszyckii* L. KOCH.

— *distinguendus* E. SIM.?

— *saltator* E. SIM.

— *penicillatus* E. SIM.?

Phlegra fasciata (HAHN).

Aelurillus V. insignitus (CLERCK). (*Ictidops V. insignitus* KULCZ. 1884).

— *festivus* (C. L. KOCH). (*Ictidops festivus* KULCZ. 1884).

Yllenus arenarius E. SIM.

Euophrys erratica (WALCK.).

— *n. sp.* \sim *erraticae*.¹⁾

— *frontalis* (WALCK.).

— *n. sp.* \sim *petrensi*. (*Eu. petrensis* KULCZ. 1884).

— *monticola* KULCZ.

— *aequipes* (CAMBR.).

Neon reticulatus (BLACKW.).

Ballus depressus (WALCK.).

Oedipus aenescens (E. SIM.). (*Ballus aenescens* KULCZ. 1884).

Niektóre z tych gatunków mają obecnie nie tę samą nazwę rodzajową, co w „Przeglądzie krytycznym“.

„*Dendryphantes encarpatus*“ należy obecnie do rodzaju *Pseudicius*, utworzonego w r. 1885 przez E. SIMONA²⁾ dla tego właśnie gatunku i kilku pokrewnych: *badius* E. SIM., *picaceus* E. SIM., *icioides* E. SIM. — Z ogólnego wejrzenia (*habitus*) sądząc, zasługuje ta grupa gatunków na rodzajowe odosobnienie od bliskich: *Dendryphantes*, *Icius*, *Epiblenum*. Że jednak sprawa nie będzie łatwa, że mianowicie kłopotliwe będzie wyznaczenie granic pomiędzy tą grupą a rodzajem *Icius*, o tém nie wątpię, chociaż znam tylko jeden gatunek z rodzaju *Icius* i cztery z rodzaju *Pseudicius*. Trudności napotyka się zwłaszcza z okazami samiecznymi; samce różnią się kształtem szczękoroży dostatecznie.

Wszystkie galicyjskie gatunki z rodzaju *Hasarius* przeniósł E. SIMON (*l. c.*) do rodzaju *Ergane*, odróżnionego od pokrewnych w r. 1881 przez hr. E. KEYSERLINGA (*Die Arachnid. Australiens*, str. 1260). Z ośmiu gatunków rodzaju *Hasarius* opisanych w *Les Ar. de Fr.* mieści się w tym rodzaju obecnie tylko jeszcze jeden: *H. Adansonii* SAV. & AUD. Czy nasze *Erganae* rzeczywiście należą do jednego rodzaju z australskimi gatunkami, opisanymi przez hr. KEYSERLINGA, powiedzieć nie mogę; jeżeli jedyny

¹⁾ Ponieważ do wykrycia tego gatunku, jak i do przekonania, że dawna galicyjska „*Euophrys petrensis*“ jest gatunkiem nieopisanym jeszcze, doszedłem przy pomocy zbiorów Dra CHYZERA, wypada mi odłożyć opisanie tych dwu gatunków do czasu wydania pracy o pająkach węgierskich.

²⁾ *Matériaux pour servir à la faune arachnologique de l'Asie méridionale*, str. 28.

znany mi australski gatunek, który wypadaloby zaliczyć do tego rodzaju, istotnie do niego należy, to nasze gatunki jeszcze raz zmienić będą musiały swą nazwę rodzajową.

Dla zastąpienia nazwy *Aelurops*, użytej przez Prof. THORELLA w r. 1869, a zajętej już dawno, bo w r. 1830, na oznaczenie pewnego rodzaju ssawców, utworzył Dr FICKERT w r. 1875 nową nazwę *Ictidops*. Tę zmienił E. SIMON 1885 r.¹⁾ na *Aelurillus*, ponieważ się okazało, że już i ona zajęta jest od r. 1868.

O powodach przeniesienia gatunku *aenescens* z rodzaju *Ballus* do rodzaju *Oedipus* (MENGE 1877) wspomniałem już wyżej (str. 11).

Do wyrażonych w „Przeglądzie“ niewielu domysłów z zakresu synonimii dodać można następujące uwagi:

Heliophanus cupreus wspomniany przez Prof. THORELLA w *Remarks on Synon.* na str. 402 (porówn. Przegląd str. 66) jest w części rzeczywiście, jak przypuszczałem, = *Hel. dubius* C. L. KOCH. Na skandynawskich okazach gatunku *Hel. cupreus*, przysłanych uprzejmie przez Prof. THORELLA, przekonałem się: 1) że samice, które w „Przeglądzie“ podałem jako należące do gatunku *Hel. cupreus*, zgadzają się z okazami zaliczonymi do tego gatunku przez Prof. THORELLA, 2) że — jak już wyżej wspomniałem — opisana w *Les Ar. de Fr.* samica gatunku *Hel. cupreus* nie do tego należy gatunku, lecz do *H. dubius*²⁾, 3) że czarna barwa głaszczków u samicy, pojawiająca się u nas nadzwyczaj rzadko, należy do całkiem pospolitych zjawisk w Szwecji. Na setki okazów galicyjskich z blade-żółtymi głaszczkami, widziałem tylko jeden okaz, znaleziony przez Prof. B. KOTULĘ koło Przemyśla, z głaszczkami czarnymi; podług okazów szwedzkich w zbiorze Prof. THORELLA trzebaby przeciwnie czarną barwę uważać za prawidłową! — Byćby mogło, że co do samic gatunków *Hel. cupreus* i *dubius* pomylił się Prof. THORELL, a za nim i ja, słuszność zaś by-

¹⁾ *Matériaux pour servir à la faune des arachnides de la Grèce.*

²⁾ W zbiorze Prof. THORELLA oprócz okazów oznaczonych przez niego samego są też egzemplarze (♀) przez E. SIMONA oznaczone jako *H. cupreus*, od galicyjskiego *H. cupreus* całkiem odmienne i równe naszemu *H. dubius*; do tych właśnie okazów odnosi się ustęp w *Remarks on Syn.* zaczynający się od słów: „*In other specimens, in which the above mentioned single or double protuberance is absent...*“

laby po stronie E. SIMONA; to przypuszczenie uważać jednak muszę z rozmaitych powodów za zupełnie nieprawdopodobne.

O jedyném w swoim rodzaju zamieszaniu w gatunkach *Ergane* (*Hasarius*) *arcuata* i *falcata*, które wyjaśniłem w Przeglądzie (str. 72—75), mileżą dotychczas arachnologowie. Prywatną wiadomość w tej sprawie otrzymałem od Prof. THORELLA; ta przemawia za mojem zapatrywaniem. Nie sądzę, żebym potrzebował tutaj pocieszać się zdaniem: *qui tacet...*; owszem uważam rzecz za załatwioną stanowczo przez zacytowany ustęp w Przeglądzie.

Sprawdzając na wszystkich okazach, jakie się w moje ręce dostały od r. 1884, cechy podane w Przeglądzie dla gatunków *Attus rupicola* i *A. floricola* (str. 76—77), przekonałem się, że trafiają się przecież — wprawdzie nadzwyczaj rzadko — okazy nie wypływające, których nawet podług owych cech na pewno oznaczyć nie można. Czy takie wyjątkowe okazy są rzeczywistymi formami przejściowymi pomiędzy *A. rupicola* i *A. floricola* — w takim razie wypadaloby uważać gatunek *A. rupicola* za odmianę górską gatunku *A. floricola*, od tej typowej formy nie odgraniczoną ściśle — czy może wchodzi tu w grę jeszcze jaki trzeci gatunek, n. p. *A. Zimmermannii* E. SIM., czy wreszcie mamy może do czynienia z mieszającami, co się najmniej prawdopodobnym wydaje, ale niemożliwe nie jest, — na to trudno dziś odpowiedzieć.

Attus distinguendus galicyjski wymaga zawsze jeszcze porównania z okazami szwedzkiego *A. cinereus* WESTR.; bez tego niepodobieństwem jest wykryć, podług opisów, czém miałyby się różnić samice tych dwu form.

Z zanotowanych od r. 1884 nowych stanowisk dla wymienionych wyżej galicyjskich Salticoidów wspomnę tu tylko dwa ważniejsze. Z gatunku *Ergane laetabunda* miałem przed r. 1884 tylko jeden okaz, wprawdzie niewątpliwie galicyjski, ale zresztą niewiadomego pochodzenia; od Prof. Dra ST. ZARĘCZNEGO otrzymałem parę okazów dorosłych tego gatunku zebranych koło Chrzanowa. Nieodżałowany ś. p. Jan CIEŚLIK odkrył w Witkowicach pod Krakowem gatunek *Leptorchestes berolinensis*, o którym przypuścić

było dawniej można, że w Galicyi pojawia się tylko we wschodniej części kraju, podobnie jak dość dużo innych gatunków zwierząt i roślin, o których z rozsiedlenia w Galicyi wnosząc, sądzićby można, że są wschodnimi, podczas gdy w rzeczywistości należą do gatunków południowych.

* * *

Przypuszczam, że kto oznaczając Salticoidy galicyjskie, dojdzie podług podanych wyżej uwag (str. 10-19), do jakiego rodzaju należy oznaczany okaz, ten nie napotka już z oznaczeniem gatunku na wielkie trudności.

Z rodzajów: *Salticus*, *Leptorchestes*, *Pseudicius*, *Pellenes*, *Phlegra*, *Yllenus*, *Neon*, *Ballus*, *Oedipus*, mamy w kraju tylko po jednym gatunku — ile dotąd wiadomo.

Dla odróżnienia dwu naszych gatunków z rodzaju *Synageles* podaje Przegl. kryt. dostateczne różnice, przynajmniej co do samic; samiec gatunku *S. confusus* nie jest dotychczas znany.

Samce trzech galicyjskich gatunków z rodzaju *Epiblemum* odróżnić łatwo podług charakterystycznego wyrostka na puszczelowej części głaszczka. Dla samic podałem l. c. str. 63 cechy, które z dołączonymi tam rysunkami zapewne zawsze do celu doprowadzą.

Dla rodzaju *Heliophanus* znajduje się również w Przeglądzie kryt. tablica analityczna, do której dodałbym obecnie tylko tyle, że samce gat. *H. auratus* i *varians* (w tablicy owej nazwany „*flavipes*?”) różnią się pomiędzy sobą także pokryciem odwłoku: łuski na grzbiecie odwłoku są u pierwszego bardzo błyszczące, dość szerokie, a leżą tak gęsto, że pomiędzy nimi prawie dopatrzeć się trudno saméj skóry (na okazach nieobdartych), u drugiego łuski z mdłym połyskiem, a bardzo wąskie, nie są zbyt gęsto ustawione, tak, że pomiędzy nimi wszędzie czarna skóra przegląda. Cechy tych dwu gatunków wzięte z budowy głaszczków, choć wybitne, wymagają, jeżeli się nie ma uléc złudzeniu, i silnego powiększenia i dokładnego ułożenia głaszczka, co zwłaszcza w tym rodzaju nie zawsze bywa łatwe.

Obydwa gatunki z rodzaju *Marptusa* różnią się już barwą znacznie; obawy o ich pomięszanie nie ma wcale. Warto jednak uwagę zwrócić na to, że może znajdzie się w Galicyi także trzeci gatunek, żyjący już w północnych Węgrzech: *M. pomatia* (WALCK.);

tęgo nawet dorosłe okazy łatwo wziąć za *M. radiata*, odróżnienie zaś młodych okazów jest prawie niemożliwe.

Co do gatunków *Dendryphantès hastatus* i *rudis* powołuję się na „Przegląd“.

Okazy dorosłe gatunków *Philæus chrysoptis* i *bicolor* odróżnia się łatwo, zwłaszcza samce. Cecha podana dla samic w tablicy w *Les Ar. de Fr.* (wzięta z barwy włosów otaczających oczy i pokrywających niższą część twarzy) nie jest pewna; lepiej bez porównania jest zwrócić uwagę na kształt pola położonego między płucotchawkami (*epigyne*): u *Ph. bicolor* mieszczą się na niem dwa głębokie okrągławe małe dolki, między sobą i od tylnego brzegu pola mniej niż o własną średnicę odległe; u *Ph. chrysoptis* ciągnie się wzdłuż tego pola wypukłość rogowa, ku przodowi wyraźniejsza, zwężona i ograniczona po każdej stronie dolkiem wąskim, ku tyłowi zaś rozlewająca się na płaszczyznę pola bez wyraźnych granic; dolki wspomniane są ku tyłowi rozbieżne.

Dla gatunków rodzaju *Ergane* wystarczy tablica w *Les Ar. de Fr.* (z zastrzeżeniem, że samica nazwana w tej tablicy *Hasarius falcatus* należy do *Erg. arcuata*, samica zaś nazwana *H. arcuatus* jest właściwie *E. falcata*).

Samce gatunków z rodzaju *Aelurillus* odróżnia się łatwo podług głąszczków, jak podają *Les Ar. de Fr.* Dla samic cecha wzięta tamże z kształtu stóp 4tej pary nóg wydaje mi się trudną do sprawdzenia; zastąpić ją można znowu cechami wziętymi z kształtu pola zwanego *epigyne*: tylna środkowa część tego pola jest w gat. *Ael. festivus* wzniesiona, granicę przednią wzniesionej części tworzą dwa doły płytkie, o brzegach niewyraźnych, ukośnie położone, ku tyłowi rozbieżne. W drugim gatunku (*V-insignitus*) nie tworzy część tylna środkowa wyraźnego wzniesienia; natomiast ozdobione jest to pole dwiema ostro wyciętymi brózdami, schodzącymi się na przodzie w kąt ostry, a ku tyłowi mniej lub więcej szybko od siebie się oddalającymi i łukowato wygiętymi.

Trudności napotyka się przy oznaczaniu gatunków z rodzaju *Attus*. Zwłaszcza tablica w *Les Ar. de Fr.* do oznaczania samic prawdopodobnie nie na wiele się przyda. Może mniej wygodnie, ale zato pewniej, aniżeli przy pomocy tego dzieła, rozpozna się nasze gatunki w następujący sposób:

A) Samce. *Attus pubescens* różni się od wszystkich innych wielkim wyrostkiem piszczelowym głąszczka, łuskowatym, na końcu

zaokrąglonym, czarnym. U innych wyrostek ten jest mały, co najwięcej średniej wielkości, zwykle mniej więcej stożkowaty, ostro zakończony; czasem trudno go się dopatrzeć między włosami pokrywającymi głaszczek.

Attus saltator i *saxicola* mają piszczel i członek piętowy I przynajmniej na dolnej stronie czarne, członek stopowy I zaś blado żółty. Pomiędzy sobą różnią się te dwa gatunki wielkością: tułogłowie pierwszego nie dochodzi nigdy dwu mm. długości, u drugiego jest ono zawsze przeszło na 2 mm. długie — częścią stopową głaszczka nie szerszą aniżeli część piszczelowa lub rzepekowa u *A. saltator*, znacznie szerszą u *A. saxicola*, wyrostkiem piszczelowym głaszczka przylegającym do części stopowej u pierwszego, u drugiego odstającym (w głaszczku wyprostowanym. Porów. rysunek w Przeglądzie).

Z gatunków, u których członek piętowy I nie jest ciemniejszy, albo tylko mało co, od członka stopowego, odznacza się *A. penicillatus* (?) od innych zgrubiałą częścią piszczelową głaszczka, wzdłuż grzbietu nie krótszą przynajmniej od części rzepekowej, z boku widzianą przynajmniej tak grubą, jak część stopowa; osobliwa też jest barwa głaszczków: blado żółta z ukośną czarną kręszą, zajmującą niecały koniec części rzepekowej, grzbiet części piszczelowej i nasadę części stopowej. (Samca tego gatunku w Galicyi znalazłem nie widziałem dotychczas).

U pozostałych gatunków zwykle wydaje się wyrostek piszczelowy głaszczka, widziany z dołu, prostym lub lekko i jednostajnie w całej długości wygiętym, od nasady do wierzchołka jednostajnie zwężonym, i przylega mniej więcej do części stopowej głaszczka prawie w całej długości, t. j. koniec jego dlatego tylko nie styka się z brzegiem tej części, że wyrostek jest prosty lub prawie prosty, a brzeg części stopowej łukowaty. Tak się rzecz ma u gatunków *A. Caricis*, *distinguendus*, *floricola*, *rupicola*. — U dwu gatunków zaś: *A. terebratus* i *Dzieduszyckii*, wyrostek ów, w nasadowej części gruby, wycięty jest w drugiej połowie po wewnętrznej stronie i tworzy hak zakrzywiony ku brzegowi części stopowej a od niej przestrzenią dość znaczną oddzielony. Cecha ta jest bardzo wyraźna w gat. *A. terebratus*; mniej wyraźna, z powodu, że cały wyrostek piszczelowy jest krótki, w gat. *A. Dzieduszyckii*. Na przypadek, gdyby kto ten ostatni gatunek miał zaliczyć do grupy poprzednich

gatunków (*A. Caricis* i t. d.), podaję niżej, czém się on od tych gatunków różni.

Gatunki *A. terebratus* i *A. Dzieduszyckii* łatwo odróżnić, pominawszy barwę i t. d., po kształcie głaszczków: u pierwszego sięga koniec wyrostka piszczelowego prawie do połowy części stopowej, ta część jest gruba, znacznie szersza od dwu poprzednich członków, jej brzeg zewnętrzny złamany jest w bardzo wyraźny kąt, włosy pokrywające grzbietną jej stronę, jasne u jej nasady, zresztą ciemne, nie tworzą wyraźnego rysunku; u drugiego (*A. Dzieduszyckii*) wyrostek piszczelowy krótki, bardzo mało sięga poza podstawę części stopowej, część stopowa jest wąska, prawie nie szersza od poprzednich członków, brzeg zewnętrzny ma jednostajnie łukowaty, a na grzbiecie ozdobiona jest linią podłużną żółtawo białą na ciemnym tle, z włosów utworzoną, sięgającą od nasady prawie po wierzchołek.

W grupie *A. Caricis* i t. d. bywa grzbiet tułogłowia albo prawie jednobarwny, bez wyraźnych białych smug (*A. Caricis* i *distinguendus*), albo ciemno zabarwiony z jaskrawymi białymi lub żółtawymi liniami (*A. floricola* i *rupicola*).

A. Caricis ma część stopową głaszczałka znacznie szerszą, *A. distinguendus* zaś nie szerszą, od piszczelowej. Także narzędziami rozrodczymi różnią się te dwa gatunki; u pierwszego są one prawie tego samego kształtu, jak w gat. *A. rupicola*; opis i rysunek tych części w gat. *A. distinguendus* podaję w Przeglądzie (str. 87. i fig. 21 a).

Co do gatunków *A. rupicola* i *floricola* powołuję się znowu na Przegląd. — Do tych dwu gatunków podobny jest *A. Dzieduszyckii* z barwy tułogłowia, różni się zaś od nich wąską częścią stopową głaszczałka i jej ubarwieniem wyżej wspomnianém.

B) Samice rodzaju *Attus* podzielić można podług kształtu tarczki między płucotchawkami (*epigyne*) na cztery grupy:

Tarczka ta jest cała rogowata i opatrzona tuż przy tylniej krawędzi dołkiem głębokim, okrągłym lub sercowatym, z brzegami ostrymi a przynajmniej zupełnie wyraźnymi (tylko na przodzie w środku brzeg jest niewyraźny). Tu należą *A. floricola*, *rupicola*, *Caricis*, wszystkie z dołkiem zaokrąglonym, i *A. penicillatus* (?), u którego dołek jest z tyłu głęboko sercowato wycięty, odpowiednio wyciętej tylnej krawędzi samej tarczki.

Attus Caricis jest barwy brunatno-rdzawej albo brunatno-szarej, prawie bez rysunku; najłatwiej jeszcze dostrzec się dadzą

cztery kropki na przedniej części odwłoku ustawione w czworobok, a za nimi dwie większe plamy, wszystkie białawe, tylko u okazów świeżo wylinionych jako tako wyraźne. *A. rupicola* i *floricola* ozdobione są wyraźnymi plamami białymi lub białawymi na tle brunatnym lub w części czarnym; zresztą porówn. „Przegląd“.

2. Tarczka rogowa, czerwonawa, opatrzona dołkiem albo bardzo oddalonym od tylnej krawędzi, małym, głębokim, poprzecznym, jakby z dwu połączonych okrągłych dołków utworzonym (*A. terebratus*), albo też dołek zajmuje mniej więcej środek tarczki, jest dość wielki, płytki, a brzegi ma tak rozlane i płaskie, że trudno określić jego granice (*A. pubescens*). Część tarczki między dołkiem a tylną krawędzią tworzy u pierwszego gatunku słabą, mniej lub więcej wyraźną podłużną wyniosłość, mocno połyskującą, przedzieloną zwykle w pozdłuż bardzo wąską brózdką, u drugiego zaś tworzy zagłębienie mniej więcej nieokreślone.

3. Tarczka bez dołka, blada, na tylnym brzegu w środku dość głęboko a wąsko wycięta, koło wycięcia po każdej stronie opatrzona wyniosłością rogową, rozlaną, krótką, poprzeczną. Tu należy tylko *A. Dzieduszyckii*.

4. Tarczka ozdobiona dwoma dołczkami oddzielonymi od siebie wąską wręgą. Tu należący *A. saltator* dołki ma bardzo małe, tak, że łatwo możnaby go zaliczyć do 3-jej grupy; od jedyne go tam należącego gatunku odróżnić go jednak można bez trudności po bardzo nierównych nogach III i IV-jej pary: udo III wzniesione prosto do góry wydaje się u niego przynajmniej dwa razy krótszym od ustawionego równolegle uda IV, w gatunku zaś *A. Dzieduszyckii* sięga ono daleko poza połowę uda IV.

W tej grupie odznacza się *A. saxicola* barwą tułogłowia: na tle bladym leży pomiędzy oczami tylnymi całkiem czarna plama trójkątna lub strzałkowata, przecięta białą kręską w pozdłuż. Plamy takiej nie mają *A. penicillatus*, *distinguendus*, *saltator*. Dołki wyżej wspomniane, leżą u pierwszego z nich blisko tylnej krawędzi tarczki, tak, że odległość ich od tej krawędzi mniej wynosi, aniżeli szerokość obu dołków razem wziętych; każdy dołek, po bokach i z tyłu dobrze ograniczony ostrymi brzegami, przechodzi ku przodowi w długie rynienkowate zagłębienie; możnaby także opisać to tak, że na tarczce znajduje się jedno zagłębienie podłużne, tylko po bokach i z tyłu ostrymi brzegami ograniczone, a podzielone w całej długości wręgą wąską, z tylnego brzegu wychodzącą, na

przodzie nieznacznie znikającą. — U dwu ostatnich gatunków (*distinguendus* i *saltator*) dolki bardzo małe mieszczą się koło środka tarczki, której część leżąca za nimi jest rogowata, część zaś przednia blada i mniej więcej bloniasta.

A. distinguendus jest większy (tułogłowia długość około 2·5 mm.), czworobok oczny ma z przodu i z tyłu równo szeroki; ubarwienie ciała z kolorów szarych i białych złożone nie przedstawia wyraźnych rysunków. *A. saltator*, mniejszy (długość tułogłowia około $1\frac{3}{4}$ mm.), czworobok oczny z tyłu ma nieco szerszy niż na przedzie, a rysunek na ciele zwykle wyraźny, czarny i biały.

Na sześć galicyjskich gatunków z rodzaju *Euophrys* z dwóch znane są tylko samice (*Eu. monticola* i *Eu. n. sp. ~ petrensi*).

Z samców łatwy jest do poznania *Eu. frontalis* po kiści włosów świetnie białych na częściach głaszczka rzepkowej, puszczelowej i stopowej. *Eu. aequipes* nie ma na części puszczelowej wyraźnego wyrostka, przeciwnie u *Eu. erratica* i *Eu. n. sp. ~ erratica* z łatwością można dostrzec taki wyrostek w głaszczku oglądanym czy z góry czy z dołu. Pomiedzy sobą różnią się te dwa ostatnie gatunki prawie tylko budową głaszczków. Część stopowa z góry widziana zwęża się u pierwszego mniej więcej od połowy po wierzchołek szybko i dość jednostajnie, u drugiego zwęża się tylko bardzo mało a szczyt ma raczej skośnie ucięty niż zaokrąglony. W głaszczku oglądanym od strony wewnętrznej widać u pierwszego narzędzia rozrodcze od nasady do połowy części stopowej grube, dalej szybko zwężone, tak, że tworzą z t. zw. dzióbem części stopowej (*rostrum*) — niewiele w dół zgiętym — zatokę dość szeroką, zaokrągloną. U drugiego sięgają narzędzia rozrodcze przynajmniej do $\frac{4}{5}$ długości części stopowej, szczyt mają zaokrąglony i od dzioba części stopowej, wdół zgiętego, ledwie wąską szparą oddzielony.

Samice podzielić można na dwie grupy podług uzbrojenia puszczeli II pary nóg. U trzech naszych najdrobniejszych gatunków: *Eu. aequipes*, *monticola* i *Eu. n. sp. ~ petrensi*, stoją na dolnej stronie tego członka 2 lub 3 kolce w szeregu podłużnym, prawie równo odległym od tylnego i od przedniego brzegu puszczela; na krawędzi dolnej przedniej puszczela koleców całkiem brak; u większych gatunków (*erratica*, *n. sp. ~ erratica*, *frontalis*)

stoją wzdłuż dolnej tylnej krawędzi 3 kolee, a wzdłuż przedniej dolnej często dwa: koło połowy członka i na jego końcu, — albo też tylko jeden: na końcu.

W pierwszej grupie tarczka zwana *epigyne* opatrzona jest na przodzie dolkiem głębokim, poprzecznym, ku tyłowi przechodzącym w szeroką nieokreśloną bruzdę, ciągnącą się aż do tylnego brzegu tarczki (*Euophrys n. sp. ~ petrensi*), albo też jest prawie równa, bez wyraźnych zagłębień (*Eu. monticola* i *aequipes*, których różnice podaje Przegląd).

W drugiej grupie tarczka wspomniana ma dwa głębokie podłużne dolki, rozdzielone bardzo wąską przegrodą w gat. *Eu. n. sp. ~ erratica*, płaska zaś jest, bez dołków, u *Eu. erratica* i *frontalis*. *Eu. frontalis* ma mostek (*sternum*) żółtawy, tej prawie barwy co i biodra nóg, odwłok blade z czarnymi kreseczkami; u *Eu. erratica* mostek brunatny różni się barwą znacznie od bladych bioder, odwłoku tło jest brunatne, rysunek na niem złożony z bladych linii.

Kończę ten drobny przyczynek do naszej fauny złożeniem podziękowania wszystkim, których przyjaźni, życzliwości czy uczynności zawdzięczam, że pracować mogę w obranym szczupłym zakresie, mając i materiałów i książek dosyć, chociaż na gromadzenie jednych i drugich brakłoby samemu i czasu i środków. Nie považam się wiązać z niniejszą urywkową pracą imion tych wszystkich naszych i obcych przyrodników, którym do wdzięczności jestem obowiązany. Wspomnę tylko jednego: Prof. T. THORELLA, jako tego, który od lat ośmiu wspiera mnie światłą radą, przedmiotowem a życzliwem ocenianiem moich zapędów arachnologicznych, użyczeniem książek i okazów ze swego zbioru, a do tego wszystkiego znajduje chęć i czas, chociaż go od lat wielu nęka ciężka choroba, przy jakiej inny znalazłby może dość siły ducha do pracy w nauce, nie byłby jednak chyba w stanie z równem zaparciem się siebie samego nie tylko spełniać prośby ale nawet przewidywać cudze życzenia.

Alfabetyczny spis nazw rodzajowych, gatunkowych i synonimów.

- Aelurillus str. 10, 12, 13, 24.
 — festivus 22, 27.
 — V-insignitus 22, 27.
 Aelurops 24.
 Attulus 18.
 Attus 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 27.
 — Caricis 22, 28, 29.
 — distinguendus 22, 25, 28, 29, 30, 31.
 — Dzieduszyckii 22, 28, 29, 30.
 — floricola 22, 25, 28, 29, 30.
 — penicillatus 21, 22, 28, 29, 30.
 — pubescens 22, 27, 30.
 — rupicola 22, 25, 28, 29, 30.
 — saltator 21, 22, 28, 30, 31.
 — saxicola 22, 28, 30.
 — terebratus 22, 28, 29, 30.
 — Zimmermannii 25.
 Ballus 10, 11, 26.
 aenescens 23.
 depressus 23.
 Cyrba 15.
 Dendryphantes 10, 12, 15, 16.
 encarpatus 22, 23.
 hastatus 22, 27.
 ruidis 22, 27.
 Epiblemum 10, 12, 14, 26.
 cingulatum 22.
 scenicum 22.
 tenerum 22.
 Ergane 10, 12, 13, 14, 23.
 arcuata 8, 22, 25, 27.
 falcata 8, 22, 25, 27.
 laetabunda 8, 22, 25.
 Ericulus 11.
 Eris 11.
 Euophrys 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18.
 aequipes 23, 31, 32.
 erratica 21, 23, 31, 32.
 frontalis 22, 23, 31, 32.
 monticola 23, 31, 32.
 petrensis 21.
 n. sp. ~erraticae 21, 23, 31, 32.
 n. sp. ~petrensi 23, 31, 32.
 Hasarius 14, 23.
 Adansonii 23.
 arcuatus 22.
 falcatus 22.
 laetabundus 22.
 Heliophanus 10, 12, 15, 17, 26.
 aeneus 22.
 auratus 22, 26.
 cupreus 21, 22, 24.
 dubius 21, 22, 24.
 flavipes 20, 22.
 patagiatus 18, 22.
 varians 20, 22, 26.
 Hyctia 12.
 Icius 15, 16, 23.
 Ictidops 24.
 festivus 22.
 V-insignitus 22.
 Leptorchestes 10, 26.
 berolinensis 22, 25.
 Maevia 15, 16.
 Pavesii (multipunctata) 15.
 Marptusa 10, 12, 14, 26.
 muscosa 22.
 pomatia 26.
 radiata 22, 27.
 Menemerus 15, 16.
 Neaetha 11.
 Neera 11.
 Neon 10, 11, 26.
 reticulatus 23.
 Oedipus 10, 11, 24, 26.
 aenescens 23.
 Pellenes 10, 12, 13, 14, 26.
 crucigerus 22.
 Philaeus 11, 12, 13, 15, 16, 17.
 bicolor 22, 27.
 chrysops 22, 27.
 Phlegra 10, 11, 15, 16, 26.
 fasciata 22.
 Pseudicius 10, 12, 15, 16, 23, 26.
 badius 23.
 encarpatus 22, 23.
 icioides 23.
 picaceus 23.
 Salticus 10, 26.
 formicarius 22.
 Synageles 10, 26.
 confusus 22, 26.
 hilarulus 22.
 Yllenus 10, 12, 14, 15, 17, 18, 26.
 arenarius 22.

CZEŚĆ URZĘDOWA.

I.

SKŁAD GRONA NAUCZYCIELSKIEGO.

przy końcu roku szkolnego 1890.

A). Dla nauki obowiązkowej.

1. Skuba Tadeusz, dyrektor, uczył języka greckiego w klasie V. — 5 godzin tygodniowo.

2. Znamirowski Ignacy, doktor fil., profesor w VIII randze, uczył języka łaciń. w kl. IVa i VI, polskiego w klasie VIII. — 15 godzin tygodniowo.

3. Rozwadowski Józef, prof., uczył języka łacińskiego w kl. IIa+b. — 16 godzin tygodniowo.

4. Stodolak Stanisław, doktor fil., prof., uczył języka łaciń. w kl. III a+b, IVb — 18 godzin tygodniowo.

5. Tułasiewicz Józef, prof., gospodarz kl. V, uczył języka niemiec. w kl. Ib, historii powszech. w kl. IIIa+b, V, VII — 18 godzin tygodniowo.

6. Baczakiewicz Feliks, prof., zawiadowca biblioteki uczniów, gospodarz VIII kl., uczył języka łaciń. w kl. Ia, niemieckiego w kl. V, VIII — 16 godzin tygodniowo.

7. Alexandrowicz Włodzimierz, prof., zawiadowca zbioru map geogr., gospodarz kl. IVa, uczył języka polskiego w kl. IIa, historii powszechnej w kl. IIa, IVa, VI, VIII — 18 godzin tygodniowo.

8. Taborski Józef, prof., zawiadowca biblioteki profesorów, uczył języka łaciń. w kl. VIII, greckiego w kl. VI, VIII — 15 godzin tygodniowo.

9. Kulczyński Władysław, prof., zawiadowca gabinetu historii naturalnej, uczył matematyki w kl. IIa+b, IVa+b, historii naturalnej w kl. IIa, V, VI — 18 godzin tygodniowo.

10. Charkiewicz Edward, prof., przydzielony czasowo do Wys. c. k. Ministerstwa W. i O. w Wiedniu.

11. Siedlecki Wojciech, ks. prof., exhortator dla uczniów klas wyższych, uczył religii w kl. IIa, IIIa+b, IVa+b, V, VI, VII, VIII, — 18 godzin tygodniowo.

12. Kawecki Medard Antoni, prof., zawiadowca gabinetu fizykalnego, uczył matematyki w kl. V, VI, VII, VIII, fizyki w kl. VII, VIII, — 18 godzin tygodniowo.

13. Krasnosielski Teofil, prof., gospodarz kl. VII, uczył języka łaciń. w kl. V, VII, greckiego w kl. VII — 15 godzin tygodniowo.

14. Waškowski Wawrzyniec, egzaminowany zastępca nauczyciela, gospodarz kl. IIb, uczył języka polskiego w kl. IIb, IIIa, V, VI, geografii i historii powszechnej w kl. Ib, IIb — 19 godzin tygodniowo.

15. Zwoliński Maciej, egzam. zastępca nauczyciela, gospodarz kl. IVb, uczył języka polskiego w kl. IIIb, IVa+b, matematyki w kl. IIIa, fizyki w kl. IVa+b — 18 godzin tygodniowo.

16. Vogl Franciszek, egzam. zastępca naucz., gospod. kl. IIIb, uczył matematyki w kl. Ia+b, IIIb, historii naturalnej w kl. Ia+b, IIb; fizyki w kl. IIIa+b — 19 godzin tygodniowo.

17. Gawalewicz Adolf, egzam. zastępca naucz., gospodarz kl. Ib, uczył języka łaciń. w kl. Ib, polskiego w kl. Ia+b, geografii w kl. Ia — 17 godzin tygodniowo.

18. Gruszecki Antoni, ks., zastępca naucz., exhortator dla uczniów klas niższych, uczył religii w kl. Ia+b, IIb, — 6 godzin tygodniowo.

19. Lityński Michał, egzam. zastępca naucz., gospodarz kl. Ia, uczył języka niemieckiego w kl. Ia, IVa+b, historii powszechnej w kl. IVb — 18 godzin tygodniowo.

20. Karbowski Antoni, doktor fil., zastępca naucz., gospodarz kl. IIa, uczył języka polskiego w kl. VII, niemieckiego w kl. IIa+b, propedeutyki filoz. w kl. VII, VIII — 17 godzin tygodniowo.

21. Szafran Tomasz, zastępca naucz., gospodarz kl. IIIa, uczył języka greckiego w kl. IIIa+b, IVa+b — 18 godzin tygodniowo.

22. Kannenberg Józef, zastępca naucz., gospodarz kl. VI, uczył języka niemieckiego w kl. IIIa+b, VI, VII — 16 godzin tygodniowo.

B) Dla nauki nadobowiązkowej.

1. Tułasiewicz Józef, j. w., uczył historii kraju rodzinnego w kl. IIIa+b i VII, w każdej po jednej godzinie tygodniowo.

2. Alexandrowicz Włodzimierz, j. w., uczył historii kraju rodzinnego w kl. IV i VI, w każdej po 1 godzinie tygodniowo.

3. Lityński Michał, j. w., uczył historii kraju rodzinnego w kl. IVb w jednej godzinie tygodniowo.

5. Zwoliński Maciej, j. w., uczył kaligrafii w trzech oddziałach, po 1 godzinie tygodniowo w każdym.

5. Dec Walenty, uczył śpiewu w 2 oddziałach, — 5 godzin tygodniowo.

6. Geciów Onufry, egzam. zastępca naucz. wyższej szkoły realnej w Krakowie, uczył stenografii, w 2 godzinach tygodniowo.

7. W Towarzystwie „Sokół krakowski“ pobierała młodzież gimnazjalna naukę gimnastyki w trzech oddziałach, w każdym po 2 godziny tygodniowo.

II. ROZKŁAD NAUK.

KLASA I.

L.	Przedmiot nauki	Godzin tygodn.	Treść nauki	Autor książki szkolnej
1	Religia	2	Nauka wiary i obyczajów	Katech. Szustera (Zielińskiego).
2	J. łaciński	8	Nauka o formach prawidłowych. Co tydzień wypracowanie szkolne.	Gram. Samolewicza Przykłady Znamierowskiego 1878.
3	J. polski	3	Odmiana imion, nauka o zdaniu pojedynczym, pierwsze zasady głosowni i pisowni. Czytanie, opowiadanie i wyuczanie się na pamięć ustępów. Co dziesięć dni praca piśmienna.	Gram. Małeckiego Wypisy tom I. 1875.
4	J. niemiecki	6	Odmiana imion i czasowników, nauka o zdaniu pojedynczym, pisownia przy danej sposobności. Co tydzień wypracowania szkolne.	L. German i K. Petelenz, Ćwiczenia niemieckie.
5	Geografia	3	Wstępne pojęcia o kosmografii i geografii matematycznej, opis powierzchni ziemi według jej naturalnych własności, wiadomości najważn. z politycznej geografii, czyt. i rys. map.	Benoni i Tatomir Geografia.
6	Matematyka	3	Arytmetyka i geometrya na przemian. Cztery działania liczbami całkowitymi, podzielność liczb, ułamki; linia prosta, koło, kąty, linie równoległe, trójkąt z wyjątkiem o przystawianiu, konstrukcyje zasadnicze. Co miesiąc zadanie szkolne, ćwiczenia domowe na każdą lekcję.	Arytmetyka Zajackowskiego w. II. Geometrya Moćnika (Maryniaka) 1.
7	Historia naturalna	2 27	Ssawce i bezkręgowce.	Zoologia obrazowa Nowickiego wyd. 5.

KLASA II.

L.	Przedmiot nauki	Godzin tygodn.	Treść nauki	Autor książki szkolnej
1	Religia	2	Dzieje starego zakonu.	Dąbrowski T. Historia biblijna.
2	J. łaciński	8	Formy nieprawidłowe z powtórzeniem prawidłowych. Części mowy nieodmienne.	Gram. i Przykłady Samolewicz, 1887.
3	J. polski	3	Odmiana czasownika, zdanie złożone, składnia zgody, czytanie jak w klasie 1szej.	Gram. jak w kl. I. Wypisy tom II.
4	J. niemiecki	5	Powtórzenie i uzupełnienie nauki o formach w połączeniu z główniejszymi prawidłami składni i rzędu, tłumaczenie, pisownia. Czytanie, opowiadanie i wyuczanie się na pamięć łatwych ustępów z wypisów.	L. German i K. Petelenz, Ćwiczenia niemieckie, II.
5	Geografia	4	1. Geogr. fizyczna i polityczna Azji i Afryki. Oro i hydrografia Europy, szczegółowy opis południowej i zachodniej Europy. 2. Dzieje starożytne, sposobem biograficznym.	Geogr. Wiślickiego (Baranowskiego i Dziedzickiego) Welter (Sawczyński) I, w. V.
6	Matematyka	3	Arytmetyka i geometrya na przemian; skrócone mnożenie i dzielenie, pojedyncza reguła trzech; stosunki i przystawanie trójkątów, koło, czworobok i wielobok. Zadania jak w kl. I.	Arytmetyka Zajączkowskiego Geometrya Mochnika (Maryniaka)
7	Historia naturalna	2	W I półroczu zoologia: ptaki, gady, płazy i ryby, w II półroczu: botanika.	Zoologia jak w kl. I. Botanika Rostańskiego.
		27	Wszystkie ćwiczenia piśmienne jak w kl. I.	

KLASA III.

L.	Przedmiot nauki	Godzin tygodn.	Treść nauki	Autor książki szkolnej
1	Religia	2	Dzieje nowego zakonu.	Dąbrowski T. Szuster (Rodecki) Historia biblijna
2	J. łaciński	6	Składnia zgody i przypadków. Czytanie z Korneliusza Neposa: życoty Milytadesa, Temistoklesa, Arystydesa, Lisandra, Pelopidasa, Hannibala i Katona. Co dni 14 praca domowa, co miesiąc zadanie szkolne.	Gram. Samolewicza Kornelius Nepos (Patočki). Ćwiczenia Próchnickiego.
3	J. grecki	5	Odmiana prawidłowa imion i czasowników. W II półr. co dni 14 zadanie domowe a co miesiąc szkolne.	Gram. Curtiusa (Sternala i Samo- lewicza). Ćwiczenia Schenkla (Samolewicza).
4	J. polski	3	Nieodm. części mowy, składnia rządu, nauka o słowie, pisownia i interpunkcja, czyt. jak w kl. I. Co dni 14 praca piśmienna.	Wypisy tom III.
5	J. niemiecki	4	Składnia zgody rządu i szyku, Czytanie jak w klasie II. Co dni 10 praca piśmienna.	Gram. Schobera (Rebena). Wypisy Rebena (w. II.)
6	Geografia i historia	3	Szczegółowy opis Europy północnej, wschodniej i środkowej z wyjątkiem Austrii. Ameryka i Australia. Dzieje wieków średnich.	Welter. (Sawczyński) t. 2.
7	Matematyka	3	Rozkład godzin jak w kl. II. cztery działania literami, potęgi, pierwiastki, skrócenia, przemiany. Podobieństwo figur, nauka o kole.	Aryt. Zajączko- wskiego II; geo- metr. Moćnik-Ma- ryniak.
8	Nauki przyrodnicze	$\frac{2}{28}$	W I półroczu mineralogia. W II półroczu początki fizyki.	Łomnicki M. Mineralogia. Fizyka Soleskiego.

KLASA IV.

L.	Przedmiot nauki	Godzin tygodn.	Treść nauki	Autor książki szkolnej
1	Religia	2	Wykłady obrzędów i zwyczajów religijnych.	Liturgia ks. Jachimowskiego.
2	J. łaciński	6	Nauka o czasach i trybach; oratio obliqua, supinum; gerundium. Caesar de bello gallico 80 rozdziałów.	Gram Samolewicz; Cezar w. Prammera; Cw. Próchnickiego.
3	J. grecki	4	Odmiana czasowników na „ω“ począwszy od perf. act.; odmiana czasowników na „ιι.“; odmiana niewzorowa czasownika.	Jak w kl. III.
4	J. polski	3	Nauka o zdaniu złożonem; składnia szyku, nauka o wierszu, najzwyczajniejsze formy stylu. Czyt. z rozbiorem stylistycznym.	Wypisy t. IV, 18 ⁷⁴ .
5	J. niemiecki	4	Ukończenie i powtórzenie gramatyki. Czytanie jak w klasie II.	Gram. Schober-Reben (w IV.) Hamerski. Wypisy niem.
6	Geografia i historia	3	I. półr. Nowsze dzieje z uwzględnieniem do związku ich z dziejami Austrii. Powtórzenie geografii Europy. II półr. Szczegółowa geografia monarchii austro-węgierskiej.	I. Sawczyński t. 3. II. Dr. Szaraniewicz geografia.
7	Matematyka	3	Stosunki i proporcje składane z zastosowaniem do rachunków praktycznych, równanie 1go stopnia, Stereometria.	Arytm. Zajączkowskiego, II, geometr. Moćnik-Maryniak.
8	Fizyka	3	Mechanika, akustyka, magnetyzm, elektryczność, optyka.	Soleski.
		29	Wszystkie prace piśmienne jak w klasie III.	

KLASA V.

L.	Przedmiot nauki	Godzin tygodn.	Treść nauki	Autor książki szkolnej
1	Religia	2	Apologetyka i dogmatyka ogólna.	Martin. (Jachimowski).
2	J. łaciński	6	Liwiusz I. XXII. Owidyusz 1400—1500 wierszy. Prozodya i metryka. Powtórzenie gramatyki o przypadkach. Co dni 14 praca domowa, co miesiąc szkolna.	Liwiusz Zingerlego i Owidyusz wyd. Sedlmayer. Przyk. Jerzykowski część II. Gramatyka Samolewicza.
3	J. grecki	5	Nauka o przypadkach. Lektura Ksenofonta i Homera Iliady ks. I. Co miesiąc zadanie.	Gram. jak w kl III. Chrestomatya Fiderera. Ilias.
4	J. polski	3	Głosownia, etymologia; o tropach i figurach, o rodzajach stylu i gatunkach prozy i poezyi. Sprawozdanie z lektury prywatnej. Co trzy tygodnie wypracowanie szkolne.	Wypisy polskie t. I.
5	J. niemiecki	3	Czytanie w połączeniu z objaśnieniem gramatycznym i stylistycznym, memorowanie celniejszych ustępów. Sprawozdanie z lektury prywatnej. Co dni 14 wypracowanie piśmienne.	Wypisy Jandaurka.
6	Geografia i historia	4	Dzieje starożytne w połączeniu z geografią.	Gindely-Markiewicz, Historia powszechna.
7	Matematyka	4	Algebra: Wstęp, 4 działania, ułamki, stosunki i proporcye. Geometrya: longimetrya i planimetrya. Co miesiąc wypracowanie szkolne, częste ćwiczenia domowe.	Algebra Moćnika w tłum. Bodyńskiego, wyd. 2. {Geometrya Moćnika w tłumaczeniu Staneckiego.
	Historia naturalna	2 29	W I półroczu mineralogia. W II półroczu botanika.	Łomnicki. Postafiński.

KLASA VI.

L.	Przedmiot nauki	Godzin tygodn.	Treść nauki	Autor książki szkolnej
1	Religia	2	Dogmatyka szczegółowa.	Jak w kl. V.
2	J. łaciński	6	Sallusti bellum Jugurthinum. Cic. in Cat. I., Virgili z Eneidy ks. I. Eccl. I. Georg. I. Obeznanie się z formą listów. Powtarzanie gramatyki o czasach i trybach.	Wydan. Eichlera Ćwic. jak w kl. V. Gram. Samolewicza.
3	J. grecki	5	Nauka o czasach i trybach Hom. Ilias II, VI, XI VVIII. Z Herodota IX.	Hohegger, Wil- helm.
4	J. polski	3	Lektura szkolna i prywatna Dzieje literatury od początku do Stanisława Augusta. Zadania jak w kl. V.	Jak w kl. V.
5	J. niemiecki	5	Jak w kl. V.	Jandaurek dla kl. VI.
6	Historya	3	Dokończenie historyi rzymskiej (od Augusta). Dzieje średnich wieków.	Gindely-Markie- wicz. Hist. powsz. t. II.
7	Matematyka	3	Z algebry: potęgi, pierwiastki, logarytmy; równania I stopnia o jednej i kilku niewiadomych; z geometrii: stereometria i trygonometria.	Jak w kl. V.
8	Historya naturalna	2	Zoologia.	Nowicki.
			Wszystkie ćwiczenia piśmienne jak w kl. V.	

KLASA VII.

L.	Przedmiot nauki	Godzin tygodn.	Treść nauki	Autor książki szkolnej
1	Religia	2	Etyka.	Martin (Solecki).
2	J. łaciński	5	Powtarzanie gramatyki, Vergil Aeneid. IV, VI, XII, Cicero in Cat. II., pro Archia poeta, Cato maior. Co 14 dni wypracowanie.	Gram. jak w kl. VI. wydanie szkolne. Ćwiczenia Próchnickiego. Eichler, Nohl.
3	J. grecki	4	Demostenes Olinth. I. o stosunkach herzonejskich, o pokoju, Uzupełnienie gramatyki. Zadania jak w kl. V. Hom. Odys. I, V, VI, IX, X, XI.	Gram. jak w kl. VI. wydanie szkolne. Pauly et Wotke.
4	J. polski	3	Lektura szkolna i prywatna. Historia literatury, ciąg dalszy do Mickiewicza. Co miesiąc wypracowania piśmienne.	Jak w kl. VI.
5	J. niemiecki	4	Lektura szkolna i domowa. Co dni 21 wypracowanie piśm.	Harwoth, Wypisy niemieck.
6	Historia i geografia	3	Dzieje nowożytne.	Gindely t. III. wyd. Markiewicza.
7	Matematyka	3	Z algebry: Równania logarytmiczne, szeregi, rachunek procentu złożonego, kombinacje, potęgi dwumianu. Z geometrii: Zastosowanie algebry do geometr., geometria analityczna w płaszczyźnie.	Jak w kl. VI.
8	Fizyka	3	Własności ciał, ciepło, chemia. Mechanika ciał stałych i ciekłych.	Soleski, Fizyka.
9	Propedeutyka filozofii	$\frac{2}{29}$	Logika.	Kremer.

KLASA VIII.

L.	Przedmiot nauki	Co jżin tygodn.	Treść nauki	Autor książki szkolnej
1	Religia	2	Historja kościelna.	Robitsch (Jachimowski).
2	J. łaciński	5	Horacego 20 ód, 2 sat., 2 epod., 1 list. Tacit Germania, Annal. I, II. Pogląd na literaturę rzymską. Co 14 dni wypracowanie.	Grysar. Mueller Ćwicz. jak w kl. VII.
3	J. grecki	5	Plato, Apologia, Crito, Laches, Sophocles, Electra. Pogląd na literaturę grecką. Zadania jak w kl. VII.	Wyd. Krala, Wydanie Schuberta.
4	J. polski	3	Czytanie dalszego ciągu arcydzieł literatury narodowej wieku XIX. Zadania jak w kl. VII.	Mecherzyński tom. II, wyd. 2.
5	J. niemiecki	4	Podobnie jak w kl. VII. Pogląd na literaturę niemiecką. Ustne wykłady. Co miesiąc wypracowanie.	Jak w kl. VII.
6	Historja i geografia	3	Dzieje i statystyka monarchii austro-węgierskiej w zestawieniu z innymi państwami.	Hannak w tłóm. Sternala.
7	Matematyka	2	Zwięźle powtórzenie całego przedmiotu. Częste ćwiczenia.	—
8	Fizyka	3	Mechanika ciał lotnych, uzupełn., i dokończ., elektryczność, magnetyzm, ruch drgający i falowy, akustyka i optyka.	Soleski, Fizyka.
	Propedeutyka filozofii	2 29	Psychologia.	Zarys psychologii Crügera, p. Z. Sawczyńskiego.

Zmiany na rok szkolny 1890/1891.

Książki.

- Dla klasy I: Zwięzła gramatyka łacińska Dra Z. Samolewicza, — wyd. II.; L. German i K. Petelenz, Ćwiczenia niemieckie, wyd. II.; Benoni i Tatomir, Geografia na I kl., wyd. IV.; Nowicki, Zoologia dla klas niższych, wyd. VI.
- Dla klasy IV i V: Wybór pism Owidyusza, wydał Skupniewicz.
- Dla klasy V: Homera Iliada w skróceniu, wydał Sołtysik. Mocnik-Stanecki, Geometrya, wyd. III.
- Dla klasy VI: Sallustyusza Kryspa Iugurta, wydał Sołtysik. Cy-cerona 4 mowy przeciw Katylinie, wydał Sołtysik. Herodot. Wilhelm Lauczicky. Wypisy polskie.
- Dla klasy VII: Cycerona Leliusz o przyjaźni, wydał Sołtysik.
- Dla klasy VIII: Sofoklesa Antygona, wydał Majchrowicz.

Lektura łacińska.

- W kl. V: Liv. I, XXI; z Owidyusza wybór.
- W kl. VI: Sallustij Iugurtha. Cic. in Cat. I, Virg. Geor., Buc. wybór; Aen. I.
- W kl. VII: Virg. Aen. II, III, VI; Cic. in Cat. III, IV; Lae-lius, pro S. Roscio Amerino.
- W kl. VIII: Hor. carmina (wybór); Tac. Annal. I, II.

Lektura grecka.

- W kl. V: Xenoph. Chrest. (wybór z Anab.); Hom. Il. I.
- W kl. VI: Hom. Il: VI, XVI, XXII, XXIV; Herod. VIII.
- W kl. VII: Demost. olyn. I III; Hom. Odys. I. VI, VII, XIII, XIV, XV.
- W kl. VIII Plat. Apol. i Protag.; Sophocl. Antigone.



III.

Tematy do wypracowań piśmiennych.

a) W języku polskim.

W klasie V.

1. Wspomnienia z wakacyj.
2. Opis wycieczki za miasto w porze jesiennej.
3. Rolnictwo jest początkiem oświaty.
4. Nadzieje i zawody rolnika.
5. Znaczenie wody w gospodarstwie przyrody.
6. O potrzebie kształcenia się w młodym wieku.
7. Zasługi Fenicyan w cywilizacji.
8. Znaczenie zegara w życiu.
9. Jakie korzyści odnosimy z podróży?
10. O wychowaniu młodzieży w Sparcie.
11. Krótka treść „Wiesława“ K. Brodzińskiego (wedł. lektury).
12. Opis bitwy nad jeziorem Trazymeńskim (wed. Liwiusza).

W. Waškowski.

W klasie VI.

1. Potrzeba jest matką wynalazków.
2. Opis wycieczki w okolice Krakowa.
3. Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.
4. Przyjemności życia wiejskiego na podstawie „Pieśni Świętojańskiej o Sobótce“ J. Kochanowskiego.
5. Jak przedstawia J. Kochanowski zbytek w poemacie „Satyr“.
6. O ile przyczyniają się podróże do wykształcenia człowieka.

7. Obraz duchowy Urszulki w „Trenach“ Jana Kochanowskiego.
8. Skromność ozdobą młodzieńca.
9. Charakterystyka głównych osób w „Odprawie posłów greckich“ J. Kochanowskiego.
10. „Waleta włoszczonowska“ K. Miaskowskiego, a „Piecki małe“ St. Grochowskiego. (Treść i porównanie wedł. lektury.)
11. Krótka treść kazania Skargi: „O miłości ojczyzny“.
12. Myśli i wspomnienia na głos dzwonu Zygmunta.

W. Waśkowski.

W klasie VII.

1. Qui studet optatam cursu contingere metam,
Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit.
2. Charakterystyka sielanki z uwzględnieniem sielanek pisarzy polskich XVII wieku.
3. Charakterystyka Jana Karola Chodkiewicza.
4. Satyra w szczególności nikomu nie łąje,
Czołem bije osobom, gani obyczaje.
5. Rozwinąć i uzasadnić myśl zawartą w przysłowiu: „Mens sana in corpore sano“.
6. Dlaczego Kraków jest drogi sercu każdego Polaka?
7. Charakterystyka „Wiesława“ w sielance Brodzińskiego.
8. Łowy na Litwie (według „Pana Tadeusza“).
9. Zasługi Jagiellonów około rozwoju nauki i sztuki w Polsce.
10. Jakie korzyści przynosi bliskość morza ludom nad nié mieszającym.

Antoni Karbowski.

W klasie VIII.

1. Warunkiem rozwoju literatury jest znajomość jéj dziejów.
2. Brodziński a Konarski co do ich wpływu na rozwój literatury.
3. Znaczenie wieści gminnej w literaturze — na podstawie słów zawartych w Konradzie Wallenrodzie: „O wieści gminna, ty arko przymierza — Między dawnymi i młodszymi laty“.
4. Wpływ okoliczności i stosunków na utwory poetyczne na podstawie żywota Mickiewicza.
5. „Prudens futuri temporis exitum
Caliginosa nocte premit deus“.

6. „Virtutem incolumem odimus
Sublatam ex oculis quaerimus invidi“.
7. Charakter i znaczenie Halbana w powieści Konrad Wallenrod.
8. Na co baczyć należy przy wyborze stanu?

Ig. Znamirovski.

b) W języku niemieckim.

W klasie V.

1. Der Löwe zu Florenz. (Nacherzählung.)
2. Polykarp. (Nacherzählung.)
3. Beschreibung des Heimatsortes (Briefform.)
4. Beschreibung des Hahnenschlages. (Briefform.)
5. Rettung. (Nacherzählung.)
6. Die Versuchung. (Nacherzählung.)
7. Der Bauch und die Glieder. (Nacherzählung.)
8. Der Sturmvogel und die Schiffenden. (Nacherzählung.)
9. Der Fuchs und der Hahn. (Nacherzählung.)
10. Kindliche und brüderliche Liebe. (Nacherzählung.)
11. Aus dem Hüttchen. (Eine Erzählung.)
12. Brief nach überstandener schwerer Krankheit.
13. Der Mohr und der Weisse. (Nacherzählung.)
14. Der getreue Eckart. (Inhaltsangabe.)
15. Der Ring des Polykrates. (Inhaltsangabe.)
16. Das Schlangenhalsband. (Inhaltsangabe.)
17. Der Schenk von Limburg. (Gedankengang.)
18. Arion's Rettung. (Erzählung.)
19. Johanna Sebus. (Nacherzählung.)
20. Des Tauchers erster Sturz. (Nacherzählung.)

Feliks Baczkiewicz.

W klasie V.

1. Inhalt und Gedankengang des Gedichtes von Seidl „Das Glöcklein des Glückes“.
2. Jung gewohnt, alt gethan.
3. Hannibal in Italien.
4. Wohlthätig ist des Feuers Macht,
Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht....

- Doch furchtbar wird die Himmelskraft,
Wenn sie der Fessel sich entraft. (Schiller.)
5. Siegfried im Nibelungenliede.
 6. Erläuterung des Motto zu Schillers Glocke: *Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango.*
 7. Krakau (Seitenstück zum Lesestücke „Lemberg“ von Jandaurek).
 8. Die Treue im Nibelungenliede.
 9. Erbkönig und Erbkönigstöchter.
 10. Was können wir von den Bienen lernen?
 11. Charakteristik der alten Deutschen (Nach dem Schulunterricht).
 12. Böse Gesellschaft verdirbt gute Sitten.
 13. Hektor und Andromache.
 14. Erfindung der Buchdruckerkunst ist eine der wohlthätigsten Erfindungen.
 15. Der Baum und der Mensch (Nach dem Gelesenen).
 16. Ueber die Vortheile des Aufenthaltes in einer grossen Stadt.
 17. Major von Telheim (Charakterschilderung auf Grund des Schulunterrichtes).
 18. Der vierte Kreuzzug (Nach dem Schulunterrichte).

J. Kannenberg.

W klasie VII.

1. Das Leben eine Reise.
2. Ein unnütz Leben ist ein früher Tod. (Goethe).
3. Siegfrieds Tod.
4. Vortheilhafte Folgen der Nationalspiele für die Griechen.
5. Inhaltsangabe des ersten Aufzuges der „Emilia Galotti“ von Lessing.
6. Der Ackerbau, der Anfang der Cultur.
7. Ueber den Werth der Geschichte. (Nach dem Gelesenen).
8. Wir sind Gäste nur auf Erden.
9. Der Cid (Charakterschilderung).
10. Die Zunge das wohlthätigste und und verderblichste Glied des Menschen.
11. Wo rohe Kräfte sinnlos walten,
Da kann sich kein Gebild gestalten. (Schiller.)
12. Arbeit und Fleiss, das sind Flügel,
Sie führen über Strom und Hügel. (Fischart.)

13. Ursachen des 30-jährigen Krieges.
14. Wie hat Lessing die Katastrophe in „Emilia Galotti“ motiviert?
(Nach dem Schulunterricht.)

J. Kannenberg.

W klasie VIII.

1. Abhandlung von der heimatlichen Flur. (In Form einer Anrede.)
2. „Fac et respice finem“. (Beweisführung in Form einer Erzählung.)
3. Unter welchen Umständen wuchs Johanna d'Arc zur Retterin ihres Vaterlandes heran? (Darstellung nach Schiller's „Jungfrau v. Orleans“.)
4. „Unter Wölfen muss man heulen“. (Widerlegung des Grundsatzes.)
5. Ist der Mensch verpflichtet die Barmherzigkeit zu üben? (Eine Abhandlung.)
6. Welchen günstigen Umständen verdankte der junge Goethe die rasche und vielseitige Entwicklung seines dichterischen Talentes? (Eine Abhandlung.)
7. Johanna d'Arc in Bewusstsein ihrer Schuld. (Eine Schilderung.)
8. Johanna d'Arc und die Königin Isabeau. (Eine Charakteristik.)
9. Die Freuden des Winters. (Eine Schilderung.)
10. Geringes ist die Wiege des Grossen. (Abhandlung.)
11. „Undank ist der Welt Lohn“. (Abhandlung im Anschluss an Schillers „Jungfrau v. Orleans“.)
12. „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo“. (Erklärende Abhandlung.)
13. Iphigenien's Sehnsucht nach ihrer Heimat. (Eine Schilderung.)

Feliks Baczakiewicz.

c) Tematy dla piśmiennego egzaminu dojrzałości.

1. Zadanie polsko-łacińskie:

Przełożyć na język łaciński ustęp z Weltera - Sawczyńskiego
cz. I. od wyrazów: „Kiedy Grecy...“ do: „...synowi
jego Aleksandrowi“.

2. Zadanie łacińsko-polskie:

Corn. Taciti Annalium l. XV, cap. XXXVIII et XXXIX.

3. Zadanie greckie:

Przełożyć na język polski: „Plat. Protag. cap. XI od słów:

„ἦν ποτε χρόνος... δωρεῖται ἀνθρώπων“.

4. Zadanie polskie:

„Co zawdzięczamy wynalazkowi żeglugi?“

5. Zadanie niemieckie:

„Einfluss der Kreuzzüge auf die Cultur des Abendlandes“.

6. Zadanie matematyczne:


$$a) \sqrt{\frac{3x}{x+y}} + \sqrt{\frac{x+y}{3x}} = 2$$

$$xy - (x+y) = 54$$

b) Ktoś składa 12000 zł. na 4⁰/₀ i chce za to pobierać rentę przez 24 lat z końcem każdego roku. Jakaż będzie roczna renta?

c) Rozwiązać trójkąt, znając

$$a^2 + b^2 = 2650 \text{ m.}, \quad a^2 - b^2 = 1400 \text{ m.}, \quad \alpha = 68^\circ 29' 53''.$$



IV.

ZBIORY NAUKOWE.

a) Biblioteka nauczycielska.

1. Biblioteka liczyła z końcem r. szk. 1889 dzieł 1676 w 2811 tomach.

Przybyło w roku bieżącym :

a) drogą zakupną 37 dzieł w 71 tomach

b) drogą darów 18 „ „ 19 „

Z końcem roku szkolnego 1890 ma 1731 dzieł w 2901 tomach

2. Zakład prenumeruje następujące czasopisma naukowe i pedagogiczne, tudzież dzieła peryodycznie wychodzące :

1. Muzeum, 2. Szkoła, 3. Przegląd pedagogiczny, 4. Przewodnik bibliograficzny, 5. Ateneum, 6. Przegląd polski, 7. Przewodnik naukowy i literacki, 8. Kwartalnik historyczny, 9. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, 10. Wochenschrift für classische Philologie, 11. Journal de physique, 12. Zeitschrift für den physikalischen und chemischen Unterricht, 13. Encyklopedya wychowawcza, 14. Słownik geograficzny Król. polskiego, 15. Oesterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild.

3. a) Dzieła zakupione :

1. Czerny, Ogólna geografia handlowa, Kraków 1889, 2. Ihne, Römische Geschichte, Leipzig 1890 B. VII, VIII. 3. Lübke, Grundriss der Kunstgeschichte, Stuttgart 1887, 4. Lützw, Die vervielfältigende Kunst der Gegenwart. Heft XV-XVIII, 5. Horatius erkl. v. Kissling. I-III Th. Berlin 1884-1889, 6. Homeri Odyssea erkl. v. Weck H. I-IV, Gotha 1887, 7. Sophoclis Electra erkl. v. Müller, Gotha 1885, 8. Herodotos erkl. v. Sitzler, B. VII-IX,

Gotha 1885-1887, 9. Die Metamorphosen des Ovidius erkl. v. Magnus, Gotha 1885, 10. Próchnicki, Wskazówki do nauki jęz. polskiego, Lwów 1885, 11. Piramowicz, Mowy, Kraków 1889, 12. Próchnicki, Wypisy polskie dla kl. V, Lwów 1889, 13. Harre, Lateinische Schulgrammatik, Berlin 1885-1888, 14. Sas, Podręcznik metryki łacińskiej i gréckiej, Kraków 1889, 15. Terlikowski, Życie starożytnych Greków i Rzymian, Lwów 1889, 16. Samolewicz, Zwięzła gramatyka łacińska (5 egz.) Lwów 1889, 17. Fiderer, Chrestomatya z pism Xenofonta, Lwów 1888 (3 egzempl.), 18. Próchnicki, Ćwiczenia łacińskie na IV kl., Lwów 1888 (4 egz.), 19. Rosenberg, Aufgaben zum Übersetzen ins Lat. für Prima, Leipzig 1889, 20. German i Petelenz, Ćwiczenia niemieckie na II kl. Lwów 1889 (5 egzempl.), 21. Wypisy polskie dla kl. niż. T. IV Wyd. 2, Lwów 1888, 22. Zajączkowski, Początki arytmetyki. Wyd. 2. Lwów 1889 (2 egz.)

b) Otrzymano w darze:

1. Akta grodzkie i ziemskie, T. XIV Lwów 1889 (Dar W. Wydziału kraj.), 2. Danzer, Unter den Fahnen, Wien 1889 (Dar W. Min. w. i ośw.), 3. De Lagarde, Librorum veteris Testamenti pars prior, Gottingae 1883 (Dar W. Min. w. i o.), 4. Sprawozdanie o stanie szkół średnich 1884-1888 (Dar W. Rady szk kraj.), 5. Sprawozdanie z czynności Tow. pedag., Lwów 1889 (dar Tow. pedag.), 6. Zajączkowski, Początki arytmetyki Cz. I. Wyd. 2, Lwów 1889 (Dar Tow. pedag.), 7. Benoni i Tatomir, Rys geografii. Wyd. 4. Lwów 1889 (Dar Tow. pedag.), 8. Wybór pism Ovidiusza wydał Skupniewicz, Lwów 1889 (Dar Tow. uucz. szk. wyższ.), 9. Salustius, Wojna z Katyliną, wydał Sołtysik, Lwów 1889 (Dar Tow. uucz. szk. wyższ.), 10. Cicero, Leliusz, wydał Sołtysik, Lwów 1889. (Dar Tow. uucz. szk. w.), 11. Korneliusza Neposa Żywoty, objaś. Jerzykowski, Poznań 1886 (Dar księgarni Żupańskiego), 12. Jachimowski ks., Dogmatyka ogólna Wyd. 2. Lwów 1889 i Dogmatyka szczegółowa. Wydanie 2. Lwów 1889. (Dar księgarni Seyfartha i Czajkowskiego), 13. Hamerski, Wypisy niemieckie na III klasę Wyd. 4 Lwów 1890 (Dar księgarni Seyfartha i Czajkowskiego), 14. Curtius-Hartel-Ćwikliński, Gramatyka języka greckiego, Wiedeń i Praga 1890 (Dar nakładcy Tempskiego), 15. Demostenes, Wybór mów, wyd. Wotke-Schmidt, Praga 1889 (Dar nakładcy Tempskiego), 16. Sofoklesa Antygona, wyd. Schubert-Majchrowicz, Praga 1889 (Dar nakładcy Tempskiego), 17. Kunz,

Ein Vorschlag betreffend die Aufhebung der Dispensen aus der Geschichte und der Physik, Brody 1889 (Dar autora), 18. Karboviak, Mieszkania żaków krakowskich, Lwów 1887 (Dar autora).

J. Taborski.

b) Biblioteka uczniów.

1. Z końcem r. szk. 1889 liczyła :

dziel polskich 356 w 562 tomach

dziel niemieckich 166 w 274 "

Razem 522 w 835 "

2. W roku szkolnym 1890 przybyło :

Dziel polskich 18 w 34 tomach

dziel niemieckich 6 w 7 "

Razem 24 w 7 "

Z końcem r. szk. 1890 liczyła 546 dzieł w 877 tomach.

Zakupiono: 1. Henryk Sienkiewicz, Potop i 2. Pan Wołodyjowski. 3. Zygmunt Krasiński, Pisma. 4. Jan Zacharyasiewicz, Na kresach. 5. A. Bronikowski, Jan III i dwór jego. 6. Stanisław Tarnowski, Z wakacyi. 7. Ks. A. Kitowicz, Pamiętniki. 8. Kajetan Kraszewski, Od szkolnej ławy. 9. Aër, Krzyżowcy. 10. Stanisław Belza, Odgłosy Szkocyi. 11. Julian Ursyn Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich. 12. Jan z Tęczyna. 13. E. Bulwer, przekład Mar. Gawalewicza, Ostatnie dni Pompei. 14. Kajetan Kraszewski, Koniuszyc Brzeski. 15. Z. M. Schwartz, Majątek i sumienie. 16. Wł. Syrokomla, Gawędy. 17. Dr Ludomil German, Mitologia dla młodzieży. 18. Stan. Tarnowski, Henryk Rzewuski. 19. Julius Verne, Zwei Jahre Ferien, 20. P. K. Rosegger, Waldferien. 21. Richard Weitbrecht, Der Jäger von Soest. 22. Leopold Chimani, Goldkörner aus den Erfahrungen im Menschenleben. 23. Ferd. Zöhrer, Der oesterreichische Robinson. 24. Dr Adolf Stern, Geschichte der Weltliteratur.

Feliks Baczakiewicz.

c) Gabinet fizyczny.

Kupiono w r. 1890 następujące przyrządy :

1. Elektrometer według Kolbego, 2. Przyrząd do spektralnej analizy, 3. Przyrząd do refleksyi i refrakcyi światła.

A. M. Kawecki.

d) Gabinet historyi naturalnej.

Przybyły: *a*) przedmioty zakupione: 23 tablic ściennych do zoologii Leuckarta i Nitschego, 5 tablic ściennych do botaniki wydanie Gerolda, *Talpa europaea*, *Cuculus canorus*, *Fringilla coccothraustes*, *Columba livia fera*, *C. turtur*, *Coturnix dactylisonans*, *Vanellus cristatus*, *Machetes pugnax*, *Emys europaea*, *Tetrodon*, *Pyrosoma*, *Scutigera araneoides*, *Pentastomum proboscideum*, *Buthus afer*; *b*) dary: zbiór wodorostów morskich, dar p. r. L. Turnaua, *Trochosa Singoriensis*, dar p. Pukowskiej.

Wł. Kulczyński.



V.

Ważniejsze rozporządzenia Władz szkolnych z roku szkolnego 1890.

1. Wysoka Rada Szkolna krajowa okólnikiem z 16 lipca 1889 l. 11426 przesyła „Plan ograniczenia gramatyki greckiej i rozkładu téjże na klasy“ z poleceniem stósowania się nadal do tegoż przy nauce szkolnej.
2. Wys. Rada szkolna kraj. okól. z 19 października 1889 l. 18882 określa czas egzaminów wstępnych do klas II-VIII.
3. Wys. Rada szkolna kraj. okólnikiem z 18 października 1889 l. 18251 ustanawia terminy i sposób odbywania konferencyj nauczycielskich na przeciąg całego roku.
4. Jego Ekscelencya Pan Minister W. i O. reskr. z 28 września 1889 l. 19223 zarządza, iż tak zwane „utenzylia,“ sprowadzane do gabinetów z zagranicy, nie są wolne od opłaty cłowej.
5. Wys. Rada szkolna kraj. okól. z 22 listopada 1889 l. 19641 ustanawia normy dla odbywania egzaminu dojrzałości tak pisemnego jak i ustnego.
6. Jego Ekscelencya Pan Minister W. i O. reskr. z 13 listopada 1889 l. 14394 ustanowił lektorów dla języka francuskiego w uniwersytecie krakowskim i lwowskim w celu ułatwienia kandydatom kształcenia się na nauczycieli języka francuskiego w szkołach średnich.
7. Jego Ekscelencya Pan Minister W. i O. reskr. z 1 stycznia 1890 l. 21958 zarządził, by w latach 1890 i 1891, w razie niemożności obsadzenia posady suplentem, całą należytość substytucyjną rozdzielano jako remuneracyę pomiędzy nauczycieli,

którzy z powodu braku nauczyciela przedmiotów szkolnych w nadliczbowych godzinach udzielać będą.

8. Wys. Rada szkolna kraj. reskr. z 18 marca 1890 l. 4649 ustanawia nową skalę cenzur dla oceniania postępu w naukach, obyczajów i pilności uczniów.
9. Jego Ekscelecyja Pan Minister W. i O. reskr. z 8 kwietnia 1890 l. 6929 postanowił, by piśmienne egzamina dojrzałości odbywały się równocześnie we wszystkich zakładach krajowych, tudzież, by bezpośrednio przed rozpoczęciem ustnego egzaminu dojrzałości uwalniano abiturjentów na sześć dni od zajęcia szkolnego.
10. Wys. Rada szkolna krajowa okólnikiem z 30 kwietnia 1890 l. 7223 wzywa nauczycielstwo do nadsyłania wykazu dzieł, stosownych do bibliotek gimnazjalnych dla młodzieży.
11. Wys. Rada szkolna krajowa okólnikiem z 26 kwietnia 1890 l. 6595 ustanawia szczegółowe normy odbywania egzaminów wstępnych do I kl
12. Wys. Rada szkolna kraj. okólnikiem z 13 maja 1890 l. 8125 poleca, by stosownie do reskryptu Jego Ekscelecyji Pana Ministra W. i O. z 5 maja 1890 l. 8771 przechowywano w aktach gimnazjalnych piśmienne prace uczniów oraz protokoły z egzaminów wstępnych do klasy I przynajmniej przez rok jeden celem przedłożenia ich Władzy na żądanie.
13. Wys. Rada szkolna kraj. reskr. z 19 marca 1890 l. 7233 upoważnia dyrekcję gimnazjum św. Jacka do odebrania dubletów dzieł biblioteki Akademii umiejętności w Krakowie, darowanych na rzecz szkół średnich, i do przechowania tychże, aż do dalszego zarządzenia.
14. Jego Ekscelecyja Pan Minister W. i O. reskr. z 6 maja 1890 l. 8836 rozporządza w sprawie uwalniania uczniów I kl. w pierwszym półroczu od opłaty szkolnej.
15. Wys. Rada szkolna kraj. okólnikiem z 24 maja 1890 l. 7561 ustanawia liczbę zadań piśmiennych z języka niemieckiego dla wszystkich klas szkół gimnazjalnych.
16. Wys. Rada szkolna kraj. zalicza w poczet książek szkolnych:
 - a) okól. z 18 lipca 1889 l. 11630: „Ćwiczenia niemieckie dla klasy II, L. Germana i K. Petelena“;
 - b) okól. z 19 września 1889 l. 10551: „Dzieje biblijne, pobi-

- blijne i porozbiorowe dla użytku izraelskiej młodzieży, napisał Izak Planer, Lwów, 1889“;
- c) okól. z 19 września 1889 l. 14348: „K. Benoniego i Tatomira krótki rys geografii do użytku szkolnego, wyd IV, Lwów 1889.
- d) okól. z 22 października 1889 l. 18433: „Publii Ovidii Nasonis carmina selecta, Car. Ziws, 1888“;
- e) okól. z 22 października 1889 l. 18425: „Wybór pism Owidyusza, wydał Skupniewicz, Lwów, 1889“;
- f) okól. z 22 października 1889 l. 18301: 1) „4 mowy Cicerona przeciw Katylinie“, 2) „Kato starszy“, 3) „Leliusz“, 4) „Salustyusza o wojnie z Katyliną“, 5) „Tegoż o wojnie z Jugurta, wydane przez Sołtysika, Lwów 1889“;
- g) okól. z 29 października 1889 l. 19270: „Antygone Sofoklesa Schuberta, zastósował Majchrowicz, Praga 1889“;
- h) okól. z 6 grudnia 1889 l. 21698: 1) „C. J. Caesaris Comm. de bel. gal. wydał Bednarski“, i 2) „C. J. Caesaris Comm. de bel. civ. ed. Th. Paul“;
- i) okól. z 6 grudnia 1889 l. 21197: „Życie publiczne, prywatne starożytnych Greków i Rzymian, skreślił Terlikowski, Lwów, 1889“;
- j) okól. z 6 grudnia 1889 l. 17986: „Podręcznik metryki łacińskiej i greckiej, napisał Sas“;
- k) okól. z 6 grudnia 1889 l. 21202: „Wypisy polskie dla kl. V, wydał Próchnicki, Lwów, 1889“;
- l) okól. z 8 stycznia 1890 l. 22871: „Herodoti de bello Persico librorum epitome, Wilhelm-Lauczicki, Wiedeń 1888“;
- m) okól. z 1 stycznia 1890 l. 941: „Geometrya dla klas niższych szkół średnich Dra Mocnika, przełożył Dr Stanecki, wyd. III, Lwów 1889“;
- n) okól. z 13 lutego 1890 l. 2071: „L. German i K. Petelenz, Ćwiczenia niemieckie dla kl. I, wyd. II, Lwów 1890“;
- o) okól. z 25 lutego 1890 l. 2683: „Związła gramatyka języka łacińskiego dla kl. I i II, ułożył Dr Z. Samolewicz, wyd. II, Lwów, 1890“;
- p) okól. z 13 kwietnia 1890 l. 2715: 1) „Homera Iliada w skróceniu, wyd. Scheindlera, T. Sołtysik, 2 części;“ i 2) „M. Tulliusza Cicerona mowa de imper. Cn. Pompei, wyd. Kornitzera, zastósował T. Sołtysik,“;

- r) okól. z 13 kwietnia 1890 l. 5506: „Sofoklesa król Edyp, II wyd. Schuberta, zastósował Gr. Majchrowicz“;
- s) okól. z 30 kwietnia 1890 l. 7289: „Zoologia dla klas niższych szkół średnich przez Dra Nowickiego, wydanie VI. Kraków, 1890“.
17. Wys. Rada szkolna kraj. poleca do bibliotek szkolnych:
- a) okól. z 16 lipca 1889 l. 10453 dzieło: „Deutsche Sprach- und Sprechlehre, część synonim. przez T. Stahlbergera, Kraków 1887“;
- b) okól. z 6 grudnia 1889 l. 22152 mapę: „Ryby dorzecza Wisły, Styru i t. . przez Dra Nowickiego“;
- c) okól. z 26 marca 1890 l. 3041: „Pamiętnik Towarzystwa literackiego imienia A. Mickiewicza, rocznik I, II i III.



VI.

KRONIKA ZAKŁADU.

Rok szkolny rozpoczął się uroczystym nabożeństwem dnia 3 września.

Egzamina wstępne uczniów, zapisanych do kl. I, odbywały się częścią z końcem zeszłego roku szkolnego, częścią zaś z początkiem r. 1890/91 w dniach 1 i 2 września.

Zakład obchodził uroczyste imieniny Najjaśniejszych Państwa w dniach 4 października i 19 listopada; również brał udział w nabożeństwach żałobnych za dusze ś. p. Cesarzowej Maryi Anny i Cesarza Ferdynanda I.

J. E. Pan Minister W. i O. reskrytem z dnia 25 czerwca 1889 r. l. 4090 przeniósł prof. Edwarda Charkiewicza w tym samym charakterze służbowym z Tarnopola do tutejszego zakładu i zarazem przydzielił go czasowo do c. k. Ministerstwa W. i O. w Wiedniu.

J. E. Pan Minister W. i O. reskrytem z d. 25 czerwca 1889 l. 10240 przeniósł profesora Teofila Krasnosielskiego w tym samym charakterze służbowym z Wadowic do tutejszego zakładu.

Wysoka Rada szkolna krajowa przeniosła zastępców nauczycieli w tym samym charakterze służbowym a mianowicie: reskrytem z dnia 22 lipca 1889 l. 11275 Józefa Kannenberga ze Stryja i Tomasza Szafrana z Kołomyi, dalej reskrytem z dni 7 sierpnia 1889 l. 12921 Michała Lityńskiego z gimnazjum św. Anny, wreszcie reskr. z dnia 11 września 1889 l. 15757 z III gimnazjum w Krakowie do tutejszego zakładu.

J. E. Pan Minister W. i O. reskrytem z dnia 9 lipca 1889 l. 7284 nadał egzaminowanemu zastępcy nauczyciela Wawrzyńcowi Waśkowskiemu dodatek służbowy w kwocie rocznej 200 złr.

J. E. Pan Minister W. i O. reskrytem z dnia 30 lipca 1889 l. 15150 udzielił zastępcy nauczyciela Adolfowi Gawalewiczowi urlopu na przeciąg pierwszego półrocza roku szkolnego 1889/90 z pozostawieniem płacy substytucyjnej.

J. E. Pan Minister W. i O. zamianował reskrytem z dnia 17 sierpnia 1889 tutejszych zastępców nauczycieli Jana Bryła i Pawła Bryłę rzeczywistymi nauczycielami, przydzielając pierwszego z nich do c. k. gimnazjum w Bochni, drugiego zaś do c. k. gimnazjum w Stanisławowie.

Wysoka Rada szkolna krajowa przyznała dekretem z dnia 10 września 1889 l. 15445 profesorowi Józefowi Tułasiewiczowi trzeci dodatek pięcioletni.

J. E. Pan Minister W. i O. reskrytem z dnia 19 września 1889 l. 19070 udzielił profesorowi Stanisławowi Stodolakowi z powodu choroby urlopu do końca pierwszego półrocza r. s. 1889/90.

Wysoka Rada szkolna krajowa przyznała dekretem z dnia 29 października 1889 l. 19263 profesorowi Feliksowi Baczakiewiczowi trzeci dodatek pięcioletni.

Wydział krajowy uchwałą z dnia 31 stycznia 1891 l. 1 nadał Stanisławowi Szmaciarzowi, uczniowi V klasy, stypendyum z fundacyi ks. Andrzeja Sławka, w kwocie rocznej 50 złr.

W dniu 30 stycznia 1890 zakończono pierwsze półrocze, drugie zaś rozpoczęto dnia 3 lutego.

Wysoka Rada szkolna krajowa reskrytem z dnia 24 stycznia 1890 l. 1301 przeniosła ze względów służbowych tutejszych zastępców nauczycieli: Piotra Niebieszczańskiego do szkoły realnej i Włodzimierza Służewskiego do III gimnazjum w Krakowie.

W dniach od 10 do 13 lutego hospitał zakład tutejszy c. k. Inspektor krajowy Wny Pan Dr. Zygmunt Samolewicz.

Wysoka Rada szkolna krajowa reskrytem z dnia 25 lutego 1890 l. 2433 przyznała dyrektorowi Tadeuszowi Skubie czwarty dodatek pięcioletni.

J. E. Pan Namiestnik Dr. Kazimierz hr. Badeni zwiedził zakład tutejszy w dniu 14 maja; Jego Ekscelencya przybył przed godziną 8 rano do zakładu, następnie przysłuchiwał się lekcyi języka polskiego w kl. IIIa i lekcyi języka niemieckiego w klasie

IIa+b; poczem zwiedziwszy sale, w których odbywał się podówczas pisemny egzamin dojrzałości, opuścił zakład przed godziną 10.

Pisemny egzamin dojrzałości odbył się w połowie miesiąca maja, ustny zaś pod przewodnictwem Profesora uniwersytetu Jagiellońskiego Wgo Pana Dra Wincentego Zakrzewskiego w dniach od 23 do 28 czerwca; wynik egzaminu dojrzałości podaje się pod koniec niniejszego sprawozdania.

W ciągu roku szkolnego przystępowała młodzież katolicka trzy razy do spowiedzi i komunii, w wielkim zaś tygodniu odprawiła trzydniowe rekolekcyje.

Rok szkolny zakończono dnia 30 czerwca uroczystém nabożeństwem i rozdaniem świadectw.

* * *

††. W dniu 9 stycznia r. 1890 rozstał się z tym światem Lewicki Piotr, uczeń IIb klasy, a w dniu 10 marca Pajerski Jakób z klasy VIII wskutek dłuższej choroby piersiowej; obaj odznaczyli się chlubnymi postępami w naukach i wzorowymi obyczajami; to też przedwczesny zgon obydwu tych młodzieńców, rokujących na przyszłość najpiękniejsze nadzieje, wzbudził powszechny żal w zakładzie.



VII.

Statystyka uczniów.

Tytuły	I		II		III		IV		V	VI	VII	VII	Razem
	a	b	a	b	a	b	a	b					
I. Liczba uczniów:													
Z końcem r. szk. 1889	40	42	37	32	31	34	48	—	31	56	30	36	417
Z początkiem r. szk. 1890	53	55	39	42	34	33	33	33	36	32	51	33	474
Przyjęto w ciągu r. s. 1890	1	1	2	4	1	1	2	—	1	1	1	1	16
Ogółem przyj. w r. s. 1889	54	56	41	46	35	34	35	33	37	33	52	34	490
a mianowicie:													
Z obcych zakładów:													
a) z promocyą	51	51	10	7	2	3	7	2	2	4	1	5	145
b) repetytyw	1	—	—	2	1	1	3	2	1	2	—	—	13
Z tułeszego zakładu:													
a) z promocyą	—	—	30	32	30	27	24	27	33	26	51	27	307
b) repetytyw	2	5	1	5	2	3	1	2	1	1	—	2	25
W ciągu r. sz. wystąpiło:	11	8	4	6	4	3	2	1	4	3	6	3	55
L. ucz. z końcem r. s. 1890	43	48	37	40	31	31	33	32	33	30	46	31	435
a mianowicie:													
a) publicznych	42	46	36	39	31	30	31	32	31	30	45	29	422
b) prywatnych	1	2	1	1	—	1	2	—	2	—	1	2	13
2. Według miejsca urodzenia:													
Z W. Ks. Krakowskiego	23 ¹	25 ¹	14 ¹	12	14	14	11 ¹	12	17 ¹	13	24	14	193 ⁵
Z Galicji	15	19	20	26	12	13	18	17	12	14	19 ¹	13 ²	198 ⁵
Z innych krajów kor.	1	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	5 ¹
Z poza Anstryi	3	2 ¹	2	1	3	3 ¹	2 ¹	2	2 ¹	2	2	2	26 ⁴
Razem	42 ²	46 ²	36 ¹	39 ¹	31	30 ¹	31 ²	32	31 ²	30	45 ¹	29 ²	422 ¹⁸
3. Według narodowości było:													
Polaków	42 ¹	46 ²	36	37	31	29 ¹	31 ²	32	31 ²	28	45 ¹	28 ²	416 ¹¹
Rusinów	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	3 ¹
Niemców	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2 ¹
Czechów	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Razem	42 ¹	46 ²	36 ¹	39 ¹	31	30 ¹	31 ²	32	31 ²	30	45 ¹	29 ²	422 ¹⁸
4. Według wyznania:													
rzymsko-katolickiego	29 ¹	32 ²	29	25 ¹	24	23 ¹	24 ²	24	20 ²	15	36 ¹	18 ²	299 ¹²
grecko-katolickiego	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	5 ¹
ewangelickiego	12	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	3
mojżeszowego	12	14	7	13	7	5	7	8	11	13	8	10	115
Razem	42 ¹	46 ²	36 ¹	39 ¹	31	30 ¹	31 ²	32	31 ²	30	45 ¹	29 ²	422 ¹⁸
5. Wiek uczniów:													
11 lat liczyło	10	13 ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23 ²
12 " "	13 ¹	14	14 ¹	7	—	—	—	—	—	—	—	—	48 ²
13 " "	8	10	10	10 ¹	6	6	—	1	—	—	—	—	51 ¹
14 " "	4	5	9	10	12	9	6	9	1	—	—	—	65
15 " "	5	4	2	6	8	5 ¹	10 ¹	8	14 ²	1	—	—	63 ⁴
16 " "	1	—	1	6	3	8	13	7	5	9	1	—	54
17 " "	1	—	—	—	1	1	9 ²	2	6	8	14	3	38 ¹
18 " "	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	13 ¹	14 ¹	39 ²
19 " "	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5	5	8	20
20 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	1 ¹	8 ¹
21 " "	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	6	1	10
22 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
23 " "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Razem	42 ¹	46 ²	36 ¹	39 ¹	31	30 ¹	32 ²	32	31 ²	30	45 ¹	29 ²	422 ¹⁸

Tytuły	I		II		III		IV		V	VI	VII	VIII	Razem
	a	b	a	b	a	b	a	b					
6. Klasyfikacja uczniów za 2 półr.													
Stoień celujący	4	2	1	2	3	2	1	5	1	1	5	3	30
I.	23 ¹	22 ¹	29 ¹	26 ¹	22	17 ¹	19 ²	12	26 ¹	23	26	26 ¹	27 ¹⁰
II.	3	5	1	2	2	4	4	3	—	1	4	—	29
III.	7	9 ¹	—	2	2	9	3	8	—	1	—	—	35 ²
Do egz. popr. przypuszcz.	5	8	5	7	2	5	4	4	4 ¹	4	9 ¹	—	57 ²
Razem	42 ¹	46 ²	36 ¹	39 ¹	31	30 ¹	31 ²	32	31 ²	30	45 ¹	29 ²	422 ¹⁰
7. Opłaty szkolne:													
Opłatę szkolną płacono:													
w I półroczu	48	53	12 ¹	17 ¹	11	10 ¹	15 ¹	16	13 ¹	13	18	14 ¹	240 ⁶
w II półroczu	19 ¹	26 ²	11 ¹	14 ¹	14	13 ¹	14 ²	12	12 ²	12	21 ¹	13 ²	181 ²⁰
Od połowy uwolniono:													
w I półroczu	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
w II półroczu	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5
Od całej opl. uwolniono:													
w I półroczu	—	—	25	27	23	22	16	17	21	17	31	18	217
w II półroczu	20	20	25	25	17	17	16	19	19	18	24	16	236
Opłata szkolna wynosiła:													
w I półroczu zlr.	960	1060	260	360	220	220	330	320	280	260	360	300	4930
w II półroczu zlr.	430	560 ¹	240	300	280	280	330	350	280	240	440	300	3930
Razem	1390	1620	500	660	500	500	660	570	560	500	800	600	8860
Taksy wstępne wynosiły	109-20	107-10	21	21	6-30	10-50	23-10	8-40	6-30	12-60	2-10	10-50	338-10
Datki na środki naukowe	54	56	41	46	35	34	35	33	37	33	52	34	490
Taksy za dupl. świadectw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
													848-10
8. Frekwencya na naukę przed-													
miotów nadobowiązkowych:													
Historia kraju rodzin.	—	—	—	—	31	30	31	32	—	30	45	—	199
Kaligrafia	30	33	16	22	—	—	—	—	—	—	—	—	101
Gimnastyka	15	28	29	13	19	12	10	14	8	10	17	—	175
Śpiew	9	14	13	11	7	7	3	4	8	4	7	—	87
Stenografia	—	—	—	—	—	—	—	—	9	11	13	—	33
9. Stypendya:													
Stypendyum pobierało .	1	—	1	—	—	—	3	—	1	—	5	—	11
Łączna kwota pob. styp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1577-50

VIII.

Pomoc koleżeńska.

W roku szkolnym 1890 wpłynęło z dobrowolnych datków rodziców i opiekunów uczniów 68 zlr. 40 ct. w. a.

Kwotę powyższą wydano w całości na wsparcie najuboższych uczniów a w szczególności na zakupno odzieży, obuwia i na zapomogi w gotówce

Osobom, które przy wpisach uczniów lub też w ciągu roku szkolnego przyczyniły się datkami do zasilenia szczupłego funduszu pomocy koleżeńskiej, składa dyrekcyja niniejszem uprzejme podziękowanie.

IX.

KLASYFIKACYA UCZNIÓW

za drugie półrocze r. szk. 1890.

Klasa I a.

- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Kozik Michał | 10. Gorgoń Franciszek | 19. Rudolfi Adam |
| 2. Zwoliński Maryan | 11. Gutmann Maksym. | 20. Schneider Hirsch |
| 3. Kaufmann Hugo | 12. Korczyński Antoni | 21. Stein Stanisław |
| 4. Ostrowski Kazimierz | 13. Kowalski Józef | 22. Sliwa Dominik |
| 5. Dallet Józef | 14. Kus Józef | 23. Sodinger Henryk |
| 6. Fischlowitz Józef | 15. Niwicki Zygmunt | 24. Taborski Franciszek |
| 7. Flessler Józef | 16. Pajor Zygmunt | 25. Ustyanowicz Adam |
| 8. Gawliński Jerzy | 17. Romański Wiktor | 26. Winnicki Włodzim. |
| 9. Gargul Karol | 18. Rosenstrauch Zygm. | 27. Zaleski Mieczysław |

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 5, stopień II otrzymało 3, stopień III 7 uczniów.

Klasa I b.

- | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Rajski Władysław | 9. Hajdo Teofil | 17. Mrozek Józef |
| 2. Teichlauf Wilhelm | 10. Hermann Leon | 18. Płonka Ludwik |
| 3. Bieliński Leon | 11. Knoblauch Stan. | 19. Prokesz Joachim |
| 4. Bilski Klemens | 12. Kosowski Stefan | 20. Reyman Konrad |
| 5. Cieślak Antoni | 13. Kurlito Józef | 21. Szafranski Felix |
| 6. Ebersohn Elias | 14. Lauer Samuel | 22. Szumiński Apolon. |
| 7. Fendler Izak | 15. Legutko Wiktor | 23. Świętnicki Jan |
| 8. Filipkiewicz Wład. | 16. Mirtenbaum Leon | 24. Wyporek Szczepan |

25. Wodzicki Feliks (prywatysta).

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 8, stopień II otrzymało 5, stopień III 9 uczniów.

Klasa II a.

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Reiner Ryszard | 11. Fruchthändler Chaim | 21. Nowak Władysław |
| 2. Bednarski Bolesław | 12. Gawalewicz Adolf | 22. Piasecki Kazimierz |
| 3. Borowczyk Władysł. | 13. Gismann Edward | 23. Salawa Wojciech |
| 4. Budziński Franc. | 14. Gulkowski Stanisław | 24. Seweryn Józef |
| 5. Bugajski Józef | 15. Kaczmarczyk Józef | 25. Siedlecki Leon |
| 6. Chrzan Bogusław | 16. Kannenberg Tadeusz | 26. Skuba Stanisław |
| 7. Cybulski Teodor | 17. Korzeniowski Alfred | 27. Supiński Stanisław |
| 8. Einäugler Juliusz | 18. Lehrfreund Michał | 28. Szmaczarz Franciszek |
| 9. Emilewicz Tadeusz | 19. Liebermann Emil | 29. Wierzejski Stan. |
| 10. Feuereisen Teodor | 20. Maciaga Władysław | 30. Wyroba Jan. |

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 5. Stopień II otrzymał 1.

Klasa II b.

- | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Kręciosz Jan | 10. Gut Franciszek | 19. Nawara Jóef |
| 2. Soldinger Emanuel | 11. Gutwiński Fr. Józef | 20. Palkaj Leop. Edm. |
| 3. Budzynowski Leon | 12. Habermfeld Gustaw | 21. Perlberger Hirsch |
| 4. Cyfer Samuel | 13. Hirschhorn Jakób | 22. Sławiński Winc. J. |
| 5. Duszyński M. Z. | 14. Kasprzyk Benedykt | 23. Stec Franciszek |
| 6. Friedmann Maurycy | 15. Kiszka Stan. Wal. | 24. Süsskind Dawid |
| 7. Goldgart Maurycy | 16. Korngold Józef | 23. Sysło Ludwik |
| 8. Gołąb Stan. Al. | 17. Kuliński Józef | 26. Szańkowski S. F. P.] |
| 9. Grygłoski Karol | 18. Miedniak Kaz. M. | 27. Westfried Józef |
| | 28. Woźniczka Ignacy. | |

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 7; Stopień II otrzymało 2, stopień III 2 uczniów.

Klasa III a.

- | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Leonhard Stanisław | 9. Buczyński Józef | 17. Nadel Mendel |
| 2. Mika Wincenty | 10. Chmurski Antoni | 18. Reiner Pinkus |
| 3. Nowak Feliks | 11. Gmitrzak Zygmunt | 19. Rychłowski Kazim. |
| 4. Abeles Joel | 12. Grodzicki Józef | 20. Świerczewski E. |
| 5. Artz Władysław | 13. Gutmann Józef | 21. Tułasiewicz Stan. |
| 6. Batko Józef | 14. Hanusz Stanisław | 22. Wasserberger Leon |
| 7. Bonkowski Edward | 15. Kizel Stefan | 23. Zasacki Kazimierz |
| 8. Buchała Franciszek | 16. Kremler Hirsch | 24. Zegegestowski Kazim. |

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 2, stopień II otrzymało 2, stopień III 2 uczniów.

Klasa III b.

- | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Kucik Paweł | 7. Kuliński Kazimierz | 13. Pelz Maurycy |
| 2. Teufel Salomon | 8. Lané Bogusław | 14. Płachecki Zdzisław |
| 3. Bodzioch Piotr | 9. Leinkram Michał | 15. Romański Adam |
| 4. Buzala Kazimierz ✓ | 10. Macheles Zygmunt | 16. Staszewski Miecz. |
| 5. Duchowicz Bronisław | 11. Olszewski Włodz. | 17. Szybowski Józef |
| 6. Firliciański Adam | 12. Orłowski Jan | 18. Takuński Jakób |
| | 19. Wawreczka Józef. | |

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 5, drugi stopień otrzymało 4, III 2 uczniów.

Klasa IV a.

- | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Bobrowski Emil | 8. Nowotny Jan | 14. Sibauer Mieczysł. |
| 2. Błachociński Antoni | 9. Nowotny Julian | 15. Szwarz Jan Kanty |
| 3. Brason Ludwik | 10. Nycz Michał | 16. Taniewski Alfred |
| 4. Haduch Ludwik | 11. Reiner Zygfryd | 17. Wadowski Stefan |
| 5. Janczy Wojciech | 12. Reinsperger Józef | 19. Weinheber Abraham |
| 6. Korczyński Edward | 13. Schauer Jakób | 19. Wierzbiński Tadeusz |
| 7. Matula Jan | | 20. Wolff Eugeniusz. |

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 4, stopień II otrzymało 4, stopień III otrzymało 3 uczniów.

Klasa IV b.

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Hanusiak Władysław | 7. Dembowski Leon | 12. Kahane Max |
| 2. Jachimczak Franc | 8. Duda Franciszek | 13. Klebert Adam |
| 3. Kopijas Józef | 9. Gawęda Stanisław | 14. Owiński Józef |
| 4. Sandacz Józef | 10. Gryglewski Miecz. | 15. Pelz Scholem |
| 5. Wnęk Józef | 11. Jelonek Bruno | 16. Świącicki Jan |
| 6. Bobowski Władysław | | 17. Willer Maksymilan |

Do poprawczego egzaminu przeznaczono 4, stopień II otrzymało 3, stopień III 8 uczniów.

Klasa V.

- | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Szmaciarz Stanisław | 10. Josse Alfred | 19. Mazurski Józef |
| 2. Berger Aron | 11. Junger Marek | 20. Pagowski Edmund |
| 3. Emilewicz Franciszek | 12. Jüttner Marvan | 21. Porębski Józef |
| 4. Fragner Izajasz | 13. Kościński Wład. | 22. Silberstein Józef |
| 5. Gawor Błażej | 14. Król Ignacy | 23. Szurek Jan |
| 6. Goldwasser Łazarz | 15. Landau Saul | 24. Szymczykiewicz St. |
| 7. Herz Teodor | 16. Laskowski Wład. | 25. Urbanik Franciszek |
| 8. Janiga Stanisław | 17. Łobaczewski Wacław | 26. Wachtel Michał |
| 9. Janik Wojciech | 18. Mandelbaum Gabr. | 27. Weinsberg Jakób |

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 4 uczniów.

Klasa VI.

- | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Jossé Ferd. Józef | 9. Huppenthal Karol | 17. Prysak Bolesław |
| 2. Auerbach Majer | 10. Kannenberg Stan. | 18. Przeworski Józef |
| 3. Baczakiewicz Jan K. | 11. Kohn Jakób | 19. Scharf Mojżesz |
| 4. Beckmann Leon | 12. Liebermann Samuel | 20. Schudmak Ansel |
| 5. Bocheński Kazimierz | 13. Merz Alfred | 21. Sokołowski Witold |
| 6. Friedmann Ludwik | 14. Mirek Franciszek | 22. Spring Jakób |
| 7. Göllner Rudolf | 15. Paczowski Jan | 23. Süsser Bendec |
| 8. Herschthal Salem | 16. Popiel Bronisław | 24. Weisło Tomasz. |

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 4 uczniów, stopień II otrzymał 1, stopień III 1 uczeń

Klasa VII.

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. Iskrzycki Tadeusz | 11. Flach Józef | 21. Merz Ludwik |
| 2. Kieszkowski Jerzy | 12. Garycki Jan | 22. Munk Tadeusz |
| 3. Macko Andrzej | 13. Grünhut Berel | 23. Nowotny Franc. |
| 4. Matakiewicz Antoni | 14. Herz Wolf | 24. Pacyna Józef |
| 5. Tatarczuch Tadeusz | 15. Kukalski Adam | 25. Poniński Adolf |
| 6. Bartmański Władysł. | 16. Landau Schachna | 26. Siedlecki Michał |
| 7. Berezowski Tadeusz | 17. Latinik Jan | 27. Skórkowski Wacław |
| 8. Dallet Józef | 18. Latkowski Józef | 28. Srokowski Stanisław |
| 9. Dobrowolski Stanisł. | 19. Markiewicz Bronisł. | 29. Wedrychowski St. |
| 10. Dudek Franciszek | 20. Meisels Adolf | 30. Wibiral Edward |
| | 31. Wierzbicki Stanisław | |

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 9, stopień II otrzymało 4, stopień III otrzymał 1 uczeń.

Klasa VIII.

Stopień celujący otrzymało	3
Stopień I otrzymało	26
Razem	29

Wynik egzaminu dojrzałości.

Do egzaminu dojrzałości zgłosiło się:

a) uczniów publicznych	29
b) externistów	6
c) prywatysta	1
Razem	36

Od ustnego egzaminu odstąpiło 3 uczniów.

Egzamin dojrzałości z odznaczeniem złożyli:

1. Chajes Henryk z Krakowa, ur. w r. 1872
2. Kaczmarczyk Józef z Nowego Targu, ur. w r. 1871
3. Marek Zygmunt z Krakowa, ur. w r. 1872
4. Piasecki Eugeniusz ze Lwowa, ur. w r. 1872.

Za dojrzałych uznani zostali:

5. Christiani Grabieński Zygmunt z Przybyszówki ur. w r. 1871
6. Dłużynski Witold z Krakowa, ur. w r. 1872
7. Elters Wolf recte Wilhelm z Krakowa, ur. w r. 1871
8. Geldwerth Leon z Krakowa, ur. w r. 1872
9. Goldwasser Edward z Krakowa, ur. w r. 1872
10. Jaugustyn Stanisław z Krakowa, ur. w r. 1871
11. Jelonek Modest z Ludwinowa, ur. w r. 1872
12. Kawalerski Stefan z Podgórze, ur. w r. 1871
13. Kazrlik Mieczysław z Wielicza, ur. w r. 1871
14. Kluk Kluczycki Franciszek ze Żmigrodu now., ur. w r. 1873
15. Kościński Stanisław z Krakowa, ur. w r. 1872
16. Kubalski Edward z Trzcienica, ur. w r. 1872
17. Landau Izak z Krakowa, ur. w r. 1872
18. Landau Pinkus z Krakowa, ur. w r. 1873
19. Paszkiewicz Tadeusz ze Starego Sącza, ur. w r. 1871
20. Piekarczyk Antoni z Krakowa, ur. w r. 1868
21. Sternschuss Adolf z Ditkowiec, ur. w r. 1873
22. Wyrobek Antoni z Jawiszowic, ur. w r. 1868
23. Zubrzycki Stanisław z Chrzanowa, ur. w r. 1872
24. Zuławski Leon z Limanowy ur. w r. 1872
25. Słomiński Kasper z Wielichowca, ur. w r. 1869
26. Rodzoń Józef z Dobromila, ur. w r. 1868
27. Zakaszewski Witold z Leśniówki, ur. w r. 1868

Do egzaminu popr. przeznaczono 4, reprobowano na rok 1, bez terminu 1.

PRZEPISY SZKOLNE

dla

UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH KRAKOWSKICH.

§. 1.

Uczeń powinien się w szkole i poza szkołą zachowywać przyzwoicie i przykładowie, oddawać się nauce szczerze i gorliwie, ściśle wykonywać rozkazy dyrektora i nauczycieli i okazywać im zawsze i wszędzie uszanowanie.

§. 2.

Każdy uczeń obowiązany jest uczęszczać do szkoły regularnie i w czasie oznaczonym; nie wolno mu opuścić ani jednej godziny nauki obowiązkowej ani nadobowiązkowej bez słusznej przyczyny; z tą samą ścisłością ma uczestniczyć w ćwiczeniach religijnych.

Uczniowie religii niekatolickiej mają pilnie brać udział w religijnych ćwiczeniach wyznania swego i udowodnić to świadectwem swych kaznodziei albo nauczycieli.

Raz rozpoczętej nauki przedmiotów nadobowiązkowych nie wolno uczniowi porzucać bez wyraźnego życzenia opieki domowej. Jeżeli klasyfikacja w tem półroczu wykaże, iż uczeń źle postępuje w przedmiotach nadobowiązkowych, można mu zakazać uczęszczania na przedmioty nadobowiązkowe. Na naukę kaligrafii, w zakładach, gdzie ona nie jest przedmiotem obowiązkowym, mają uczęszczać uczniowie niższych klas, jeżeli nie uzyskają uwolnienia.

§ 3.

Jeżeli uczeń dla przeszkody przewidzianej nie może przyjść do szkoły, powinien, z wiedzą nadzoru domowego, prosić gospodarza klasy o uwolnienie od godzin szkolnych, a gdyby nieobecność

jego dłużej niż dzień jeden trwać miała, starać się nadto o pozwo-
lenie dyrektora. Od udziału w nabożeństwie na czas dłuższy uwalnia
tylko w wyjątkowych wypadkach ksiądz katecheta w porozumieniu
z dyrektorem.

Wrazie przeszkody nieprzewidzianej ma uczeń jak najrychlej
dać znać o niej gospodarzowi klasy a po powrocie do szkoły uspra-
wiedliwić swą nieobecność wiarygodnem świadectwem.

Nieusprawiedliwione opuszczanie godzin szkolnych i spażnianie
się do szkoły pociąga za sobą karę, względnie złą notę z obyczajów.
Jeżeli uczeń przez ośm dni po sobie następujących nie przychodzi
do szkoły i o przyczynie nieobecności nie zawiadamia zakładu, wy-
kreśla się go z listy uczniów.

§. 4.

Zakład otwiera się na kwadrans przed rozpoczęciem nauki lub
nabożeństwa wspólnego; wcześniej zgromadzać się przed zakładem
nie wolno. W zabudowaniu szkolném mają się uczniowie zachowywać
spokojnie i przyzwoicie; w klasie, gdy nauczyciel, dyrektor lub inna
osoba wyższa stanowiskiem i godnością wchodzi lub wychodzi, po-
winni uczniowie powstać z miejsc swoich.

Po lekcjach mają rozechodzić się natychmiast do domu i nie
stawać po drodze.

Chodzenie po mieście bez celu, zwłaszcza wieczorem, jest
zakazane.

§ 5.

Każdy uczeń winien przynosić do szkoły wszystkie książki
i przybory potrzebne do nauki. Nie wolno przynosić innych rzeczy
lub książek, a nawet książek szkolnych i przyborów, niemających
związku z wyznaczonymi na ten dzień lekcjami.

§. 6.

Uczniowie powinni jak najstaranniej przestrzegać porządku
i czystości w rzeczach swoich i szkolnych.

Uszkadzanie lub plamienie tak domu szkolnego, jak i przed-
miotów znajdujących się w nim, jest wzbronione. Uszkodzenie przy-
padkowe ma uczeń wynagrodzić, umyślne pociąga za sobą prócz tego
naganę lub karę.

§. 7.

Uczniowi nie wolno zmieniać miejsca, wyznaczonego mu przez gospodarza klasy, chyba, gdyby który z nauczycieli przeznaczył mu na swoje lekcye inne miejsce.

§. 8.

Podczas lekcyi obowiązani są uczniowie ze skupioną uwagą brać udział w nauce i wystrzegać się wszystkiego, coby mogło jój przeszkadzać. Wychodzić podczas nauki wolno tylko wyjątkowo i to po jednemu, za zezwoleniem nauczyciela.

Wywoływanie uczniów z klasy podczas nauki przez innych uczniów jest zakazane.

W czasie paury nie wolno uczniom wydalać się z zakładu.

§. 9.

Te przepisy odnoszą się także w zupełności do przedmiotów nadobowiązkowych.

§. 10.

Książki wypożyczone z biblioteki szkolnej zwracać należy w przepisany czas i nieuszkodzone. Uczeń, który opuszcza zakład w ciągu roku, powinien natychmiast zwrócić wypożyczone książki.

§. 11.

Wszelkie składki pieniężne bez osobnego pozwolenia dyrektora są wzbronione.

§. 12.

Czas wolny od obowiązków mają uczniowie przepędzać bądź na jakimkolwiek pożytecznym zajęciu, bądź na stósownych rozrywkach.

Zabrania się w każdym miejscu gier, połączonych ze stratą czasu i pieniędzy. Nie wolno uczęszczać do restauracyi, kawiarni, cukierni, piwiarni, kregielni i tym podobnych innych lokali publicznych.

Do teatru lub na inne widowiska przyzwolite uczęszczać mogą uczniowie klas niższych tylko w towarzystwie rodziców lub osób

starszych. Uczniom klas wyższych wstęp na nie nie jest wzbroniony, wszakże dyrektor może wzbronąć uczęszczania na pewne przedstawienia.

Wzbronione jest uczęszczanie na publiczne bale i na publiczne zabawy z tańcami, tudzież na zabawy i zebrania urządzone w szkołach tańców poza godzinami lekcji tańców, natomiast wolno uczniom uczęszczać na zabawy urządzone w domach prywatnych w towarzystwie rodziców lub osób starszych, o ile dyrektor nie uzna za potrzebne uczynić w tej mierze pewnych zastrzeżeń.

§. 13.

Rozprawom sądowym przysłuchiwać się nie wolno.

§. 14.

Uczniowie powinni wystrzegać się złego i nieestosownego towarzystwa, a w wyborze książek do czytania radzić się nauczycieli, aby nie marnować drogiego czasu na czytanie książek złych i szkodliwych. Wypożyczanie książek z czytelnicy publicznych jest wzbronione.

§. 15.

Nie wolno palić tytoniu i cygar.
Noszenie lasek i jakichkolwiek odznak jest wzbronione.

§. 16.

Między sobą powinni uczniowie żyć zgodnie i po koleżeńsku. Każdy powinien odwozić kolegów od złego, a zachęcać do szlachetnego postępowania. Wzajemne obelgi, wyszydzanie ułomności fizycznych, obraza religii lub narodowości współuczniów najsurowiej są zakazane.

§. 17.

Żadnemu uczniowi nie wolno mieszkać bez odpowiedniego nadzoru; brak odpowiedniej opieki pociąga za sobą wydalenie ucznia z zakładu. O każdej zmianie odpowiedzialnego nadzoru i o zmianie mieszkania powinien uczeń bezzwłocznie zawiadomić gospodarza klasy.

fi. 18.

Uczniom nie wolno pomiędzy sobą zakładać stowarzyszeń, ani należeć do jakiegokolwiek stowarzyszenia.

§. 19.

Nie wolno żadnemu uczniowi ogłaszać drukiem własnych prac literackich bez zezwolenia dyrektora.

§. 20.

Za przekroczenie przepisów powyższych wymierzać się będzie karę, która, stósownie do przewinienia, stopniować się może: od upomnienia aż do wydalenia ucznia z zakładu, a nawet do wykluczenia ze wszystkich szkół Monarchii.

PRZEPISY

w sprawie zapobieżenia szerzeniu się chorób zaraźliwych w szkołach.

§. 1.

Żadnemu uczniowi, dotkniętemu chorobą zaraźliwą, nie wolno uczęszczać do szkoły tak długo, dopóki nie wykaże świadectwem lekarskiem, że powrót jego do szkoły nie zaszkodzi innym uczniom.

Do chorób zaraźliwych należą przedewszystkiem:

1. Ospa, 2. dyfterya (błonica), 3. tyfus plamisty i powrotny, 4. tyfus jelitowy (brzuszny), 5. czerwonka (dysenterya), 6. szkarlatyna (płonica), 7. odra i różyczka, 8. róża i choroby przyranne, 9. wąglik, 10. zapalenie oczu, 11. koklusz, 12. świerzp, 13. zapalenie gruczołów przyusznych (parotitis).

§. 2.

Jeżeliby świadectwo lekarskie nie mogło być przedłożone, wolno uczniom, którzy byli dotknięci chorobą zaraźliwą przyjść do szkoły dopiero po zupełnym wyzdrowieniu, a mianowicie przy ospie, szkarlatynie i dyfteryi po upływie sześciu, a przy odrze po upływie czterech tygodni, licząc od dnia zachorowania.

§. 3.

Uczniom, którzy są wprawdzie zdrowi, jednakże zostają w bezpośredniej styczności z osobą dotkniętą chorobą zaraźliwą, nie wolno wchodzić do szkoły tak długo, dopóki niebezpieczeństwo zakażenia nie będzie usunięte, co powinno być stwierdzone, o ile to tylko możliwe, świadectwem lekarskiem, lub dopóki nie upłynie przepisany w §. 2im termin, sześciu, względnie czterech tygodni, licząc od dnia zasłabnięcia owej trzeciej osoby.

§. 4.

Uczniom zabrania się najostrzej wchodzenia do pomieszczeń, gdzie panują choroby zakaźne.

Do Rodziców i Opiekunów.

Wpisy uczniów na rok szkolny 1891 odbędą się dnia 29, 30 i 31 sierpnia. Późniejsze zgłoszenie się do zapisu tylko w wyjątkowych wypadkach może być uwzględnione.

Uczniowie mają się zgłaszać do wpisu osobiście w towarzystwie rodziców lub opiekunów i przedłożyć świadectwo z ostatniego półrocza.

Uczniowie nowo do zakładu wstępujący mają przedłożyć: a) metrykę urodzenia, b) świadectwo szkolne i c) złożyć takse wpisową w kwocie 2 złr. 10 ct. w. a.

Każdy uczeń ma złożyć przy wpisie 1 złr. na pomnożenie środków naukowych.

Oplata szkolna, która ma być złożoną w pierwszych sześciu tygodniach każdego półrocza, wynosi 20 złr. w. a. na jedno półrocze.

Rodzice i opiekunowie zechcą przy wpisie oświadczyć dyrekcyi, czy sobie życzą, aby ich synowie lub pupile pobierali naukę w przedmiotach nadobowiązkowych. Kto naukę tę rozpocznie, temu nie wolno jej przerywać przed końcem roku bez zezwolenia dyrekcyi.

Egzamina wstępne do I klasy odbywają się w dwu terminach, t. j. pierwszy termin przypada 30 czerwca i 1 lipca, drugi termin 1 i 2 września.

Na egzamina wstępne do klas wyższych, tudzież na egzamina poprawcze, przeznaczają się dzień 1 2 i 3 września.

Nabożeństwo wstępne odbędzie się dnia 3 września, a dnia 4 września rozpocznie się regularna nauka szkolna.

W Krakowie dnia 30 Czerwca 1890.



Tadeusz Skuba
dyrektor.

TREŚĆ.

1. Galicyjskie pająki z rodziny Salticoidae, podał Władysław Kulczyński.
 2. Część urzędowa, przez c. k. Dyrektora.
-

CITY OF
MAGELL
GRACIOLENSIS

17

17