

Skorowidz Rzeczowy Tomu XVII-go.

A. Prace Oryginalne.

Str.

| | |
|---|-----|
| A. Krakowski. O wybitnej roli terapii kąpielowej w leczeniu klinicznym niektórych chorób układu nerwowego | 3 |
| Br. Karbowski. Zarys działalności naukowej i lekarskiej Dra L. Lublinera | 22 |
| B. Karbowski. W sprawie leczenia wewnątrzsiodełkowych guzów mózgu napromienianiami radowymi — na zasadzie 10-letniego doświadczenia | 71 |
| H. Gabay. Histamina i jej zastosowanie w dermatologii | 84 |
| J. Dworecki i J. Goldfarb. Przyczynek do zakażeń ogólnych pałeczką odmienia (proteus vulgaris) | 94 |
| A. Brewda. Przypadek wycinowania macicy | 104 |
| H. Jozowa. Leczenie płasawicy wodą destylowaną | 136 |
| N. Mesz. O przesuwalności żołądka w jamie brzusznej | 118 |
| B. Jochweds i A. Wajngot. Badania kliniczne szybkości krwibiegę metodą sacharynową Liana i Facqueta | 126 |
| Z. Finkelstein. O sztywności karku w zespole Menièr'a | 148 |
| A. Zamenhof. O leczeniu operacyjnym niedrożności kanału nosowo-łzowego | 156 |
| A. Kobryner i Z. U. Glajgewicht. Badania doświadczalne nad przebiegiem opadania krwinek u człowieka | 163 |
| J. Szper i L. Fligel. Ropień podprzeponowy po stronie lewej | 171 |
| H. Roter. Przyczynek do samowyleczenia ciężkiej postaci gruźlicy otrzewnej | 183 |
| D. Widowiński. Przypadek t. zw. pseudodemencji Wernicke'go | 177 |
| L. Lipszowicz. Ischias — jako zagadnienie dokrewno-roślinne (doniesienie tymczasowe) | 190 |
| J. Dobroczyński i P. Cienki. O wartości nowego odczynu ciążyowego Tomasza i Dory Walker | 195 |
| Dyr. Lubowska. Szkoła Pielęgniarstwa w Warszawie — Dworska 17 (po angielsku) | 202 |

B. Pokazy.

| | |
|--|----|
| Azotemia hypochloremiczna | 54 |
| Duru plamistego nietypowy przypadek | 20 |
| Enterokokowej parainfekcji przypadek w durze brzuszny | 19 |
| Erythrodermia posalwarsanowa | 34 |
| Guz przerzutowy (carcinoma) gruczołów chłonnych szyj- nych, uciskający zwój współczulny górny | 66 |
| Grypy powikłanie płucne | 46 |
| Guza pozasiadolkowego leczenie aplikatorem radowym, wprowadzonym do przedniego dołu czaszkowego | 44 |
| Guz woreczka żółciowego | 48 |
| Kamicy powikłanej ropniami wątroby po uprzednio wy- konanej cholecystydemii nawrót | 41 |
| Kamicy pęcherzyka żółciowego z zapaleniem trzustki dwu- krotne operowanie z następnym zespoleniem przewo- dowo-dwunastniczym | 36 |
| Małopłytkowości ciężkiej przypadek w durze brzuszny | 13 |
| Melanoblastoma | 36 |
| Mózgu i rdzenia rozsiane zapalenie z porażeniami ner- wów czaszkowych | 29 |
| Niedodma ostra płuca | 49 |
| Obcego ciała (igły) aseptyczna wędrówka w mięśniach dolnego gardła | 28 |
| „Płatów sercowych“ 2 przypadki | 15 |
| Posocznica usznego pochodzenia, leczona operacyjnie i prze- taczaniem krwi | 25 |
| Pławy 3 przypadki, leczone metodą Stephensa | 32 |
| Pemphigus vegetans | 33 |
| Rzęzączkowego zapalenia stawów leczenie | 12 |
| Rozsianego zapalenia układu nerwowego wielonerwowa postać | 52 |
| Raka płaskokomórkowego krtani przypadek | 64 |
| „Strumitis“ przypadek | 14 |
| Śledziony usunięcie w przebiegu ostrej atrombocytozy | 56 |
| Torsyjnego kurczu rzadka odmiana | 60 |
| Trombopenii ostrej przypadek w przebiegu szkarlatyny | 13 |
| Ucha środkowego wczesnego okresu obraz histopatologiczny | 24 |
| Wyrostka wydłutowanie a po nim plastyka metodą Ko- leschara | 23 |
| Wyrostka robaczkowego przedziurawienie obok ropniaka pęcherzyka żółciowego | 40 |
| Żołądka rozległa rezekcja | 38 |
| Zapalenia mózgu powikłanie | 45 |

W najcięższych przypadkach zatruc

środkami odurzającymi,
gazem świetlnym
tlenkiem węgla (CO) itd.

**w nieprzewidzianych wypadkach
podczas narkozy**

C O R A M I N A

„Ciba”

5 — 15 cm³ dożylnie + 5 cm³ domięśniowo

Skutek natychmiastowy, długotrwały



Pabianicka Spółka Akcyjna Przemysłu Chemicznego, Pabianice

W mobilizowaniu sił obronnych ustroju, zdalnych do walki z zarazkiem lub jego jadowitymi produktami

**Z A L E C A M Y
S Z C Z E P I O N K Ę**

SISTOFEBRIN

zawierającą z jednej strony niechorobotwórcze grzybki, z drugiej (n. b. zabite) ciała gronkowców i pneumokoków (w zawiesinie).

Szczepionka o własnościach wstrząsowych

STREPTON

Własności te związane są z obecnością zabitych drobnoustrojów jak gronkowce i paciorkowce na podłożu Flavonu (kwasu jod-oxy-chinolino-sulfonowego).

Zastosowanie: wszelkiego rodzaju ropnie, zapalenie ucha środkowego i gruczołów, wszelkie schorzenia narządów płciowych kobiecych, oraz wszelkie sprawy wywołane paciorkowcami i gronkowcami.

Odczyn nieznaczny
temperatura waha się
w granicach 1 — 2°

Sposób użycia:
1 — 2 cm domięśniowo
co 2 — 3 dni

Chemiczno-Farmaceutyczne Zakłady Przemysłowe

Fr. Karpiński, Sp. Akc.

Warszawa, ul. Wolność 79.