

SPRAWOZDANIE
DYREKCYI
C. K. GIMNAZYUM
W WADOWICACH
za rok szkolny 1888.



W Wadowicach,
NAKŁADEM FUNDUSZU NAUKOWEGO.

Drukiem Fr. Foltyna w Wadowicach.
1888.



SPRAWOZDANIE

DYREKCYI

C. K. GIMNAZYUM

W WADOWICACH

za rok szkolny

1888.



W Wadowicach,

NAKŁADEM FUNDUSZU NAUKOWEGO.

Drukiem Fr. Foltyna w Wadowicach.

1888.

103774

II 1888



Treść.

1. O roślinach owadożernych i sposobie ich żywienia się. — (Ueber die insectenfressenden Pflanzen und ihre Ernährungsweise). Przez prof. Leona Guńkiewicza.
2. Część urzędowa ułożona przez dyrektora.

Biblioteka Jagiellońska



1003122897

I.

O roślinach owadożernych

i

sposobie ich żywienia się,

przez

Leona Guńkiewicza.

Powierzchnia ziemi jest miejscem pobytu istot organicznych, które dążą do utrzymania osobnika (jednostki) i całego ich rodu przy życiu; temi są rośliny i zwierzęta, które się żywią i rozradzają, a do tego mają odpowiednie narządy. Zwierzęta wyszukują sobie lub zdobywają pokarm, w pyszczku go żują lub tylko połykają, w żołądku trawią a w końcu w krew i różne tkanki przerabiają. Nadto potrzebują one powietrza, które dostaje się im w udziale przez oddechanie płucami, tchawkami lub skrzelami; z niego zużytkowują kwasoród (tlen), celem zamieniania węgla na kwas węglowy (CO_2), by go z krwi wydzielić i ją odświeżyć.

To samo dzieje się u roślin, przyodzabiających nam swą zielonością i pięknymi kwiatami doliny, góry, zarośla i wody; to zaś skutecznia się w nieco odmienny sposób, aniżeli u zwierząt. Rośliny biorą pokarm, choć nie mają podobnego i odrębnego otworu, jak zwierzęta; do tego służą im korzenie, zakończone utworem gąbczastym, tak zwaną gąbeczką lub czapeczką (spongiola) i niemi czerpią rośliny z podłoża pokarm płynny będący roztworem mineralnych składników ziemi. Pokarm ten dostaje się do tychże korzonków i rozchodzi się w nich w skutek pewnych własności fizykalnych ciała roślinnego, mianowicie wnikanania i przenikania cieczy przez błony komórek (endo- i ezosmozy) oraz włoskowatości naczyń w tkance roślin się znajdujących. Rośliny potrzebują również powietrza, a dostają go wraz z kwasem węglowym przez liczne otworki naskórka, tak zwane szparki (stomata), które na powierzchni liści w rozmaitej ilości, bo od 222 (u *Agave americana* L., agawy meksykańskiej) do 12858 (u *Prunus Lau-*

rocerasus L., śliwy wawrzynowej) na powierzchni 1 cm. □ są rozmieszczone i łączą się z przestworami międzykomórkowymi. W te to otworki wnika i nagromadza się w nich kwas węglowy z powietrza atmosferycznego, a w skutek działania światła słonecznego bywa w gąłkach zieleni w ciągu dnia na węgiel i tlen (kwasoród) rozłożony. Węgiel łączy się z wodą przez korzenie wessaną w skrobię (materyał zapasowy) i w zieleni, a tlen wolny z liści wydzielony odświeża powietrze. Rośliny przyswajają zatem w dzień węgiel wśród zielonej plazmy (pierwoszczu), w nocy zaś pobierają tlen z powietrza, a wydechają kwas węglowy (dwutlenek węgla (CO₂) i parę wodną. W taki więc sposób żywią się rośliny zielonowe w ogólności, lecz w zjawisku tego ogólnego sposobu żywienia się roślin napotykamy wyjątek; są bowiem rośliny, które żywią się już gotowemi substancjami, mianowicie ciałem zwierzęcem, więc materyą azotową.

W ubiegłym stuleciu zauważano nieraz, że na listkach niektórych roślin maluchne muszki i inne drobne owady, jakby na jakim lepie, więzną i tak długo na uwieży pozostają, iż w końcu tracą swe życie i giną. Takie chwytnie tych drobnych istot było dla ówczesnych przyrodników z początku zagadką, wreszcie zwrócili oni na to zjawisko większą swą uwagę. Tak amerykański przyrodnik John Ellis badał od r. 1765. do r. 1768 roślinę, obecnie muchołówką, *Dionaea muscipula* L., zwaną, którą z bagnistych miejsc Karoliny (półn. Ameryki) zupełnie świeżą otrzymywał. Obserwując tę roślinę spostrzegł, że ta swe liście za dotknięciem się ich szybko zamyka i zauważył także, że siadające na nie owady przez liście te ujęte ginęły, twierdził nawet, że one przez tęgie szczeciny na każdej połowie listka po 3 będące przekłute zostają i życie tracą. Wiadomości tej udzielił Ellis r. 1768 Lineuszowi, ale ten szwedzki botanik uważał tę za wyskok wybujałej wyobraźni.

W lecie r. 1779. spostrzegł Dr. Roth z Bremy, że mała roślinka po torfowiskach rosnąca, którą obecnie rosiczką lub rośnikiem, *Drosera*, zwą, pokrywa się na swych listkach lepka, cieczą i łowi mrówki, małe muszki i inne owady drobne, w czem włoski główkowate jój listeczków pewien udział biorą. W skutek tego robił on dalsze swe spostrzeżenia nad rosiczką okrągło- i wązkolistną, *Drosera rotundifolia* L i *D. longifolia* L. Wtedy to on zauważył, że listeczki tych roślin mają po sobie rozsiane gruczolki, które ciecz wydzielają, że się blaszka liści powoli łyżeczkowato wygina, jeżeli na nią małe owadki usiądą, a włoski gruczolkowe zginając się je przykrywają i w końcu zwierzątko te giną. Zjawisko to naprowadziło go nawet na przypuszczenie, że te drobne żyjątka służą do żywienia się tych roślin.

Wiadomość co do łowienia owadów u muchołówki, *Dionaea*, którą Ellis Karolowi Lineuszowi (K. Linné, później Linnaeus) udzielił, okazała się prawdziwą, gdyż ją stwierdził Dr. Curtis 1834 r., a za powód tego ruchu liści u téjże rośliny poczytywał on wrażliwość 3 szczecin na jej listkach się znajdujących; roślinę tę nazwał Diderot: Une plante presque carnivore.

Dr. Hooker wspomniał o poczynionych swych spostrzeżeniach na takich roślinach w mowie wypowiedzianej na posiedzeniu sekcji botanicznej brytyjskiego zgromadzenia przyrodników w r. 1875. Zwracali jeszcze inni uczeni swą uwagę na te rośliny jak: Asa Gray, profesor historii naturalnej w New Cambridge; Dr. Burdon — Sanderson; Canby; Dr. Ferd. Juliusz Cohn, prof. botaniki i dyrektor fizyologicznego Instytutu na wszechnicy we Wrocławiu; Groenland; John Joseph, botanik angielski; S. Wiliam Jackson, dyrektor ogrodu botanicznego w Kew nad Tamizą; Kurz; Dr. Julius Milde, profesor botaniki na wszechnicy we Wrocławiu; Morren; Dr. Nitschke, profesor i dyrektor ogrodu botanicznego w Monasterze; Jean Ant. Sarracin; Stein, inspektor ogrodu botanicznego we Wrocławiu; August Trecul, członek Akademii umiejętności w Paryżu; Warming; amerykańka Mrs. Treat i wielu jeszcze innych przyrodników, z których kilku przytoczę; a od r. 1875 zaczęły się ukazywać liczne rozprawy w pismach naukowych lub streszczenia w beletrystycznych.

Z owych badaczy odszczególnił się najwięcej Karol Darwin jako niezmordowany i gruntowny przyrodnik oraz twórca teorii descendency, którego Du Bois Reymond w mowie na posiedzeniu berlińskiej Akademii umiejętności d. 28. stycznia 1883 r. dla uczczenia Darwina odbytém nazwał „Kopernikiem świata organicznego“. Darwin był też pierwszy, który robił szereg systematycznych doświadczeń z takimiż szczególniejszemi roślinami i obserwował dokładnie to zjawisko chwytania owadów przez te rośliny, a wyniki z tych umieszczał w swych rozprawach i ogłosił je w swém dziele: *Insectivorous plants*, by Charles Darwin. London. John Murray, Albemarte Street. 1875., które następnie przetłumaczono na inne języki. W jednej połowie tego dzieła skreśla Darwin swe spostrzeżenia i doświadczenia z rosiczką, *Drosera*, a potem z muchołówką, *Dionaea*, dalej z pęcherzycznikiem, *Aldrowanda*, tłustoszem, *Pinguicula*, pływaczem, *Utricularia* i *Genlisea*. W dziele tém podał Darwin nie tylko przegląd poznanych faktów łowienia owadów, ale wyświecił tę sprawę żywienia się tych roślin ciałami zwierzęcemi przez własne nader pouczające doświadczenia, a na wszystko podał jasne a niezbite dowody. Nadto wyjaśnił, że muchołówka, *Dionaea*, oraz wiele innych roślin łączy drobne

owady za pomocą bardzo trafnie urządzonych lub przekształconych liści i cieczy z gruczołów na nich się znajdujących wydzielanej, że w tej cieczy się rozplývają lub rozkładają miękkie części ciała owadów, a w ten sposób przysposobioną materję białkową (azotową) w swe liście wciągają i do budowy swego organizmu ją zużywają, podczas gdy niestrawne części pozostają nietknięte. Zarazem stwierdził Darwin, że te rośliny owady złowione trawią, bo chemiczne badania tej cieczy wykazały, że ona zawiera ferment do pepsyny podobny. To też te rośliny, które ciała zwierzęcego używają jako pożywienia, nazwano owadożernymi, a niektórzy uczeni i przyrodnicy nadali im ogólniejszą nazwę mięsożernych.

Od tego czasu jednem z najciekawszych twierdzeń z dziedziny fizjologii roślin było zdanie, że są rośliny, które łowią owady, by te im za pokarm służyły. Tak więc w nowszych czasach, bo w ubiegłym dziesiątku lat naszego stulecia poznano, że są istotnie rośliny, które się ciałami zwierzęcymi (azotowemi) żywią, a nowocześni fizjologowie i botanicy zajęli się rozwiązaniem tej zagadki przedtém nieodgadnionej i zbadaniem znaczenia przepychu barw kwiatów, wydzielanej słodyczy i wonnych olejków u roślin. Zauważyli bowiem, że na znacznej części roślin strojnych w barwy, a obfitujących w olejki aromatyczne lub słodycze, usiada mnóstwo przeróżnych drobnych zwierzątek. Wykazali także uczeni, że u pewnej liczby tychże roślin budowa liści w szczególniejszy sposób i odpowiednio do łowu owadów jest zastosowaną, że te to rośliny posiadają zdolność trawienia mięsnych części ciała owadów, czyli żywienia się ciałem zwierzęcém. Tu muszę dodać, że niektóre z tych roślin nawet wcale korzonków nie mają, którymiby pokarm z podłoża czerpały, a wolno po wodach pływając skazane są tylko na żywienie się drugimi organizmami, więc ciałem owadów. W taki więc sposób doszli badacze przyrody do przekonania, że myśl żywienia się roślin ciałem owadów, którą do niedawna jako dziwaczną lub śmieszna uważano, jest nietylko prawdziwą, ale że nawet zupełnie odpowiada umiejętnie zbadanym faktom.

Cała czynność tych roślin podczas łowienia drobnych zwierzątek jest następująca. Małe przelatujące owady bywają zwabiane to jaskrawą barwą tychże roślin, to silną nieraz wonią wydzielanej cieczy, a gdy te na takiej roślince usiądą zostają przez jej listki w szczególniejszy sposób przytrzymane i życia pozbawione. Potem następuje rozpuszczanie miękkich części ich ciała w równocześnie wydzielającym się płynie kwaśnym, który pod względem chemicznym i fizyologicznym podobny jest do trawiącego płynu w żołądku zwierzęcym. W taki więc sposób zostają azotowe tkanki ciała owadów w płyn zamienione, przez te same listki wessane i do budowy

organizmu zużyte, części zaś niestrawne, jak szkielet chitynowy po wyprostowaniu się blaszki liścia przez powiew wiatru strącone.

Fizyologiczne znaczenie tegoż sposobu żywienia się roślin owadożerczych polega głównie na tém, że te mogą przyjmować pożywienie nawet zwierzęce, czyli materye azot zawierające, co jest wyjątkowém zjawiskiem u roślin zawierających zielen w swych komórkach. One to żywią się gotową substancją organiczną, której części białkowane (azotowe) bywają zapomocą peptonowatego fermentu w podobny sposób rozpuszczane, jak się to dzieje w żołądku zwierzęcym, a potem przez naskórek liści i jego utwory (gruczoły) wessane. Listki zatem mają ważne u wszystkich roślin przeznaczenie, bo służą do czerpania kwasu węglowego z powietrza za dnia, kwasorodu zaś w nocy, więc do oddechania, podczas gdy u roślin owadożerczych inną mają jeszcze czynność, są bowiem zastosowane do trawienia mięsnych części ciała owadów.

Skład chemiczny tej cieczy trawiącej, jaką rośliny owadożerne z gruczołków swych liści wydzielają, badano już wielokrotnie, a wynik otrzymany jest w ogólności następujący. Trawiąca ciecz z gruczołów liści roślin owadożernih wydzielana reaguje (działa) z początku alkalicznie, później zaś, mianowicie w czasie łowienia owadów i trawienia ich ciała, a zatem wobec ciał białkowatych, jest już kwaśną, zawiera w sobie kwasy jak: kwas cytrynowy, octowy, mrówkowy i masłowy, a działa na ciała azotowe rozpuszczająco; więc ma własność rozpuszczania białka (ściętego) włóknika (fibryny) itp. części ciała zwierząt, a zatem ciecz ta podobna jest do pepsyny soku żołądkowego, wydzielanego przez gruczoły trawięcowe u zwierząt, która działa, że ciała białkowane zamieniają się na części rozpuszczalne, czyli peptony. Zdania badaczy przyrody o znaczeniu pokarmu zwierzęcego dla roślin owadożerczych są podzielone; jedni twierdzą, że żywienie się ciałami białkowatemi jest dla tychże roślin korzystném, inni zaś utrzymują, że szkodliwém lub bezwzględnie niepotrzebném. Przez liczne bowiem doświadczenia stwierdzono, iż te rośliny wcale prawidłowo się rozwijają i należycie rosną, choć pożywienia mięsnego nie miały. Nowsze jednak badania wykazały, że rosiczka, roślina owadożercza, ma przy zwierzęcém pożywieniu kwiaty większe i obficieź wydaje nasiona, niż jój okazy, które żadnego pokarmu zwierzęcego nie otrzymały.

Wprawdzie za obfite pożywienie zwierzęce działa u tych roślin wrzeczko szkodliwie, bo liście rosiczki lub muchołówki zwykle obumierają, jeżeli za duży owad złowiły, jego ciało rozpuściły i materją organiczną się przesyciły, lub jeżeli 2—4 krotne łowienie małych owadów bez przerwy

prawie następowało; to jednak zjawisko wskazuje, iż i u roślin pewne ograniczenie w przyjmowaniu pokarmu zwierzęcego, a nie przesycaenie się nim, jest potrzebne, by mogło być dla nich korzystnym. Celem zbadania, czy ten sposób żywienia się tychże roślin wpływa na ich organizm korzystnie lub nie, robił E. Regel doświadczenia. Pielęgnował on w tym celu w 8-iu wazonach rosiczkę okrągło- i wąskolistną, *Drosera rotundifolia* L. i *D. longifolia* L. pod kloszem szklanym. Na listki jednej połowy okazów z każdego gatunku kładł co ośm dni kawałeczki mięsa wielkości główki od szpilki, drugą zaś połowę tych roślin nie karmił mięsem. Spostrzegł wprawdzie, że rośliny niekarmione mięsem silniejszym się odznaczały wzrostem, karmione zaś dostawały po listkach czarne plamy, ich liście wędły, lecz te ostatnie rośliny miały kwiaty w większej ilości a nasiona większych rozmiarów. Liczba nasion u roślin niekarmionych mięsem była wprawdzie trzy razy większą, a nawet waga wszystkich nasion w ogóle była większą, ależ za to nasiona roślin karmionych mięsem miały większy ciężar gatunkowy, niż u roślin niekarmionych, a u *Drosera rotundifolia* był on nawet dwa razy większy*).

Darwin hodował 200 rosiczek okrągłolistnych na talerzu mchem napełnionym a przedzielił je w środku przegrodą. Rośliny jednej połowy talerza karmił co pare dni mięsem, a to trwało od czerwca do września. Wpływ karmienia mięsem był taki, że listki tych roślin wkrótce się zielonością okazały pokryły, pięknie wyrosły, a głąbiki uwieńczone kwiatami były wyższe i liczniejsze, niż zwykle; wynik tego doświadczenia jest zestawiony w następującej tabelce, w której liczba 100 odnosi się do roślin mięsem niekarmionych.

Waga roślin prócz głąbików z kwiatami	100: 121·5
Ilość głąbików z kwiatami	100: 104·9
Wysokość „ „	100: 159·9
Waga „ „	100: 231·9
Ilość torebek nasiennych	100: 194·4
Ilość nasion w jednej torebce	100: 122·7
Ilość nasion z wszystkich torebek	100: 241·5
Waga „ „ „	100: 379·7
Średnia waga nasion	100: 157·3

*) Botanische Zeitschrift 1879. N. 40.

Z tego zestawienia wynika, że karmienie mięsem korzystnie wpłynęło na łądygę kwiatową (głębik) i nasiona, czyli, że u roślin owadożer-nych pokarm zwierzęcy wpływa korzystnie na rozwój kwiatów i nasion.

M. Reess i Ch. Kellermann robili także podobne doświadczenia ze 120-ma rosiczkami, które karmili mszycami a przystęp innych owadów był przez nakrycie kloszem uniemożliwiony. Wówczas zauważyli ci badacze, że część roślin zupełnie się pięknie rozwinęła i obficie wydała nasiona, ale wejrzenie i wzrost rosiczek był okazalszym. Dokładne dalsze poszukiwania wykazały, iż karmione rosiczki przewyższały inne pod względem liczby ukwitnień i kwiatuszków, dojrzałych torebek, wagi nasion i wagi suchych pąków zimowych, jak to wykazuje następująca tabelka, w której liczba 100 odnosi się do roślin niekarmionych mszycami.

	Według Darwina	Według Reessa i Kellermannna
Liczba ukwitnień i kwiatów	165 : 100 . . .	152 : 100
Liczba torebek	194 : 100 . . .	174 : 100
Waga „	380 : 100 . . .	205 : 100

W tém zestawieniu i porównaniu wyników z doświadczeń Darwina i Reessa widzimy pewną różnicę co do liczb, lecz ta da się tém wytłomaczyć, że Darwin karmił swe rosiczki co 2 dni kawałeczkami mięsa, a zaś Reess i Kellermann mszycami; wykazuje jednak, że karmienie rosiczki ciałem zwierzęcém (materyą organiczną azotową) jest dla kwiatów i torebek korzystném, a ztąd możemy wniosek wyprowadzić, że to dotyczy reszty roślin owadożerzych i że jest dla nich nie bez korzyści

Owadożerne rośliny znajdujemy w kilku rodzinach, mianowicie w rodzinie rosiczkowatych, Droseraceae DC., dzbanecznikowatych, Nepentheae Lindl., pływaczowatych, Utricularieae L. i kapturkowatych, Sarraceniaceae Torr. Wszystkich roślin owadożerzych jest 15 rodzajów a około 350 gatunków i nie brak ich w żadnym obszarze flory naszej ziemi, bo są one według Dra E. Goeze'go we wszystkich częściach świata rozszerzone i to od północy aż do najdalszego południa, tak w starym jak i w nowym świecie. Rośliny te możnaby podzielić na rzeczywiście trawiące i nietrawiące t. j. żywiące się tylko substancjami pochodzącymi z rozkładu miękkich części ciała owadów lub innych małych istot żyjących. Ze względu zaś na sposób łowienia owadów są rośliny owadożerce trojaki. Jedne łowią i trawią zwierzątka zapomocą włosów i gruczołów

jak: *Drosera*, *Drosophyllum*, *Byblis* i *Roridula*. Drugie łowią owady przez zwieranie się liści jak *Pinguicula*, *Dionaea* i *Aldrovanda*. Wszystkie te tu przytoczone rośliny mają własność trawienia ciała złowionych owadów. Nareszcie są rośliny, które mają osobne narządy do łowienia owadów, a te są przekształconymi ogonkami lub listkami na łapki w szczególny sposób urządzone, ciało zaś tych zwierząt podpada tylko rozkładowi, a nie trawieniu i materya rozkładowa bywa wessana. Takiemi roślinami są: *Utricularia*, *Polypompholyx* Lehm., *Genlisea* St. Hil., *Nepenthes*, *Heliamphora* Benth., *Cephalotus* Labil., *Sarracenia* i *Darlingtonia*. Do roślin owadożerzych zaliczaną także bywa *Caltha dionaefolia* Hook. z Ziemi Ognistej.

Wszystkie te rośliny zawierają w swych komórkach zielen, mogą więc przyswajać sobie węgiel z kwasu węglowego (dwutlenku węgla) powietrza atmosferycznego, ale zarazem mogą się żywić gotowemi substancjami z ciał organicznych pochodzącemi, więc białkowatemi czyli azotowemi; można przeto powiedzieć, że rośliny te pasożytują, jakkolwiek je z właściwymi pasożytami roślinnymi będącymi bez zieleni na równi postawić nie można. Sposób żywienia się każdej z tych roślin owadożerzych poznamy przy szczegółowym jego opisie w pojedynczych ich rodzajach lub gatunkach.

Po mokrych łąkach i trzęsawiskach Europy, po miejscowościach różnej szerokości i wysokości geograficznej pojawia się niepokazna roślina którą u nas zwą rosiczką lub rośnikiem,

***Drosera rotundifolia* L.**

W ogólności znaleźć ją można po wilgotnych a pulchnych darniach torfowca (*Sphagnum*) tak w równinach jako téż i górzystych okolicach, znajdował ją bowiem Dr. A. Peter w lipcu r. 1877 w Pioninach na Babięj górze, więc na wysokości 1770 metrów, a przychodzi ona także w Alpach.

Z małego i włóknistego korzonka téj rośliny wyrasta 6—8 okrągławych liści odziomkowych rozpościerających się po ziemi w kształcie rozetki, a ich ogonki są 2—4 cm. długie. Pośród tychże wyrasta 14 cm. wysoka łodyżka kwiatowa (głębik), a nawet natrafić można na okazy o 2—3 głębkach, na których jest 6—9 drobnych białych kwiatuszków w kłos poskupianych. Rosiczki kwitną w lipcu i sierpniu, a korona kwiatuszków otwiera się zwykle w południe i przy pogodném niebie.

Listeczki téj rośliny pokryte są na górnéj powierzchni blaszki 120—260 dosyć długimi włoskami lepkiemi, których wierzchołki są gruczołkowato nabrzmiałe. Skrajne włoski, czyli na brzegu liści położone, są najdłuższe i pochylają się nieco na zewnątrz blaszki, środkowe zaś są stopniowo coraz krótsze i prostopadłe do powierzchni liści. Główkowate ich wierz-

chołki są gruczołkami purpurowo czerwonemi, podczas gdy włoski są blade zielone. Gruczołki środkowych włosków są kuliste, skrajnych zaś już nieco podłużne, a wszystkie są tkanką wielokomórkową, w której komórki środkowe są śrubowo zgrubiałe, zewnętrzne zaś nie. Włoski liści takimi gruczołkami uwieńczone składają się z kilku szeregów podłużnych komórek, z których środkowe są również śrubowo zgrubiałe i łączą gruczoły z wiązkami naczyniowemi liści. Komórki gruczołków wypełnia ciecz ziarnista a purpurowa, podczas gdy we włoskach jest ona zieloną, bo zawiera gałeczki zieleni.

Tak ukształtowane gruczołki są wrażliwe na pewne wpływy zewnętrzne i wydzielają ciecz lepka a przezroczystą, w skutek czego się pokrywają bezbarwnemi kropelkami. Kropelki te nie znikają wcale z gruczołków liści, jak rosa, która się ulatnia, gdy ją słońce oświeci i ogrzeje, lecz połyskują i mieniają się w słońcu barwami tęczowemi tak świetnie, że każdy listeczek wydaje się, jakby był przyozdobiony wieńcem licznych w słońcu się lśniących drobnych brylancików. Piękne to zjawisko dało też powód, że tej małej roślince nadano nazwę rosiczki lub rośnika, prócz tego przypisywali jej niektórzy szczególniejsze własności, utrzymywali bowiem jak np. botanik Rembert Dodoens z Mecheln (ur. 29 czerwca 1517), Dodonaeus zwany, że rosiczka posiada niezawodne środki przeciw wszelkim niszczącym chorobom ludzi; a z powodu tego ówczesnego zapatrywania i przypisywania jej takich własności liście tej rośliny, które mają smak gorzki, na skórze zaś sprawiają pęcherze, gdy się niemi ciało natrze, miały dawniej zastosowanie lekarskie. Także i alchemicy zwracali swą uwagę na rosiczkę sądząc, że owe połyskujące kropelki cieczy przez gruczoły wydzielanej są surowym materiałem służącym do wyrabiania „złotej tynktury i eliksiru nieśmiertelności.“ Do tych należy chemik Arnold Bachuone, zwany Arnoldus Villanovus lub de Villanova, profesor z Barcelony, żyjący w końcu 16 stulecia, którego ówczesnym zwyczajem uważano za „alchemika i ucznia czarta.“ W skutek tego Arnold Bachuone przez pewnych swych współziomków znieawidzony i z kraju wypędzony udał się do Włoch i wyrabiał tam z rosiczek przez destylację swą „wodę złotą (aqua auri),“ która miała być skuteczném lekarstwem na wszelkie choroby.

W nowszych atoli czasach odkryto inne a podziwienia godne własności tej rośliny, które w miarę ich dokładniejszego poznania ciekawość uczonych wzniciły.

Botanik Roth zauważył w lecie r. 1779, że komary, mrówki, chrząszczyki i inne drobne owady bywają przez połyskujące w słońcu gruczołki rosiczki zwabiane i że się nieraz kilka lub kilkanaście sekund po nad tą

roślinką w odległości mniej więcej 1go metra unoszą, a spocząwszy następnie na jej lepkich listkach jak w jakim lepie więzgną. Rzeczywiście, jak tylko jakie małe żyjątko na blaszce listeczka usiadzie, bywa zaraz przez lepką ciecz przytrzymane, a wspierając się na sterzących włoskach wywiera ono na swą podstawę pewne ciśnienie i wywołuje zarazem motoryczne ich podrażnienie. Szybko potem powtarzające się ruchy tego owadu, by z niedogodnego położenia się wydobyć, wytwarzają wrażliwość liści i spowodują ruch włosków, które w 15—20 minutach poczynają się ku owadowi i miejsca podrażnienia pochylać i zwierzątko to z wolna pokrywać. Jeżeli zaś owad na brzegu listka usiadł, to dostanie się mimowolnie na sam środek blaszki mianowicie w skutek tego pochylania się włosków i równoczesnego prawie wyginania się brzegów listka, tak że utworzy się na jego powierzchni wklęsła kotlinka na kształt łyżeczki. Im żywawiej będzie się poruszało to zwierzątko czując się pozbawione swój wolności, by ująć raz z tej matni, to jego ruchy staną się skutecznym bodźcem do wytworzenia ruchu włosków, czyli ich zginania się; a tak ciągłe szamotanie się owadu zwiększy wrażliwość w otaczających go włoskach, która udziela się całej blaszce liścia, rozchodzi się bowiem aż do nadbrzeżnych włosków. W skutek tego podrażnienia pochylają się włoski dookoła owadu, iż go te w ciągu pół godziny pokryją, na całej zaś blaszce listka uskutecznią się w to 8—12, a niekiedy w 15-tu godzinach odpowiednio do ciepłoty powietrza. Ruch ten włosków poczyną się u ich podstawy, bo dolna część włoska się zgina, górna zaś nie. Co do chyżości zginania się włosków zauważył Darwin, patrząc przez lupę na rosiczkę, że jak tylko jakie ciało na gruczołku spoczęło, to zginanie się włoska nastąpiło już w 10-ciu sekundach. Całe to zachowanie się listka rosiczki w obec znajdującego się na nim owadu skreślił Darwin temi słowy: Moznaby myśleć, że się widzi nisko uorganizowane zwierzę, które swemi ramionami swą zdobycz objęło; dla tego nazwał on te włoski rosiczki rożkami (Tentakeln). —

Temu obejmowaniu owadów przez te włoski towarzyszy wydzielanie cieczy kwaśnej z ich gruczołków, a dokonywuje się to w 1—4 lub 5 godzinach, w miarę zaś częstszych ruchów ujętego zwierzątka jest ono coraz obfitsze, a ciecz nagromadza się w około niego w takiej ilości, że owad ten jest nią pokryty, w skutek czego przetchlinki jego do tchawek prowadzące się pozatykają i następstwem tego jest śmierć owadu przez uduszenie. Ciecz ta wtedy wydzielana jest kwaśną i działa na miękkie części ciała zwierzęcego rozpuszczająco a tylko szkielet hitynowy owadów pozostaje nietkniętym, Darwin zaś twierdzi, że ta ciecz zawiera ferment do pepsyny podobny i ma własność zamieniania białka na peptony. W taki

więc sposób zamienia się miękkie ciało owadu na masę płynną, którą gruczoły listka wessają, po kilku zaś dniach wyprostowuje się znowu blaszka a z owadu zobaczyć można tylko same niestrawne części jego ciała, które następnie powiew wiatru strąca i liść od niepotrzebnego już ciężaru uwalnia. W krótkce ukażą się włoski listka w pierwotnym ich pionowym położeniu, gruczoły zaś będą suche, bo przestały już wydzielać płyn trawiący. Po pewnym czasie poczną pojawiać się po gruczołkach włosków owe błyszczące, a w słońcu wspaniale się mieniące krople cieczy bezbarwnej a lepkiej i łowienie owadów rozpoczyna się na nowo przy nadarzonej sposobności.

Taki jest przebieg łowienia owadów u rosiczki, która wtedy wydziela dwojaką ciecz ze swych gruczołów, wydzielina bowiem gruczołków niepodrażnionych jest cieczą obojętną, a po ich podrażnieniu staje się już kwaśną i taką pozostaje, dopóki trawienie ciała zwierzęcego się nie ukończy. Prof. Frankland badał skład chemiczny tego kwaśnego płynu, a analiza ta wykazała, że w tymże jest prawdopodobnie kwas propionowy, a może mieszanina kwasu octowego i masłowego, bo po dodaniu tu kwasu siarkowego wytwarzał się zapach pepsyny. M. Reess i H. Will także robili w czerwcu 1875 r. podobne badania tej cieczy celem poznania jakości działania tego podczas trawienia ciała owadów czynnego fermentu. W tym celu robili 12 doświadczeń z cieczą rosiczki okrągłolistnej, *Drosera rotundifolia* L., w czasie których kładli glicerynę na wszystkie listki tej rośliny, a zawsze otrzymywali wynik jednakowy. Włókniak (fibryna) z chloranem gliceryny na liść położony rozpuszczał się w zwyczajnej cieplej pokojowej, a rozpływanie jego było tém prędzsze, im więcej użyto w tym celu gliceryny, kosmy zaś włókniaka namoczone w kwasie solnym i na liściach rosiczki położone rozpuszczały się w tej cieczy trawiącej w ciągu 24 godz.

W doświadczeniach tych przekonali się M. Reess i H. Will, że rosiczka także absorbuje substancje białkowate, które w jej cieczy się rozpuściły. Wreszcie starali się ci badacze poznać własność i skład chemiczny tego płynu trawiącego, który kwaśną reakcją na papier lakmusowy okazuje i okazało się, że ta ciecz jest mieszaniną różnych kwasów organicznych, przedewszystkiem kwasu masłowego, mrówkowego i propionowego, których obecność już sam zapach zdradza, składu zaś chemicznego dokładnie oznaczyć nie mogli z powodu niedostatecznej ilości tej wydzieliny.

W taki sposób poznano dokładnie, że rosiczka jest zaopatrzoną w narządy zastósowane do łowienia drobnych żyjątek i trawienia ich ciała, że ta czynność w rzeczywistości się odbywa, jakoteż, że ta roślina strawione ciało zwierzęce zużywa, lecz zdania uczonych pod względem zna-

czenia tego urządzenia i rzeczywistej potrzeby dla organizmu tych roślin są różne. W tym celu robił też M. Büsgen doświadczenia dla poznania rzeczywistej wartości tego sposobu żywienia się rosiczki, *Drosera*, względnie zaś innych roślin owadożerczych, a dla uniknięcia możliwych błędów rozpoczął on swe obserwacje z kiełkującymi nasionami rosiczki okrągłolistnej, *Drosera rotundifolia* L. Waga użytych nasion okazała się małą, bo 100 nasionek ważyło 2 mg., ciężar więc jednego nasionka wynosił w przecięciu 0·02 mg. Dojrzałe te nasiona zebrał M. Büsgen w końcu października r. 1880., przezimował je następnie w piwnicy, następnego zaś roku (1881.) zasiał je ku końcu stycznia w poprzednio wygotowanym torfie i nakrył kloszem szklanym. W maju zakiełkowały te nasiona, w czerwcu zaś były już tak duże roślinki, że doświadczenia swe karmieniem 36 w tym celu obranych rosiczek mógł Büsgen już rozpocząć. Jedną połowę tych rosiczek karmił on mszycami w dniach: 22. i 28. czerwca, następnie 1, 6, 12, i 20. lipca, dalej w początku i środku sierpnia jakoteż września z wynikiem następującym.

Rośliny żywione mszycami miały już dnia 22 lipca 90 listeczków, niekarmione zaś 95, a może to dla tego, że pomiędzy ostatnimi okazami mogły się znajdować rosiczki więcej rozwinięte, ale zato okazy żywionych rosiczek odznaczały się większymi rozmiarami liści i silniejszą budową. W końcu października utraciły rosiczki już liście, przeto trzymał je Büsgen w pokoju chłodnym (*Kalthaus*) i skrapiał wodą co 14 dni. Po takim przezimowaniu tych roślin powtórzył Büsgen w następnym roku dalsze swe spostrzeżenia z 30 rosiczkami, a 5. maja (1882 r.) rozpoczęte żywienie ich mszycami dało wynik następujący. Karmione rośliny, których było 14, wydały 126 liści, nieżywione zaś mszycami, tj. 16 okazów, tylko 96 liści, rosiczki zaś karmione były tak silnie rozwinięte, iż zaledwo 2 okazy z niekarmionych tamtym co do zrostu mogły dorównać. Przy takim samym pielęgnowaniu i karmieniu roślin, jak w roku ubiegłym, zakwitły rosiczki w ciągu lata, a 26. lipca były już zupełnie dojrzałe torebki.

Wynik karmienia rosiczek jest następujący:

Liści rozwiniętych u 14 rosiczek	żywionych było	194
„ „ u 16 „ nie „ „	„ „	222
Głębików z kwiatami u 14 „	żywionych „	17
„ „ u 16 „ nie „ „	„ „	7
Torebek z nasionami u 14 „	żywionych „	90
„ „ u 16 „ nie „ „	„ „	20
Waga suchych okazów rosiczek	żywionych	= 0·352 gr.
„ „ „ „	nie żywionych	= 0·110 gr.

W prawdzie z 36 rosiczek użytych do pierwszego doświadczenia zginęły 4 okazy żywione a 2 nieżywione, lecz z tego zestawienia okazuje się, że żywienie rosiczek wpływa korzystnie na ich rozwój oraz liczbę głąbików z kwiatami i torebek nasiennych.

Powtarzał jeszcze Büsgen te doświadczenia i otrzymywał zawsze analogiczne wyniki, przeto na podstawie tych badań był następującego zdania. Materya organiczna (zwierzęca) przez liście rosiczki wessana jest dla rozwoju téj rośliny, mianowicie w wytwarzaniu nasion wielkiego znaczenia, a potrzebę tego sposobu żywienia się można tylko przez pielęgnowanie kilku po sobie następujących generacyj wykazać. Pewną jest rzeczą, że ciała azotowe rosiczka rzeczywiście trawi i z pewną korzyścią dla swego organizmu zużywa, czyli że materya zwierzęca azot zawierająca jest dla rosiczki potrzebnym pokarmem. Jeźliby zaś ostatecznie przyjmowanie substancji białkowatęj nie miało być u roślin owadożerczych bezwarunkowo potrzebném, jednakże jest ono dla nich istotnie korzystném*).

Nie tylko ciało zwierzęce działa podrażniająco na liście rosiczki, lecz i inne ciała azotowe, albowiem takie same zjawisko ukazuje się, gdy na listku téj rośliny położymy: kawałeczek białka ugotowanego, mięsa, kroplę mléka a nawet włos ludzki $\frac{1}{5}$ mm. długi, ważący 0.000822 mg., Darwin zaś kładł kawałeczki włókna bawełny wagi $\frac{1}{8000}$ grana i włos $\frac{1}{78000}$ gr. a włoski listka rosiczki zgięły się. Z wielu substancyj przez Darwina w tym celu używanych okazały się zarówno skuteczne: węglan-, azotan- i fosforan amoniaku, których używał w małych ilościach, a zawsze z widocznym skutkiem. Tak $\frac{1}{268800}$ grana węglanu amoniaku, spowodowało zginanie się włoska, listka rosiczki, podobnie $\frac{1}{691200}$ grana azotanu amoniaku, a nawet nader mała dawka fosforanu amoniaku ważąca $\frac{1}{19760000}$ grana wytworzyła ruch włoska.

Nareszcie, jeżeli na listku rosiczki spocznie jakie ciało nieazotowe, np. ziarnko piasku, strzępek papieru, kawałeczek mehu, gąbki, węgla drzewnego lub szkła, nastąpi wprawdzie ruch włosków, lecz czynności trawienia wcale nie będzie. Tak samo nie podrażnią gruczołów rosiczki krople dęszczy, gdy na jęj listeczek padną, jakoteż i inne materye bezazotowe.

Zatem na liście rosiczki działają podrażniająco tylko ciała azotowe, nadto Darwin twierdzi, że te rośliny mogą nawet odróżnić, czy ciało na liść położone azot w sobie zawiera, czy nie, zginanie się zaś włosków

*) Naturforscher. XVI. 1883. N. 45. str. 427 i 428; Botanische Zeitung XLI. 1883. Nr. 35 i 36.

liści może być odpowiednio do przyrodzonej własności ciała na nie położonego pędzłem lub powolniejszym. Rozmaite też ciała działają na liście rosiczek ze względu na długość czasu różnie, upływa bowiem czas od 1. godz. do 24. godz. nim ciało włoski nakryją. A Balding w Wisbech obserwując rosiczki zauważył, że te rośliny większe nawet od siebie zwiérzątka, jak np. ważki (*Libellula*) łowią i trawią, oraz że okazy roślin są niekiedy znacznie mniejszych rozmiarów, niż owady przez nie złowione, które czasami bywają do $24\frac{1}{2}$ mm. długie, podczas gdy szerokość rozpostartych skrzydeł nawet $32\frac{1}{2}$ mm. wynosi. Balding naliczył raz 6 rosiczek na powierzchni $1' \square = 9'99$ dm. \square ziemi, które prócz małych owadów jeszcze kilka *Pyrrhosoma minium* złowiły, a na jednej rosiczce były dwie ważki, z których jedna była już częściowo strawioną, druga zaś co dopióro może ujętą*).

Siedzibą wrażliwości listków rosiczki są według Darwina gruczoły i niektóre przyległe komórki (górne) włoska, podrażnienie zaś przenosi się od jednego włoska do dalszych przez całą jego długość, a następnie rozszerza się w blaszce liści rosiczki. Równoczesne podrażnienie kilku naraz gruczołów udziela się szybciej, niż jednego gruczołu, a mianowicie w kierunku podłużnym liścia, aniżeli w poprzecznym, to zaś rozchodzenie się podrażnienia odbywa się w miększku tkanki liści a nie w naczyniach. Podobnie zapatruje się Pfeffer, który twierdzi, że rozszerzanie się w liściu rosiczki wywołanego podrażnienia zupełnie w inny sposób się odbywa niż w czułku, *Mimosa pudica* L., roślince nie należącej do roślin owadożerczych; przypuszcza on bowiem, że to podrażnienie listka rosiczki rozchodzi się od komórki do komórki, więc nie przez wiązki naczyniowe, przewodnikiem zaś tego jest plazma**).

Darwin także zauważył, że purpurowa plazma w komórkach w chwili podrażnienia gruczołka przez substancję azotową oraz ruchu włosków w kuleczki się gromadzi, które co chwila swój kształt zmieniają i są w ustawicznym ruchu, co tak długo trwa, aż wszystkie miękkie części ciała owadu przez ciecz trawiącą rozpuszczone i wessane zostaną. Zginaniu się zatem włosków liści rosiczek towarzyszy zmiana własności drobin plazmy w komórkach gruczołów. Włoski liścia rozwiniętego a nigdy jeszcze nie podrażnionego składają się z komórek napełnionych jednostajną cieczą purpurową, ściany zaś wysłane są warstwą bezbarwnej i krążącej plazmy. Jeżeli zaś włoszek został podrażniony i substancję organiczną za-

*) Naturforscher XVII. 1884. N. 38 str. 256. i Nature 1884. p. 241.

***) Naturforscher XXI. 1888. N. 2. str. 22.

bsorbował, wówczas owa ciecz purpurowa dotychczas jednostajna skupia się w drobne masy rozmaitego kształtu kulistego lub słupkowatego, które unoszą się w bezbarwnym płynie komórek. Zmiana ta w ugrupowaniu się plazmy poczyna się w gruczołach, następnie objawia się komórkach włoska przez całą jego długość aż do podstawy, podczas gdy w ciągu tego zjawiska powstałe ciała plazmy co chwilę swój kształt zmieniają, to się rozdzielają, to łączą ze sobą i tak w ustawicznym są ruchu, a tylko przez króciuchny czas się uspakajają na poprzecznej ścianie komórki. Gdy zaś już wszystka substancja azotowa wessaną została a włoski listka wyprostowywać się zaczęły, to te kuleczki i słupeczki plazmy rozpływają się, a w komórkach płyn purpurowy okaże się znowu jednostajnym, tak jak z początku przed podrażnieniem listka.

Wszelkie doświadczenia robione z rosiczką *Drosera* co do przebiegu trawienia ciał białkowatych dały wynik następujący.

1. Gruczołki włosków liści rosiczki są bardzo wrażliwe na ciała azotowe, jeżeli te na blaszce położymy lub owad usiedzie.

2. Podrażnienie w gruczołku wywołane udziela się całemu włoskowi oraz i sąsiednim włoskom liścia.

3. W chwili tego podrażnienia i jego trwania odbywają się w komórkach gruczołów i włosków osobliwsze a nader charakterystyczne zmiany w zawartości komórek, bo plazma mąci się, a następnie się układa w większe lub mniejsze kuleczki lub słupeczki, które co chwila swój kształt zmieniają i są w ustawicznym ruchu. Zmiany te ukazują się najprzód w gruczołku, a potem kolejno w komórkach włoska, które się wskutek tego u swój podstawy zginają.

4. Od chwili podrażnienia gruczołków wydziela się z nich ciecz lepka i kwaśna zarazem, która działa na ciała azotowe zapomocą w niej znajdującego się fermentu rozpuszczająco. Ciecz ta działa podobnie jak pepsyna soku żołądkowego u zwierząt kręgowych w chwili trawienia, przeto jest płynem analogicznym.

5. Liście rosiczki mają własność trawienia materji azotowej i jej wessania celem użycia téjże do budowy własnego organizmu, głównie zaś kwiatów i nasion.

W taki sam sposób żywią się inne gatunki rosiczki, których wszystkich jest 100, a z tych niektóre przytoczę. *Drosera longifolia* Hayne, jest dość rzadką rośliną z bagien torfowych, ma liście podługne i również do łowu owadów ukształtowane, które mają smak ostro-cierpki i sprawiają na skórze pęcherze; z nich robiono znany płyn (*aqua auri*). Innymi gatunkami z rodzaju *Drosera* są: *Drosera intermedia* Hayne, *D. longifolia* Sm.,

D. anglica Huds., *D. filiformis*, *D. spathulata*, *D. binata*, *D. capensis*, *D. pallida*, *D. trinervis*, *D. heterophylla*, *D. auriculata* Labill. z Australii i wiele jeszcze innych, które wszystkie po całej powierzchni ziemi są rozszerzone z wyjątkiem wysp morza Australskiego. Według Dra Richarda Szomburgka, dyrektora ogrodu botanicznego w Adelaide (połudn. Australia) rośnie w Australii gatunek rosiczki (rośnika) od krajowców „Munuru“ zwany. Zgrubiały jęj korzeń służy dwom plemionom północnej Australii za pokarm, a wyszukują tę roślinę po deszczu ulewnym, gdyż wtedy ma być jęj korzeń najsmaczniejszym dla nich pokarmem. Jeżeli upragnionego deszczu nie mogą się doczekać, w tedy zbierają się w nocy tak zwani „Rainmarker“ celem odbycia pewnej ceremonii i zaklinania dęszczy, lecz podczas tęjże ich czynności nie może być ani obcy ani do tego niepowołany obecny. Do tęj ceremonii używają oni drewnianych wężkich deszczulek któremi w powietrzu tak silnie machają, że świst powstaje; są one 3–7½ dm. długie i prawdopodobnie z drzewa *Rzewni*, *Casuarina*, zrobione, a na nich jest wyryty poczwórny rysunek tęj australskiej rosiczki. lecz bardzo w prymitywny sposób i napuszczony czerwoną barwą. Po skończonej ceremonii chowają te przybory swoje między liście, by ich nikt niepowołany nie widział*).

Do roślin rosiczkowatych należy także *Drosophyllum lusitanicum* St. z Portugalii i Marokka. Liście tęj rośliny nie okazują już ruchów, lecz owady bywają przez lepłą śluzowatą ciecz, jaką gruczoły liści wydzielają, jakby jakimś lepem przytrzymane, w kwaśnym płynie przez maluchne gruczołki listka wydzielanym strawione i wessane. Roślinami również owadożernymi, które tu należą są: *Byblis gigantea* Lindl. z Australii gorącej (północnej) i *Roridula dentata* L. z południowej Afryki, a przedewszystkiem rośnie ona w kraju przyładkowym. U obu roślin są na długich a wężkich listkach liczne gruczoły obficie ciecz trawiącą wydzielające, więc to są rośliny łowiące i trawiące owady jedynie za pomocą swych licznych gruczołów.

Pośród lasów i miejsc bagnistych Ameryki północnej a przedewszystkiem Karoliny i Florydy jest osobliwa roślina, którą odkrył pewien amerykańczyk r. 1765 na bagnach Karoliny, muchołówką, *Dionaea*, zwana. Pierwsze jęj okazy otrzymał przyrodnik John Ellis, i wynik swych spostrzeżeń z tą rośliną poczynionych udzielił listownie Lineuszowi dnia 23. września 1769 r, a ten szwedzki przyrodnik nadał tęj roślinie dla jęj pię-

*) *Botanische Zeitschrift* 1879. str. 161.

nych białych kwiatków w okółek ułożonych nazwę Venus Dionaea, na cześć bogini Venus Dione, obecnie zaś nazywa się ta ozdobna roślina

Dionaea muscipula L.

Muchołówka jest trwałą rośliną, ma liczne korzonki, z których wyrasta 6—12 ciemno-zielonych listeczków odziomkowych promienisto się po ziemi prawie rozścielających. Pośród różyczki tych liści wyrastają 1 lub 2 czerwonawe głąbiki, 18—20 cm. wysokie, uwieńczone 6—8 dość dużymi białymi 5 płatkowatymi kwiatuškami. Szczególniejszej budowy i kształtu są liście tej rośliny. Ogonek listka rozpląszcza się po obu stronach w dwa skrzydełka, a blaszka dzieli się na dwa półkoliste nieco wklęsłe płaty liścia, które łączy dość grube żeberko główne barwy czerwonej. Z brzegów każdej połowy liścia wyrasta 10—20 tęgich szczeciniastych włosków czerwonych, a na powierzchni każdej połowy liścia wznoszą się 3 (czasem 4) długie, ostre szczeciny, jakby jakie kolce. Między tymi kółkami są po liściu rozrzucone liczne, małe, czerwone, tarczowate gruczołki wielokomórkowe, które wydzielają ciec owady nęcącą i miękkie ich ciało trawiącą. Tak ukształtowane listki są nader podrażliwe a zarazem wyborną i bardzo szybko działającą łapką na owady. Jeżeli jaki skrzydlaty owad świetnym ubarwieniem liści zwabiony lub dla odpoczynku na listeczek tej rośliny zleci i mimowolnie tych 3 szczecin chociaż jak najślabiej się dotknie, lub o nie zawadzi, tedy w téjże prawie chwilec podniosą się oba półkoliste połowy listka, przy żeberku głównym się zegną i tak się zbliżą do siebie, że brzegami się swymi zetkną i w końcu na kształt książki się zamkną. Wówczas pozna owad, że jest ujęty i że z tej łapki więcej już ująć nie może, bo wszelki odwrót jest dla niego zamknięty, gdyż jak tylko brzegi blaszki listka się zetkną nadbrzeżne szczeciniaste włosy się skrzyżują i na kształt palców u rąk złożonych się zginają. Ellis nawet twierdził, że owad ten przy zamykaniu się listka przez owe trzy środkowe kolce jakby jakimi sztylecikami przeszyty bywa. Im bardziej będzie się szamotał ujęty owad, tém więcej i dokładniej zwierają się obie półowki liścia i tak silnie go w objęciach swych trzymają, że prędkiej blaszkę rozedrzyć można, niż ją otworzyć. Wszystkie gruczoły licznie po zielonej tkance liścia rozsiane były przedtém suche, a wskutek tego podrażnienia poczynają obficie wydzielać w około owadu ciec bezbarwną, kleistą a kwaśno reagującą, bo ona zmienia niebieski papier lakmusowy na czerwony. Ciec ta rozpuszcza miękkie części ciała owadu, które azot zawierają, a gdy to wszystko w roztworze się zamieni, tedy gruczołki go wessają, roślina zaś zużywa go z pewną korzyścią.

Zatem łowienie i trawienie owadów u muchołówki odbywa się w podobny więc sposób jak u rosiczki; i tego zdania był już Ellis, ależ to zapartywanie jego miał Lineusz za dziwaczną nowinę mu udzieloną, lecz to samo twierdził Dr. Curtis i inni. Listki téj rośliny są tak przez 8—9 dni zamknięte, a otwierają się aż po 10—15 dniach, zaś z owadu pozostają tylko niestrawne części szkieletu chitynowego. Gdy przypadkiem na listeczek muchołówki padnie kawałeczek drzewa lub kamyczek, to wprawdzie zamkną się obie połówki liścia, ale po krótkim czasie znowu się otworzą, gruczoły zaś okażą się bezczynne.

Ten sposób łowienia owadów i ich trawienia badał dokładnie Darwin. Kładł on na listki muchołówki kawałeczki białka i gelatyny, a po ośmiu dniach otworzywszy jeszcze zamknięty liść nie znalazł na nim ani śladu z tychże, gdy zaś położył jakie ciało nieazotowe, to liść się wprawdzie zwał, lecz po 24 godzinach się otworzył, a ciało położone było wcale nie tknięte. Zatem ciała azotowe na liście téj rośliny położone bywają strawione, bo wtedy owe liczne gruczołki, jakie po zielonej powierzchni naskórka liściowego są licznie rozsiane, poczynają wydzielać ciecz bezbarwną, a kwaśno reagującą. Ciecz ta ma własność rozpuszczania ciała zwierzęcego i innych substancyj azotowych, a gdy to nastąpi rozczyń ten bywa przez liść wessany (zabsorbowany). i zużyty.

Chyżość zginania się i zwierania obu tych połówek liścia zawisła od wielu okoliczności, tj. czy owad, lub inne ciało azotowe padnie na te 3 wrażliwe kolce, lub nie, czy je podrażni, lub wcale ich się nie dotknie. Jeżeli na blaszkę liścia położymy jaką materję azotową, ale tak ostrożnie, żeby żadna z tych 3 szczecin nie została podrażnioną, to zamykanie się liścia będzie bardzo powolne, przeto te 3 szczeciny a właściwie kolce uważane są za siedzibę wrażliwości liści. Również twierdził angielski fizyolog Burdon Sanderson r. 1874, że muchołówka, oddawna już znana roślina, w rzeczywistości łowi owady i je trawi, do czego służy jój ciecz kwaśna, z gruczołków na blaszce liścia się znajdujących wydzielana, w której po pewnym czasie miękkie ciało owadu z wyjątkiem chitynowych części się rozpuszcza i w tkankę liścia wnika.

Podobne doświadczenia robił A. Fraustadt kładąc na 3 listki małe kawałeczki ściętego białka, które przedtem aniliną na czerwono zabarwił. Po 24 godzinach zamknął się najprzód jeden liść, po dalszych 24 godzinach drugi, a wreszcie po 6 godzinach trzeci. Po dniach 8 otwarł on liść pierwszy, a białka położonego na nim wcale nie znalazł, tylko w komórkach gruczołów tegoż listka, które przed doświadczeniem bezbarwny płyn zawierały, było dość duże ciało okrągłe, czerwone, oczywiście ani-

liną wysanego białka zabarwione. Również zawierały niektóre naczynia skrajne w środkowych wiązках naczyniowych ogonka liściowego nieco czerwonej aniliny; zatem białko to na liściu położone było w płyn zamienione, wessane i po całym liściu rozprowadzone. Także badał Fraustadt komórki na skrobię używając jodu i znalazł, że zielone komórki liści, które ciało owadu strawiły, lub białkiem karmione były, albo wcale żadnej skrobi, albo bardzo mało jej zawierały niż komórki tych liści, które pokarmu zwierzęcego nie otrzymały, podczas gdy bezbarwne komórki liści były nader obficie skrobią napełnione i to w takiej samej ilości, jak u liści niekarmionych*).

Wszelkie zwieranie się i otwieranie obu tych połówek liścia, jakoteż przyczynę tego badali uczeni wielokrotnie. Za siedzibę tej wielkiej wrażliwości liści uważa Ellis te 3 kolce blaszki, bo zginanie się tych połówek liścia następuje wtedy, jeżeli owad choć jeden z nich dotknięciem podrażni.

J. Burdon-Sanderson zrobił w roku 1873 odkrycie, że liście mucholówki okazują siły elektromotoryczne, które odpowiednimi przyrządami fizykalnymi zmierzyć można. W tym celu robił on doświadczenia z zachowaniem wszelkich ostrożności, a do oznaczenia napięcia elektrycznego w liściu używał on elektrometru Lippmanna, w którym napięcie prądu elektrycznego mierzy się przez posunięcie się słupka rtęci i jego wypukłej powierzchni w rurce włoskowatej. W tych doświadczeniach okazało się, że w liściu mucholówki są prądy elektryczne i te powodują zginanie się obu połówek blaszki liścia. Także robił Burdon z F. J. M. Page'm doświadczenia celem zbadania elektryczności liści mucholówki, a do podrażniania owych 3 szczeciniastych koleców używano cieniuchnego pędzlika z włosów wielbłąda. Przy powtarzanem podrażnieniu okazywał liść wiadome ruchy, a na brzegu liścia wyrosłe szczecinki nakrzywiały się ku powierzchni blaszki liścia. Także zauważali ci przyrodnicy, że za każdym dotknięciem owych 3 koleców wyżej wspomnianym pędzlikiem nastąpiło lekkie zbliżanie się owych dwóch płatów (połówek) blaszki liścia, a każde następne zbliżanie się ich było znaczniejsze, niż poprzedzające, wreszcie zwarły się obie połowy i liść był zamknięty. Cały przebieg doświadczenia i jego wynik unaocznia następująca tabelka, w której oznacza kolumna pod I. liczbę dotknięć pędzlikiem, przeto i podrażnień trzech szczecin, pod II. mechaniczny skutek oznaczony kątem nachylenia się włoska, pod III. czas w sekundach, jaki upłynął między pierwszym dotknięciem a zbliżeniem się połówek liścia.

*) Naturforscher IX. 1876. Nr. 45. str. 424.

Tabela

podająca wyniki z doświadczeń Burdon'a i Page'go.

I. Liczba podrażnień	II. Kąt nachylenia	III. Czas ubiegły
1—7	0	∞
8	0	∞
9	0	∞
10	$\frac{1}{4}$	15·5 sek.
11	$\frac{1}{4}$	10·8
12	$\frac{1}{2}$	7·3
13	1	5·8
14	$1\frac{1}{2}$	5
15	$1\frac{3}{4}$	4·5
16	$2\frac{1}{2}$	5·4
17	3	4·5
18	2	7·6
19	$3\frac{1}{2}$	3·8
20	$3\frac{3}{4}$	3·7
21	$4\frac{3}{4}$	3·3
22	$5\frac{1}{2}$	4
23	7	2·7
24	$8\frac{1}{2}$	2·5
25	8	2·3
26	10	2·2
27	liść był już całkowicie zamknięty.	

Zatem pierwsze 9 podrażnień były bez skutku, a po tych następne podrażnienie wywołało tak słaby ruch, iżby niedostrzeżonym pozostał, gdyby go rodzajem dźwigni nie uwydatniono, nareszcie każde następujące zbliżanie się obu połówek liścia okazało się w wielu razach znaczniejsze, niż poprzedzające*).

Z badań Burdon-Sandersona robionych w r. 1876. co do elektromotorycznych własności liści muchołówki okazał się następujący wynik: Zewnętrzna powierzchnia każdej połowy liścia jest względem wewnętrznej dodatnio elektryczną, a część dolnej powierzchni żeberka środkowego w pobliżu owych wrażliwych 3 szczytów zachowuje się dodatnio względem

*) Naturforscher X. 1877. N. 15. str. 115.

innych części zewnętrznej powierzchni liścia. Zarazem okazało się, że w liściu, którego prąd elektryczny z przeciwległych punktów jego górnej i dolnej powierzchni odprowadzono, w wielu razach dolna powierzchnia się względem górnej dodatnio zachowuje, a rzadziej ujemnie.

Doświadczenia robione celem poznania chyżości udzielania i rozprzadzania podrażnienia i jej mierzenia wykazały, że odstępy czasu przypadające między podrażnieniem jednej połowy liścia a pierwszą fazą ruchu wynoszą: 0·04'', 0·03'', 0·055'', 0·033'', 0·05'', a w przecięciu 0·0416'', podczas gdy przy podrażnieniu przeciwległej połowy liścia te wynoszą: 0·09'', 0·09'', 0·055'', 0·07'', 0·06'', a średnia wartość = 0·073''. Jeżeli zaś przyjmujemy, że odległość między dwoma punktami, jako miejscami podrażnienia obu przeciwległych połówek liścia, wynosi 6 mm., wówczas by chyżość przeprowadzenia udzielanego podrażnienia w 1-ój sekundzie w ogólności 200 mm. wynosiła. W badaniach zaś robionych celem poznania stosunku zachodzącego między podrażnieniem a mechanicznym skutkiem wykazały, że ustęp czasu między podrażnieniem i zamknięciem się listka zawisł od temperatury powietrza, bo przy 20° C. czas ten wynosił 1'' *).

Także podczas doświadczeń Burdona okazało się, iż na ten ruch i zwieranie się liścia muchołówki, *Dionaea*, wpływa korzystnie ciepłota 32°–35° C, jakoteż pewne nasycenie parą wodną powietrza atmosferycznego, albowiem ogrzanie liści do 45° C. przyspieszyło w liściu napięcie elektryczne, oraz jego maximum, ochłodzenie zaś jego przez zbliżenie małego kawałka lodu opóźniło w nim początek i przebieg napięcia elektryczności**).

Dr. Munk z Berlina badał także elektryczność liści muchołówki, który twierdził, że siedzibą sił elektromotorycznych jest listeczek tej rośliny i że tu zachodzi analogia między zjawiskiem ruchu liści muchołówki a ruchu mięśni z nerwami kręgowców względnie ssaków.

Kunkel starał się te zjawiska w inny sposób wytłomaczyć; zaprzeczał bowiem obecności różnicy napięć elektrycznych w niepodrażnionych liściach muchołówki, a obserwowane zjawiska elektryczne sprowadzał na ruchy cieczy w komórkach tkanki blaszki liści w czasie zamykania się ich, które spowodowało ich podrażnienie. Zatem według Kunkela hipotezy przyczyną tego ruchu byłaby zmiana naprężenia w mięksiszu liści i to w chwili, gdy owad na nie usiadł i te 3 szczeciny na każdej polowie listka się znajdujące podrażnił.

Muchołówkę, *Dionaea muscipula* L., można hodować w pulchnej ziemi torfowej zmieszanej z pokrajanym mchem i piaskiem, pod którą się

*) Naturforscher XV. 1882. N. 51. str. 492 i 493.

**) Naturforscher X. 1877. N. 13. str. 119.

znajduje warstwa kamyczków lub drobnych kawałeczków cegły jako podkład. W lecie stawia się tę roślinę na miejscu świetlistém i podlewa się ją obficie wodą, w zimie zaś w pokoju chłodnym, ale nie zbyt zimnym i w miejscu jasnym, ale mało się ją wtedy wodą skrapia. Rośliny te otrzymujemy to z nasion, to z kłębu (kłącza), który się na kilka części dzieli, by ją rozmnożyć.

Do rodziny rosiczkowatych, Droseraceae, należy także roślina również owadożerna pęcherzycznikiem lub szumotliną zwana, której nadano nazwę botaniczną na cześć włoskiego botanika i zoologa 16-go stulecia Ulissesa Aldrovandi z Bolonii a tą jest

Aldrovanda vesiculosa L.

Rzadka to roślina ze środkowej i południowej Europy, a w ogólności przychodzi ona w krainach południowych, od Francji i Włoch aż do Indji wschodnich i Nowej Hollandji, znaleziono ją także w wodach stojących koło Krakowa, Kaniowa, w Tynieckiem Kole, w stawie raciborskim, w górnym Szląsku, jeziorze Bodeńskim i w Tyrolu (Bozen).

Nitkowata jej łodyga jest skąpo rozgałęzioną, nie ma korzonków, z węzłów wyrastają skupione okręgi małych drobnych listeczków, w kątach zaś liści są białe kwiatuszki. Klinowate ogonki liści są okryte 5—6 szczecinkowatymi włoskami, a na ich szczycie jest blaszka liściowa przekształconą w maleńki pęcherzyk kształtu łyżeczki a wielkości soczewicy o główném żeberku przez środek przebiegającym; w taki więc sposób tworzy ona kotlinkę, której brzegi jakoteż i powierzchnię pokrywają włoski, a między nimi są drobne gruczołki. Sierpowato wygięty brzeg listka wieńczy 5—6 rzęs większych i mniejszych naprzemianlegle położonych, górna zaś powierzchnia liścia w pęcherzyk przekształconego ma po sobie włosy o 4-ech gałązkach na kształt krzyża św. Jędrzeja ułożonych.

Pęcherzyczki te są łatwe do podrażnienia a mianowicie w ciepłej porze lata, bo za najlżejszém ich dotknięciem zwiernają się wzdłuż żeberka środkowego w podobny sposób jak u muchołówki, Dionaea, a po 18—24 godzinach znowu się otwierają. Ruch ten owych liści w pęcherzyki przekształconych obserwował najpierw De Lassus w r. 1861., Cohn zaś przekonał się, że w ten sposób zamykające się pęcherzyki tej rośliny różne nader drobne zwierzątka wodne pochwytyją. Wreszcie Stein, inspektor botanicznego ogrodu w Wrocławiu i gorliwy florzysta, spostrzegł przypadkiem w r. 1873., że te pęcherzyczkowato ukształtowane liście tej wodnej roślinki za ich podrażnieniem przez owady wodne w podobny sposób, jak liście muchołówki, Dionaea, się zamykają, zwierzątka te ujmują i ciało

ich trawią. W tym celu trzymał Stein te rośliny w szklaném naczyniu napełnioném wodą, w której się znajdowały drobne słodkowodne małżoraczki, tak zwane grzębiki, Cypris. Po pewnym czasie dostrzegł Stein, że w pęcherzykach téj rośliny te zwierzątka się znajdowały, z których po dniach kilku tylko niestrawne części odnalazł.

Rzeczywiście jest Aldrowanda rośliną owadożerną, bo jak tylko jakie małe wodne żyjątko do wklęsłej powierzchni listeczka się zbliży i jej włosków 4 ramiennych dotknie, tedy blaszka liścia poczyna się przy żeberku główném zginać i zwolna zamykać, przez co utworzy się na równej przedtém powierzchni listka zagłębienie, w które się zwierzątko dostaje. W końcu brzezi liścia się zetkną, skrajne szczecinki jak u muchołówki, *Dionaea muscipula* L. za siebie zajdą i owad został ujęty, a w téj łapce znajdujące się zwierzę ginie dla braku pożywienia i miękkie części jego ciała popadają w kilku dniach w rozkład, poczem liście ponownie się otwierają.

Zatem łowienie żyjątek wodnych u téj rośliny odbywa się w zupełnie podobny sposób, jak u muchołówki, z tą tylko różnicą, że ostatnia chwyci owady lądowe, zaś Aldrowanda, jako roślina wodna, zwierzątka słodkowodne. Gruczołów ciecz trawiącą wydzielających nie poznano jeszcze u pęcherzycznika, Aldrovanda, lecz ta roślina wodna nie ma korzeni, przeto żywić się musi w inny sposób, jak każda roślina, a będąc przeznaczoną na żywienie się małymi zwierzątkami wodnymi jest przeto rośliną owadożerną, za pokarm zaś służą jej małe skorupiaczki (mikroskopowej wielkości), jak oczliki, Cyclops, nader liczne słodkowodne małżoraczki (grzębiki), Cypris, i 2 mm. duże wioselczaki, Daphnia, i prócz tych jeszcze inne małe wodne zwierzątka.

W podobny sposób, jak *Aldrovanda vesiculosa* L. żywią się obokrajowe pęcherzyczniki, jak *Aldrovanda verticillata* w Indyach Wschod. i *Aldrovanda australis*, w Australii rosnąca. Z pęcherzycznikiem *Aldrovanda*, kończą się rośliny owadożerce z rodz. *Droseraceae*, u których włosy naskórka roślinnego przez przyjęcie innej fizyologicznej czynności odpowiednio do nowego przeznaczenia zmodyfikowane zostały. W podobny sposób żywiące się rośliny, jak rosiczkowate, zawiera rodzina pływaczowatych, *Lentibulariaceae* Rich., które są roślinami zielnymi. Do tych należy tak zwany tłustosz pospolity,

***Pinguicula vulgaris* L.**

Tłustosz przychodzi dość często w Europie środkowej i północnej, po mokrych łąkach torfowych, miejscach źródlistych pomiędzy mchem,

po bagnach, a niekiedy i suchych miejscach, w równinach i górach (Alpy); u nas znaleziono go w okolicy Lwowa, Złoczowa i Brodów. Mała ta roślina ma krótkie, mało rozgałęzione korzonki i 6—9 blade lub żółto-zielonych listeczków odziomkowych w różyczkę ułożonych. Pośród nich wyrasta kilka cienkich czerwonych głąbików, które są 6—13 a nawet 20 cm. wysokie, o jednym 2 cm. długim, pochylonym, niebiesko-fioletowym do fiołka podobnym kwiatuszką, z koroną nieumiarowo dwuwargową ($\frac{2}{3}$) i w ostrogę zaopatrzoną.

Liście tej rośliny są grube, mięsiste, 2—5 cm. długie, a 8—24 mm. szerokie i eliptyczne. Brzegi blaszki liściowej są równe i nieco w górę wygięte, a górna powierzchnia liści jest w dotknięciu tłusta, jak gdyby była jakim tłuszczem posmarowaną, dlatego liście tłustosza odróżniają się od innych roślin, a nawet oko badacza na siebie zwracają. W Anglii uchodzą liście tej rośliny za szkodliwe dla owiec, w ogólności działają one przeczyszczająco, a w „Botanice szczegółnej“ Dra R. Czerwiakowskiego jest w opisie téjże rośliny na str. 1235 ustęp następujący: „Liście tej rośliny mają wytępniać owady trapiące człowieka“. Istotnie można znaleźć na nich małe owady nieżywe, nawet nasiona, ździebełka itp. rzeczy jakby poprzyklepiane, a nawet gęstym śluzem pokryte. Patrząc na powierzchnię górną liścia (przez szkło powiększające) zobaczymy, iż naskórek jego jest pokryty mnóstwem tarczowatych gruczołków i przeświecającymi lepkiemi włosami. Gruczołki na listku się znajdujące są niejednakowo wielkie, z tych większe są tkanką 16-tu komórek, mniejsze zaś 8-miu komórek, a wszystkie mają trzoneczki 1 i 2 komórkowe. Takich gruczołków naliczyć można na 1 cm. □ powierzchni listka około 25000, zatem na wszystkich 6—9 listkach będzie ich około 500—800 tysięcy. Gruczoły te wydzielają ciecz lepka i ciągnącą się, z której Darwin otrzymał nitkę 47·4 cm. długą.

Tak ukształtowane listki są wrażliwe na wpływy zewnętrzne, gdyż jak tylko jakie ciało obce na nie padnie, lub owad usiedzie, okażą się zaraz podobne objawy ruchu liści, jak u rosiczki, Drosera, bo te ciała wywierają na liściu pewne ciśnienie, więc téż mechaniczne podrażnienie. Wtedy brzegi listka poczną się zwolna podnosić i stopniowo zaginać, że owad w ciągu 2 $\frac{1}{2}$ godziny obejmą. Wówczas gruczoły wydzielają od tej chwili ciecz kwaśną, miękkie części ciała w gęstawy płyn zamieniającą, który następnie przez gruczoły wessany bywa.

To samo dzieje się, gdy na liściu małe kawałeczki mięsa lub ugotowanego białka albo włóknika (fibryny), sernika (kaseiny), mleka, węglanu amoniaku, nieco pyłku kwiatowego, nasionka itp. rzeczy położymy. Darwin kładł na listki tłustosza małe kawałeczki chrząstki owczej i spostrzegł,

że po 24 godzinach krawędzie listka były już zagięte, a po 32 godzinach ciątka te w płyn się już zamieniły i wessane zostały, bo po 48 godzinach brzegi listka się odgięły i z chrząstek nic nie pozostało, gruczoły zaś przedtem zielone ukazały się czerwono-brunatne. Zatem płyn komórek doznał pewnej zmiany wskutek wessania chrząstki w ciecz zamienioną. Nie tylko ciała zwierzątek bywają przez tę roślinę trawione, ale i części roślinne np. pyłek kwiatów, nasionka, ździebelka itp., przeto *Pinguicula* jest wszystkożerną, gdyż żywi się mięsem zwierzęcym, owadami i roślinkami. W podobny sposób żywią się inne gatunki z rodzaju *Pinguicula*, jak *Pinguicula grandiflora* Lam., *P. lusitanica*, *P. alpina* L. z białymi kwiatami i krótką ostrogą korony. *Pinguicula bicolor* przychodzi w okolicy Lwowa, jak Dr. Wołonzak podaje: In pratis turfosis ad pagum Podmanasterz in agro Leopolitano sat copiose, ma głąbik 20 cm. wysoki, kwiatuśki mniejsze niż *Pinguicula vulgaris* L., tylko z białymi wierzchołkami korony i ostrogę 5 mm. długą. *Pinguicula crystallina* Sibth. znalazł Th. v. Heldreich w lipcu r. 1879. w północnej Grecyi, w okolicy Doris na górze Korax, na wysokości 5500'—7000' (1738—2212 m.) nad poziom morza. Roślina ta ma białe kwiatuśki, a liście są jasno żółto zielone, tłuste i tworzą różyczkę. Przy pierwszym spojrzeniu zauważył na nich Heldreich wyraźne czarne plamy, lecz gdy się dokładniej im przypatrzył, zobaczył, że te plamy czarne od różnych a licznie nagromadzonych owadów pochodzą, zarazem spostrzegł, że te różne żyjątko były; na tych listeczkach tego tłustosza jak gdyby jakim lepem poprzyklejane. Znajdowały się tam drobne muszki, do 7 mm. długie sieciarki, pluskwiaki i małe chrząszczyki, po największej części kusaki (*Staphylini*), a ich ciała w różnym stopniu rozkładu. Jedne były mniej więcej strawione, podczas gdy ciała drugich były zupełnie nienaruszone, więc zapewne co dopiero złowione, bo brzegi liści były jeszcze pozawijane; zatem ta roślina jest również owadożerną, jak i inne gatunki z rodz. *Pinguicula*. Pod tym względem robił J. W. Clark doświadczenia z tłustoszem, *Pinguicula lusitanica*, które wykazały, że ta roślina owady trawi a materya rozkładowa dostaje się przez absorbeyę do tkanki liści i ich ogonków, w końcu zaś rozchodzi się po całej roślinie*).

Wszystkie dotąd przytoczone lub opisywane rośliny z rodziny *Droseraceae*, jakoteż i *Pinguicula* z rodziny *Lentibularieae* łowią i trawią owady zapomocą swych liści i na nich znajdujących się gruczołów cieczy trawiącą wydzielających. Są jeszcze inne rośliny owadożercze, u których

*) Journal of Botany. v. IV. N. 153. Septb. 1875. p. 268.

łowienie owadów w zupełnie inny sposób niż u poprzednich się odbywa. U takich roślin nie ma objawów ruchu liści wskutek wytworzonego podrażnienia przez ciała azotowe, lecz tu są liście w szczególniejsze narządy przekształcone, a których osobliwe urządzenie umożliwia włożenie w nie małych zwierzątek i przytrzymywanie ich w różny sposób, tak że się z nich wydobyć nie mogą. Tam giną te małe owady, ciało podlega rozkładowi, rozpływa się i służy tym roślinom za pożywienie. Takimi roślinami są: Pływacz, *Utricularia* z rodziny *Lentibulariaceae* Rich., dalej Dzbanechnik, *Nepenthes*, z rodziny *Nepentheae* Lindl., *Cephalotus* z rodziny *Cephaloteae* i Kapturniki: *Sarracenia*, *Darlingtonia* i *Heliamphora* z rodziny *Sarraceniaceae* Torrey.

***Utricularia vulgaris* L.**

Pływaczem pospolitym a u dawnych pisarzy krwawnikiem zwany, jest rośliną wód stojących Europy umiarkowanej i północnej, jakoteż Ameryki. Rośnie po trzęsawiskach, moczarach, rowach i bagnach torfowych, w równinach i okolicach nieco górzystych do wysokości 550 m.; jest rośliną wodną i pływającą a nie ma korzeni. Jój łodyżka jest wątlą, 2 $\frac{1}{2}$ —3 dm. wysoką, na której się ukazują od czerwca do sierpnia drobne ale okazałe kwiatuszki bezogonkowe w liczbie 3—10 ułożone w gronko. Korona jest złoto-żółta, pomarańczowo prążkowana i nieumiarowo dwuwargowa ($\frac{4}{3}$) z ostrogą. Na delikatnej łodyżce są drobne pierzastodzielne liście nitkowate, a w ich kątach małe, sprężyste, przejrzyste a wewnątrz próżne pęcherzyki wielkości grochu lub soczewicy. Roślina ta zanurzona jest w wodzie i w niej pływa, do czego służyć jój mają owe pęcherzyki, które dlatego dawni botanicy powietrznymi nazwali. Pęcherzyki te są u młodych w rozwoju będących roślin wypełnione wodą, ale gdy mają pływacze zakwitnąć, to one stają się próżne, napełniają się powietrzem i wtedy rośliny wynurzają swe łodyżki, iż te sterczą po nad powierzchnią wody, poczem zapylenie kwiatów się skutecznie.

Pęcherzyki te są przekształconymi wierzchołkami listeczków nitkowatych a służą nie tylko jój do pływania po wodach stojących, ale też i do innego celu. Jak nowe spostrzeżenia i badania budowy tych pęcherzyków wykazały, są one według Cohna nader ciekawie i w osobliwszy sposób urządzone łapki na drobne (mikroskopowej wielkości) rozmaite zwierzątka wód słodkich. Każdy pęcherzyk jest na krótkim trzoneczku, ma w górnej części otwór czworoboczny, którego brzeg ma dwa małe wyrostki a wieńczą go rozmaicie rozdzielone włoski i kuliste gruczołki. W górnej części otworu po obu stronach wyrostka górnego są dwie

widelkowate szczecinki, a w dolnej części cztery pojedyncze włoski. Każdy pęcherzyk zamyka się od wewnątrz delikatnym niebieskawym i ruchomym wieczkiem, jakby jaką klapą z góry na dół od środka otworu przymykającą. Wieczko to przylega szczelnie do brzegów i dolnego wyrostka pęcherzyka wskutek pewnej sprężystości jego tkanki, lecz przy najmniejszym naciśnięciu otwiera się na wewnątrz podczas gdy na zewnątrz wydzwignąć się nie da, gdyż opiera się o dolny wyrostek. Wskutek tak umieszczonego wieczka od wewnątrz otworu pęcherzyka jest między brzegiem otworu a wieczkiem przedsionek, a wewnątrz za wieczkiem komora, której ściany są wysłane 2 i 4 ramiennymi włoskami, tylko nie ma tu gruczołów. Ponieważ *Utricularia* tak samo jak *Aldrovanda* jest bez korzeni i pływa po wodzie, tedy według Cohna zapatrywania musi mieć ta roślina pewne narządy do przyjmowania pokarmów potrzebne, a takimi przyrządami są owe pęcherzyczki. To przypuszczenie Cohna okazało się uzasadnionym, bo przekonał się on, że w pęcherzykach tej rośliny znajdują się często wodne zwierzątka, które po kilkudniowym pobycie giną, a ciało ich podlega potem rozkładowi. Wskutek tego poczytywał je Cohn i inni za nader trafnie ukształtowane łapki na maluchne zwierzątka słodkowodne, które istoty tej roślinie za pokarm służą. Rzeczywiście można dość często znaleźć w tychże pęcherzykach żywe zwierzątka wodne (raczki słodkowodne) lub trupy i ich szkielety, a w te łapki dostają się te drobne żyjątka w pojedynczy sposób. Za najłżejszym naciśnięciem na to ruchome wieczko popycha je zwierzątko wodne przed sobą do środka i w ten sposób otwiera sobie drogę do wnętrza pęcherzyka, gdzie też wchodzi. W tém klapa sprężysta zamyka sama otwór, a zwierzę już więcej na zewnątrz wydostać się nie może, bo okaże się niemożliwość ucieczki z tego dobrowolnego więzienia, choćby zwierzątko przypadkiem na to wieczko nacisnęło, które do brzegów otworu przylega, a prócz tego szczecinki zewnętrzne niedozwalają najmniejszym żyjątkom wydostać się na zewnątrz. Tak ujęte zwierzątka pływają dzień lub dwa, w końcu po pewnym czasie dla braku pożywienia i powietrza tracą tam życie, ciało ich podlega wkrótce rozkładowi, miękkie części rozpływają się w wodzie, a materya ta bywa przez 4 ramienne włosy wessana*).

Delphino Federico z Chiavari w Ligurii, profesor botaniki w Genui, znalazł w r. 1868 w pęcherzykach pływacza, *Utricularia*, wodne skorupiaczki i zauważył, że się w nie wciskają drobne (do 2 mm. wielkie) na-

*) *Botanische Zeitschrift*. 1881. str. 362.

gie raczki jak plesznice czyli wioselczaki (np. *Daphnia*), które żyją krociami po stawach i bagnach.

Cohn włożył raz taką roślinkę do wody, w której było wiele oczlików (*Cyclops*) i innych zwierzątek wodnych, a następnego dnia zrana znalazł wszystkie pęcherzyki tej rośliny wypełnione temiż wodnemi żyjątkami, z których niektóre przez 5—6 dni przy życiu były.

G. E. Simms w Oxfordzie zrobił bardzo ciekawe odkrycie, że *Utricularia vulgaris* L. w swych pęcherzykach nawet co dopiero wylęgłe rybki łowi i ich życia pozbawia. Trzymał on tę roślinę w wodzie, w której pływały drobne rybki, które się u niego w domu z ikry wylęgły. Wiele z tych znalazł on w otworach pęcherzyków, a niektóre były nawet już nieżywe. Dał on H. N. Moseley'owi okaz tej rośliny w naczyniu szklaném napełnioném wodą celem dalszego badania tego zjawiska. Moseley trzymał świeże te rośliny w naczyniu pełném wody, a w niej maluchne rybki i ikrę, z której narybek wydobywać się począł. W krótkim czasie, bo może po 6-ciu godzinach, znalazł on więcej niż tuzin tych rybek w pęcherzykach tychże roślin, tylko nie natrafił na porę, w której to łowienie się odbywało. Rybki były w większej części za główkę ujęte, która tak głęboko w pęcherzykach tkwiła, że koniec pyszczka dotykał się tylniej ścianki, oba zaś czarne oczka tych zwierzątek można było zobaczyć przez przejrzyste ścianki pęcherzyków. Mało rybek było ujętych za sam ich pyszczek, a jeszcze mniej za płetewkę ogonową, zaś w 3-ch czy 4-ch przypadkach tkwiła rybka główką w jednym pęcherzyku, a ogonkiem w sąsiednim, a jej ciało łączyło oba te pęcherzyki. Moseley odcinał pęcherzyki z pochwyconą rybką, badał ich zawartość i znalazł w nich ciała rybek już w rozkładzie, zamienione w ciecz mniej więcej śluzowatą, a 4-ro ramienne włoski wnętrza pęcherzyków tkwiły w tej kleistej pół płynnej materii zwierzęcej i zdawały się zawierać substancję ziarnistą, jaką prawdopodobnie wessały. W taki sposób przekonał się Moseley, że *Utricularia* nie tylko owady wodne, ale i drobnouchne kręgowce wodne (narybek) i inne zwierzątka łowi i trawi, bo znalazł on także w cieczy tych pęcherzyków tłumy wymoczków*). Na podstawie tychże spostrzeżeń uważana jest *Utricularia vulgaris* L. za roślinę owado- i mięsożerną, bo łowi ona narybek i inne drobne zwierzątka słodkowodne, jak wioselczaki (mikroskopowe raczki), których ciało po złowieniu podlega rozkładowi i bywa potem wessane.

*) Naturforscher XVII. 1884. N. 29. str. 276 i Nature. V. XXX. 1884 p. 81.

Do rodz. *Utricularia* należy wiele gatunków również owadożerczych. Z tych *Utricularia minor* L. ma wzrost mniejszy niż *Utricularia vulgaris*, a jęj kwiatuszki są także mniejsze i ostroga krótsza, pylniki zaś zrosłe; jest to rzadka roślina i rośnie po rowach łąk. *Utricularia intermedia* Hayne, którą Bracht we Franzensbad znajdował, ma liście widlaste w dwóch szeregach ułożone a pęcherzyki barwy ciemnej. W kwiatuśkach są pęciki wolne a ostroga cztery razy dłuższa od dolnej wargi korony. *Utricularia ochroleuca* Hartm., przez G. Brücknera nazwana *U. macroptera*, ma pęcherzyki jaśniejsze a ostrogę krótszą. Znajduje się ona u nas, a według Aschersona rośnie w Szwecyi, Norwegii i w Niemczech po wodach stojących. *Utricularia neglecta* Lehm. ma grono dużych kwiatów (4–8). *Utricularia brevicornis* sp. n. (*U. indermedia* Koch. „Flora 1847“) jest znacznie mniejszą rośliną w porównaniu z *Utricularia intermedia* Hayne., pęcherzyki i kwiaty ma dwa razy mniejsze niż *U. intermedia* Hayne. *U. brevicornis* miano za odmianę gatunku *U. intermedia* Hayne, lecz porównanie jęj z *U. intermedia* wykazało typową ich różnicę. Nazwa *brevicornis* pochodzi od krótszej ostrogi niż ostroga *U. intermedia*. *U. brevicornis* przychodzi w Czechach, pod Frankfurtem nad Odrą, Palatynacie (nadreńskim Koch) i Łużycach (*Lusatia superior*, Burkhardt.*). Wreszcie należy jeszcze: *Utricularia nelumbifolia* Lehm., którą znalazł Gardner w Ameryce, na górach zwanych „Orgelgebirge bei Rio“ jakoteż *Utricularia Bremii* Heer. i *U. spectabilis* Madauss.

W podobny sposób żywią się inne zagraniczne rośliny do rodz. *Utricularia* należące, mianowicie *Polypompholyx multifida* Lehm. i *tenella* z zachodniej Australii, *Genlisea* St. Hil. z gór Ameryki z gatunkami: *aurea*, *ornata* i *filiformis* (z Brazylii), i *africana* z południowej Afryki. U tych roślin są pęcherzyki nader szczególnej budowy i zawierają dwa szeregi gruczołów. —

Prócz roślin dotąd opisywanych i przytaczanych są jeszcze inne owadożerczemi, których liście mają utwory kształtu kubków. W nich zbiera się czysta ciecz bez smaku lub nieco kwaskowata, w której toną owady, a substancye z rozkładu ich ciał powstałe bywają przez roślinę wessane; więc one żywią się padliną. Takie rośliny rosną w okolicach błotnistych Azji międzyzwrotnikowej, Indyj wschodnich, Ceylonu, wysp oceanu Indyjskiego i Malajskiego Archipelagu, więc po wyspach Sundajskich (Borneo, Sumatra etc.), Filipinach, w Nowej Guinei i północnej Australii,

* Botanische Zeitschrift XXXVII. 1887. str. 117—121.

Nowej Kaledonii, po wyspach Seyschelskich i na wyspie Madagaskar. Rośliny te należą do rodzin: *Nepentheae* Lindl, i *Sarraceniaceae* Torr.

Dzbanecznikowate, *Nepentheae*, obejmują 1 rodzaj: *Nepenthes* z 30 gatunkami, prócz wielu odmian, a jednym z tych jest tak zwany dzbanecznik właściwy, dawniej znany pod nazwą: Koneweczka lub Łagiewnica

***Nepenthes destillatoria* L.**

Roślina to bagnista znana była jeszcze za czasów Lineusza, jest krzewem trwałym, a z jej bulwiasto nabrzmiałego kłębu (kłącza) wyrasta 2—3 m. długa łodyga węzłowa, grubości palca, uwieńczona gronem drobnych nieco zielonawych kwiatuszków. Z węzłów łodygi wyrastają liście naprzemianległe, skórzaste, podłużnie eliptyczne, 20—25 cm. długie, których żeberko główne przedłuża się w wąs. Ten wygina się esowato i przekształca w utwór dzbanuszkowaty, do urny podobny, 10—15 cm. długi przykryty wieczkiem, które jest blaszką liścia. Dzbanuszek ten jest ciawo zielony, miejscami czerwony, a wewnątrz czerwono prążkowany. W dolnej części jest on pokryty włoskami i licznymi czerwonymi gruczołkami, których Hooker na powierzchni 1''□ = 7 cm.□ 3000 naliczył, a w górze, poniżej brzegu, jest ściana wewnętrzna dzbanuszka tego gładką. Pierścieniowaty otwór ma 2½ cm. w średnicy, brzeg sam jest nabrzmiały i wysłany licznymi gruczołami jaskrawo ubarwionymi. Przykrywające go wieczko ma wyrostek kształtu ostrogi, jest ono ruchome, pstro użytkowane, a spód jego jest zasiany gruczołami, które ciecz wydzielają. Gruczołki na brzegu otworu umieszczone wydzielają ciecz słodką, owady nęcącą, w dolnej zaś połowie dzbanuszka się znajdujące wydzielają ciecz czystą i kwaśną, która się tam zbiera, ilość zaś tej cieczy ma być tak znaczną, że dla spragnionego człowieka 10 dzbanuszków ma wystarczyć do chwilowego zaspokojenia pragnienia. „W Botanice szczególnej Dra R. Czerwiakowskiego w opisie dzbanecznika jest następujący ustęp: „Ciekawa to roślina i nader obchodząca badaczy przyrody swym narządem wydzielnicznym. Wysoko cenioną bywa od podróżujących a nawet i od krajowców, gdyż ciecz jej z dzbanuszków ożywia i wzmacnia znużonych drogą i wpływem podniebia.“ Nawet okazy w cieplarniach pielęgnowane wydzielają ową ciecz z gruczołów swych dzbanuszków, która się w nich w dostatecznej ilości nagromadza a nie paruje, ich bowiem wieczka przylegają zwykle szczelnie do brzegów otworu tego zbiornika.

Czysta ta ciecz, a przezroczysta jak woda źródłana, dała powód, że tej osobliwej roślinie dano nazwę *Nepenthes*. Wyraz ten pochodzi z greckiego *νηπενθηός, ές*; składa się z *νή*, nie i *πένηθος, εος, τὸ*, troska, smutek,

i znaczy uśmierzający, ca, ce, smutek, boleść, zmartwienie; zaś *νηπενθές* *φάρμακον*, τὸ, ma oznaczać egipski środek czarodziejski, który dany do wina po wypiciu go troski i smutek usuwa. Według Homera (Odyssea IV. 220—221.) podawała Helena taki napój umysł uspakajający swemu mężowi.

Ciecz ta, która się w dzbanuszkach tej rośliny wydziela i nagromadza jest bez smaku lub nieco kwaskawa, a w niej to znajdują się dość licznie nieżywe owady, które ciecz słodka przez te liczne gruczoły wydzielana im drogę do środka dzbanuszka wskazała, które następnie przekroczyły brzeg otworu, a po gładkiej ścianie idąc na dno dzbanuszkowatego zbiornika wpadły i w cieczy tam obficie nagromadzonej się utopiły. Wydzielina ta ma mieć według Hookera własność trawienia miękkich części ciała owadów, z doświadczeń zaś okazało się, że ona rozpuszcza nie tylko ciała owadów, ale nawet surowe mięso, gotowane białko i tym podobne materje azotowe, uchodzi przeto za ciecz owady i inne zwierzątka trawiącą.

Roślinami w ten sposób się żywiącemi a należącemi do rodzaju *Nepenthes* są inne gatunki uwagi godne, z których niektóre przytoczę.

Nepenthes Phyllamphora Willd. bywa niekiedy hodowaną w cieplarniach a ma zielono-żółte dzbanuszki 20 cm. długie. *Nepenthes Rajah* ma bardzo duże dzbanuszki, gdyż te są 3—3 $\frac{1}{3}$ dm. długie, podczas gdy na Borneo rosnące te rośliny mają dzbanuszkowato rozwinięte liście nawet $\frac{1}{2}$ mtr. długości. *Nepenthes Rafflesiana* Jacq. jest bujniejszą rośliną niż *N. destillatoria* L., jej zaś dzbanuszki są 2—3 dm. długie, a 4—6 cm. szerokie. *Nepenthes madagascariensis* Poir. ma według Bréon'a dzbanuszki w nocy wieczkiem zupełnie przykryte, które tak silnie do brzegów otworu przylega, że trzeba użyć pewnej siły, by je podźwignąć. Wieczko to podnosi się z rana i ciecz przez dzień paruje, a w ciągu nocy znowu się ona wydziela. W jednym dzbanuszku ma się tej cieczy do 7 łutów czyli 122 $\frac{1}{2}$ gram. nazbierać, a ma być tak świeża, że ją Bréon często pijał, by pragnienie ugasić. Te i inne gatunki z rodz. *Nepenthes* są roślinami owadożerczemi, jak to doświadczenia w tym względzie czynione wykazały. Na wzór doświadczeń Reessa i Willa, które dla poznania trawiącego fermentu cieczy przez rosziczkę wydzielanej ci uczeni robili, badał także Gorup-Besanez ciecz dzbanecznika *Nepenthes Phyllamphora* Willd., jakoteż *N. gracilis*; to samo czynił S. H. Vines z wydzieliną dzbanuszków rośliny *Nepenthes hybrida* i *N. gracilis*, a gdy do tej cieczy dodano alkoholu i gliceryny okazał się wynik takiż sam jak w doświadczeniach Reessa i Willa, włóknik bowiem czyli fibryna rozpuścił się zupełnie*).

*) Naturforscher VIII. 1875. str. 471 i IX. 1876. str. 326.

Dzbaneczniki, *Nepenthes*, można hodować w wilgotnych cieplarniach podobnie jak storczyki. Rośliny zasiane w ziemi, zawierającej próchnicę (humus) oraz domieszkę piasku i gliny kruchej a wolnej tylko od wapna, potrzebują ciepłoty 20° R. = 25° C., które po 2 miesiącach się rozsada, kloszem nakrywa i w półcienistym miejscu stawia. W lecie wstawia się wazony w talerzyki wodą napełnione, którą często zmieniać należy a w zimie są niepotrzebne te podstawki z wodą. Rośliny te potrzebują różnej ciepłoty, bo w porze letniej 20° — 25° R. (25 — $31\frac{1}{4}^{\circ}$ C.), w zimie zaś 12 — 15° R. (15 — $18\frac{3}{4}^{\circ}$ C.), by się należycie rozwinąć mogły.

Liście dzbanuszkowato rozwinięte ma roślina z bagien południowo-zachodniego końca Australii pochodząca, której nazwa botaniczna jest

***Cephalotus follicularis*. Labill.**

Z jej kłębu (kłącza) wyrastają liście odziomkowe w liczbie 12—20, z tych jedne są płaskie, lancetowate lub łopatkowate, drugie zaś tworzą niskie dzbanuszki wieczkiem nakryte. Dzbanuszki te są kształtu naparstka, na zewnętrznej ich powierzchni znajdują się 3 pary wąskich a długich błoniastych wyrostków kształtu skrzydełek na brzegu orzęsionych; są one umieszczone z góry na dół wzdłuż dzbanuszków i tworzą trzy rynienki. Spód wieczka ma grube i szerokie pręgi, oraz jaskrawe plamy, brzeg zaś dzbanuszka jest nabrzmiąły i również ma po sobie poprzeczne pręgi, jakoteż kolce do środka otworu skierowane. Dzbanuszki są w środku gładkie i tylko w połowie wnętrza mają liczne brodaweczki, które są gruczołkami kwaśną cieczą wydzielającymi. Jak tylko owad na brzegu dzbanuszka usiedzie a następnie do środka wejdzie, wieczko zaraz przy- myka otwór, a na brzegu znajdujące się kolce, które są do wnętrza dzbanuszka pochylone, nie stawiają przeszkody zwierzątku, w zamierzonym zaś odwróceniu wstrzymują je na dół dzbanuszka sterczące kolce, a tak ucieczka jest niemożliwą. Z tego powodu dalej ono krocząc natrafia na cieczą, w której ostatecznie tonie, a ta w dzbanuszku wydzielona cieczą kwaśną rozpuszcza to ciało zwierzęce (azotowe), więc je trawi; cieczą ta nagromadza się tam w znacznej ilości, gdyż Robert Brown znalazł te dzbanuszki do połowy tą cieczą napełnione, w niej zaś wielką ilość potopionych owadów.

Rośliny te można w domu pielęgnować w sposób podobny jak mucholówkę, *Dionaea*.

Trzecią rodziną obejmującą rośliny owadożercze są rośliny *Sarraceniaceae* Torrey, do której są zaliczone 3 rodzaje, a 8 gatunków, mianowicie rodzaj *Sarracenia* z 6-ma gatunkami, jakoteż rodz. *Darlingtonia*

i rodz. *Heliamphora* o 1 gatunku. Rośliny z rodz. *Sarracenia* rosną wzdłuż wybrzeża Stanów Zjednoczonych od strony Atlantyku, głównie zaś na południu Wirginii, a jeden tylko gatunek znajduje się w okolicach ku północy położonych aż do Nowej Fundlandyi, oraz w zachodnich krainach aż do Michigan. Bagniste miejscowości Ameryki północnej począwszy od ujścia rzeki Missisipi aż po Kanadę miłe wprawdzie sprawiają dla oka wrażenie, kobierzec bowiem mchu i innych roślin pokrywa tu uroczę okolice. Kraj ten bagnisty jest prawie bezdrzewny a obfity w trawiaste sawanny, zwane tu „flat woods, lub low pine barrens“, a tylko w skromnej liczbie są tu krzewy i drzewa. Tu rosną bujnie wspaniałe rośliny, do których spieszy znużony wędrownik, by na tym kobiercu po trudach odpocząć, lecz doznaje on przykrego złudzenia na tym gruncie chwiejnym, bo zamiast suchej ziemi napotyka tu podróżny nieraz bagno tylko przystrojone w przeróżne ozdobne rośliny. Pośród widłaków: *Lycopodium alepecuroides*, *L. Carolinianum* i *L. inundatum* ver. *pinnatum*, jako też darnin torfowca (*Sphagnum*) spostrzedz tu można różne rosiczki (rośniki), jak *Drosera brevifolia*, *D. filiformis* itp., oraz rośliny z rodziny kapturkowatych, *Sarraceniaceae* Torrey., a z tych odznacza się świetnie ubarwionym kwiatem uwagi godna roślina, tak zwany Kapturzik szkarłatny,

***Sarracenia purpurea* L.**

Roślinę tę przywiózł z Quebecku do Paryża Dr. Sarracin w końcu 17-go stulecia, a Lineusz nadał jej na cześć tego lekarza i przyrodnika nazwę utworzoną z jego nazwiska, a tą jest *Sarracenia* L. Trwała ta roślina wydaje z kłębu (kłącza) mnóstwo liści $1\frac{1}{2}$ dm. długich a z pomiędzy nich 3-16 dm. wysoki głąbek o jednym wierzchołkowym a zwiśłym kwiatku barwy ciemno-szkarłatnej. Ogonki liści są na kształt rogu obfitości lejkowato wydęte i rozszerzają się ku swęj podstawie. Lejki są jabłkowo zielone i pokryte gęstą siatką szkarłatnych żyłek, a ich otwór przykrywa blaszka liścia tworząc nerkowato-sercowate wieczko o bocznych skrzydełkach w kształcie kapturka, który jest u jednych gatunków płaski, a u innych, jak u *Sarracenia violaria*, po nad sam otwór kubka lejkowatego tak wygięty, że go zupełnie przykrywa, w skutek czego krople deszczu choćby wiatrem niesione do środka lejka wpaść nie mogą. Kapturek ten jest u *Sarracenia purpurea* L. brunatno czerwono plamisty a u *S. Leucophylla* Rafin. z Louiziany jest on orzęsiony. Lejkowaty ten utwór jest po stronie wewnętrznej włoskami gruczołkowatemi pokryty, które w głąb lejka są skierowane i tak ułożone, że tworzą rodzaj rowka u góry szerszego ku dołowi zaś się zwężającego. Brzeg otworu lejka okala

1 cm. szeroki wieniec szczecinkowatych włosków, których gruczołki ciecz słodką i tak silnie wonną wydzielają, że jest ponętą dla owadów w pobliżu tych roślin latających. To też owady te bywają tą piękną barwą kwiatu i kubków lejkowatych jakoteż wonią tej słodczy zwabiane i gdy na boczne płatki kapturka usiądą, w otwór lejka zagładną, to do jego wnętrza z łatwością się dostają, a gdy przekroczą one wieniec rzęsów otwór lejka okalających, tedy odwrót dla nich jest niemożliwy, bo na dół pochyłe włoski już wrócić się im nie dozwolą. A zatem zmuszone są owady iść po gładkich ścianach, a uczyniwszy to wpadają na dno lejka, którego dolną połowę wypełnia ciecz z gruczołów wydzielona i w niej się topią. Tu ulega ich ciało rozkładowi, a rozpuszczalne części ciała służą roślinie za pokarm, z tego też powodu *Sarracenia* policzoną jest do roślin owadożer-nych. Do tychże kubków ciśnie się tyle owadów, że według opowiadań przyrodników ptaki owadami się żywiące ze szczególném upodobaniem te rośliny odszukują, wieczka podnoszą i w lejkach swój pokarm w obfitości znajdują. Roślinę tę znają w Wirginii, Karolinie Louizianie, Alabamie i t. d. pod nazwą: „Pitscher Plants lub Fly Traps.“

Inne gatunki kapturnika są: *Sarracenia flava* L., *Drummondi* Hook, *rubra* Walt., *psittacina* Mx., *leucophylla* Rafin, *variolaria* Mx., a u wszystkich jest ogonek liścia podobnie lejkowato wydęty i kapturkiem przykryty. Lejek ten jest u jednych gatunków prostym i ma otwór mniej więcej otwarty, a u innych, jak u *Sarracenia variolaris* Mx., zakrzywiony, brzegi zaś skrzydeł kapturka wydzielają ciecz, która jest dla tej rośliny nader pożyteczną w czasie łowienia owadów, jak to Dr. Melichamps wykazał. *Sarracenia Drummondi* Hook, jest również rośliną bagnistą z północnej Ameryki, wyrasta ona do 35 cm. wysokości, a jej workowato wydęte ogonki purpurowe nakryte są blaszką liścia w wieczko przekształconą i wypełniają się do połowy czystym płynem z gruczołów wydzielonym, w którym jest zawsze mnóstwo utopionych owadów. Lineusz mniemał, że dzbanuszki kapturników przechowują wodę dla spragnionych ptaków podczas gdy obecnie uczeni są innego zdania.

Dla tej szczególniejszej budowy liści, pięknych i wspaniale ubarwionych kwiatów kapturnika, *Sarracenia*, jakoteż dla tego szczególnego sposobu żywienia się rozkładowemi częściami ciała owadów, pielęgnują ogrodnicy te rośliny od lat kilku, a przez sztuczne zapyłanie ich otrzymali liczne odmiany kapturników, które się nawet pięknnością i przepychem barw od dziko rosnących odznaczają. Sposób pielęgnowania i rozmnażania kapturników jest taki sam jak u muchołówki, *Dionaea*.

Do rodziny kapturkowatych, Sarraceniaceae należy prócz Sarracenia także *Darlingtonia Torr.* rosnąca w Kalifornii, dla tego nazwano ją

***Darlingtonia californica* W. M. Derby.**

Roślinę tę odkrył M. Brackenridge, członek ekspedycji Wilke'go w r. 1842, następnie otrzymał W. M. Canby w r. 1851 okazy kwitnące od Dra Torrey'a, a w tymże samym roku znalazł ją Dr. Hülse na moczarach kalifornijskich. *Darlingtonia* znajduje się na niektórych bagnistych miejscowościach pośród gór Kalifornii, przedewszystkiem zaś w Sierra Nevada, na wysokości 2000—2300 m. poniżej lodowców, na Mte Shasta. J. G. Lemmon mieszkając w północnej Kalifornii często miał sposobność widywać te rośliny w owych okolicach, a botanizując w tych stronach natrafił na miejsce, w którym tak silna woń się rozszerzała, że ją zdala poczuł. Po dokładnem rozpatrzeniu się odkrył jój źródło; oto znalazł grupę tychże roślin, ich zaś liście były pełne owadów i nieco pochylane prawdopodobnie w skutek znacznej ilości tych zwierzątek, które w płynie w tych kubkach nagromadzonym się potopiły. Przesłał on też W. M. Canby'emu świeże okazy téj rośliny wspominając zarazem, że to roślina owadożerna i że ją nazywają łapką na owady.

Darlingtonia ma liście odziomkowe 3 dm. długie, a pośród nich wznoszą się 6—12 dm. wysokie głąbiki z pochyłonymi kwiatami purpurowymi. Ogonek liściowy 8 dm. długi a do 2½ cm. szeroki przekształca się w rurkę, która się około swój osi o 180° skręca i zagina, wskutek czego jój otwór, 1-3 cm. w średnicy szeroki, zbliża się do podłoża téjże rośliny. Cała ta rurka jest subtelnie zielono użyłkowana i ma po sobie pół przezroczyste plamy żółtawe, przez które się światło do środka rurki dostaje. Otwór téj rurki przykrywa wypukły, błoniasty i również przezroczysty kapturek, a jest on innego kształtu niż u kapturnika, *Sarracenia*, albowiem u swój podstawy jest on wąski, potem nagle się rozszerza, dzieli na 2 boczne lancetowate skrzydełka, i tak przybiera kształt rybiego lub jaskółczego ogona. Wierzchołki tych dwóch skrzydełek zakrzywiają się nieco na wewnątrz i tak zgiętą rurkę przykrywają od dołu, że ani krople deszczu, ani woda bagien do środka téj rurki się nie dostanie. Kapturek ten jest plamisty, barwa jego przechodzi z zielonej w ciemnobrunatną lub czerwoną, na jego brzegu są maluchne brunatne gruczołki, które wydzielają ciecz słodką będąca pojętą na owady, a między temi gruczołkami są kuliste, jasno ubarwione wyniosłości, które są prawdopodobnie także jakimiś gruczołkami a może ciecz wydzielającymi. Wnętrze tego kapturka wyścielają dosyć długie szczeciny, sterzące ku

otworowi rurki, podczas gdy górne brzegi obu jego płatków są w całej prawie długości na 2·6—6·6 mm. zagięte, a te dwa fałdy tworzą rowek, który od zewnątrz ku otworowi rurki się rozszerza i schodzi się z fałdem podobnym na brzegu rurki i naprzeciwko niego się znajdującym. Fałd ten jest znacznie szerszy i więcej rozwinięty, niż kapturka, w miejscu zaś zetknięcia się tych fałdów jest błoniaste skrzydełko, prawie 6½ mm. szerokie, które się począwszy od otworu rurki aż do środka téjże z wolna rozszerza a następnie się dzieli na dwa podobne skrzydełka, które tworzą rowek. Pośród tych są małe brunatne szczeciny gruczołkami uwieńczone a między nimi znajdują się kuliste jasno ubarwione gruczoły. W taki więc sposób cała wewnętrzna powierzchnia téj rurki zasiana jest maluchnymi gruczołkami ciecz wydzielającymi, której spód napełnia się czystym płynem do wysokości kilku lub kilkunastu centymetrów i tak wiele, że S. G. Lemmon z dwóch rurek 1 uncję (3½ Dg.) téj cieczy otrzymał; w niej znajdował on mnóstwo utopionych owadów, jako téż resztki ich ciał. Owady te zwabiają jasno ubarwione rurki jakoteż ciecz w nich wydzielana, jak się Lemmon o tem przekonał, albowiem raz niosąc Darlingtonie, aby je mógł w domu pielegnować, tłumy owadów osowatych wciskały się do środka rurek tych roślin, tak że te zwierzątka często z nich strącać musiał, a nawet same rurki rozcinać, by te osy uwolnić lub z nagromadzonej cieczy mógł je wydobyć.

Prof. Riley znajdował w rurkach téj rośliny same skrzydlate owady, które w locie przez jasno ubarwione kapturki, pstre gruczołki i słodki przez nie wydzielany płyn zwabione na jednym z tych dwóch płatków kapturka siadają, do otworu rurki zagładają i w jej środek wchodzą, albowiem owa rynienka przez fałdy kapturka utworzona i liczne grube szczeciny w górę rurki skierowane tam je prowadziły. Jak tylko te owady do środka rurki wejdą i nieco w górę postąpią, odwrót dla nich okaże się niemożliwym, natrafia bowiem na szczeciny, które im ucieczkę uniemożliwiają. Drugą przeszkodą w zamierzonym odwrocie są owe półprzeźroczyste plamy żółte, które, jak Dr. Melichamps się trafnie wyraża, jakby jakie okienka (areolae) w przeciwnym kierunku od otworu rurki światło przepuszczają i tam znajdujące się owady w błąd wprowadzają. Przez te to okienka dostaje się więcej światła do środka rurek, niż przez sam ich otwór nakryty kapturkiem, ponieważ zaś te w tylnej części rurki się znajdują, przeto owady dążące do miejsca jaśniej oświetlonego dostają się na jej spód, gdzie w cieczy toną. Wreszcie trzecią przeszkodą w ucieczce owadów jest skręcenie rurki około osi o kąt 180°, które u Darlingtonii charakterystyczną jest własnością, a dodać tu muszę, że liście jednéj i téj

samą rośliną są wszystkie nietylko o kąt 180°, ale też i w jedną tylko stronę skrócone, podczas gdy u innych okazów w odwrotnym kierunku to skrócenie nastąpiło; w ogólności te rurki są najczęściej w prawo niż w lewo skrócone*).

W taki więc sposób bywa owad przez pstry kapturek i jego gruczoły, oraz słodką i wonną ciecz zwabiony, wzdłuż rynienki kapturek do otworu rurki poprowadzony i przez małe szczeciny do środka rurki skierowane, wewnętrzny fałd i błoniaste skrzydełko do kroczenia w tymże kierunku wewnątrz rurki zniewolony, a następnie przez przeświecające plamy żółte (okienka) i światło przez nie przepuszczone, jakoteż szczeciny w dolnej połowie rurki w zamierzonej ucieczce powstrzymany. Wskutek tego dostaje się on nareszcie na dół rurki, gdzie w cieczy na kilka lub kilkanaście centymetrów tam nagromadzonej tonie, jego ciało podlega rozkładowi, a miękkie jego części w ciecz się zamieniają, którą ściany rurki za pomocą gruczołków wessawczy zużywają.

Dzbanuszkowato wydęte ogonki liści są u *Heliamphora* Bent., rośliny należącej do rodz. *Sarraceniaceae* Torrey, które jej służą do łowienia owadów, celem zużycia ich ciała, a dzbanuszki tej rośliny mają dwa oddzielnie wykształcone skrzydełko kapturek, które u podstawy zaledwo się stykają. Roślinę tę owadożerczą odkrył Richard Schomburgk w górach Roraima, w bagnie gór wysokich, a można ją znaleźć na jednym pasmie Kordyllierów, w Wenezueli, Brytylskiej Guayanie.

Wszystkie tu opisywane lub tylko przytoczone rośliny używają wprawdzie do budowy ich organizmu tak węgla czerpanego za pomocą zielonych liści z kwasu węglowego powietrza jako też różnych soli gleby w kształcie rozczynów, a zatem pokarmów nieorganicznych, pobieranych z ich podłoża za pomocą korzeni, lecz prócz tego sposobu żywienia się wszystkim roślinom wspólnego mają one jeszcze, jak wykazano, zdolność żywienia się materią zwierzęcą, więc pokarmem organicznym, azot zawierającym; przeto nazwano te rośliny, jak wiadomo, owado- lub mięsożernymi. Zjawisko to wyjątkowe w świecie roślinnym zostało wprawdzie poznane i przez liczne doświadczenia stwierdzone, lecz zachodzi tu nareszcie jeszcze pytanie, dlaczego to łowienie owadów i ich trawienie jest częstym zjawiskiem u roślin z wód stojących, bagnisk i trzęsawisk? Na

*) *Botanische Zeitung*. 1875. str. 287—293.

to byłaby krótka odpowiedź mianowicie, że miejsca pobytu takich roślin są po części ubogie w azotowe składniki, a których rośliny podczas dojrzewania owocu potrzebują.

Analogiczny sposób żywienia się roślin, ze względu na wyżej opisany, mamy prócz grzybów u roślin w humusie rosnących, u tak zwanych pasożytów, jak u: Łuskiewnika, *Lathraea squamaria* L., Zarazy (przytuliovej) *Orobanche* L., Korzeniówki, *Monotropa Hypopitys* L., dalej u niektórych storczykowatych i u *Rafflesyi*, której kielkujące nasiona wnikają w korzeń żywiciela, w nim się rośliny rozrastają i z niego czerpią pokarm gotowy, a tylko w czasie kwitnienia po nad powierzchnię podłoża się wydobywają. Rośliny te czerpią wprawdzie i zużywają organiczne połączenia, one pasożytują, lecz nie są roślinami owadożerczami, jakkolwiek niektórzy uczeni roślinie *Lathraea squamaria* L. następnie dwom roślinom zieleń w swych komórkach zawierającym tj. *Bartsia alpina* i *Parnassia palustris* L. sposób żywienia się ciałem zwierzęcym przypisują, przeto przytoczę jeszcze zdania tych przyrodników o tych trzech roślinach i przypisywanym im sposobie żywienia się.

Budowę łuskiewnika skreślił F. Cohn w swym odczycie na siódmém zgromadzeniu botanicznej sekcji szląskiego Towarzystwa Kultury krajowej.

Lathraea jest rośliną bezzieleniową, więc pasożytem; ję lodyga wyrasta z rozgałęzionego kłębu (kłacza), który jest okryty grubemi, mięsistemi a bezbarwnemi łuskami, na końcu zaś ma cienki korzonek w korzenie leszczyny się zapuszczający. Mięsiste te łuski mają według Bowmanna i Stenzla osobliwszą budowę, przedstawiają się bowiem jako układ jam i kanalików, które się rozgałęziając promienisto są rozłożone i na zewnętrznej powierzchni łusek jamkami się kończą. Łuski te pokryte są na swęj powierzchni licznemi gruczołami rozmaitej wielkości, zresztą ich budowa jest taką samą jak u roślin *Aldrowanda* i *Dionaea*, owe zaś jamki wypełnia ciecz, którą za wydzielinę tych licznych gruczołów uważają.

Tak ukształtowane łuski są według Cohna łapkami na drobniuchne żyjątka, jak nicienie (*Nematodes*) i niektóre pierścienice (*Annelides*), które się w te jamy wciskają, z powodu tęg wydzielinę życie tam utracają, a ciało ich służy potem roślinie za pokarm. W tym celu badał Cohn tęg roślinę w różnych porach lata i znalazł raz w tych jamkach żywe nicienie, mianowicie węgorki (*Anguillulae*) a raz nawet roztocze (*Acarina*). Mimo tego nie mógł Cohn wnioskować na owadożerczość rośliny, a owa dziwna budowa łusek i jęg przeznaczenie była dla niego niewyjaśnionem

zjawiskiem, jakkolwiek obecność jam i gruczołków na tę myśl naprowadza, że te narządy tej rośliny w jej żywieniu pewien udział mieć muszą*).

A. Kerner i R. Wettstein wspominali o łuskiewniku, *Lathraea squamaria* L. na posiedzeniu wiedeńskiej Akademii Umiejętności i przypisywali tej roślinie własność łowienia i trawienia owadów. W opisie tej rośliny wspominają ci uczeni, że łuski jej mają po stronie grzbietnej roweczki, w którym się znajduje 5–13 otworków na powierzchni tych mięsistych łusek umieszczonych, a prowadzących do oddzielnych komór podłużnych wzdłuż łusek się ciągnących. Powierzchnia każdej komory ma dwojakie organa, mianowicie włoski główkowate, których na powierzchni 1 mm. □ około 25–32 się znajduje, jakoteż półkuliste wyniosłości, które są tkanką płaskich komórek i pokrywają końce wiązek naczyniowych tych łusek.

Między te łuski dostają się nader maluchne zwierzątka, które w wilgotnym humusie zawsze się znajdują, jak n. p. z owadów: mszyce (*Aphis*) i skoczogonki (*Podura*), lub też roztocze (*Acarina*), z mszywiolów zaś wrotki i nawet wymoczki. Żyjątka te wślazają przez te otworeczki na powierzchni łusek się znajdujące do środka komór i tam według Kenera i Wettsteina prawdopodobnie wskutek wpływu gruczołków giną, albowiem główkowato nabrzmiałe wierzchołki włosków i półkuliste wyniosłości, jakie się w środku tych komór znajdują, wydzielają wtedy przez błonę komórek liczne nitki plazmy. Niteczki te mają do ciała maluchnych zwierzątek zupełnie przylegać, je jakby jakimi ramionami chwytne obejmować i na te istoty trawiąco działać, albowiem ci obserwatorowie spostrzegli, że z ciała tych zwierzątek jedynie niestrawne resztki pozostają, a nie zauważyli, czy osobna ciecz trawiąca, jak u poprzednich roślin owadożerczych się wtedy wydzielała**).

To zapatrywanie Kenera i Wettsteina ma być według A. Scherffel'a błędne, albowiem według niego owe długie nitki plazmy mają być łańcuchem bakteryj (*Stäbchen-Bakterien*), a zaś ta wydzielina w owych komorach łusek tej rośliny się znajdująca mogła się tylko przyczynić, że te bakterye tam się dostały i w tych komorach chemiczne zmiany wywołały, z których *Lathraea* korzystała, lecz owadożerczą rośliną nazwać ją nie można***).

Podobne narządy, w jakie owa bezzieleniowa roślina (*Lathraea*) do łowienia zwierzątek jest zaopatrzona, posiada także *Bartsia alpina*, roślina z rodziny *Rhinathaceae*, która zielen w swych komórkach zawiera. Rośnie

*) Naturforscher. X. 1887. N. 40. str. 380.

**) Naturforscher XX. 1887 N. 19. str. 167.

***) Mittheilungen des botan. Instituts zu Graz. Heft II.

ona po mokrych miejscach w Alpach, Karkonoszach*), nawet w krajach północnych, więc całej prawie Europie. Ponieważ jej zielen zawiera barwik czarny i fioletowy, tedy wejrzenie tej rośliny jest ponure; kwitnie ona w czerwcu i lipcu. Jako roślina zieleniowa może się ona samodzielnie żywić, jednakże jej ziemne pędy mają małe korzenie przybyszowe ssawkami zwane, które zapuszczają w korzenie innych roślin n. p. traw i pokarm z nich czerpią, zatem roślina ta żywi się jak każda inna, a zarazem jest pasożytem. Bartsia jest według Kenera i Wettsteina uwagi godną rośliną, bo nie tylko pasożytuje po trawach alpejskich, ale ma mieć jeszcze własność żywienia się zwierzątkami drobnymi. Na pędach tej rośliny ukazują się w jesieni pąki pokryte łuskami bezzieleniowemi, brzegi tych łusek są na zewnątrz odgięte i mają żłóbki, a na ich powierzchni znajdują się włoski, główkowato na wierzchołku nabrzmiałe i półkuliste grupy komórek. Czy zwierzątka w tych zagłębieniach rynienkowatych łowione i trawione bywają jeszcze niewiadomo, tylko Kerner i Wettstein twierdzą wnosząc z analogii budowy łusek u tej rośliny i łuskiewnika, że te narządy mają podobne znaczenie jak u łuskiewnika, *Lathraea*. W ten sposób *Bartsia alpina* żywiła by się w czworaki sposób: przez przyjmowanie kwasu węglowego za pomocą zielonych liści, powtórę przez korzenie, po trzecie przez pasażowanie na roślinach i przez łowienie i trawienie drobnych zwierzątek. Lecz ostatni sposób żywienia jest według Dra Heinrichera nie prawdopodobny a zatem nie stwierdzony.

Obie te rośliny t. j. *Lathraea squamaria* i *Bartsia alpina*, u których poznano narządy mające służyć jako łapki na żyjątko drobne, a które narządy A. Kerner i R. Wettstein nazwali „die rhizopodoiden Verdauungsorgane thierfangender Pflanzen**),“ nie można jeszcze policzyć do roślin owadożernych.

Niektórzy przypisują własność żywienia się ciałem owadów także nader ozdobnej roślinie, która znana jest u nas pod nazwą dziewięciornik,

***Parnassia palustris* L.**

Roślinę tę uważali starsi botanicy belgijscy i niemieccy za tak zwaną trawę „Parnasu“ Dioskoridesa. Rośnie ona w ziemi gipsowej a rzadziej wapnistej, zwykle po łąkach mokrych nawet nieco pagórkowatych przyprzyodzabiając je od lipca swemi białemi kwiatuškami przejrzysto użytkowanemi. Z włoknistego kłębu (kłącza) wyrasta kilka liści odziomko-

*) Riesengebirge.

***) Naturforscher XX. 1887. N. 19. str. 168 i Sitzungsberichte der Wiener Akademie. XCIII. 1886.

kowych długoogonkowych, żywo zielonych i 3 dm. wysoka łodyga o jednym liściu bezogonkowym i ją obejmującym, a na jej wierzchołku jest jeden okazały kwiatuszek biały z przejrzystymi drobnouchnymi żyłkami. Korona jest 5-cio płatkowa umiarowa, z 5-ma pręcikami, a za każdym płatkem są maluchne, bardzo ozdobne łuski zielone kształtu liry. Na brzegu każdej łuski jest 13--15 włosków gruczołkowatych a u jej podstawy gruczoł. Z tych gruczołów wydzielają się krople miodowej cieczy, która ma mieć własność rozpuszczania ciał azotowych, czyli trawienia drobnych muszek i komarów, jakie tą cieczą słodką znęcone tam się dostały. Dla tego niewytłomaczonego zjawiska przypisują niektórzy tej roślinie własność żywienia się małemi owadkami, wszakże nie można o tej roślinie stanowczo orzec, że jest rośliną owadożerną.



II.

Część urzędowa.

A. Skład grona nauczycieli przy końcu roku szkolnego 1888.

1. Seweryn Arzt, dyrektor, uczył geografii i historii w klasie V. 3 godziny tygodniowo.
2. Wincenty Bobrzyński, profesor, uczył języka łacińskiego w kl. I., niemieckiego w VI. i VIII. — razem 16 godzin tyg.
3. Jan Pawlica, profesor, członek rady miejskiej, uczył języka łacińskiego w VI., greckiego w V. i VI. kl. — razem 16 godzin tyg.
4. Julian Lizak, profesor, uczył języka niemieckiego w V. i VII., matematyki w IV. i VII., propedeutyki filozoficznej w VII. i VIII., geografii w I. klasie — razem 21 godzin tyg.
5. Walenty Myjkowski, profesor, zawiadowca gabinetu fizykalnego, uczył matematyki w III. B. V. VI. VIII., fizyki w IV. VII i VIII. klasie.; — razem 21 godzin tyg.
6. Tomasz Dziama, profesor, uczył języka łacińskiego w VII. i VIII. klasie, greckiego w IV. i VIII. kl. — razem 19 godzin tyg.
7. Michał Frąckiewicz, profesor, zawiadowca biblioteki nauczycielskiej, uczył języka polskiego w I. V. VI. VII. i VIII. kl., niemieckiego w I. kl. — razem 21 godzin tyg.
8. Leon Guńkiewicz, profesor, zawiadowca gabinetu naturalnego, uczył historii naturalnej w I. II. III. A. III. B. V. i VI.; matematyki w II. i III. A. klasie; — razem 18 godzin tyg.
9. Ludwik Tota, profesor, uczył języka łacińskiego w II. i V., greckiego w VII., polskiego w II. klasie; — razem 21 godzin tyg.

10. Teofil Krasnosielski, nauczyciel, przydzielony do c. k. gimnazjum św. Anny w Krakowie.
11. Fryderyk Lachner, nauczyciel, uczył rysunków wolnорęcznych w kl. I. II. III. A, III. B. i IV., matematyki w I. kl. — razem godzin tyg. 20. Oprócz tego rysunków jako przedmiotu nadobowiązkowego przez 4 godzin tyg.
12. Waleryan Heck, nauczyciel, uczył geografii i historii w kl. II. III. A., III. B., VII., języka niemieckiego w II.; — razem 18 godz. tyg. Także historii kraju rodzinnego w klasach III. i VII. przez 2 godz. tyg.
13. Ksiądz Jan Krupiński, nauczyciel, katecheta i exhortator, uczył religii we wszystkich klasach — razem 18 godzin tyg.
14. Józef Kurowski, egzaminowany zastępca nauczyciela, zawiadowca biblioteki dla młodzieży, uczył języka polskiego w III. B. kl., niemieckiego w III. B. i IV., geografii i historii w IV. VI. i VIII. kl. razem 22 godz. tyg.; także historii kraju rodzinnego w IV. i VI. kl. przez 2 godz. tyg.
15. Franciszek Barański, zastępca nauczyciela, uczył języka łacińskiego w III. B. i IV., greckiego w III. A., polskiego w IV. klasie; — razem 20 godz. tyg.
16. Anatol Łucyk, zastępca nauczyciela, uczył języka łacińskiego, polskiego i niemieckiego w III. A., greckiego w III. B. kl., — razem 18 godz. tyg.; — oprócz tego kaligrafii jako przedmiotu nadobowiązkowego 2 godz. tyg. i śpiewu 4 godz. tyg.

B. Rozkład nauk.

I. Klasa.

Gospodarz: Fryderyk Lachner.

Religia. 2 godz. tyg. katechizm katolicki.

Język łaciński. 8 godz. tyg. Nauka prawidłowa imion i czasowników, ważniejsze przyimki i spójniki, tudzież najważniejsze reguła ze składni; ćwiczenia w tłumaczeniu z języka łacińskiego na polski i odwrotnie. Od listopada począwszy co tydzień 1 zadanie szkolne i 1 ćwiczenie domowe.

Język polski. 3 godz. tyg. Nauka o zdaniu pojedynczym i częściach tegoż w połączeniu z interpunkcją o formach imion; z głosowni

najważniejsze zasady wyłożone przy odmianie imion; czytania z Wypisów, opowiadanie i deklamacya. Co miesiąc wypracowanie domowe i szkolne i 1 dyktat.

Język niemiecki. 6 godz. tyg. Odmiana imion i czasowników słabych w połączeniu z najpotrzebniejszymi prawidłami składni, szyku i rządu; czytanie i tłumaczenie z języka niemieckiego na polski i odwrotnie. Co miesiąc 2 zadania szkolne, 1 domowe, 1 dyktat.

Geografia. 3 godz. tyg. Pojęcia wstępne z geografii matematycznej i fizycznej, oro- i hydrografii, główne pojęcia z geografii politycznej. Rysowanie map na tablicy i zeszytach.

Matematyka. 3 godz. tyg. Naprzemian arytmetyka i geometrya. Z arytmetyki system dziesiętny, 4 działania liczbami całkowitemi i dziesiętnymi, mianowanemi i niemianowanemi, metryczne miary i wagi, sposoby skracać rachunkowych, podzielność liczb i działania ułamekami zwykłymi. Z geometryi nauka o liniach, kole, kątach, trójkątach (aż do przystawiania). Co miesiąc zadanie szkolne, na każdą lekcję zadanie domowe.

Historya naturalna. 2 godz. tyg. W I. półroczu zwierzęta kręgowce ssące; w II. półroczu zwierzęta bezkręgowce.

Rysunki wolnoręczne. 4. godz. tyg. Rysowanie prostokreślnych utworów geometrycznych z wolnej ręki, mianowicie linii prostych, kątów, trójkątów, czworokątów i wielokątów na podstawie rysunku nauczyciela na tablicy. Prócz tego teoretyczne objaśnienie kształtów i bryłowości ciał przy pomocy okazów i modeli. Początki ornamentu płaskie. Ćwiczenia uczniów z pamięci.

II. Klasa.

Gospodarz: Leon Guńkiewicz.

Religia: 2 godz. tyg. Historya biblijna starego testamentu.

Język łaciński. 8. godz. tyg. Powtarzanie odmian prawidłowych, nauka o formach nieprawidłowych, przysłowki, przymyki, spójniki; główne prawidła ze składni, acc. c. inf., abl. absol.; tłumaczenie zdań łacińskich na język polski i odwrotnie. Co miesiąc 3 zadania szkolne i 1 domowe.

Język polski. 3 godz. tyg. Powtórzenie i uzupełnienie nauki o formach, mianowicie nauka o słowie z uwzględnieniem głosowni. Nauka o zdaniu złożoném w głównych zarysach w połączeniu z interpunkcją; składnia zgody. Czytanie ustępów z Wypisów, opowiadanie i deklamacya. Zadanie piśmienne jak w klasie I.

Język niemiecki. 5 godz. tyg. Powtórzenie i uzupełnienie nauki o formach, następnie przysłówki, przyimki, spójniki; o szyku w zdaniu główném i poboczném. Tłómaczenie ustępów niemieckich i polskich, konwersacya, deklamacya. Co miesiąc 2 zadania szkolne, 1 domowe i 1 dyktat.

Geografia i historia. 4 godz. tyg. Z geografii 2 godz. powtórzenie i uzupełnienie geografii matematycznej, geografia fizyczna i polityczna Azji i Afryki; poziomy i pionowy układ Europy, szczegółowa geografia południowych i zachodnich państw Europy. Historia starożytna przez 2 godziny tyg.

Matematyka. 3 godz. tyg. Z arytmetyki powtórzenie działań ułamkami, skrócone mnożenie i dzielenie, stosunki, proporcye, reguła trzech, nauka o miarach, wagach i monetach; rachunek procentowy. Z geometrii przystawanie i własności trójkątów, koło, czworobok, wielobok i wymiar kątów figur prostokreślnych. Zadania piśm. jak w klasie I.

Historia naturalna. 2 godz. tyg. W I. półroczu ptaki, gady, płazy i ryby; w II. półroczu botanika.

Rysunki wolnoręczne. 4 godz. tyg. Ornament geometryczny; zasady perspektywy i rysowanie przestrzennych geometrycznych utworów z wolnej ręki według prawideł perspektywy z modeli druczianych i drewnianych.

III. Klasa.

Gospodarze: w III. A. Anatol Łucyk.

w III. B. Franciszek Barański.

Religia. 2 godz. tyg. Historia biblijna nowego testamentu.

Język łaciński. 6. godzin tyg. Z gramatyki składnia zgody i rządu, nauka o przyimkach; tłómaczenie ustępów polskich na język łaciński. Z Corneliusa Neposa czytano żywoty: Milcyadesa, Temistoklesa, Arystydesa, Cymona, Epaminondasa, Pelopidasa, Hanibala. Co 14 dni zadanie szkolne, co 3 tyg. domowe.

Język grecki. 5 godz. tyg. Odmiana imion i czasowników aż do źródłosłowu perfecti; ćwiczenia z języka greckiego na polski i odwrotnie. Od 15 listopada 2 zadania co miesiąc, szkolne i domowe naprzemian.

Język polski. 3 godz. tyg. Z gramatyki nieodmienne części mowy, składnia zgody i rządu, składnia w obrębie czasownika, pisownia, nauka o zdaniu złożoném w połączeniu z interpunkcją. Czytanie ustępów z Wypisów, opowiadanie, deklamacya. Co 14 dni zadanie domowe lub szkolne.

Język niemiecki. 4 godz. tyg. Z gramatyki powtórzenie partyi przerobionych w I. i II. klasie, składnia zgody i rządu, o szyku. Czytanie ustępów z Wypisów, preparacya domowa, tłumaczenie, konwersacya, deklamacya. Co miesiąc 1 zadanie domowe i 2 szkolne.

Geografia i historia. 3 godz. tyg. na przemian geografia i historia. Z geografii: szczegółowa geografia Europy środkowej (z wyłączeniem monarchii austriacko-węgierskiej), wschodniej i północnej, Ameryki i Australii. Ćwiczenia kartograficzne. Historia średniowieczna.

Matematyka. 3 godz. tyg. Z arytmetyki: skrócone działania uławkami przybliżonymi, główne działania liczbami algebraicznymi całymi i uławkami, wynoszenie do 2. i 3. potęgi, wyznaczanie 2. i 3. pierwiastka i zastosowanie skróconego dzielenia do tego działania. Z geometrii: Wymiar długości i powierzchni, przemiana i podział figur, wymiar obwodu i powierzchni koła, podobieństwo figur i własności elipsy, hyperboli i paraboli. Zadanie piśmienne jak w klasie I.

Nauki przyrodnicze. 2 godz. tyg. W I. półroczu mineralogia; w II. półr. fizyka; nauka o własnościach ciał, ciepłe, chemia.

Rysunki. 3 godz. tyg. Ćwiczenia w rysowaniu ornamentów płaskich według rysunku nauczyciela na tablicy i wzorów kolorowych z szczególnem uwzględnieniem wzorów greckich i rzymskich; nauka o stylu ornamentów i dalsze ćwiczenia w perspektywie.

IV. Klasa.

Gospodarz: Józef Kurowski.

Religia. 2. godz. tyg. Nauka o obrzędach kościoła katolickiego.

Język łaciński. 6 godz. tyg. Z gramatyki syntaktyczne właściwości przymiotników i zaimków, użycie czasów i trybów; odpowiednie ćwiczenia w tłumaczeniu z języka polskiego na łaciński; prozodya o hexametrze i distychu. Lectura: Caesaris commentarii de bello gallico lib. I. II. IV. (z opuszczeniem opisu mostu); Ovid. Metam. lib. I. 89—262, lib. VIII. 183—235. Co 14 dni zadanie szkolne, co 3 tygodnie zadanie domowe.

Język grecki. 4. godz. tyg. Dalszy ciąg odmiany prawidłowej czasowników od źródłosłowu perfecti począwszy, odmiana czasowników na $\mu\acute{\iota}$ i nieprawidłowe odmiany; główne zasady składni; tłumaczenie z języka greckiego na polski i odwrotnie. Co 14 dni zadanie szkolne i domowe na przemian.

Język polski. 3 godz. tyg. Dokładna nauka o zdaniu złożonem o szyku i interpunkcyi szczegółowo; główne zarzysy etymologii; o wier-

szowaniu; ważniejsze zasady stylistyki. Czytanie ustępów z Wypisów, opowiadanie i deklamacya. Zadania piśmienne jak w klasie III.

Język niemiecki. 4 godz. tyg. Z gramatyki powtórzenie i uzupełnienie składni, mianowicie o czasach i trybach. Czytanie, tłumaczenie, konwersacya i wygłaszanie memorowanych z Wypisów ustępów. Zadania piśmienne jak w klasie III.

Geografia i historia. 4 godz. tyg. W I. półroczu historia no-wożytna z szczególném uwzględnieniem monarchii austriacko-węgierskiej; w II. półroczu szczegółowa geografia monarchii austriacko-węgierskiej.

Matematyka. 3 godz. tyg. Z arytmetyki stosunki i proporcye składane, rachunek łańcuchowy, rachunek składanego procentu i zrównania z jedną i więcej nieznanymi. Z geometrii: stereometria. Zadania piśmienne jak w klasie III.

Fizyka. 3 godz. tyg. Statyka, hydrostatyka, aerostatyka, dynamika, akustyka, magnetyzm, elektryczność, optyka.

Rysunki wolnoręczne. 3 godz. tyg. Rysowanie ornamentów plastycznych i trudniejszych wzorów ornamentalnych, rysowanie członków architektonicznych z modeli, ćwiczenia w rysowaniu z pamięci i dalszy ciąg perspektywy.

V. Klasa.

Gospodarz klasy: Ludwik Tota.

Religia. 2. godz. tyg. Dogmatyka ogólna.

Język łaciński. 6 godz. tyg. Z gramatyki powtórzenie i uzupełnienie składni zgody i rządu, właściwości języka łacińskiego w połączeniu z ćwiczeniami do tłumaczenia z języka polskiego na łaciński. Czytano Liviusa ks. I. 1—40 i XXI.; Ovidiusa Metam. I. 163—415, II. 1—366, VIII 183—235; Fast. II. 83—118, IV. 419—618. Co 14 dni zadanie domowe lub szkolne na przemian.

Język grecki. 5 godz. tyg. 1 godzina gramatyka, a 4 lektura. Z gramatyki powtórzenie nauki o formach, składnia aż do zaimka; tłumaczenie odpowiednich ustępów z języka polskiego na grecki. Lektura: W I. półroczu ustępy z Xenofonta (Cyrop. IV. 6. 1—10, V. 2. 1—20, VIII. 7. 1—28; Anab. I. 1., 2. 1—4, 7 8); w II. półroczu 3 godz. tyg. Homera Ilias i 1 godz. tyg. lektura Xenofonta; z Homera Iliady czytano ks. I. Co miesiąc 1 zadanie szkolne lub domowe.

Język polski. 3 godz. tyg. Historia piśmiennictwa polskiego do początku wieku 16-go. Czytanie cenniejszych ustępów z staropolskich

pomników literatury w połączeniu z gramatycznymi uwagami, a z literatury XVI. wieku do Kochanowskiego. Co 3 tyg. 1. zadanie piśmienne.

Język niemiecki. 4 godz. tyg. Czytanie ustępów z Wypisów z stósonnem objaśnieniem gramatycznym, stylistycznym i estetycznym; opowiadanie, deklamacya. Co 14 dni zadanie domowe lub szkolne.

Geografia i historia. 3 godz. tyg. Dzieje starożytne aż do zdobycia Italii przez Rzymian z poglądem na religią, literaturę i sztukę. Odpowiedne partye z geografii starożytnej.

Matematyka. 4 godz. tyg. Z algebry: Systematyczny wykład głównych działań liczbami algebraicznymi, system liczbowy, podzielność liczb, ułamki zwykłe i dziesiętne, stosunki, proporcye, zrównania 1 stopnia z 1 i więcej niewiadomymi. Z geometrii: longimetrya i planimetrya. Co miesiąc 1 zadanie szkolne, częste zadania domowe.

Historia naturalna. 2 godz. tyg. W I. półroczu mineralogia systematyczna w połączeniu z geognozyą; w II. półroczu botanika z paleontologią i geografią roślin.

VI. Klasa.

Gospodarz klasy: Jan Pawlica.

Religia. 2. godz. tyg. Dogmatyka szczegółowa.

Język łaciński. 6 godz. tyg. 1 godz. gramatyki, 5 godz. lektura. Z gramatyki dalszy ciąg składni o czasach i trybach do inf. włącznie; tłum. odpowiednich ustępów polskich na język łaciński, Lektura: w I. półr. Sall. Catilina, Cicero in Catilinam I.; w II. półroczu Verg. Aen. I. IV. V. Ecl. I. Wygłaszanie celniejszych ustępów czytanych na pamięć. Zadania jak w klasie V.

Język grecki. 5 godz. tyg. Z gramatyki (1 godz.) nauka składni aż do infinit. wyłącznie. Tłumaczenie ustępów polskich na język grecki. Czytano z Xenofonta Comment. I. 1. 1—20, 2. 1—10, nadto w I. półroczu z Iliady Homera księgę VI i X. a w II. półroczu Herodota ks. IX. i Homera Ilias XVI. Wypracowania piśmienne jak w klasie V.

Język polski. 3 godz. tyg. Czytanie celniejszych ustępów z autorów złotego wieku literatury polskiej; historyczno-literackie, gramatyczne i estetyczne uwagi nad literaturą tego okresu; deklamacya. Zadania piśm. jak w klasie V.

Język niemiecki. 4 godz. tyg. Czytano, objaśniano i wygłaszano ustępy z przepisanych Wypisów; konwersacya. Zadania piśm. jak w klasie V.

Geografia i historia. 4 godz. tyg. Dalszy ciąg historii starożytnej i historia wieków średnich z ustawicznym uwzględnieniem geografii odnośnych krajów.

Matematyka. 3 godz. tyg. Z algebry o potęgach, pierwiastkach, logarytmach i zrównaniach 2. stopnia z jedną niewiadomą. Z geometrii: stereometria i trygonometria prostokreślna. Wypracowania piśmienne jak w klasie V.

Historia naturalna. 2 godz. tyg. Zoologia systematyczna w połączeniu z paleontologią i geograf. rozszerzenie zwierząt.

VII. Klasa.

Gospodarz: Julian Lizak.

Religia. 2 godz. tyg. Etyka katolicka.

Język łaciński. 5 godz. tyg. — 1 godz. gramatyka, 4 lektura. Z gramatyki ukończenie składni, właściwości języka łacińskiego w połączeniu z ćwiczeniami gramatyczno-stylistycznymi. Lektura: w I. półr. Cicero pro Milone, Cic. Disp. Tusc. I. 9 13, 26—34, 57—61, 97—102, 118 i 119; w II. półroczu: Cic. Disp. Tusc. II. rozdziałów 20; Vergil. Aen. III. IV. VI.

Wypracowania piśmienne jak w klasie V.

Język grecki. 4 godz. tyg. — 1 godz. gramatyka, 3 lektura. Z gramatyki infinitivus, participium, właściwości zdań względnych, zdania pytajne i partykuły; tłumaczenie odpowiednich ustępów z języka polskiego na grecki. — Lektura: Demostenesa mowy olintyjskie I. II. III., Homera Odys. ks. V. VI. IX. Zadania piśmienne jak w klasie V.

Język polski. 3 godz. tyg. Czytanie celniejszych ustępów z okresu panegiryczno-makaronicznego i Stanisławowskiego w połączeniu z historyczno-literackimi i estetycznymi uwagami. — Zadania piśmienne jak w klasie V.

Język niemiecki. 4 godz. tyg. Czytano i objaśniano celniejsze ustępy z Wypisów Harwota. Zadania piśmienne jak w klasie V.

Geografia i historia. 3 godz. tyg. Dzieje nowożytne z uwzględnieniem geografii.

Matematyka. 3 godz. tyg. Z algebry: Zrównania nieoznaczone I. stopnia, zrównania kwadratowe i wykładnicze o 1. i 2. niewiadomych, postęp różnicowy i geometryczny z zastosowaniem do procentu składanego i obliczenia renty, permutacje, kombinacje i wzór Newtona z zastosowa-

niami, — Z geometrii: ćwiczenia w rozwiązywaniu zagadnień trygonometrycznych, geometria analityczna w płaszczyźnie. Wypracowania piśmienne jak w klasie V.

Fizyka. 3. godziny tyg. Ogólne własności ciał, chemia, statyka, dynamika, ciepło.

Logika. 2 godz. tyg. Logika formalna.

VIII. Klasa.

Gospodarz: Tomasz Dziama.

Religia. 2 godz. tyg. Historia kościelna.

Język łaciński. 5 godz. tyg. 1 godz. gramatyka i odpowiednie ćwiczenia do tłumacz. z polskiego języka na łaciński. 4 godz. lektura. Czytano z Horac. Od. I. 1. 2. 10. 12. 31. 37. II. 1. 2. 16. 17. 18. 20. III. 1. 2. 10. 19. 30. IV. 4. 14. 15., Ep. 1. 2., Satyr. I. 9. II. 6., Ep. ad Pison.; z Tacyta; Germania 1—27., Annales I. II. III. (wyjątki). Zadania piśm. jak w kl. V.

Język grecki. 5. godz. tyg. 1 godz. gramatyki, 4 godz. lektura. Z gramatyki dokończenie i uzupełnienie gramatyki z odpowiednimi ćwiczeniami. Lektura: Sofoklesa Ajas, Platona Apologia i Laches. Wypracowania piśmienne jak w klasie V.

Język polski. 3 godz. tyg. Czytanie cenniejszych ustępów z autorów XIX. wieku w połączeniu z historyczno-literackimi i estetycznymi uwagami. O sztuce w ogólności, nauka poezji. Zadania jak w klasie V.

Język niemiecki. 4 godz. tyg. Rozbiór analityczny dramatów Schillera: Wallensteins Lager, die Piccolomini, Wallensteins Tod. Czytano też ustępy umieszczone w Wypisach z 30-letniej wojny tegoż. Goethego: Hermann und Dorothea. Wypracowania piśmienne jak w klasie V.

Geografia i historia. 3 godz. tyg. W I. półroczu historia monarchii austriacko-węgierskiej; w II. półroczu statystyka monarchii austriacko-węgierskiej; powtórzenie ważniejszych zdarzeń z historii greckiej i rzymskiej.

Matematyka. 2 godz. tyg. Powtórzenie i uzupełnienie całego materiału naukowego tak co do teorii, jak i w zastosowaniu do zagadnień szczegółowych. Wypracowania piśmienne jak w klasie V.

Fizyka. 3 godz. tyg. Mechaniczna teoria ciepła, akustyka, magnetyzm, elektryczność i optyka.

Psychologia. 2 godz. tyg. Psychologia empiryczna.

C. Przedmioty nauki nadobowiązkowój.

1. Historya kraju rodzinnego w 4. oddziałach dla uczniów klasy III. IV. VI. VII. po jednéj godzinie tygodniowo. W III. klasie uczono sposobem biograficznym od najdawniejszych zabytków historycznych do r. 1492 — w IV. klasie od r. 1492—1815. W VI. klasie uczono na podstawie chronologii systematycznego rozwoju dziejów kraju rodzinnego od początków historycznych do roku 1492 z uwzględnieniem równoczesnych stosunków państw sąsiednich; w VII. klasie tak samo od r. 1492—1815.
2. Rysunki wolnoręczne. 4 godz. tyg. Rysowanie ornamentów podług modeli gipsowych i antyków w zimowém półroczu przy oświetleniu.
3. Kaligrafia. 2 godz. tyg. Na naukę tę uczęszczali tylko uczniowie I. i II. klasy.
4. Śpiew. 4 godz. tyg. Uczniowie podzieleni byli na 2 oddziały. W I. oddz. uczono teoryi śpiewu przez 2 godz., w II. oddz. śpiewu kościelnego przez 2 godz. tyg.

D. Wykaz książek

w roku szkolnym 1888 używanych w tutejszém gimnazyum.

Religia. W I. klasie: katechizm Schustera w tłumaczeniu ks. Zielińskiego. 3. wyd. — W II. klasie: Dzieje starego zakonu ks. T. Dąbrowskiego. — W III. klasie: Dzieje nowego zakonu ks. T. Dąbrowskiego. W IV. klasie: Liturgika ks. Jachimowskiego. — W V. klasie: Dogmatyka ogólna Dra Martina, tłóm. ks. Jachimowskiego. — W VI. klasie: Nauka wiary w szczególności ks. Jachimowskiego. — W VII. klasie: Etyka katolicka ks. Dra. Soleckiego. — W VIII. klasie: Historya kościelna Robitscha w tłóm. ks. Jachimowskiego.

Język łaciński. A). Gramatyka Dra Zygmunta Samolewicza wyd. 4. — B). Ćwiczenia: w I. i II. klasie Dra Z. Samolewicza; w III. klasie Franciszka Próchnickiego; w IV. i V. kl. Jerzykowskiego część II. w VI. klasie Trzaskowskiego część I.; w VII. i VIII. klasie Próchnickiego. — C). Autorowie: w klasie III. Żywoty Corneliusa Neposa wyd.

Jerzykowskiego; w IV. klasie Caesar de bello gallico wyd. Hoffmana; w V. klasie Livius wydanie Zingerlego i Ovidius wyd. Jerzykowskiego; w VI. klasie Sallustius wyd. Linkera, Cicero wyd. Nolla, Vergilius wyd. Hoffmanna; w VII. kl. Vergilius Hoffmanna, Cicero Klotza; w VIII. kl. Horatius wyd. Grysara i Tacitus wyd. Halma.

Język grecki. A). Gramatyka Curtiusa opracowana p. Dra Zygmunta Samolewicza i T. Sternala, wydanie 3. Ćwiczenia Schenkla opracowane przez Samolewicza wydanie 4. we wszystkich klasach. B). Autorowie: w V. klasie Chrestomatya z Xenofonta Schenkla w tłóm. Borzemskiego; w V. i VI. kl. Homera Iliada wyd. Hoheggera; Herodot wydanie Wilhelma; w VII. kl. Demostenes wyd. Paulego; Odys. wyd. Hoheggera; w VIII. kl. Sofokles wyd. Teubnera, Plato wyd. Jahna.

Język polski. A). Gramatyka A. Małeckiego wyd. 6. we wszystkich klasach. — B). Wypisy w I. kl. tom I. wyd. 4.; w II. kl. tom II. wyd. 5.; w III. kl. tom III. wyd. 4.; w IV. kl. tom IV. wyd. 2.; w V. i VI. kl. Dra Karola Mecherzyńskiego tom I. wyd. 2.; w VII. kl. Wypisy polskie dla użytku klas wyższych tom II. część 1.; w VIII. kl. tom II. część 2.

Język niemiecki. A). Gramatyka w I. kl. Dra J. Molina wyd. 2.; w II. kl. Schobera w przerob. Dra Germana część 1. wyd. 4.; w III. i w IV. kl. Schobera przerob. p. Dra Germana część 2.; B). Wypisy: w I. kl. Ćwiczenia Dra Molina wyd. 2.; w kl. II. Rebena — Germana wyd. 4.; w kl. III. Hamerskiego część I. wyd. 2.; w IV. kl. Hamerskiego część 2.; w V. kl. Jandaureka — Hamerskiego wyd. 2.; w VI. kl. Harwota tom 1. wyd. 2.; w VII. i VIII. kl. Harwota tom II.

Geografia i historia. W I. kl. geografia Benoniego i Tatomira wyd. 3.; w II. kl. geografia Baranowskiego i Dziejickiego wyd. 3. i historia pow. Weltera przerob. p. Z. Sawczyńskiego tom I. wyd. 5.; w III. kl. geografia jak w klasie drugiej, historia Weltera przerob. p. Sawczyńskiego tom II. wyd. 4.; w IV. kl. historia Weltera — Sawczyńskiego tom. III. wyd. 4. i Dra J Szaraniewicza — opis monarchii austr.-węg. wyd. 3.; w V. kl. historia Gindelego tłóm. p. Markiewicza tom I. wyd. 2.; w VI. kl. Gindely — Markiewicz tom II. wyd. 2.; w VII. kl. Gindely — Markiewicz tom III. wyd. 2.; w VIII. klasie Tomek — Markiewicz historia monarchii austr.-węg. i Dra Szaraniewicza Statystyka monarchii austr.-węgierskiej. wyd. 3.; Atlas Kozenna we wszystkich klasach przy nauce geografii; Kieperta, Putzgera lub Stielera przy nauce historii.

Matematyka. W I. i II. klasie arytmetyka Mocnika opracowana przez E. Bączalskiego; geometrya Mocnika — Maryniaka część I.; w III.

i IV. kl. Arytmetyka Bączalskiego i Grzybowskiego część II.; geometrya Mocnika — Maryniaka część II. — w całym wyższem gimnazyum Arytmetyka i Algebra Mocnika opracowana p. Bodyńskiego i geometrya Mocnika w opracowaniu Dra Staneckiego. — Logarytmy Wierzbickiego.

Historya naturalna. W I. i II. klasie Zoologia Nowickiego; w II. klasie botanika Hückla; w III. klasie mineralogia Łomnickiego; — w V. klasie w I. półroczu mineralogia i geologia Łomnickiego; w II. półroczu botanika Dra Rostafińskiego; w VI. kl. Zoologia Nowickiego — dla klas wyższych.

Fizyka. W III. kl. fizyka Staneckiego, część I.; w IV. kl. fizyka Kunzeka w opracowaniu Staneckiego; — w VII. i VIII. kl. fizyka dla klas wyższych Chlebowskiego.

Propedeutyka filozofii. W VII. klasie Logika Dra Kremera; w VIII. kl. Psychologia Crügera w opracowaniu Zygmunta Sawczyńskiego.

Zmiany na rok szkolny 1889.

a) Książki:

Dla klasy I: Arytmetyka Dra Wł. Zajączkowskiego.

Dla klasy II: Botanika Dra Rostafińskiego.

Dla klasy III: Fizyka Józefa Soleskiego.

b) Lektura.

α) łacińska: w V. klasie Livius I i XXI., Ovidius Metam: I. 163—415, VI. 146—312, VIII 611—724, X. 1—77, XI. 85—193; Fasti II. 83—118; Tristia IV. 10;

w VI. klasie Sallust. Jugurtha, Cicero in Catilinam I., Vergil. Aen. II. III., Georg Laudes vitae rusticae, Ecl. I.;

w VII. klasie Cicero in Verrem IV., Laelius, Vergil. Aen. VI. XII.; w VIII. klasie Horat. carm. I. 1. 2. 12. 14. 20. 37.; II. 1. 3. 7. 15. 17. 20; III. 3. 8. 29. 30., IV. 4. 5. 14. 15; Epod. 2. 7. Sat. I. 1. 10. Tacit. Germania 1—27 i Annales I. II. III. mianowicie ustępy dotyczące wewnętrznych stosunków rzymskich.

β) grecka: w V. klasie Xenoph. Chrestom. Anabasis I. 9. III. 1. 2., Cyrop. I. 5. 1. i następne; VII. 2. Homer Ilias I.;

w VI. klasie Homer Ilias III. IV. XVI., Herodot V., Xenoph. Cyr. VI. 2. 1—16, 9—25, 3. 21—37, 4. 1—12, VII. 1—45;
 w VII. klasie Demosth. Philip. I. II. „o pokoju“; Hom. Odyss. VI. VII. VIII. IX. X.;
 w VIII. klasie w I. półr. Plato-Apologia, Entyphro, w II. półroczu Sophocl. Antigona.

E. Tematy do wypracowań piśmiennych.

1. w języku polskim.

w V. klasie.

1. Wyjaśnić myśl zawartą w przysłowiu Mikołaja Reja: Z przyjacielem igraj słówkiem rzadko, rączką nigdy (dom.).
2. Przechadzka po polach w jesieni (szk.).
3. Wyprawa Igora na Połowców treść (dom.).
4. Życie i zasługi Jana Długosza (szk.).
5. Znaczenie obelisków i piramid w Egipcie (dom.).
6. Treść poematu Brodzińskiego — Wiesław, (szk.).
7. Życie pozagrobowe starożytnych Egipcyan (dom.).
8. Opis pożaru (szk.).
9. Obraz zimy (dom.).
10. Jakie błędy wytyka i jakich ostrzeżeń udziela narodowi polskiemu Mikołaj Rej w „Żywocie człowieka poczciwego“ mianowicie w ustępach czytanych w szkole (szk.).
11. Ogród a szkoła — porównanie (dom.).
12. Skreślić w krótkości żywot Reja z Nagłowic (szk.).
13. Zwyczaje w czasie Świąt Wielkanocnych (dom.).
14. Krótkie sprawozdanie z lektury domowej o Klemensie Janickim (chata wieśniaka, pobyt w Padwie,) (dom.).
15. Charakterystyka Filipa II. macedońskiego (dom.).
16. Polowanie na niedźwiedzia (treść według Pana Tadeusza) (szk.).

w VI. klasie.

1. Urszula Kochanowska, charakterystyka (dom.).
2. Treść „Satyra“ Kochanowskiego (szkol.).
3. Zalety okolic górzystych (dom.).
4. Odprawa posłów greckich (szk.).
5. Objąć wiersz Kochanowskiego:

Stateczny umysł pamiętaj zachować,
 Jeśli cię pocznie nieszczęście frasować;
 Także i w górę nie radzę wylatać,
 Kiedy się szczęście umie z Tobą bratać. (dom.)

6. Opowiadanie Jacka Soplcy (szk.). 7. Objasnić dwuwiersz Szymonowicza: „Z dobrymi dobrym będziesz, gdy się ze złym zbracisz, byś był najostrożniejszym, własne dobro stracisz“ (dom.) 8. Halszka z Ostroga, opowiadanie (szk.). 9. Rozwinąć myśl zawartą w kazaniu Skargi o miłości ojczyzny (dom.). 10. Stare wrota, opowiadanie według Kondratowicza (szk.). 11. Bolesław Chrobry i Karol Wielki, porównanie (dom.). 12. Pasieki ruskie, podług Klonowicza (szk.). 13. Widok stepu, na podstawie lektury (dom.). 14. Zasługi Alfreda Wielkiego (dom.). 15. Obrazki przyrody w I. księdze Pana Tadeusza (szk.). 16. Pobyt Eneasza u Dydony, według lektury (szk.).

w VII. klasie.

1. Myśli na cmentarzu wiejskim — według elegii Niemcewicza: „Cmentarz wiejski“ (dom.). 2. Wyjaśnić myśl zawartą w zdaniu: Zwyciężyć siebie samego, największem jest zwycięstwem (szk.). 3. Rozebrać i ocenić wiersz Franc. Karpińskiego: Powrót z Warszawy na wieś (dom.). 4. Rolnictwo podstawą oświaty (szk.). 5. Labor non onus, sed beneficium (dom.). 6. Wyjaśnić myśl zdania: Zgoda buduje, niezgoda rujnuje (szk.). 7. Opisać pamiątkę miejscową (dom.). 8. Charakterystyka wojewody w Maryi Malczewskiego (dom.). 9. Rozebrać i ocenić sielanekę Naruszewicza: Mirtyl (szk.). 10. Zabawy uczniów w naszym zakładzie (dom.). 11. Zły do urazy bierze przestrożę, dobry do poprawy (szk.). 12. Chata wieśniaka w naszych stronach (dom.) 13. Wyjaśnić myśl sentencji: Ze złej gęby niedobra mowa; nie uczerpnąć z błota czystej wody (dom.). 14. Wielkonoce w domu rodzinnym (szk.).

w VIII. klasie.

1. Stręścić powieść poet. Brodzińskiego: Wiesław (dom.). 2. Wyjaśnić zdanie wypowiedziane w Konradzie Wallenrodzie: Wielkie serca są jak ule zbyt wielkie; miód ich zapelnąć nie może, stają się gniazdem jaszczurek (szk.). 3. Gaj brzozowy a las bukowy — porównanie (dom.). 4. Ipse sibi nocet is, alium qui laedere studet (szk.). 5. Wyjaśnić znaczenie przysłowia: kwap się zwolna (dom.). 6. Śmierć ostatniego z Horeszków (szk.). 7. Charakterystyka cześnika w „Zemście“ Fredry (dom.). 8. Rozbiór ballady „Świtezianka“ (dom.). 9. Pożytek z wynalazku prochu (szk.). 10. Zdarzenie stanowiące istotę powieści „Grażyna“ (szk.).

2. W języku niemieckim.

w V. klasie.

1. Inhaltsangabe der Schiller'schen Ballade: Graf von Habsburg. (dom.) 2. Eine Übersetzung aus dem Polnischen. (szk.) 3. „Die Gründung Roms“ nach Livius. (dom.) 4. Der Weinstock. (szk.) 5. Nil als Grundlage der ägyptischen Cultur. (dom.) 6. Eine Übersetzung aus dem Polnischen. (szk.) 7. Inhaltsangabe der Schiller'schen Ballade „Der Taucher.“ (dom.) 8. Der trojanische Krieg. (szk.) 9. Die Bedeutung der hellenischen Sagen. (dom.) 10. Inhaltsangabe des Schlegel'schen „Arion.“ (szk.) 11. Veranlassung und Ursachen zu den Perserkriegen. (dom.) 12. Eine Übersetzung aus dem Polnischen. (szk.) 13. Wodurch erlangte Athen seine Bedeutung in den Perserkriegen. (dom.) 14. Inhaltsangabe des Uhland'schen „Schenk von Limburg.“ (szk.) 15. Das Gebirge und seine Bewohner. (dom.) 16. Historische Grundlage der Schiller'schen Ballade: „Der Ring des Polykrates.“ (szk.) 17. Das Familienleben der alten Römer. (dom.) 18. „Wie Diego trauert;“ nach Herders Cid. (szk.) 19. Über die Lösung der Gleichungen. (dom.)

w VI. klasie.

1. Die Hochzeit des Peleus und der Thetis. (dom.) 2. Inhaltsangabe des Gedichtes von Bürger: „Lied vom braven Mann.“ (szkol.) 3. Die Griechen in Aulis. (dom.) 4. Inhaltsangabe des Gedichtes von Bürger: „Lenore.“ (szkol.) 5. Achilleus und Agamemnon. (dom.) 6. Der Jugurthinische Krieg. *Tłómaczenie z Gindelego.* (szkol.) 7. Zerstörung Karthagos. (dom.) 8. „Hüons Erzählung“ in Wielands Oberon, Gesang I. (szkol.) 9. Roms Eroberung durch die Gallier. (dom.) 10. „Adam Śmigielski.“ Aus den Denkwürdigkeiten des Erazm Otwinowski; *tłómaczenie z polskiego.* (szkol.) 11. Die Verschwörung Catilinas. Nach Sallust. (dom.) 12. Inhaltsangabe des Gedichtes von Voss: „Der siebzigste Geburtstag.“ (szk.) 13. Karl des Grossen Bestrebungen um die Cultur. (dom.) 14. Aeneas Irrfahrten nach der Zerstörung Troias. (szkol.) 15. Inhaltsangabe des Gedichtes von Wieland: „Geron der Adelige.“ (dom.) 16. „Dolon,“ eine Erzählung nach der Ilias X. (szkol.) 17. Spaziergang im Frühling. (dom.) 18. Inhaltsangabe des Gedichtes von Wieland: „Der Vogelgesang oder die drei Lehren. (szkol.) 19. Vorgeschichte zu Lessings: „Minna von Barnhelm“ mit Hinweisung auf die entsprechenden Stellen im Drama. (dom.) 20. „Quilibet fortunae suae faber. (szkol.)

w VII. klasie.

1. Eine Übersetzung aus dem Polnischen. (szk.) 2. Über den Spruch Göthes: „Wer ist der unbrauchbare Mann, Der weder gehorchen, noch befehlen kann.“ (dom.)
3. Vorgeschichte zu Lessings „Emilia Galotti.“ (szkol.) 4. Über den Spruch Göthes; „Lust und Liebe sind Fittige zu grossen Thaten.“ (dom.)
5. Einleitung zu der Ciceronianischen Rede „Pro Milone.“ (szk.) 6. Schilderung des Städtchens, in welchem der Wirt zum „goldenen Löwen“ wohnt, und seiner Umgebung nach Göthes „Hermann und Dorothea.“ (dom.) 7. Charakteristik des Apothekers, in Göthes „Hermann und Dorothea.“ (szk.) 8. Wie vertheidigt der Pfarrer die Neugierde in Göthes „Hermann und Dorothea.“ (dom.) 9. Der peloponnesische und dreissigjährige Krieg. (Eine Parallele). (dom.) 10. Über die Worte Schillers: „Nur durch das Morgenthor des Schönen drangst du in der Erkenntnis Land.“ (dom.) 11. Die Vorfabel zu der Göthe'schen „Iphigenie auf Tauris“ (szk.) 12. Begründung des Hauptgedankens in der Schiller'schen Ballade: „Die Bürgerschaft.“ (dom.) 13. Charakteristik Iphigeniens im Göthes gleichnamigen Drama. (szk.) 14. Entwicklung der dramatischen Handlung in Göthes „Iphigenie auf Tauris.“ (dom.) 15. Eine Übersetzung aus dem Polnischen. (szkol.) 16. Die Grundidee der Schiller'schen Ballade: „Die Kraniche des Ibykus“ (dom.) 17. Composition der Schiller'schen Ballade: Der Kampf mit dem Drachen.“ (szk.) 18. Über die Worte Schillers:
- „Von der Stirne heiss,
Rinnen muss der Schweiss,
Soll das Werk den Meister loben,
Doch der Segen kommt von oben.“ (dom.)

w VIII. klasie.

1. Die Exposition des Drama: Jungfrau von Orleans“ nach seiner Grundidee. (dom.) 2. Inhaltsangabe des Gedichtes: „Das Glöcklein des Glückes.“ (szkol.) 3. Die Vorgeschichte zu Schillers Drama: „Wallenstein.“ (dom.) 4. Inhaltsangabe des Gedichtes von Chamisso: „Die Kreuzschau.“ (szkol.) 5. Ackerbau ist der Anfang aller Cultur. (dom.) 6. Inhaltsangabe des Gedichtes von Uhland: „Der Waller.“ (szkol.) 7. „Ring des Polykrates.“ (Eine Vergleichung der Erzählung im Herodot mit dem Gedichte Schillers.) (dom.) 8. Gustav Adolf, König von Schweden. (szkol.)

9. Disposition und Inhalt des Prologs zu Schillers: „Wallenstein.“ (dom.)
 10. „Wallensteins Tod.“ (szkol.) 11. „Wallensteins Abfall vom Kaiser.“
 (dom.) 12. Vorgeschichte zu „Hermann und Dorothea.“ (szkol.) 13. Die
 Bekehrung Polens zum Christenthume. (dom.) 14. Inhaltsangabe des drit-
 ten Gesanges von Göthes: „Hermann und Dorothea.“ (szkol.) 15. Der
 anbrechende Morgen im Walde. (dom.) 16. Die Elemente hassen das
 Gebild der Menschenhand. (szkol.) 17. Welche Umstände erregen in Schil-
 lers: „Maria Stuart“ besonders die Gefühle der Furcht und des Mitleids.
 (dom.) Wer nicht vorwärts geht, der kommt zurücke. (szkol.) 19. „Labor
 non onus sed beneficium.“ (dom.)

Tematy do piśmiennego egzaminu dojrzałości.

1. Z języka łacińskiego: a) Przełożyć na język łaciński ustęp z „Wypisów polskich“ dla klasy II. „Akropolis“; b) Cic. Tusc. Disp. V. 13.
2. Z języka greckiego: Soph. Electr. 23—57.
3. Z języka polskiego: Znaczenie rycerstwa w wiekach średnich.
4. Z języka niemieckiego: Gaude sorte tua. (Hor. Ep.).

5. Z matematyki: a)
$$\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = 12$$
$$\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = 104.$$

- b) Objętość piramidy prostej o podstawie kwadratowej jest obj. = 640 m^3 ; obliczyć różnicę objętości stożków: opisanego i wpisanego w tę piramidę; c) W jakiej szerokości geogr. wynosi jeden stopień równoleżnika 100 kilom? (Promień ziemi = 6377.4 kilom.).

F. Zbiory naukowe.

I. Biblioteka nauczycielska.

Z końcem roku szkolnego był jój stan następujący:

	W r. 1888	Jest
	przybyło	ogółem
	tomów i zeszytów	tomów i zeszytów
W dziale:		
I. Teologii, filozofii i pedagogiki	5	149
II. Historii i geografii	8	417
III. Filologii klasycznej:		
a) Języka i literatury łacińskiej	6	351
b) " " greckiej	5	316
IV. Matematyki i nauk przyrodniczych:		
a) Matematyki	8	152
b) Nauk przyrodniczych	1	248
V. Języka i literatury polskiej	26	413
VI. " " greckiej	3	242
VII. Dzieł zbiorowych i różnej treści	6	270
Razem . . .	68	2558
<i>Oprócz tego posiada jeszcze biblioteka:</i>		
Atlasów i albumów	—	26
Map	9	96
Programów	145	1829
Rycin Langla do historii	—	24

Z pism peryodycznych prenumerowano w b. r. następujące:

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien, Przewodnik bibliograficzny, Kwartalnik historyczny, Bibliotekę warszawską, Przewodnik naukowy i literacki (z ryczałtu), der Naturforscher, Oesterreichische botanische Zeitschrift (dar Wys. c. k. Ministerstwa W. i Ośw.), Mittheilungen der geographischen Gesellschaft in Wien, Verordnungsblatt für den Dienstbereich des k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht (z ryczałtu).

a) *W roku bieżącym zakupiono:*

- I. W dziale teologii, filozofii i pedagogiki:
- 1) Kummer Dr. Karl Ferd. Stimmen über den österr. Gymnasiallehrplan v. 26. Mai 1884. Wien 1886.
 - 2) Dąbrowski ks. Tomasz. Historia biblijna Cz. II. Nowy zakon. Stanisławów 1881.
 - 3) Schmid K. A. Encyclopädie des gesamen Erziehungs- und Unterrichtswesens. Tom 9 i 10. Lipsk 1887.
- II. W dziale historyi i geografii:
- 1) Weiss Dr. J. B. Lehrbuch der Weltgeschichte VIII. Band, 2 Hälfte. Schreckenszeit der franz. Revolution Wien 1887.
 - 2) Szujski Józef. Dzieła. Wyd. zbiorowe. Serya II. T. V. i IV. Opowiadania i roztrząsania Kraków 1885. i Serya III. T. I. Pisma polityczne.
 - 3) Gindely Ant. Dzieje powszechne dla wyższych klas szkół średnich. T. II. i III. Dzieje średniowieczne i nowożytnie, tłóm. Mich. Markiewicz. Rzeszów 1886.
 - 4) Welter. Dzieje wieków średnich dla klas niższych gimn. T. II. tłóm. Z. Sawczyński. Kraków 1880.
 - 5) Zarański Stanisław. Pierwiastki dziejów ojczystych w ich organicznym rozwoju Kraków 1886.
 - 6) Zöppritz Dr. Karl. Leitfaden der Kartenentwurfslehre Leipzig 1884.
- III. W dziale filologii klasycznej:
- 1) Polybii historia ed. Lud. Dindorfius. Vol. III. & IV. Lipsiæ 1886.
 - 2) Korneliusza Neposa Żywoty z objaśnieniami i słowniczkiem, wyd. A. Jerzykowski. Poznań 1886. Wyd. 4.
 - 3) Próchnicki Franc. Przykłady do tłumaczenia z języka polskiego na łaciński na III. klasę. Lwów 1883.
 - 4) Aeschinis in Ctesiphontem oratio rec. Andreas Weidner Lipsiæ 1872.
 - 5) Samolewicz Dr. Zygmunt. Gramatyka języka łacińskiego Lwów 1884. Wyd. 4.
- IV. W dziale matematyki i nauk przyrodniczych:
- 1) Mocnik Fr. Arytmetyka dla użytku niższych klas gimn. Cz. II. na III. i IV. klasę, tłóm. Bączalski i Grzybowski. Lwów 1882.
 - 2) Mocnik Fr. Geometrya pogładowa Cz. II. na III. i IV. klasę, tłóm. Grzegorz Maryniak, Lwów, 1886.
 - 3) Mocnik Franc. Geometrya dla klas wyższych szkół średnich, Lwów 1880, tłóm. Dr. Tomasz Stanecki.
 - 4) Mocnik Franc. Arytmetyka i Algebra dla klas wyższych z XV. wyd. przeł. J. Bodyński, Lwów, 1880.
 - 5) Łomnicki A. M. Mineralogia dla klas niższych, Lwów, 1882.
- V. W dziale języka i literatury polskiej:
- 1) Szujski Józef. Dzieła, wyd. zbiorowe Ser. I. Dramata. Kraków. 1886.
 - 2) Mecherzyński Dr. K. Przykłady i wzory z najcelniejszych

poetów i prozaików polskich T. I. wyd. 2. Kraków, 1877. 3) Chociszewski Józef. Piśmiennictwo polskie, wyd. 2. Poznań 1882. 4) Jul. Słowacki, Dzieła wyd. A. Kaczurby Kraków 1888. 5) Małecki Ant. Gramatyka języka polskiego szkolna, wyd. 7. Lwów 1886. 6) Roman Pilat. Pamiętnik towarzystwa literackiego im. Ad. Mickiewicza, Lwów 1887. 7) Wypisy polskie dla klas niższych. T. III. wyd. 4. Lwów 1878. 8) Kitowicz ks. A. Pamiętniki do panowania Augusta III. i Stan. Augusta. Wyd. Kaczurby. Lwów, 1882, 3 tomy.

VI. W dziale języka i literatury niemieckiej:

1) Hamerski Edward. Wypisy niemieckie na klasę III. i na kl. IV. Lwów 1882/3, 2 tomy. 2) Harwot Georg. Deutsches Lehr- und Lesebuch 2 Band. Przemysł 1885.

b) Otrzymano w darze:

I. W dziale pedagogiki:

1) Statut organizacyjny nauki dopełniającej w publicznych szkołach pospolitych, Lwów 1886.

II. W dziale filologii klasycznej:

1) Homeri Odysseæ epitome ed. Fr. Pauly. C. Wotke, Lipsiæ, Pragæ 1887. Dar księgarza Tempskiego. 2. Herodoti historiarum lib. V, VI, VII, ed. Alfr. Holder, Pragæ 1887. Dar Tempskiego. 3) Demostenis orationes selectæ ed. C. Wotke. Lipsiæ, Pragæ 1887. Dar Tempskiego. 4) Bielikowicz ks. Antoni, Słownik polsko-łaciński. Krak. 1866, 2 tomy.

III. W dziale matematyki:

1) Zajączkowski Władysław. Początki arytmetyki na I. i II. klasę. Lwów 1887. Dar nakładców.

IV. W dziale języka i literatury polskiej:

1) Kwiatkowski Antoni. O sposobie traktowania lektury utworów piśm. w języku ojczystym, Drohobycz 1886. 2) Dzieła Adama Mickiewicza. Wydanie zupełne. Paryż 1880. 11 tomów. Dar od komitetu pomnika dla Ad. Mickiewicza.

V. W dziale dzieł rozmaitej treści:

1) Pawlikowski Dr. J. G. Wyższa szkoła rolnicza w Dublanach. Fakta i uwagi. Kraków 1886. Dar autora. 2) Seifman Dr. Zdanie sprawy o szkole weterynaryi we Lwowie za 5-letni okres jęj istnienia 1881–1886. Lwów 1886.

2. Biblioteka dla młodzieży:

Biblioteka obejmuje obecnie 651 dzieł, w 847 tomach.

W bieżącym roku szkolnym przybyły następujące dzieła:

Adam Mickiewicz pisma 5 tomów, Tatomir: Ferye alpejskie, Tegoż: obrazki geograficzne, Tegoż: Apostołowie słowiańscy św. Cyryli i Metody, Słowacki: dzieła 6 tom., Małecki: Juliusz Słowacki życie i pisma, Kito-wicz: Opis obyczajów i zwyczajów w Polsce za Augusta III., Zipper Alb.: Mitologia Greków i Rzymian, Dr. Ziemia: Estetyka poezyi; Wyprawy misyjne do krajów Zambezy, Anczyc: księga sławniejszych odkryć geo-graficznych, Müller, Chęciński: Młodość sławnych ludzi, Teresa Jadwiga: Z przeszłości, Przyborowski: Król Krak i królowna Wanda.

Zipper: Kurzer Abriss zugleich Repetitorium der deutschen Litera-tur-Geschichte, Schmidt: Die Türken vor Wien, Grimm: Sagen und Mär-chen aus der Heroenzeit der Griechen und Römer, Gerstäcker: - Schmidt: Die Pampas Indianer, Verne: Die grossen Seefahrer des 18. Jahrhunderts.

3. Gabinet historii naturalnej posiadał:

a) W dziale zoologicznym:

Okazów wypechanych	75
Rogów	4
Słojów z okazami w spiryt.	22
Zbiór owadów,	
Koralowców	3
Skorup mięczaków	60
Okazów z masy papierowej	7
" " " gipsowej	4
Atlasów	5
Tablic	10

b) W dziale botanicznym:

Okazów z masy papierowej	6
Pni drzew	85

Zielnik	1
Okazów owoców	7
Tablic	54
Różne botaniczne przybory w pudełku.	

c) W dziale mineralogii:

Modeli krystalów	78
Okazów minerałów, skał, ska- mielin	152
Tablic	10
Atlas geologiczny	1
Skalę topliwości wedł. Kobeka,	
Skalę twardości, Warstwy ziemi,	
Mineralogiczne przybory.	

W tym roku zakupiono:

1. Model skóry w przekroju, 2. model zębów, 3. Spaćek: Gebisse der Säugethiere, 4. Schmidt - Göbel: die schädlichen und nützlichen Insecten in Forst, Feld und Garten (14 tablic), 5. Geisler: die wichtigsten Arznei- und Giftpflanzen Mitteleuropas (1 tabl.), 6. Geissler: die wich-

tigsten Cultur- und Handelspflanzen (1 tabl.) 7. Forwerg: Blattformen (8 tabl.) 8. Najważniejsze lekarskie i jadowne rośliny (1 tabl.).

Otrzymano w darze:

1. Bociana czarnego (*ciconia nigra*), 2. baka (*ardea stellaris*), 3. Świn-
kę morską (*cavia cobaya*), od Wgo pana Gajdy, 4. Jeżokraba (maja squi-
nado) od Wgo pana Lachnera, 5. Sokoła pustulkę (*falco tinunculus*) od
uczni Dolkowskiego. 6. Dębinki i żółędzie, 7. torebkę bawełny, 8. to-
rebki kawy i 9. indigo w słoiku, od Wgo pana Guńkiewicza.

4. Gabinet fizyczny posiada obecnie 347 przyrządów, mianowicie:

w dziale:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
przyrządów:	12.	23.	17.	26.	26.	22.	62.	78.	42.	39.

W tym roku zakupiono: Lampę łukową elekt., rurę Geislerowską,
przyrząd Hoffmanna (do rozkładu kwasu solnego), cyrkiel, ciepłomierz,
audiometer i elektromagnes sporządzono w gabinecie.

5. Do nauki rysunków

posiada zakład obecnie wzorów 1472, modeli 128, przyborów 23. W tym
roku zakupiono:

a) Kolb H. 25 Wandtafeln für das elementare Freihand-Zeichnen.
b) Steigl: Wandtafeln für den Zeichenunterricht — serya I. kart 12
serya II. kart 15. — c) Modele z masy papierowej w pudełkach, serye 4.

6. Biblioteka książek szkolnych

dla ubogich uczniów liczy (po sporządzeniu nowego inwentarza i wydzie-
leniu książek, które już wyszły z użytku szkolnego) 170 dzieł; wszystkie
znajdowały się w ręku ubogich uczniów. — Datki wrzucane do puszek
po exhortach, przeznaczone na pomnożenie tego księgozbioru, przyniosły
od dnia 22. stycznia 1888 do końca roku szkolnego 33 Zł. 37 kr.

G. Kronika Zakładu.

I. Zmiany w gronie nauczycielskiem:

1. Reskryptem z dnia 26. lipca 1887 do l. 499 doniosło Wys. Prezydyum c. k. Rady szk. kraj., że J. E. Pan Minister W. i Ośw. zamianował dekretem z dnia 9. lipca 1887 do l. 11907 rzeczywistym nauczycielem w tutejszém c. k. gimnazyum Waleryana Hecka, zastępcę nauczyciela w c. k. gimnazyum Stanisławowskiém.

2. Reskryptem z dnia 7. września 1887 do l. 11697 poleciła Wys. c. k. Rada szk. kr. uwolnić zastępcę nauczyciela Adama Miodońskiego na jego własną prośbę od obowiązków nauczycielskich w tutejszym c. k. gimnazyum z końcem września.

3. Reskryptem z dnia 7. września 1887 do l. 604 przeniosło Wys. Prezydyum c. k. Rady szk. kr. zastępcę nauczyciela Edwarda Schirmera z tutejszego gimnazyum do II. c. k. gimnazyum we Lwowie.

4. Reskryptem z dnia 18. września 1887 do l. 610 doniosło Wys. Prezydyum c. k. Rady szk. kr., iż J. E. P. Minister W. i Ośw. dekretem z dnia 26. sierpnia 1887 do l. 16403 zamianował ks. Jana Krupińskiego rzeczywistym nauczycielem religii w tutejszém c. k. gimnazyum.

5. Reskryptem z dnia 6. listopada 1887 do l. 723 doniosło Wysokie Prezydyum c. k. Rady szk. kr. w myśl rozp. Wys. c. k. Ministerstwa W. i Ośw. z dnia 27. października 1887 do l. 21476, że Jego Ces. i Król. Apostolska Mość raczył Najwyższém postanowieniem z dnia 23. października 1887 zamianować profesora gimnazyum Drohobyckiego, Seweryna Arzta, dyrektorem tutejszego zakładu.

6. Reskryptem z dnia 15. stycznia 1888 do l. 18247 zatwierdziła Wys. c. k. Rada szk. kr. nauczyciela tutejszego zakładu, Ludwika Totę, w zawodzie nauczycielskim, nadając mu zarazem tytuł c. k. profesora.

7. Reskryptem z dnia 2. maja 1888 do l. 5216 przyznała Wysoka c. k. Rada szk. kr. profesorowi Albertowi Gąsiorowskiemu trzeci, a

8. Reskryptem z dnia 12. maja 1888 do l. 6621 profesorowi Michałowi Frąckiewiczowi drugi dodatek kwinkwenalny.

9. Reskryptem z dnia 5. października 1887 do l. 13662 powierzyła Wys. c. k. Rada szk. kr. zastępcy nauczyciela Łucykowi Anatolemu naukę kaligrafii, a

10. Reskryptem z dnia 9. października 1887 do l. 14383 naukę śpiewu w tutejszym c. k. gimnazyum.

11. Dnia 11. czerwca 1888 zmarł po krótkiej chorobie w sile wieku profesor Albert Gąsiorowski, który przez lat 16 pracował w tutejszym zakładzie udzielając języka polskiego i historii powszechnej. W wolnych od pracy zawodowej chwilach zasiliał pracami swymi nacechowanymi oryginalnym talentem mianowicie nowelami, które pisał pod pseudonimem Górowskiego i Tristisa, rozmaite czasopisma tak polityczne jak i literackie. Pracą swą w zakładzie i literaturze ojczystej, postępowaniem taktownem i uprzejmém, potrafił zmarły zyskać sobie szacunek nie tylko u kolegów i młodzieży, ale téż i u szerszej publiczności, która żał swój nad stratą jego wyraziła przez liczny udział w odprowadzeniu zwłok na miejsce wiecznego spoczynku i licznemi wspomnieniami pośmiertnemi w dziennikach cześć jego pamięci oddała.

II. Rok szkolny 1888 rozpoczął się dnia 3. września 1887 uroczystém nabożeństwem.

Egzamin wstępny uczniów zapisanych do klasy I. odbył się częścią z końcem zeszłego, częścią zaś z początkiem tego roku w dniach 1. i 2. września. Na 49 uczniów zostało 3 przy egzaminie tym reprobowanych.

Zakład obchodził uroczyście Imieniny Najjaśniejszych Państwa; zaś dnia 6. maja 1888 odprawiono żałobne nabożeństwo za spokój duszy Najjaśniejszej Cesarzowej Maryi Anny, a dnia 27. czerwca 1888 za spokój duszy Najjaśniejszego Cesarza Ferdynanda I.

Wysoka c. k. Rada szk. kr. reskryptem z dnia 13. września 1887 do l. 12968 przyzwoliła na podział III. klasy na dwa oddziały.

Do spowiedzi i komunii św. przystępowała młodzież katolicka gimnazjalna trzy razy w roku szk. 1888 i odprawiła w wielkim tygodniu trzydniowe rekolekcyje.

Pisemna część egzaminu dojrzałości odbyła się w czasie od 11—16 czerwca, ustna zaś pod przewodnictwem delegata Wysokiej c. k. Rady szkolnej krajowej Wgo Pana Marcelego Studzińskiego, c. k. dyrektora szkoły realnej krakowskiej dnia 7. 9. i 10. lipca 1888.

Pierwsze półroczcie zakończono dnia 30. stycznia 1888; drugie rozpoczęto dnia 3. lutego. Rok szkolny zakończono dnia 30. czerwca uroczystym nabożeństwem i rozdaniem świadectw.

H. Ważniejsze rozporządzenia władz szkolnych.

Wysoka c. k. Rada szkolna krajowa zaliczyła w poczet książek dozwo-
lonych do użytku szkolnego lub poleciła do biblioteki następujące książki:

1. Weltera dzieje powszechne skrócone, przełożył na język polski Zygmunt Sawczyński. — Część I. Dzieje starożytne. Wydanie 5. uzupełnione. — Kraków, nakładem księg. Himmelblaua 1886. — Rozp. z dnia 20 lipca 1887 do l. 8822.
2. Kurzer Abriss, zugleich Repetitorium der deutschen Literaturgeschichte von Dr. Albert Zipper — rozp. z dnia 31. lipca 1887 do l. 9108.
3. Chanoch L'naar: Historia biblijna wraz z zasadami i rytuałem religii mojżeszowej dla użytku izraelskiej młodzieży szkolnej, opracował Izidor Planer — Część I. Lwów 1886 — rozp. z dnia 28 sierpnia 1887 do l. 12193.
4. Cornelii Taciti opera, quae supersunt, recensuit Joannes Müller. Vol. I. Pragae — Tempsky i
5. Herodots Perserkriege. Griechischer Text mit erklärenden Anmerkungen für den Schulgebrauch herausgegeben von Dr. Val. Hintner I. Theil — 2-te Auflage 1887. Wien Hölder. reskr. z dnia 23 września 1887 do l. 12006.
6. C. Julii Caesaris Commentarii de bello Gallico — Scholarum in usum edidit Ignatius Prammer — Pragae — Tempsky 1887;
7. T. Livii ab urbe condita lib: I. II. XXI. i XXII., scholarum in usum edidit Antonius Zingerle — Pragae — Tempsky 1887 i
8. P. Ovidii Nasonis carmina selecta. Scholarum in usum edidit H. St. Sedlmayer — Pragae — Tempsky 1887 — reskr. z d. 23 września 1887 do l. 10812.
9. Platonis Apologia et Crito. Scholarum in usum edidit Josephus Král. Tempsky — Pragae 1885;
10. Platonis Protagoras — Scholarum in usum edidit Josephus Král. — Pragae — Tempsky 1886;
11. P. Vergilii Maronis carmina selecta — edidit Edmundus Eichler — Pragae — Tempsky 1887 — reskr. z d. 21 września 1886 do l. 9228.

12. Istorja biblijna staroho zawita dla hr. kat. mołodzieży serednych szkół, napsawsa Ałeksiej Torońskij — Lwów 1887 — reskr. z dnia 29 października 1887 l. 15918.
13. Przykłady do tłumaczenia z języka łacińskiego na polski i z polskiego na łaciński. Ułożył Dr. Z. Samolewicz. Część II. Na drugą klasę. Wydanie 3. We Lwowie. Nakładem Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych 1887 — reskr. z dnia 8 listopada 1887 do l. 15675.
14. M. Tulli Ciceronis orationes selectae. Scholarum in usum edidit Hermannus Nohl. Vol. V. Tempsky — Pragae 1888;
15. Homeri Odysseae epitome. In usum scholarum edidit Franciscus Pauly. Editio correctior, quam curavit Carolus Wotke. Pars I. et II. — Tempsky — Pragae 1887 — rozp. z d. 23 grudnia 1888 do l. 16866.
16. Droga do szczęścia prawdziwego — książka do nabożeństwa wydana przez ks. Jakóba Nowakowskiego, — Lwów Łukaszewicz 1885 — reskr. z dnia 23 grudnia 1887 do l. 10465.
17. Z wydawnictwa Graesera w Wiedniu: Schiller: Jungfrau von Orleans, Maria Stuart, Braut von Messina; Goethe: Iphigenie auf Tauris, Torquato Tasso, Hermann und Dorothea; Lessing: Minna von Barnhelm; Shakespeare: Julius Caesar — reskr. z d. 28 grudnia 1887 l. 1994.
18. Dr. Ludomił German — Mitologia dla młodzieży z 26 rycinami. — Kraków — Himmelblau 1886, reskr. z d. 31 stycznia 1886 do l. 570.
19. Die Ernährung des Menschen und seine Nahrungs- und Genussmittel — Über Aufforderung des k. k. Ackerbau-Ministeriums verfasst von Strohmer — Wien — Graeser 1887 — reskr. z dnia 18. lutego 1888 do l. 572.
20. Reskrytem z dnia 8 czerwca 1887 do l. 317 podaje Wysoka c. k. Rada szk. kr. do wiadomości grona nauczycielskiego, iż J. E. P. Minister W. i Ośw. wyraził gotowość udzielać kandydatom stanu nauczycielskiego, którzy zamierzają składać egzamin kwalifikacyjny z języka niemieckiego, stypendyów po 400 złr. dla dalszego kształcenia się na uniwersytecie wiedeńskim.
21. Reskrytem z dnia 28 czerwca 1887 do l. 6361 postanawia Wysoka c. k. Rada szk. kr., by odtąd w I. półroczu klasy VIII. czytano Horacego, a w drugim półroczu Tacyta.
22. Reskrytem z dnia 25. sierpnia 1887 do l. 11902 poleca Wys. c. k. Rada szk. kr., aby natychmiast po każdym terminie egzaminacyjnym posyłano wykazy tych uczniów, którzy przy egzaminie wstępnym do klasy I. reprobowani zostali.

23. Reskryptem z dnia 5. września 1887 do l. 9422 ogłosiła Wys. c. k. Rada szk. kr. okólnik J. E. P. Ministra W. i Ośw. z dnia 1. lipca 1887, aby w każdym zakładzie oznaczyła konferencya fachowych nauczycieli dokładnie materyał mający być przerobionym z gramatyki łacińskiej i greckiej.
24. Reskryptem z dnia 25. października 1877 do l. 15616 stanowi Wys. c. k. Rada szk. kr. zasadę, że tylko ten uczeń może uzyskać uwolnienie od opłaty szkolnej lub pozostawienie tegoż nadal, który się wykaże świadectwem szkolném ucznia publicznego z bezpośrednio ubiegłego półrocza a cenzury świadectw odpowiadają przepisany warunek uwolnienia od opłaty szkolnej.
25. Reskryptem z dnia 11. listopada 1887 do l. 16409 zaznacza Wysoka c. k. Rada szk. kr., że każda szkoła średnia jest obowiązana do wydawnictwa programu i że program powinien wyjść z druku przy końcu roku szkolnego.
26. Okólnikiem z dnia 24. listopada 1887 do l. 17320 przypomina Wys. c. k. Rada szk. kr. reskrypt Wys. c. k. Ministerstwa W. i Ośw. z dnia 16. października 1886 do l. 19190, według którego egzamin poprawczy z jednego przedmiotu jest możliwy tylko przy pierwszym egzaminie dojrzałości, a abiturycenci reprobowani po raz drugi, mogą składać egzamin dojrzałości po raz trzeci tylko za pozwoleniem Wys. c. k. Ministerstwa, do którego wnosić mają podania przez Wysoką c. k. Radę szk. kr. w miesiącu marcu.
27. Okólnikiem z dnia 5. grudnia 1887 do l. 15677 podaje Wysoka c. k. Rada szk. kr. do wiadomości reskrypt Wys. c. k. Ministerstwa W. i Ośw. z dnia 8. października 1887 do l. 17123 téj treści, że na przyszłość należy do egzaminu wstępnego do klasy przygotowa wczéj przypuszczać tylko tych uczniów, którzy dziewiąty rok życia albo już ukończyli, albo ukończą w tym roku kalendarzowym, w którym do zakładu wstępują.
28. Na mocy Najwyższego postanowienia z dnia 24. listopada 1887 rozporządza J. E. P. Minister W. i Ośw., że dyrektorowie i profesorowie szkół średnich, którzy są członkami Rady państwa, uwolnieni są na cały czas trwania ich mandatu od wszelkich obowiązków i czynności nauczycielskich.
29. Reskryptem dnia 24. grudnia 1887 do l. 18679 przypomina Wysoka c. k. Rada szk. kr., że historia kraju rodzinnego, będąc przedmiotem nadobowiązkowym, nie może uwalniać nauczyciela od wykładu historii polskiej, jako integralnej części historii powszechnej.

30. Okólnikiem z dnia 28. grudnia 1887 do l. 17951 poleca Wys. c. k. Rada szk. kr. usunąć książki z użytku szkolnego, które z powodu niewłaściwego uposażenia pod względem typograficznym działają szkodliwie na wzrok uczniów.

J. Statystyka uczniów.

	W k l a s a c h								Razem	
	I.	II.	III a.	III b.	IV.	V.	VI.	VII.		VIII.
Z końcem roku 1886/7 było uczniów	45+1	60	46		30	29	22	17	19	268+1
Na początku r. 1887/8 wpisało się:	51	44	29	28	39	23	21	21	18	274
W ciągu roku szkolnego wstąpiło	1	—	—	—	1	1	—	—	1	4
Wpisano więc w ogóle	52	44	29	28	40	24	21	21	19	278
Pomiędzy wpisanymi było:										
a) nowych uczniów (z promocją)	50	1	2	—	3	2	2	—	—	60
b) obcych repetentów	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
c) ponownie wpisanych z promocją	—	41	24	28	36	19	19	21	16	204
d) „ „ „ repetentów	2	2	2	—	1	3	—	—	3	13
W ciągu roku szkolnego wystąpiło	3	—	2	1	1	2	1	1	2	13
Liczba uczniów przy końcu r. sz. 1887/8	49	44	27	27	39	22	20	20	17	265
Z tej liczby uczniów publicznych	48	43	25	27	39	22	20	20	17	261
„ „ „ prywatnych	1	1	2	—	—	—	—	—	—	4
2. Miejsce urodzenia:										
Z miasta Wadowic	11	7	3	4	8	6	4	4	5	52
Z powiatu Wadowickiego (nie licząc Wadowic	16	18	10	6	6	5	3	5	4	73
Z powiatu Białskiego	6	5	3	2	10	1	4	5	2	38
„ „ Chrzanowskiego	4	—	—	1	—	—	—	—	—	5
„ „ Myślenickiego	3	4	1	5	5	3	—	—	—	21
„ „ Nowotarskiego	1	1	—	1	2	2	—	—	1	8
„ „ Żywieckiego	1	1	3	—	—	2	4	1	—	12
Z innych powiatów Galicyi	7	7	5	8	8	3	4	5	4	51
Z Węgier	—	1	2	—	—	—	—	—	1	4
Z Królestwa Polskiego	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	49	44	27	27	39	22	20	20	17	265
3. Język ojczysty:										
polski	48	43	27	27	39	22	20	20	17	263
niemiecki	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
4. Religia:										
Rzymsko-katolicka	43	41	27	26	37	21	18	17	17	247
Grecko-katolicka	1	—	—	—	—	—	1	1	—	3
Wyzn. ewangel.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
„ mojszesz.	5	2	—	1	2	1	1	2	—	14
	49	44	27	27	39	22	20	20	17	265

	W k l a s a c h								Razem	
	I.	II.	IIIa.	IIIb.	IV.	V.	VI.	VII.		VIII.
5. Wiek uczniów:										
Urodzonych w r. 1877 (11 lat)	12	2	—	—	—	—	—	—	—	14
" " 1876 (12 lat)	11	9	—	—	—	—	—	—	—	20
" " 1875 (13 lat)	14	6	4	9	1	—	—	—	—	34
" " 1874 (14 lat)	8	15	7	3	7	—	—	—	—	40
" " 1873 (15 lat)	3	8	4	4	9	2	—	—	—	30
" " 1872 (16 lat)	1	4	7	5	11	6	6	—	—	40
" " 1871 (17 lat)	—	—	4	4	7	8	4	—	—	27
" " 1870 (18 lat)	—	—	1	—	—	2	5	1	2	11
" " 1869 (19 lat)	—	—	—	1	4	4	4	11	2	26
" " 1868 (20 lat)	—	—	—	1	—	—	—	3	3	7
" " 1867 (21 lat)	—	—	—	—	—	—	1	5	5	11
" " 1866 (22 lat)	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
" " 1864 (24 lat)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
" " 1861 (27 lat)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	49	44	27	27	39	22	20	20	17	265
6. Frekwencja według miejsca pobytu rodziców:										
miejscowi:	18	16	5	10	7	8	8	11	7	90
zamiejscowi:	31	28	22	17	32	14	12	9	10	175
	49	44	27	27	39	22	20	20	17	265
7. Klasyfikacja:										
a) Z końcem roku szkolnego 1888 otrzymano										
stopień celujący	4	3	4	6	4	1	3	2	1	28
" pierwszy	25+1	28	18+2	13	22	18	10	16	16	166+3
Do egzaminu poprawcz. przeznaczono	6	6	2	5	6	1	4	2	—	32
stopień drugi	9	6	1	2	6	1	2	—	—	27
" trzeci	4	0+1	—	1	1	1	—	—	—	7+1
Do egzaminu uzupełniającego z powodu słabości przypuszczono	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Razem	48+1	43+1	25+2	27	39	22	20	20	17	261+4
b) Dodatkowa klasyfikacja za rok 1886/7										
Do egzaminu poprawcz. przeznaczono	5	1	10	—	5	7	—	4	—	32
Z tych odpowiedziało	4	1	9	—	5	6	—	4	—	29
nieodpowiedziało	1	—	1	—	—	1	—	—	—	3
Wynik ostateczny za rok szkol. 1886/7:										
Stopień celujący	4	13	4	1	5	2	—	2	—	31
" pierwszy	38	43	35	26	17	20	17	17	—	213
" drugi	3	2	5	3	7	—	—	—	—	20
" trzeci	1	2	2	—	—	—	—	—	—	5
Razem	46	60	46	30	29	22	17	19	—	269

	W k l a s a c h								Razem	
	I.	II.	III a.	III b.	IV.	V.	VI.	VII.		VIII.
8. Opłata szkolna w r. 1888										
Opłatę szkolną złożyło w I. półroczu	51	11	5	4	8	5	5	4	1	94
" " " w II. " "	17+1	12+1	5+2	5	14	5	9	5	1	73+4
Uwolnionych było od całej opłaty										
w I. półroczu:	—	33	24	24	31	16	16	17	18	179
w II. półroczu:	31	31	20	22	25	17	11	15	16	188
Opłata szkol. wynosiła w ogóle zł. w a.										
w I. półroczu:	765	165	75	60	120	75	75	60	15	1410
w II. półroczu:	270	195	105	75	210	75	135	75	15	1155
Razem	1035	360	180	135	330	150	210	135	30	2565
Taksy wstępne wynosiły Zł.	105	2-1	4-2	—	6-3	4-2	4-2	—	—	126
Datki na środki naukowe Zł.	52	44	29	28	40	24	21	21	19	278
Opłata za duplikaty świadectw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
9. Frekwencja na przedmioty nadobowiązkowe:										
na naukę historii kraju rodzinnego	—	—	52	39	—	20	20	—	—	181
" " rysunków	—	—	12	11	7	3	9	1	—	43
" " kaligrafii	38	34	—	—	—	—	—	—	—	72
" " śpiewu	17	18	12	14	14	7	12	4	3	101
10. Stypendya:										
Pobierali stypendya z fundacyi:										
a) Samuela Głowińskiego 157 zł. 50 ct.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
b) c. k. dyrekcji skarbu 150 zł.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
c) wsparcia imienia Mikołaja Kopernika 28 zł.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
z tej samej fundacyi 35 zł.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
d) izraelskiego komitetu składkowego miasta Wadowic imienia Najd. Arcyksiężniczki Gizeli 8 zł. 40 ct.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
e) Andrzeja Nielepca 50 zł.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
f) myślenickiej 26 zł.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Ogólna liczba stypendystów	—	1	—	1	—	—	2	1	3	8
Kwota stypendyjna wynosiła zł.	—	50	—	26	—	—	185 50	35	315 90	612-40

K. Klasyfikacya uczniów

za II. półrocze 1888.

Klasa I.

Stopień celujący:

Guzdek Wincenty.
Mięslowicz Władysław.
Trammer Jérzy.
Warzeszkiewicz Kazimierz.

Stopień pierwszy:

Beranek Stanisław.
Bogdani Wiktor.
Borowczyk Feliks.
Borowiec Józef.
Ciszek Franciszek.
Dembiński Tadeusz.
Frąckiewicz Tadeusz.
Gołba Józef.
Górny Jan.

Israeli Abraham.
Jaworski Ferdynand.
Juras Stanisław.
Kamiński Antoni.
Kiszakiewicz Ludwik.
Magiera Bronisław.
Mecnarowski Kazimierz.
Miarka Antoni.
Miśko Floryan.
Nikiel Karol.
Serwin Józef.
Weiss Henryk.
Witkowski Ignacy.
Zajas Jan.
Zajac Tadeusz.
Żmuda Franciszek.

Stopień II. otrzymało 9.

Stopień III. „ 4.

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 6.

Klasa II.

Stopień celujący:

Cholewka Stanisław.
Płonka Jan.
Rajda Aleksander.

Stopień pierwszy:

Bazal Nikodem.
Bielewicz Stefan.
Bobrzyński Mieczysław.

Bogdański Kazimierz.
Chmielewski Ewaryst.
Chmielowski Antoni.
Czapik Józef.
Fonferko Adam.
Foryś Franciszek.
Gąsiorowski Leon.
Gros Józef.
Halon Leib.

Jędrzejowski Kazimierz.
 Kamecki Daniel.
 Kocyan Stefan.
 Lindner Adam.
 Mendyk Władysław.
 Mosch Józef.
 Nikiel Jan.
 Pindelski Józef.

Rychlik Ludwik.
 Schwarz Adolf.
 Szarek Jan.
 Timal Rudolf.
 Węgrzyn Jan.
 Wiśnicki Jan.
 Wysocki Stefan.
 Żurek Roman.

Stopień II. otrzymało 6.

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 6.

Klasa III. A.

Stopień celujący:

Folta Jan.
 Grudzień Ignacy.
 Jura Andrzej.
 Vrana Władysław.

Stopień pierwszy:

Chlebowski Antoni.
 Czerwiński Jan.
 Gayczak Bronisław.
 Geruszczak Maksymilian.
 Górski Tadeusz.
 Grzywa Franciszek.

Hörunter Eugeniusz.
 Janicki Michał.
 Karafiat Jan.
 Komorek Józef.
 Kozłowski Franciszek.
 Kuś Franciszek.
 Leśniak Władysław.
 Małysa Michał.
 Röhr Ludwik.
 Rychlik Alojzy.
 Szczęśniak Józef.
 Vrana Edmund.

Stopień II. otrzymał 1.

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 2.

Klasa III. B.

Stopień celujący:

Frąckiewicz Stanisław.
 Mięslowicz Erwin.
 Migdałek Konstanty.
 Sadowski Józef.
 Śmietana Waclaw.
 Wierzbicki Leon.

Stopień pierwszy:

Adamowicz Stanisław,
 Bajorski Jan.
 Brańka Michał.
 Gielata Karol.
 Jasiński Emil.
 Kankofer Antoni.

Migdałek Józef.
 Moskała Jan.
 Nowak Franciszek.
 Smółka Wawrzyniec.

Wilczyński Ludwik.
 Włodek Wilhelm.
 Zaczek Władysław.

Stopień II. otrzymało 2.

Stopień III. „ 1.

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 5.

Klasa IV.

Stopień celujący:

Bogdani Maryan.
 Dbałowski Włodzimierz.
 Dudziak Jan.
 Mika Franciszek.

Stopień pierwszy:

Babicz Edward.
 Biesik Herman.
 Bocheński Kazimierz.
 Czapik Karol.
 Dembiński Czesław.
 Haber Artur.
 Hojny Józef.
 Janicki Józef.

Kłaput Jan.
 Kornicki Wojciech.
 Krupiński Rudolf.
 Kubiczek Roman.
 Kurowski Jędrzej.
 Meciszewski Czesław.
 Miarka Teofil.
 Offner Mordche.
 Palusiński Józef.
 Pytel Józef.
 Sokalski Eustachy.
 Strowski Maryan.
 Winiarski Bolesław.
 Wojewodziec Paweł.

Stopień II. otrzymało 6.

Stopień III. „ 1.

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 6.

Klasa V.

Stopień celujący:

Krzanok Walenty.

Stopień pierwszy:

Biela Józef.
 Bieroński Jan.
 Chmielewski Julian.
 Czerwiński Tomasz.

Dbałowski Józef.
 Dihm Władysław.
 Gąsienica Bronisław.
 Guńka Jakób.
 Israeli Ludwik.
 Kaznowski Antoni.
 Krzeszowski Jan.
 Kulig Zygmunt.

Kuska Antoni.
 Maciąga Stanisław.
 Masny Jan.

Pomietło Aleksander.
 Ruła Adam.
 Wądolny Władysław.

Stopień II. otrzymał 1.

Stopień III. „ 1.

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 1.

Klasa VI.

Stopień celujący:

Gayczak Władysław.
 Rzeszódka Kazimierz.
 Trammer Schoel.

Fryś Wilhelm.
 Jarosz Józef.
 Masny Ignacy.
 Styła Ludwik.
 Szydłowski Wacław.
 Wąsik Franciszek.
 Widlarz Ferdynand.
 Zachariasiewicz Tadeusz.

Stopień pierwszy:

Bier Leonard.
 Bobrzyński Karol.

Stopień II. otrzymało 2.

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 4.

Do egzaminu uzupełniającego 1.

Klasa VII.

Stopień celujący:

Biesik Józef.
 Szłósarczyk Franciszek.

Gałgan Marcin.
 Gąsiorowski Tadeusz.
 Giziński Maksymilian.
 Hajost Jan.
 Hryniewiecki Jan.
 Kubiczek Ludwik.
 Kwiatkowski Mieczysław.
 Nikliborc Szczepan.
 Pomietło Franciszek.
 Talaga Paweł.

Stopień pierwszy:

Banaś Franciszek.
 Bazal Jan.
 Caputa Józef.
 Czapiński Ludwik.
 Dworak Józef.
 Faifer Michał.

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 2.

Klasa VIII.

Stopień celujący:
Trojnar Józef.

Stopień pierwszy:
Alberti Stanisław.
Brzeźniak Michał.
Chrzęszcz Ludwik.
Czerwiński Władysław.
Dihm Stanisław.
Ferek Franciszek.

Juras Antoni.
Namaczyński Jan.
Palczny Nikodem.
Pawlicki Michał.
Polony Tadeusz.
Roman Michał.
Rozak Franciszek.
Rychlik Tadeusz.
Wienczek Stanisław.
Zajęc Karol.


L. Wynik egzaminu dojrzałości.

Do egzaminu dojrzałości zgłosiło się uczniów publicznych . . .	17
Przed rozpoczęciem egzaminu odstąpił	1
Egzamin składało	16
Z tych uznała komisya za dojrzałych	14
Pozwolono poprawić egzamin z jednego przedmiotu po wakacjach	1
Reprobowano bez terminu	1

Za dojrzałych uznani:

Alberti Stanisław.
Brzeźniak Michał.
Chrzęszcz Ludwik.
Czerwiński Władysław.
Dihm Stanisław.
Juras Antoni.
Namaczyński Jan.

Palczny Nikodem.
Pawlicki Michał.
Polony Tadeusz,
Roman Michał.
Rychlik Tadeusz.
Trojnar Józef.
Wienczek Stanisław.



Do rodziców i opiekunów.

Wpisy uczniów do gimnazjum na rok szkolny 1889 odbędą się dnia 29. 30. i 31 sierpnia. Późniejsze zgłoszenie się do zapisu może być uwzględnione tylko w razie ważnych powodów.

Przy zapisie ucznia do szkoły musi być obecny ojciec, lub matka albo opiekun. Każdy uczeń obowiązany jest przynieść należycie wypełnione nacyonale, świadectwo z ostatniego półrocza i datek na środki naukowe w kwocie 1 złr. w. a.; oprócz tego każdy nowo wstępujący do zakładu metrykę chrztu lub urodzenia i takse wstępną w kwocie 2 złr. 10 cent. Wszyscy uczniowie wstępujący do klasy I. muszą się poddać egzaminowi wstępnemu, który się odbędzie dnia 1 i 2 lipca i dnia 1 i 2 września, poczem dopiero ostateczne przyjęcie do zakładu nastąpi.

Uczniowie przychodzący z innych zakładów do tutejszego gimnazjum winni przynieść świadectwo z ostatniego półrocza, opatrzone uwolnieniem z zakładu, do którego w ostatniem półroczu uczęszczali.

Ponieważ nie wolno uczniom gimnazyalnym gdzieindziej mieszkać, jak tylko tam, gdzie Dyrekcyja gimnazyalna pozwoli, przeto zechcą rodzice i opiekuni dowiedzieć się pierwój u Dyrekcyi, czy miejsce, gdzie zamierzają synów i pupilów swoich umieścić, nie należy do zabronionych.

Oplata szkolna, która ma być złożoną w pierwszych sześciu tygodniach każdego półrocza, wynosi na jedno półrocze 15 złr. w. a.

Ponieważ częste porozumiewanie się szkoły z rodzicami i nadzorem domowym jest rzeczą nader pożądaną, przeto będą się Profesorowie co niedzielę od 9—10 znajdować w kancelaryi gimnazyalnej celem udzielania rodzicom i nadzorom domowym wiadomości o postępie w naukach i prowadzeniu się uczniów.

Rodzice i opiekunowie zechcą przy wpisie oświadczyć Dyrekcyi, czy życzą sobie, aby ich synowie lub pupile pobierali naukę w przedmiotach nadobowiązkowych. Kto naukę tę rozpocznie, nie wolno mu jój przerwać przed końcem roku szkolnego bez zezwolenia Dyrekcyi. Opuszczanie godzin nauki nadobowiązkowej wpływa niekorzystnie na ogólną cenzurę z pilności.

Nabożeństwo wstępne odbędzie się dnia 3. września, poczem dnia 4. września rozpocznie się regularna nauka szkolna.



Seweryn Arzt,
dyrektor.

