

1892. B. 6.

Murdziński Fr.

Kalendarz lekarski krakowski
na r. 1892.

Medyc pol. 3596 / I

Biblioteka Jagiellońska



1003121179

KALENDARZ LEKARSKI

KRAKOWSKI

NA ROK

1892.

Na wezwanie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego

ułożył

Dr Franciszek Murdzieński,

Lekarz ordynujący Szpitala ś. Ludwika.

ROK PIERWSZY.

W KRAKOWIE,

NAKŁADEM KSIĘGARNI S. A. KRZYŻANOWSKIEGO.

1892.

SPIS RZECZY.

Przedmowa.	89
Kalendarz kościelny.	
Spis środków lekarskich zawartych w podręczniku terap.	
Podręcznik terapeutyczny	116
Nowe leki	116
Ważniejsze krajowe i zagraniczne zakłady zdroj. kąpielowe	130
Kąpiele z dodatkiem środków lekarskich	144
Najwyższe dawki środków leczniczych	147
Waga różnych dawek	147
Porównanie wag aptekarskich	147
Dawki przeciętne dla dzieci	147
Porównanie dawki leków w stosunku do wieku	147
Ile kropli liczy się na gramm	147
Leczenie zapomocą wziewań	147
Dawki środków używanych do wziewań	147
Leczenie zapomocą wstrzykiwań podskórnych	147
Tablica brzemienności	147
Otrucia ostre i sposób ratowania w tychże	147
Ratowanie pozornie zmarłych.	147
Warunki przyjmowania obłąkanych do zakładów publicz- nych lub prywatnych	147
Rozbiór moczu	147
Kilka uwag o świadectwach lekarskich	147
Świadectwo sądowo-lekarskie	147
O sądowych oględzinach i sekeyach zwłok	147
Służba zdrowia w Galicyi	147
Ogólne przepisy pocztowe	147
Poradnik telegraficzny	147
Ruch pociągów na kolejach żelaznych	147
Skala stemplowa	147
Notatki.	

42819
I

W KRAKOWIE,

W Drukarni „CZASU“ FR. KLUCZYCKIEGO I SPÓŁKI
pod zarządem Józefa Łakocińskiego.





PRZEDMOWA.

A roku 1868 wydał w Krakowie Dr Adam Czyżewicz, dzisiejszy Prof. położnictwa we Lwowie, pierwszy *Kalendarz lekarski polski*, aby, jak pisze w przedmowie: «wyrugować rozpowszechnione u nas i naszymi pieniędzmi kupowane kalendarze tego rodzaju zagraniczne». Powodzenie tego kalendarza było wielkie, jednak z powodu wyjazdu Wydawcy, dalszy rocznik się nie pojawił.

Dopiero w r. 1879 wydał Prof. Dr Janikowski, wraz z Doc. Drem Grabowskim *Kalendarz lekarski krakowski* na rok 1880, a następnie na rok 1881. Śmierć Prof. Janikowskiego przerwała dalsze wydawnictwo.

Uznając potrzebę tego rodzaju kalendarza dla lekarzy w Galicyi zamieszkałych*), zajął się wydaniem onegoż Dr Jan Stella Sawicki, Inspektor szpitalów w Galicyi. Przez szereg lat, t. j. od roku 1883 do roku 1891, pojawiały się roczniki *Kalendarza lekarskiego* we Lwowie, a nader staranne opracowanie, jednało im wielu przyjaciół. Należy Mu się

*) Nie mając zamiaru pisania historyi kalendarzy lekarskich, i uwzględniając jedynie stosunki galicyjskie, wspomnieć jednak muszę, że od r. 1870 wychodził w Warszawie *Kalendarz lekarski* nakładem „Gazety lekarskiej“. Od r. 1882 *Rocznik lekarski*, wydawnictwo „Medycyny“, wychodzący dotąd pod redakcyą Dra Fritschego, a od paru lat wychodzi też *Kalendarz lekarski* Dra I. Polaka, Redaktora „Zdrowia“.

też za prace przez szereg tych lat podjęte, ze strony Kolegów w Galicyi zamieszkałych, pełne uznanie.

W roku bieżącym jednak doniósł Kol. Dr Sawicki «Towarzystwu lekarskiemu krakowskiemu», iż z powodu różlicznych zajęć, nie może wydawać dalszych roczników, a zwracając uwagę na potrzebę takiego kalendarza, prosi, aby Towarzystwo nie dało upaść temu krajowemu wydawnictwu.

Wezwany przez Komitet «Towarzystwa lekarskiego krakowskiego», aby się zająć wydaniem *Kalendarza lekarskiego*, przyjąłem wezwanie li tylko dla tego hasła, jakie w tej żmudnej pracy ożywiało moich poprzedników, t. j. «aby pieniądze za granicę nie wysyłano».

Chciałem odpowiedzieć jak najlepiej życzeniom Szanownych Kolegów, czas do zebrania materiałów miałem jednak za krótki. Jeżeli zatem napotkam na inne żądania, co do układu kalendarza, chętnie w przyszłym roczniku zaprowadzę zmiany.

W końcu składam serdeczne podziękowanie Kolegom, którzy mi dopomogli do ułożenia podręcznika terapeutycznego, a mianowicie: Prof. Drowi Gluzińskiemu, Drowi Marcisiewiczowi, Prof. Drowi Marsowi, Drowi Opieńskiemu, Prof. Drowi Pieniążkowi, Drowi Rosenzweigowi, Drowi Schaitterowi, Drowi Sokołowskiemu, Drowi Surzyckiemu, Doc. Drowi Trzebicky'emu i Drowi Zieleniewskiemu.

Kraków, w październiku 1891.

Dr Murdzieński.

Styczeń.

Janwar.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA RUSKIE.
1 P.	Nowy Rok. Almacha m.	20	Ihnatia jep. mucz.
2 S.	Makarego i Martyniana	21	Juliany mucz.
3 N.	2 po Boż. N. Daniela m.	22	N. 4 Adw. Anastazyia mucz.
4 P.	Tytusa m. i Eugeniusza	23	Muczen. 10 w Kry.
5 W.	Emiliana p. i Telesfora	24	<i>Wigil. do Rożdest.</i>
6 S.	Trzech Króli	25	Rożdest. Chryst.
7 C.	Juliana i Lucyana m. ☾	26	Sobor Pr. Bohor.
8 P.	Seweryna m. i Maksyma	27	Stefana mucz.
9 S.	Mareyanny panny m.	28	20 tysiacz. Muczen.
10 N.	1 po 3 Kr. Wilhelma b.	29	N. 1 po Roż. 14 tys. ubit. Mład.
11 P.	Higiniusza b. i Leone.	30	Anysyi prepod.
12 W.	Honoraty i Arkadyusza	31	Mełanyi Rymianki
13 S.	Hilarego b. i Gotfryda w.	1	Janwar. N. Obrez. Hosp.
14 C.	Feliksa męcz. ☽	2	Sylwestra papy Rym.
15 P.	Pawła 1 pust. i Maura w.	3	Małachia proroka
16 S.	Marcellego p. i Ottona w.	4	Sobor 70 apost.
17 N.	2 po 3 Kr. Imie Jezusa	5	N. 2 po Roż. Wig. do Bohoj.
18 P.	Kat. ś. Piotra. w Rzym.	6	Bohójawłonyi Hospod.
19 W.	Ferdynanda w. i Henryka	7	Sobor S. Joanna
20 S.	Fabiana i Sebastyana m.	8	Heorhia prepod.
21 C.	Agnieszki panny m.	9	Połyjewkta mucz.
22 P.	Wincentego i Anastaz. ☾	10	Hryhoria jepisk.
23 S.	Zaślubienie N. Maryi P.	11	Fteodosya prepod.
24 N.	3 po 3 Kr. Tymoteusza b.	12	N. 1 po B. Tatyanny mucz.
25 P.	Nawrócenie św. Pawła	13	Jermyła mucz.
26 W.	Batyldy i Pauli wdowy	14	SS. Otec w Synai
27 S.	Jana Złotoustego b. w.	15	Pawła Ftyweysk.
28 C.	Karola W. i Walerego b.	16	Petra Weryhy
29 P.	Franciszka Salezego b. ☽	17	Antonia Welykaho
30 S.	Hiacynty i Martyny p. m.	18	Aftanasya i Kyryła
31 N.	4 po 3 Kr. Alb.-Ludwiki	19	N. 2 po B. Makarya prepod.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

1 — 1 **Tebeht.**

6 — 6 Tekufah.

10 — 10 Post. Obl. Jerozol.

30 — 1 **Schebat.**

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 7 g. 2 m. 32 rano.

☽ dnia 14 g. 4 m. 46 rano.

☾ dnia 22 g. 5 m. 2 rano.

☽ dnia 29 g. 5 m. 58 popoł.

Luty.

Februł.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 P.	<i>Wigil.</i> Ignacego bisk. m.	20 Jeuftymya Welykaho
2 W.	Oczyszczenie N. Maryi P.	21 Maxyma prepod.
3 S.	Błażeja biskupa męcz.	22 Tymoftea apost.
4 C.	Weroniki panny	23 Kłymenta jepisk.
5 P.	Agaty panny męcz. ☾	24 Xenyi prepod.
6 S.	Doroty panny męcz.	25 Hryhorya bohosh.
7 N.	5 po 3 Kr. Romualda opata	26 N. 3 po B. Xenofonta prep.
8 P.	Jana z Mathy	27 Joanna Złatoust.
9 W.	Apolonii p. m. i Sabina	28 Jefrema prepod.
10 S.	Scholastyki i Sylwiana	29 Ihnatia jep. mucz.
11 C.	Hipolita i Eufrozyny	30 Trech Swiatyteł.
12 P.	Modesta m. i Eulalii ☽	31 Kyra i Joanna mucz.
13 S.	Juliana i Katarzyny R.	1 Februł. Tryfona mucz.
14 N.	6 Staroz. Walentego kapł.	2 N. 4 po B. Strytenye Hospod.
15 P.	Faustyna i Jowity mm.	3 Symeona bohopr.
16 W.	Julianny panny męcz.	4 Isydora prepod.
17 S.	Sabina bisk. i Sylwina	5 Ahaftyi mucz.
18 C.	Symeona i Konstancyi	6 Wukoła prepod.
19 P.	Konrada w. i Mansweta	7 Parftenya prepod.
20 S.	Leona p. i Zenobiusza	8 Fteodora mucz.
21 N.	7 Mięsup. Eleonory p. ☾	9 N. 5 po B. Miasop. Nykyfora
22 P.	Katedry ś. Piotra w Ant.	10 Charałampia mucz.
23 W.	Florentego w. i Piotra D.	11 Własya jep. mucz.
24 S.	Eberharda wyznawcy	12 Meletya archiep.
25 C.	<i>Macieja apostoła</i>	13 Martyniana prepod.
26 P.	Wiktoryna i Wiktora m.	14 Auxentia prepod.
27 S.	Aleksandra b. i Nestora	15 Onysyma apost.
28 N.	8 Zapustna. Anastazyi ☽	16 N. 6 Syrop. Pamfyła mucz.
29 P.	Romana opata	17 <i>Post Wel.</i> Fteodora mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

28 — 30 R. Ch.

29 — 1 Adar.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 5 g. 10 m. 59 rano.

☾ dnia 21 g. 1 m. 34 rano.

☽ dnia 12 g. 8 m. 58 popoł.

☽ dnia 28 g. 5 m. 7 rano.

Marzec.

Mart.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA RUSKIE.
1 W.	Albina b. i Antoniny	18	Lwa Papy Rymaskaho
2 S.	<i>Popielec.</i> Heleny ces.	19	Archyppa apost.
3 C.	Kunegundy p. i Tycyana	20	Lwa episk.
4 P.	Kazimierza królew. pol.	21	Tymoftea prepod.
5 S.	Fryderyka op. i Euzeb. ☾	22	SS. MM. w Ewhen.
6 N.	1 Wstępna. Kolety p.	23	N. 1 Wstupna. Połykarpa j.
7 P.	Tomasza z Akwinu w.	24	Obr. Gławy Joanna Kre.
8 W.	Jana Bożego i Beaty	25	Tarasia archiep.
9 S.	<i>Such.</i> Franciszki Rzym.	26	Porfyrja archiep.
10 C.	40 Męczenników	27	Prokopia archiep.
11 P.	<i>Such.</i> Konstantego W.	28	Wasyłyia prepod.
12 S.	<i>Such.</i> Grzegorza W. pap.	29	Kassyana Sergia.
13 N.	2 Sucha. Krystyny p. ☽	1	Mart. N. 2 Postu. Jewdoki
14 P.	Zacharyasza p. i Matyldy	2	Fteodota mucz.
15 W.	Izabelli i Leoncyi pp.	3	Jewtropia mucz.
16 S.	Cyryaka dyakona	4	Harasyrna prepod.
17 C.	Gertrudy i Patrycego b.	5	Konona mucz.
18 P.	Aleksandra b. i Edwarda	6	SS. 42 męczenników
19 S.	<i>Józefa obłubieńca NMP.</i>	7	Wasyłyia mucz.
20 N.	3 Głucha. Eufemii i Teod.	8	N. 3 Postu. Fteofylaka m.
21 P.	Benedykta opata w. ☾	9	SS. 40 Męczenników
22 W.	Katarzyny król. szwedz.	10	Kondrata mucz.
23 S.	Wiktoryana i Oktawiana	11	Sofronia prepod.
24 C.	<i>Wig.</i> Gabryela archan.	12	Fteofana prepod.
25 P.	Zwiastowanie N. Maryi P.	13	Nikyfora patryar.
26 S.	Teodora b. i Olimpii p.	14	Wenedykta prepod.
27 N.	4 Srodop. Jana pusteln.	15	N. 4 Postu. Ahapia mucz.
28 P.	Sykstusa pap. wyzn. ☽	16	Sawyna mucz.
29 W.	Eustazego op. i Cyryla d.	17	Alexia prepod.
30 S.	Kwiryna m. i Zozyma	18	Kyryła archiep.
31 C.	Balbiny i Kornelii pp.	19	Chrysanfta mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

6 — 7 Śmierć Mojżesza.
 10 — 11 Post Estery.
 13 — 14 Purim.

14 — 15 Schuschan-Purim.
 29 — 1 **Nisan.**

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 5 g. 8 m. 34 wiecz.

☽ dnia 13 g. 2 m. 15 popoł.

☾ dnia 21 g. 6 m. 36 popoł.

☽ dnia 28 g. 2 m. 37 popoł.

Kwiecień.

Apriel.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA RUSKIE.
1 P.	Hugona b. i Teodory m.	20	Prepod. Otec. w Ob. Saw.
2 S.	Franciszka z Pauli w.	21	Jakowa prepod.
3 N.	5 Biała. Pankracego	22	N. 5 Postu. Wasylija jepisk.
4 P.	Izydora bisk. wyzn. ☉	23	Nykona prep.
5 W.	Wincentego Ferer. w.	24	Zacharyi prepod.
6 S.	Celestyna papieża	25	Błahowiszcze
7 C.	Epifaniusza męż.	26	Sobor Hawryła
8 P.	7 Boleści NMP. Dyoniz.	27	Matrony muz.
9 S.	Maryi Kleofe, siostry NP.	28	Hariona prepod.
10 N.	6 Kwietnia. Ezechiela pr.	29	N. 6 Postu. Marka prepod.
11 P.	Leona pap. wyzn.	30	Joanna Listwycz.
12 W.	Juliusza p. i Damiana ☿	31	Ipatya jepisk.
13 S.	Justyna m. i Idy panny	1	Apriel. Maryi Jehyp.
14 C.	<i>Wiecz. Pańska</i> Waleryana	2	Tyta prepod.
15 P.	<i>Wielki.</i> Ludwiny i Kasyl.	3	Piatok welyki. Nykyty prep.
16 S.	<i>Wielka.</i> Lamberta męż.	4	Josyfa prepod.
17 N.	Wielk. Zmartw. P. Rudolfa	5	N. Woskresenye. Fteoduła m.
18 P.	Wielkan. Apoloniusza m.	6	Pon. swity. Jewtychia jep.
19 W.	Jerzego b. i Antonii p.	7	Wt. swity. Heorhia prep.
20 S.	Agnieszki z Pol. ☾	8	Irodiona apost.
21 C.	Anzelma bisk. w.	9	Jewpsyhia jepisk.
22 P.	Sotera i Kaja mm.	10	Terentia muz.
23 S.	<i>Wojciecha arcybisk. m.</i>	11	Antypy jepisk.
24 N.	1 Przew. Jerzego i Saby	12	N. 1 po W. Wasylija prep.
25 P.	Marka ewangielisty	13	Artemona jepisk.
26 W.	Kleta i Marcelina mm. ☼	14	Martyna papy.
27 S.	Anastazego p. i Teofila	15	Arystarcha apost.
28 C.	Witalisa m. i Waleryi p.	16	Ahapii muz.
29 P.	Piotra mężennika	17	Symeona prepod.
30 S.	Katarzyny Sen. panny	18	Joanna prepod.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

6 — 9 Tekufah.	16 — 19 } Półświęta.
11 — 14 Przeddzień do Paschy.	17 — 20 } Półświęta.
12 — 15 Święto Paschy.	18 — 21 Siódme święto.
13 — 16 Drugie św. Paschy.	19 — 22 Koniec Paschy.
14 — 17 } Półświęta.	27 — 30 R. Ch.
15 — 18 }	28 — 1 Ijar.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☉ dnia 4 g. 7 m. 41 rano.	☾ dnia 20 g. 7 m. 20 rano.
☽ dnia 12 g. 7 m. 46 rano.	☼ dnia 26 g. 11 m. 6 wiecz.

Maj.

Maj.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA BUSKIE.
1 N.	2 po W. Grobu Jez. Filipa	19 N. 2 po W. Joanna prep.
2 P.	Zygmunta i Atanazego	20 Fteodora prepod.
3 W.	<i>Znalezienie ś. Krzyża</i> ☾	21 Januaria mucz.
4 S.	Floryana m. i Moniki	22 Fteodora Sykeota
5 C.	Gotarda b. i Piusa V.	23 Heorhia mucz.
6 P.	Jana w ol. i Benedykty	24 Sawwy mucz.
7 S.	Flawii i Domicelli pp.	25 Marka Apost.
8 N.	3 po W. NP. Łask. Stanisł.	26 N. 3 po W. Wasyłyia mucz.
9 P.	Grzegorza Naz. i Dyzmy	27 Symeona jep. mucz.
10 W.	Izydora włośc. i Joba	28 Jasona apost.
11 S.	Beatryksy panny	29 Dewiat muczenników.
12 C.	Nereusza i Pankracego ☿	30 Jakowa proroka.
13 P.	Hilarego b. i Serwacego	1 Mai. Jeremia pror.
14 S.	Bonifacego męcz.	2 Aftanasya Welykaho
15 N.	4 po W. Zofii i 3 jej cór.	3 N. 4 po W. Tymoftea mucz.
16 P.	Jana Nep. i Ubalda b.	4 Pełahyi mucz.
17 W.	Paschalisa w. i Torpeda	5 Iryny mucz.
18 S.	Feliksa kapuc. i Eryka	6 Jowa Prawednaho
19 C.	Piotra Cel. i Pudenc. ☾	7 Wspóm. Kresta
20 P.	Bernardyna Sen. wyzn.	8 Joanna Bohosław.
21 S.	Heleny królowej	9 Pren M. Nykoł.
22 N.	5 po W. Julii p. m.	10 N. 5 po W. Symeona Apost.
23 P.	† Dezyderyusza bisk. w.	11 Mokia mucz.
24 W.	† Joanny wd. i Afry m.	12 Jepyfania jepisk.
25 S.	† Urbana pap. i Grzeg.	13 Hlykeryi mucz.
26 C.	Wniebowst. P. Filipa N. ☿	14 Wozn. Hosp. Isydora mucz.
27 P.	Jana pap. męcz.	15 Pachamyia Welyk.
28 S.	Magdaleny de Pазis	16 Fteodora prepod.
29 N.	6 po W. Maksyma b. w.	17 N. 6 po W. Andronika ap.
30 P.	Feliksa pap. w.	18 Fteodora prepod.
31 W.	Petronelli panny m.	19 Patrykia jepisk.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

2 — 5 Post.	15 — 18 Święto szkolne.
5 — 8 Post.	27 — 1 Sivan.
9 — 12 Post.	31 — 5 Przeddz. Ziel. Świąt.
11 — 14 Passah-Scheni.	

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 3 g. 8 m. 31 wiecz.	☾ dnia 19 g. 4 m. 12 popoł.
☿ dnia 12 g. 12 m. 19 noc.	☿ dnia 26 g. 7 m. 9 rano.

Czerwiec.

Ijun.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.	
1 S.	Nikodema męcz.	20	Ftalatea mucz.
2 C.	Eugeniusza i Erazma ☾	21	Konstantyna i Jeleny
3 P.	Klotyldy król. i Pauli	22	Wasylyia mucz.
4 S.	<i>Wigilia.</i> Flawiana bisk.	23	Michaiła prepod.
5 N.	Zest. Ducha ś. Florencyi	24	N. Sosz. S. Ducha. Symeona
6 P.	Świąteczny. Norberta op.	25	SSS. Trojcy. Tretye Obr. Hł.
7 W.	Roberta bisk. i Sabiny	26	Karpa apost.
8 S.	<i>Such.</i> Medarda bisk. w.	27	Fteraponta jepisk.
9 C.	Felicyana męcz.	28	Nykyty prepod.
10 P.	<i>Such.</i> Małgorzaty kr. S. ☽	29	Fteodosyi mucz.
11 S.	<i>Such.</i> Barnaby apost.	30	Isaaka prepod.
12 N.	1 po S. SSS. Trójcy. Onufr.	31	N. 1 po S. Jeremia apost.
13 P.	Antoniego z Padwy	1	Ijun. Justyna mucz.
14 W.	Bazylego W. bisk. w.	2	Nykyfora patr.
15 S.	Wita i Modesta mm.	3	Łukilyana mucz.
16 C.	Boże Ciało. Justyny p.	4	Tyto Chryst. Mytofana p.
17 P.	Adolfa b. i Marcyana ☾	5	Doroftea jep. mucz.
18 S.	Marka i Marcelina mm.	6	Wyssariona prepod.
19 N.	2 po S. Gierwazego i Prot.	7	N. 2 po S. <i>Post do Petra</i>
20 P.	Reginy i Florentyny pp.	8	Fteodora mucz.
21 W.	Alojzego Gonzagi w.	9	Kyryła archiep.
22 S.	Paulina b. i Konsorecyi	10	Tymoftea jep. mucz.
23 C.	Agrypiny i Wandy pp.	11	Warftołomea apost.
24 P.	<i>Serca Jez. Nar. ś. Jana</i> ☽	12	Sostradan. Pr. Boh. i Onufr.
25 S.	Wilhelma w. i Łucyi p.	13	Akiłyny mucz.
26 N.	3 po S. Jana i Pawła br. m.	14	N. 3 po S. Jelyssea proroka
27 P.	Władysława króla w.	15	Amosa proroka
28 W.	<i>Wigilia.</i> Leona pap.	16	Tychona prep.
29 S.	Piotra i Pawła apostołów	17	Manuiła mucz.
30 C.	Emilii i Lucyny mm.	18	Leontia mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

1 — 6 Zielone Święta.

2 — 7 Drugie święto.

25 — 30 R. Ch.

26 — 1 **Thamuz.**

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 2 g. 11 m. 11 rano.

☽ dnia 10 g. 2 m. 52 popoł.

☾ dnia 17 g. 10 m. 20 popoł.

☽ dnia 24 g. 3 m. 26 popoł.

Lipiec.

Ijuł.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA RUSKIE.
1 P.	Teobalda op. i Aarona	19	Judy Ftad. apost.
2 S.	<i>Nawiedz. NP.</i> i Ottona ☾	20	Meftodia jepisk.
3 N.	4 po S. Alfreda i Anatoleg.	21	N. 4 po S. Jułyana mucz.
4 P.	Józefa Kalas. i Prokopa	22	Jewsewya jep. mucz.
5 W.	Cyrylla i Metodego ap.	23	Ahrypiny mucz.
6 S.	Izajasza pr. i Dominiki	24	Roźdest S. Joanna Krest.
7 C.	Estery kr. i Klaudyusza	25	Fewronyi prepod.
8 P.	Elźbiety król. wdowy	26	Dawdy prepod.
9 S.	Cyryla b. i Anatolii	27	Sampsona prepod.
10 N.	5 po S. Jana z D. i Amal. ☽	28	N. 5 po S. Kyra i Joanna
11 P.	Pelagii, Sabina i Norb.	29	Petra i Pawła Apost.
12 W.	Jana Gwalb. i Epifany	30	SS. Apost. 12.
13 S.	Małgorzaty panny m.	1	Ijuł. Kosmy i Dam.
14 C.	Bonawentury doktora w.	2	Położ. Ryzy. Preś. Boh.
15 P.	Rozesł. Apost. i Henryka	3	Iakynfta mucz.
16 S.	<i>NMP. Szkapl.</i> i Rajnolda	4	Andreia archiep.
17 N.	6 po S. Aleksego w. ☾	5	N. 6 po S. Aftanasia Afron.
18 P.	Szymona z Lipnicy w.	6	Sysoa prepod.
19 W.	Wincentego a Paulo w.	7	Ftomy prepod.
20 S.	Czesława i Kassyana m.	8	Prokopya mucz.
21 C.	Daniela pror. i Praksedy	9	Pankratya jep. mucz.
22 P.	Maryi - Magdaleny	10	45 Muczen.
23 S.	Teofila m. i Apolinarego	11	Jewfymyi mucz.
24 N.	7 po S. Krystyny p. ☽	12	N. 7 po S. Prokta mucz.
25 P.	<i>Jakóba apost.</i> i Krzyszt.	13	Hawryła archan.
26 W.	<i>Anny Matki N. Maryi P.</i>	14	Akyły apost.
27 S.	Natalii i Liliozy pp.	15	Kyryka mucz.
28 C.	Innocentego i Wiktora	16	Aftynohema jepisk.
29 P.	Marty gosp. p. i Lueylli	17	Maryny mucz.
30 S.	Julitty p. i Heleny wd.	18	Jemylyana mucz.
31 N.	8 po S. Kunegundy kr. ☽	19	N. 8 po S. Makryny prep.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

7 — 12 Tekufah
12 — 17 Post. Zdob. świątyni.

25 — 1 **Ab.**

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☾ dnia 2 g. 3 m. 33 rano.

☽ dnia 10 g. 3 m. 3 rano.

☾ dnia 17 g. 3 m. 7 rano.

☽ dnia 24 g. 12 m. 50 noc.

☾ dnia 31 g. 9 m. 5 wiecz.

Sierpień.

Awgust.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 P.	Piotra w Okowach m.	20 Ryi proroka
2 W.	N. Maryi P. Anielskiej	21 Symeona prepod.
3 S.	Znalez. ś. Szczepana	22 Maryi Mahdałyny
4 C.	Dominika wyzn.	23 Trofyma mucz.
5 P.	NP. Snieżnej i Oswalda	24 Chrystyny mucz.
6 S.	<i>Przemienienie Pańskie</i>	25 Uspen. S. Anny
7 N.	9 po S. Kajetana i Alberta	26 N. 9 po S. Jermołaja mucz.
8 P.	Cyryaka i Maryana m. ☽	27 Pantaleimona mucz.
9 W.	Kamilla z Lel. i Romana	28 Prochora apost.
10 S.	Wawrzyńca i Filomeny	29 Kałynyka mucz.
11 C.	Zuzanny panny m.	30 Syły apost.
12 P.	Klary, Hilaryi i Felicys.	31 <i>Zapust do Uspenya</i>
13 S.	<i>Wigilia.</i> Hipolita męcz.	1 Awgust. Proischozd. K.
14 N.	10 po S. Enzebiusza m.	2 N. 10 po S. Stefana mucz.
15 P.	Wniebowzięcie N. M. P. ☾	3 Isaaka prepod.
16 W.	Rocha wyznawcy	4 Sedny Otrokrw.
17 S.	Anastazego b. i Mirona	5 Jewsychnyia mucz.
18 C.	Heleny Szwedzkiej kr.	6 Preobraz. Hospodync
19 P.	Benigny p. i Sebalda w.	7 Demetya prepod.
20 S.	Bernarda op. i Samuela	8 Jemetyana jepisk.
21 N.	11 po S. Jacka w. i Joanny	9 N. 11 po S. Matfitya apost.
22 P.	Symforyana i Tymot. ☽	10 Ławrentya mucz.
23 W.	Zacharyasza i Filipa B.	11 Jewpła mucz.
24 S.	<i>Bartłomieja apostoła</i>	12 Fotya mucz.
25 C.	Ludwika kr. fraucusk.	13 Maxyma prepod.
26 P.	Aleksandra m. i Zefiryna	14 Michea proroka
27 S.	Róży p. i Przen. ś. Kaz.	15 Uspenye Pr. Bohorodycy
28 N.	12 po S. <i>Pociesz. NMP.</i>	16 N. 12 po S. Nerukotw. Obr.
29 P.	Ściecie ś. Jana i Sabina	17 Myrona mucz.
30 W.	Feliksa męcz. ☽	18 Flora i Ławra mucz.
31 S.	Rajmunda wyzn.	19 Andrea mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

2 — 9 Post. Spalenie świąt.
8 — 15 Dzień radości.

23 — 30 R. Ch.
24 — 1 **Elul**.

ODMIANY KSIEŻYCA.

☽ dnia 8 g. 1 m. 17 popoł.

☽ dnia 22 g. 12 m. 18 rano.

☾ dnia 15 g. 7 m. 57 rano.

☾ dnia 30 g. 2 m. 48 popoł.

Wrzesień.

Sentiabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.		ŚWIĘTA RUSKIE.
1 C.	Idziego opata wyzn.	20	Samuła proroka
2 P.	Stefana kr. i Kaliksty m.	21	Ftaddea apost.
3 S.	Eufemii i Bronisławy p.	22	Ahaftonyka mucz.
4 N.	13 po S. Joach. i Rozalii	23	N. 13 po S. Łuppa mucz.
5 P.	Wawrzyńca i Urbana p.	24	Jewtychia mucz.
6 W.	Zacharyasza proroka ☿	25	Watftołomea apost.
7 S.	<i>Wigilia.</i> Reginy p. m.	26	Adryana m. i Natalii m.
8 C.	Narodzenie N. Maryi P.	27	Pimena prepod.
9 P.	Gorgoniusza i Sergiusz.	28	Moysea muryna
0 S.	Mikołaja z Tolent. w.	29	Usikn. Gławy S. Joanna
1 N.	14 po S. Im. NMP. Jacka	30	N. 14 po S. Alexandra patr.
2 P.	Tobiasza w. i Gwidona	31	Położ. Poiasz. P. Bohor.
3 W.	Aureliusza bisk. ☾	1	Sentiabr. Symeona S.
4 S.	<i>Such. Podwyż. ś. Krzyża</i>	2	Mamanta mucz.
5 C.	Nikodema, Emila i Melity	3	Anfytyma mucz.
6 P.	<i>Such.</i> Ludmiły i Edity p.	4	Wawyły Swiaszczen
7 S.	<i>Such.</i> Piętna ś. Franc.	5	Zacharyi pror.
18 N.	15 po S. Józefa z Kop.	6	N. 15 po S. Wosp. Cud. S. M.
19 P.	Januarego m. i Konst.	7	Sozonta mucz.
20 W.	Eustachego i Faustyna	8	Rozdestwo Pr. Bohorod.
21 S.	Mateusza apost. ew. ☼	9	Joakima i Anny
22 C.	Maurycego b. i Tomasza	10	Mynodory prepod.
23 P.	Tekli panny męcz.	11	Fteodory prepod.
24 S.	Gerarda biskupa m.	12	Awtonoma mucz.
25 N.	16 po S. Władysł. z Gieln.	13	N. 16 po S. Kornyla mucz.
26 P.	Jozefata b. i Cypryana	14	Wozdwyżenye S. Kresta
27 W.	Przenies. ś. Stanisława	15	Nykity mucz.
28 S.	Wacława męcz.	15	Josafata archiep.
29 C.	<i>Michała archaniola</i> ☾	17	Sofii mucz.
30 P.	Hieronima doktora w.	18	Jewmenia prepod.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

18 — 26	Selichot.	23 — 2	Drugie święto.
21 — 29	Wigil. Nowego Roku.	25 — 4	Post. Gedaljach.
22 — 1	Tischri. Nowy Rok 5653.	30 — 9	Wig. Święto pojedn.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☿ dnia 6 g. 10 m. 27 wiecz.	☼ dnia 21 g. 2 m. 36 rano.
☾ dnia 13 g. 2 m. 9 popoł.	☽ dnia 29 g. 7 m. 39 rano.

Październik.

Oktiabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 S.	Remigiego bisk. wyzn.	19 Trofyma mucz.
2 N.	17 po S. NMP. Różańc.	20 N. 17 po S. Jewstafya m.
3 P.	Kandyda m. i Lukrecyja p.	21 Kodrata apost.
4 W.	Franciszka Seraf. w.	22 Foky mucz.
5 S.	Flawii i Charytyny pp.	23 Zaczat. s. Joanna Krest.
6 C.	Brunona bisk. wyzn. (P)	24 Ftekly mucz.
7 P.	Justyny p. i Helana w.	25 Jewfrosini prepod.
8 S.	Brygidy wd. i Pelagii p.	26 Joanna Bohosłowa.
9 N.	18 po S. Wincentego Kadł.	27 N. 18 po S. Kałystrata m.
10 P.	Franciszka Borg. w.	28 Charytona prepod.
11 W.	Placydy i Filonelli pp.	29 Kyryaka prepod.
12 S.	Maksymiliana bisk. (C)	30 Hryhorya jep. mucz.
13 C.	Edwarda króla wyzn.	1 Okciabr. Pokr. P. Boh.
14 P.	Kaliksta p. i Fortunaty	2 Kypryana jepisk.
15 S.	Jadwigi, Teresy i Aurelii	3 Dyonysya mucz.
16 N.	19 po S. Pawła opata w.	4 N. 19 po S. Jeroftea jep. m.
17 P.	Florentego i Małgorzaty	5 Charytyny mucz.
18 W.	Łukasza Ewangielisty	6 Ftomy apost.
19 S.	Piotra z Alkantary w.	7 Sergia i Wakha
20 C.	Przenies. ś. Wojciecha (E)	8 Pełachii prepod.
21 P.	Urszuli panny m.	9 Jakowa apost.
22 S.	Korduli i Alodyi pp. m.	10 Jewłampya mucz.
23 N.	20 po S. Jana Kantego	11 N. 20 po S. Fyłypa apost.
24 P.	Rafała archaniola	12 Prowa mucz.
25 W.	Kryspina i Kryspiana m.	13 Karpa i Papyła
26 S.	Ewarysta pap. i Fulki	14 Nazaryya mucz.
27 C.	Iwona w. i Sabiny m.	15 Jewtymy prepod.
28 P.	<i>Szymona i Tadeusza ap.</i> (O)	16 Łonhyna mucz.
29 S.	Narcyza b. i Euzebii p.	17 Osy proroka
30 N.	21 po S. Marcelego pap.	18 N. 21 po S. Łuki jew. ap.
31 P.	<i>Wigilia.</i> Wolfganga b.	19 Joila proroka

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

1 — 10	Święto pojednania.	14 — 23	Radość z praw.
5 — 14	Przeddz. św. kuczek.	21 — 30	R. Ch.
6 — 15	Święto kuczek.	22 — 1	Marcheschwan.
7 — 16	Drugie św. kuczek.	24 — 3	Post.
12 — 21	Święto palmowe.	27 — 6	Post.
13 — 22	Koniec kuczek.	31 — 10	Post.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

(P) dnia 6 g. 7 m. 31 rano.	(E) dnia 20 g. 7 m. 44 wiecz.
(C) dnia 12 g. 10 m. 57 wiecz.	(O) dnia 28 g. 10 m. 46 wiecz.

Listopad.

Nojabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 W.	Wszystkich Świętych	20 Artemia mucz.
2 S.	<i>Dzień Zaduszny.</i> Wiktor.	21 Hariona prepod.
3 C.	Huberta b. i Sylwii wd.	22 Awerkia jepisk.
4 P.	Karola Bor. i Modesty ☽	23 Jakowa apost.
5 S.	Elżbiety m. i Emeryka	24 Arefty mucz.
6 N.	22 po S. Leonarda w.	25 N. 22 po S. Markiana m.
7 P.	Herkulana i Amaranta	26 Demetria mucz.
8 W.	Czterech Koronatów m.	27 Nestora mucz.
9 S.	Teodora żołn. i Ursyna	28 Terentia mucz.
10 C.	Andrzeja z Aw. i Nimfy	29 Anastasyi mucz.
11 P.	Marcina bisk. w. ☾	30 Zynowia mucz.
12 S.	Marcina pap. m.	31 Stachya apost.
13 N.	23 po S. <i>Op. NP. i Stan. K.</i>	1 Nojabr. N. 23 po S. Kosmy
14 P.	Serafiona m. i Hipacego	2 Josafata Archiep. mucz.
15 W.	Leopolda wyzn.	3 Akepsymy mucz.
16 S.	Edmunda i Pawła od Kr.	4 Joannykia prepod.
17 C.	Salomei król. panny	5 Hałaktyona mucz.
18 P.	Pośw. kośc. Rz. i Grzeg.	6 Pawła archiep.
19 S.	Elżbiety kr. i Placydy ☽	7 MM. 33 Melyty
20 N.	24 po S. Feliksa de Val.	8 N. 24 po S. Mychajła archan.
21 P.	<i>Ofiarowanie N. Maryi P.</i>	9 Onysyfora mucz.
22 W.	Cecylii panny męcz.	10 Szesty apostołów
23 S.	Klemensa p. i Lukrecyi	11 Myny mucz.
24 C.	Jana od Krzyża i Flory	12 Joanna myłostywa
25 P.	<i>Katarzyny panny męcz.</i>	13 Joanna Złatoust.
26 S.	Piotra Aleks. i Konrada	14 Fylypa apost. <i>Zapust.</i>
27 N.	i Adw. Waleryana b. ☽	15 N. 25 po S. Hurya i Samon
28 P.	Rufina m. i Grzegorza p.	16 Mattea jewanhel.
29 W.	Saturnina i Illuminaty	17 Hryhoria jepisk.
30 S.	<i>Post. Andrzeja apost.</i>	18 Płatona mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

20 — 1 **Kislev.**

21 — 2 Prośba o deszcz.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☽ dnia 4 g. 5 m. 9 popoł.

☽ dnia 19 g. 2 m. 39 popoł.

☾ dnia 11 g. 11 m. 22 rano.

☾ dnia 27 g. 11 m. 47 rano.

Grudzień.

Dekabr.

DNI	ŚWIĘTA RZYMSKIE.	ŚWIĘTA RUSKIE.
1 C.	Eligiusza b. i Natalii wd.	19 Awdya proroka
2 P.	<i>Post.</i> Chryzologa i Aurel.	20 Prokia i Hryhory
3 S.	Franciszka Ksawerego	21 Wchod. Pr. Bohorodocy
4 N.	2 Adw. Barbary p. m. ☽	22 N. 26 po S. Fyłymona ap.
5 P.	Sabby opata wyzu.	23 Amfylochya jepisk.
6 W.	<i>Mikołaja b.</i> i Leoneyi	24 Jekataryny mucz.
7 S.	<i>Wigilia.</i> Ambrożego b.	25 Kłymenta papy
8 C.	Niepok. Pocz. N. Maryi P.	26 Ałypya prepod.
9 P.	<i>Post.</i> Leokadyi i Waleryi	27 Jakowa mucz.
10 S.	<i>N. Maryi P. Loretańskiej</i>	28 Stefana mucz.
11 N.	3 Adw. Damazego p. ☾	29 N. 1 Adwontu. Paramona m.
12 P.	Aleksego i Pawła	30 Andrea apost.
13 W.	Łucyi, Otylii i Eugen.	1 Dekabr Nauma pror.
14 S.	<i>Such.</i> Nikazego bisk.	2 Awwakuma pror.
15 C.	Ireneusza męcz.	3 Sofonia pror.
16 P.	<i>Such.</i> Euzebiusza bisk.	4 Warwary mucz.
17 S.	<i>Such.</i> Łazarza bisk.	5 Sawwy Oswiaszcze.
18 N.	4 Adw. Ocz. płodu NMP.	6 N. 2 Adwentu. Nykołaja jep.
19 P.	Faustyna i Nemez. ☽	7 Amwrosia jep. medyof.
20 W.	Teofila męczennika	8 Patapia prepod.
21 S.	<i>Post.</i> Tomasza apostoła	9 Zaczat. Bohoro.
22 C.	Zenona męczennika	10 Myny Jermoh. mucz.
23 P.	<i>Post.</i> Wiktoryi p. m.	11 Danyła Stołpny
24 S.	<i>Wigilia.</i> Adama i Ewy	12 Spyridona jepisk.
25 N.	Boże Narodzenie	13 N. 3 Adwentu. Ewstratia d.
26 P.	Szczepana pierwszego m. ☽	14 Ftyrsa mucz.
27 W.	<i>Jana ewangelisty</i>	15 Jelewteryja jepisk.
28 S.	Młodzianków męcz.	16 Ahhea proroka
29 C.	Tomasza Kantuaryjsk.	17 Danyła proroka
30 P.	Dawida kr. i Sabina	18 Sewastyana mucz.
31 S.	Sylwestra p. i Melanii	19 Wonyfatya mucz.

KALENDARZ ŻYDOWSKI.

9 — 20 Prośba o deszcz.
 13 — 24 Wzniesienie światła.
 14 — 25 Pośw. świętyni.
 19 — 30 R. Ch.

20 — 1 **Tebeth.**
 21 — 2 Koniec pośw. świat.
 29 — 10 Post. Oblęż. Jeruzal.

ODMIANY KSIĘŻYCA.

☽ dnia 4 g. 3 m. 37 rano.

☽ dnia 19 g. 9 m. 33 rano.

☾ dnia 11 g. 3 m. 49 rano.

☾ dnia 26 g. 10 m. 42 wiecz.

Spis środków lekarskich

zawartych

w podręczniku terapeutycznym.

- idum agaricin* 807.
arsenicus 35, 677.
bichloroacetic.
benzoicum 190, 192, 222, 223, 353, 642, 718.
boricum 194, 199, 201, 261, 274, 278, 290, 292, 375, 394, 468, 643, 748, 841.
carbol. 100, 108, 141, 195, 262, 273, 304, 345, 346, 402, 493, 665, 669, 680, 870.
hyperosmicum 521.
lacticum 506, 806.
muriatic. 145, 179, 191, 322, 327.
nitricum 265.
phosphoric. 193.
pyrogallic. 385, 681.
pyrolignos 142.
salicyl. 30, 54, 198, 309, 377, 379, 384, 392, 454, 466, 469, 51., 651, 811, 815, 871, 873.
conitium 637, 860.
donis vern. 71, 880.
lether acet. 38, 52.
- sulphuric. int. 85, 215.
lethylenum brom. 374.
lgaricin 452.
loe Extr. 34, 568.
Althea 487, 576.
.lumen cr. 56, 110, 117, 271, 496, 518, 645.
mmon. brom. 4, 548.
- muriat. 494, 505.
- sulphoichtyol. 539, 613, 614.
nylenhydrat. 299, 456.
- Amylnitrit.* 79.
Amylum Orizae 342, 758.
Antipyrin 46, 234, 484, 542, 558, 564, 636, 639, 713, 745, 798, 827.
Apomorphin 129, 173, 359.
Aq. calcis 258.
- chloroformi 251.
- lauroceras 446, 492.
- menth. pip.
- plumbi 472.
Arbutin 186.
Argent
- nitric. 23, 59, 101, 111, 154, 197, 270, 272, 275, 280, 287, 298, 500, 840, 844, 901.
Aristol 260, 628, 839.
Arnica 581.
Arsenic alb. vid. acid. arsenic.
Atropin 155, 363, 373, 453, 473, 474.
Bals. copaiv. 88, 90, 91, 92.
- peruv. 8, 121, 298, 709.
- tolut. 122.
Belladonna 63, 82, 119, 257, 315, 365, 371, 536, 631, 702, 865.
Benzol. 800.
Benzin. 799.
Betol 485.
Bismut salicyl. 169, 316, 585, 670.
- subnitric. 76, 439, 688, 857.
Borax 625, 626, 747.
Brom. natr. 233, 238, 440, 743.
Bromoform. 641.
Burovi liquor. 312, 313, 367.

- Butylchloral* 554, 562.
Calcaria carbon. 763.
 — *phosphor.* 687.
Calomel. 75, 224, 247, 254, 286, 308, 333, 524, 530, 779.
Camphora 51, 219, 229, 296, 768, 835.
 — *inj.* 37, 61, 627, 717, 832.
Cannab. indic. 181.
Cannab. tannic. zob. nowe leki.
Cascara Sagrada 567, 574.
Castoreum 151.
Cerium oxalicum 441.
 — *valerianicum* 442
Chamomil. ol. 253.
China decoct. 48, 459, 551, 652, 725, 749.
 — *extract.* 27, 364.
Chinin ferro citric. 214.
 — *muriat* 25, 45, 457, 458, 461, 463, 541, 546, 559, 635, 712, 825, 830.
 — *sulphuric.* zob. *muriat.*
 — *tannic.* 168, 317, 462, 720.
Chlorathydrat. 235, 237, 256, 319, 330, 331, 334, 533, 601, 632, 736, 741, 742, 859, 861, 868.
Chlorina liquid. 767.
Chloroform 62, 252, 528, 556, 653, 671, 701.
Chrysarobin 356, 431, 432, 433.
Cocain mur. 83, 120, 148, 341, 443, 444, 471, 580, 582, 586, 622, 630, 633, 660, 667, 673, 804, 805, 820, 864.
Codein mur. 150, 549, 638, 856, 857.
 — *phosphor.* 303, 737.
Coffein citr. 57, 156, 545, 684, 878.
 — *natrobenz.* 70, 879.
 — *natrosalic.* 541, 832.
Colchicum 699.
Collodium 815.
Collyrium 277.
Colombo 328.
Condurango 138, 146.
Convallaria 72, 610.
Coto 166.
Cotoin 163.
Creolin 137, 143, 383, 836.
Creosot 226, 809, 810, 812, 813.
Croton ol. 787.
Cubebae 112.
Cuprum sulphur 94, 288, 675.
Curare 370, 523.
Digitalis 69, 249, 606, 609, 787, 874, 875, (*tinct.*) 876.
Diuretin zob. *Theobromin.*
Dover pulv. 130, 165.
Emplastrum cerussae 293.
 — *hydrarg.* 368, 619, 773.
 — *saponat.* 368.
Equisetum 73, 724.
Ergotin 418, 419, 420, 427, 862
Eserin 401.
Eucalyptus tinct. 512.
Exalgin 241, 700.
Extr. gelsemii. 563.
Ferrum bromatum 659.
 — *carbonic. sacch.* 298, 325.
 — *jodat. sacchar.* 731.
 — *lacticum* 211.
 — *oxydat. dialys.* 209.
 — *pyrophosphor.* 212, 686.
 — *reductum* 40, 210.
 — *sesquichl.* 55, 105, 144, 241, 413, 421, 726, 727.
 — *sulphuric.* 206, 207, 422.
Filix mas. 786, 788, 791.
Flores benzoes 222, 884.
 — *sulphur.* 705.
Fol. uvae ursi 185.
Glycerin. 288, 339.
Guajacol 814.
Hydrargyr. bichlorat. corro-
patrz sublimat.
 — *oxydulatum tannic.* 759, 767, 781.
 — *salicyl.* 782, 783, 784.
 — *thymolacetic* 780.
Hydrastininum mur. 426.
Hydrastis canad. extr. 318, 426, 538, 808.
Hyosciamus 102.
Hyosciamin 595, 596.
Ichtyol 16, 391, 407, 468, 409, 410, 411, 470, 696, 697, 698.
Ipecacuanh. 125, 132, 133, 134, 171, 503, 508, 510, 550, 657, 674.
Jodum 502, 513, 589, 648, 775, 777
Jodoform 5, 6, 7, 21, 22, 68, (*int.*) 114, (*supp.*) 259, 279, 305, 535, 616, 756, 757, 772, 802, 837, 838

- Iodol* 522, 897, 900
Iod natr. 245, 480, 482, 532.
Iodi Tra. 17, 18, 403, 404, 612,
 732, 755, 776.
Juglandi fol. 167.
Juniperus 250, 608.
Kali acetic. 69, 608, 609.
 — *bromat.* 440.
 — *carbon.* 264.
 — *caustic.* 843.
 — *chloricum ext.* 139, 243, 478,
 647, 761, 762, *int.* 47, 53, 60.
 — *hypermangan* 98, 109, 136, 140,
 376, 397, 450, 646, 738.
 — *jodatum* 19, 20, 79, 81, 369,
 386, 405, 406, 531, 540, 615,
 617, 750, 752, 753.
Kamala 793.
Kosso 789.
Koussina 792.
Lac sulphur. 9, 14, 378, 436.
Lanolin 605.
Liparin 693.
Liquor. alum acet. 312, 313, 367.
Liquor. ammon. anis 84, 220,
 716.
 — *ferri album.* 39, 41, 213.
 — *kali arsenicosi* 730.
Lithion carb. 555, 591, 592, 655,
 — *jodatum* 64.
Lobelia 81, 882.
Lupulin 230, 231, 232.
Magnesia carbon. 572.
 — *usta.* 327.
Mentha pip. 307.
Menthol. 393, 396, 445, 668.
Mixtur. gumm. 162, 831.
Morphium 129, 149, 152, 177, 183,
 184, 216, 299, 475, 553, 575,
 624, 634, 664, 803, 821, (*inj.*)
 824.
Naphthalin 164.
Naphthol 10, 15, 355, 357, 437,
 451, 683, 706, 711, 832, 834,
 846.
Natr. benzoic. 131, 227, 255,
 488.
 — *bicarbon* 104, 124, 176, 320,
 491.
 — *carbonic.* 263.
 — *jodatum* 482, 618, 751, 770.
 — *nitros.* 80.
Natr. salicyl 48, 187, 217, 310,
 311, 479, 534, 561, 666, 714,
 715, 826.
 — *subsulphuros.* 672.
 — *sulphur.* 74.
 — *sulphoichtyolic* 407, 408, 409.
Nitroglycerin 159.
Ol. amygdal. 872.
 — *caryophyll.* 708.
 — *jecoris asel.* 689, 690, 728, 733.
 — *juniperi* 498.
 — *petrae* 603, 604.
 — *pini* 499.
 — *rusci* 335, 336, 337, 347, 354,
 438.
 — *santali* 89.
 — *therebinth.* 50, 107, 362, 527.
Ononis spin. 654.
Opium tinct. 2, 151, 182, (*supp.*)
 218, 276, 415, 526, 621, 818,
 845, 846, *exter.* 1, 164, 537, 576,
 611, 819.
Papayotin 54, b.
Paraldehyd 500.
Pelletierin 790, 794.
Pepsin germ. 326.
Petroleum 603, 604.
Phenacetin. 543, 828.
Phosphor 691, 692, 693, 694.
Pilocarpin 49, 246, 306, 400, 598,
 797.
 — *extr.* 32.
Pix liquid. 679.
Piperin 511.
Plumb. acet. 271, 284, 285, 295,
 344, 380, 381, 423.
 — *tannic.* 294.
Podophyllin 573.
Polygala Senega 126, 510.
Praecipitat alb. 26, 204, 340, 682,
 774, 816.
 — *flavum* 203, 525.
 — *rubrum* 118, 590, 620.
Propylamin 240.
 — *Doveri zob. Dover.*
Pulv. lap. Baptist. 13.
Pyoctanin 135.
Quebracho 77, 329.
Ratanh. 225, 399, 764, 766.
Resorcin 11, 196, 228, 269, 740,
 801, 847.
Rheum tinct. 567.

- Sabina* 268.
Saccharin 389, 739.
Sal. amar. 571.
 — *ammon.* 489.
Salep 161, 829.
Salol 188, 486, 588.
Santonin 65, 66.
Secale corn. extr. 106, 414, 416,
 417, 430, 552, 658, 746.
Semin lim. 103, 180, 481.
Senega zob. Polygala.
Solut. ars. Fowler 236, 460, 515,
 519, 520, 547, 560, 594, 676,
 678.
 — *Pearson* 43, 465.
Sozodol 467.
Sparteïn 157, 881.
Spirit. Sapo Kalin 704.
Strophantus 158, 607, 863, 877.
Strychnin 153, 366, 597, 599, 600.
Styrax 707, 710.
Sublimat 202, 276, 281, 358, 448,
 507, 516, 769, 778.
Succ. citri 58.
Sulphonal 239, 455, 529, 795, 869.
Sulphur. aurat antim. 128.
 — *praecipit.* 10.
Syrup ferri jodat. 729.
Tannin 86, 116, 170, 189, 387,
 398, 412, 421, 447, 497, 577,
 663, 685, 719, 765.
Tartar stibiat 172.
Terpinhydrat 636.
Terpinol 123, 395.
Thallin 97.
Therebinth. 107, 362.
Theobromin 248.
Thymian 640.
Thymol 390, 587, 644, 890.
Tilia 866.
Tinct. aconiti 31, 699.
 — *amara* 178.
 — *benzoes* 30.
 — *cantharid.* 28.
 — *capsici* 33, 301.
 — *colchici* 699.
 — *coto.* 166.
 — *ferri acct. aether*
 — *ferri chlorati* 44.
 — *ferri pomati* 42, 324.
 — *gallar.* 244.
 — *Gelsemii* 563.
 — *Helianthi* 469.
 — *myrrhae* 649.
 — *nuc rom.*
 — *Strammon.* 79.
 — *Valerian zob. Valeriana.*
 — *veratri virid.* 650.
Unguent. hydrarg. ciner. 2
 476, 477, 504.
 — *Wilkinson* 354.
Urethan 332, 534, 602, 796.
Valeriana Tra 151, 160, 656, 7
 744, 302.
Vaselin 283.
Veratrin 557, 565, 583, 703.
Viburnum 3, 4.
Vinum Condurango 138, 147.
 — *stibiat.* 78, 127.
Zinc. chlorat. 889.
 — *oxydatum* 12, 24, 291, 292, 3
 350, 372, 734.
 — *sulphuric.* 87, 93, 95, 113, 11
 200, 274, 382, 495, 501, 5
 662.
 — *sulphocarboll* 99.

Ab
 J
 kaz
 lue
 wet
 cie
 kov
 sie
 szc
 cia
 dli
 flo
 spo
 chu
 sw
 u
 po
 sk
 W
 cia
 kr
 ni
 ja
 I.

PODRĘCZNIK TERAPEUTYCZNY

ze zbiorem

najwięcej używanych recept.

Abortus.

Jeżeli abortus habitualis, wykazanie przyczyny. Przeciw lues: leczenie przeciwiłkowe nawet podczas ciąży — jeżeli jakieś cierpienie macicy, leczenie takowego. Strzedz chorej w okresie w którym poprzednio ronila, szczególnie w pierwszej połowie ciąży. Usunięcie wpływów szkodliwych, podnoszących działanie tłoczeni brzusznej, zabronienie spółkowania, nadmiernego ruchu, trzęsącej jazdy i td. Wolne swobodne ubranie. — Unikanie u osób krwistych czynników podniecających, napojów wyskokowych, silnych wrażeń. W razie krwawienia podczas ciąży, gdy nieodchodzą skrzepy krwi i przy badaniu jaja wyczuć nie można, leczenie wstrzymujące poronienie i spokój.

1. *Extr. Opii aquosi 0·10,*
But. Cacao q. s. ut. f. l. artis
Suppositoria ad anum Nr.
quinque.

S. Rano i wieczorem czopek (i częścięj).

2. *Tinct. Opii simpl. 10·00.*

S. 20—25 kropli rano i wieczorem w lewatywie.

Gdy niema już nadziei utrzymania ciąży: środki pobudzające czynność porodową: zimne

okłady na brzuch, wstrzykiwania do pochwy rozczyrnami środków przeciwnilnych (kw. karbolowy 3⁰/₀. Creolina 1—2⁰/₀). Gdy jajo wystąpiło z jamy do szyi macicy, można podać secale cornutum.

Gdy krwawienie znaczne, zatamponowanie pochwy najpierw gazą jodoformową, poniżej zaś tamponami z waty, napojonemi gliceryną. (Zmienić za 6—10 godzin i przestrzyknąć pochwę). Jeżeli zachodzi możebność usunięcia jaja w całości, szczególnie gdy odchody cuchnące, usunąć takowe zabiegiem ręcznym.

W razie krwawienia skutkiem pozostania resztek z jaja płodowego w macicy — wyskrobanie tychże tępą łyżeczką. (Postępowanie aseptyczne).

W ostatnim czasie polecano też:

3. *Extr. fluid. Viburni prunifol. gtt. 10,* w połączeniu z 0·50 chloralu, dopóki bóle nie ustana.

W następnych dniach:

4. *Ammon. bromat. 15·00,*
Extr. fluid. Viburn. 2·00,
Aq. dest. 120·00.

S. 2 razy dziennie łyżeczkę.

Abscessus frigidus.

Z otwarciem tego rodzaju ropnie nie potrzeba się wcale spieszyć

wyjawszy tych przypadków, w których rychle usunięcie ropnia wskazane jest z przyczyn innych. Leczenie ropni zimnych może być bardzo rozmaite. Albo ograniczamy się tylko do otwarcia ropnia i wprowadzenia doń sączka, lub też aspirujemy ropę przyrządem aspiracyjnym Dieulafoya lub Potaina. Po wypuszczeniu całej ilości ropy, wstrzykuje się do jamy kilkadziesiąt gramów zawiesiny jodoformowej, z której część po kilku minutach wypuszczamy, resztę zaś w jamie ropnia pozostawiamy. Na cały ropień zakłada się następnie opatrunek uciskający z przylepca. Postępowanie to wyjątkowo tylko prowadzi do celu za pierwszym razem, zazwyczaj należy je powtórzyć kilka razy w odstępach kilkutygodniowych. W niektórych razach, można cały ropień otworzyć szerokim ciecikiem, ściany jego wyskrobać ostrą łyżką a potem po zatamowaniu krwotoku, zalać całą ranę zawiesiną jodoformową i dokładnie zeszyć. Do przetok po ropniach gruźliczych, należy wprowadzać prećiki jodoformowe, kawałki lapisu lub też prećiki z balsamu peruwiańskiego.

5. Jodoform 10'00.

Glycerin 100'00.

S. Przed użyciem zakłócić.

6. Jodoform 9'00,

Mucill. gum. arab.

Glycerin. āā. 1'00,

Mf. bacill long. ctm. 4,
crass. mllm. 2.

S. Prećiki jodoformowe.

7. Jodoform,

Butyr Cacao āā. 10'00,

Mf. bacill long. ctm. 4,
crass. mllm. 2.

8. Bals. peruv. Glycerin.

Gelatin āā. q. s. f. l. a. bacill
long. ctm. 8, crass. mllm. 4.

Nr. X.

Acne vulgaris.

Ropnie gruczołowe i podskórne otworzyć bisturem, zaskórnikiem wycisnąć, następnie naciera się miejsca te spirytusem mydlanym i zmywa letnią wodą, wreszcie używa się środków, które wśrodmiernej reakcyi, powodują szybkie oddzielenie przyskórka i więc i komórek wyścielających gruczoły łojowe. Takiemi środkami są: siarka, naftol, resorcyna.

9. Lactis sulphur. 10'00,

Kali carbonici 5'00,

Spir. lavandul 20'00,

Glycerin. 50'00,

Ol. caryophyll,

Ol. menthae.

Ol. rosmarin āā. 1'00.

DS. Zakłócić przed użyciem. Górną część tego płynu się zlewa, nabiera się na flanelę nieco osadu i wciera takowy dość mocno, nazajutrz zmywa się osad wodą letnią, i tak postępuje 8—10 dni.

Szybciej działa:

10. Naphthol-B 5'00,

Sulphur. praecip. 25'00,

Sapon. virid.

Vaselini flavi āā. 10'00,

Mf. Pasta. S. Maść.

Pastą tą naciera się wieczorem z pomocą flaneli, zostawia ją na skórze godzinę, a potem się ściera. Stosować 8—10 dni.

Bardzo energicznym środkiem jest:

11. Resorcin.

Zinci oxydat.

Amyli Oryzae āā. 10'00,

Vaselini. flav. 20'00.

Mf. Ung. S. Maść.

Maść tę wciera się wieczorem, zostawia przez 1/2 godziny, a następnie ją ściera.

Ponieważ wszystkie te środki drażnią skórę, należy je łączyć ze środkami łagodzącymi t. j.

wieczorem wcierać jedną z powyższych maści a rano wetrzeć:

- 12.** *Zinci oxydati,*
Magist. Bismut. āā. 1'00,
Ung. emollient. 10'00.

Maść tę naciera się w cieniutkiej warstwie i posypuje pudrem.

- 13.** *Pulv. lapid. Baptistae,*
Talci veneti,
Amyli orizae āā. 30'00,
Ol. rosar. gtts. IV.

Acne nodata ustępuje przy zaprzestaniu używania tego środka.

Acne rosacea. Pierwszym zadaniem usunięcie podstawy choroby, a więc przy niezycie przewodu pokarmowego woda Karlsbadzka, Maryenbadzka, przeciw anaemii: żelazo, arsenik, w razie zmian chorobowych części rodnych, leczenie odpowiednie; zaprzestanie napojów wyskokowych. Leczenie miejscowe ma na celu sprowadzenie skurezu naczyń, jakoteż usunięcie guzków, będących następstwem przerostu tkanki łącznej i zapalenia grucz. łojowych. Telangiektazye usuwa się przez obwodowe nacięcie pni naczyń rozszerzonych, w kilka dni po tych nacięciach (których ma być kilkanaście) wciera się siarkę z wyskokiem.

- 14.** *Lactis sulphur. 10'00*
Spir. vini gallici 50'00,
Glycerini 1'50.

lub maść naftolową:

- 15.** *Naphtholi-B 2'00,*
Sulphur. praecip. 10'00.
Sapo virid.
Vaselin flavi āā. 7'00.

Maść tę wciera się wieczorem na godzinę, usuwając potem watą. Dobrze też działa maść resoreynowa *p. acn. vulg.*

Usunięcie większych guzków wymaga operacji.

W ostatnich czasach polecano:

- 16.** *Ichtyoli 2'00,*
Lanolin.
Vaselin āā. 10'00.

FUNG. S. Na noc posmarować, rano zmyć wodą z mydłem.

Mały kawałek płótna macza się we wrzącej wodzie i na minutę przykładana na chore miejsca; powtórzyć 2—3 razy dziennie. Do wody można dodać nieco kwasu salicylowego.

Actinomykosis.

Ile możności doszczętne usunięcie części schorzałych, przez wycięcie lub wyskrobanie zapomocą ostrej łyżki. Opatrunek jodoformowy lub sublimatowy.

Adenitis inguinalis.

Absolutny spokój; w początkach lodowe okłady, przetwory jodowe. W dalszym okresie okłady wysychające (z letniej wody lub octanu glinowego). Skoro się tylko chębotanie daje wykazać, należy ropień zapomocą szerokiego cięcia otworzyć i ranę wytamponować gazą jodoformową. Celem przyspieszenia wyleczenia, można resztki gruczolów, o ile jeszcze nie uległy zropieniu, wyłuszczyć lub usunąć ostrą łyżką. W zatonki powstałe podczas gojenia się rany, można wprowadzać przeciki jodoformowe lub kawałki lapisu, choć najpewniejszym sposobem pozostanie zawsze rychłe rozcięcie i otwarte leczenie tychże.

- 17.** *Tct. jodi 30'00.*
 S. Zewnętrznie.

- 18.** *Tct. jodi.*
 — *Gallar. āā. 30'00.*
 S. Zewnętrznie.

- 19.** *Kali jodat. 2'00,*
Jodi pur. 0'20,
Glycerin. 40'00.
 S. Zewnętrznie.

- 20.** *Kali jodat.* 2'00,
Jod. puri. 0'20,
Ungu. simpl. 20'00.
Mf. Ung. S. Maść.
- 21.** *Jodoform* 9'00,
Glycerin.
Mucill. gumm. arab. āā. 1'00,
Mf. *bacill. long. ctm.* 4.
crass. mllm. 2.
S. S. n.
- 22.** *Jodoform*
Butyr Cacao āā. 10'00,
Mf. *bacill. long. ctm.* 4.
crass. mllm. 2.
S. S. n.
- 23.** *Argent. nitric. fus. inbacill.*
tenuissim 5'00.
S. S. n.

Alkoholismus.

Acutus zobacz: Otrucia.
Chronicus. Leczenie tylko w zakładach moźebne. *Tra chinæ, Tartar. emetic.* czasami w lżejszych stopniach pomaga. Na tle *A.* najważniejsze zob. *delirium tremens.*

Alopecia.

1. *e. seborrhoea.* a) Przyczynowa: usunąć niedokrewność, poprawić ogólne odżywienie, leczyć kiłę (alopecia e seborrhea syphilitica).

b) Leczenie miejscowe. Istniejące strupy i łuski rozmiękczyć, a następnie zmywaniem usunąć. Do rozmiękczenia strupów używa się oliwy, tranu, olejku migdałowego, wcierając takowe pędzlem szczecinowym lub gąbką 4—5 razy dnia. U mężczyzn można poprzednio włosy krótko obciąć. Do zmycia rozmiękczonego strupów i łusek, używa się u dzieci płynnego mydła glicerynowego, u starszych *spiritus saponato Kalinus.* Mydło wciera się gąbką lub flanelą aż do powstania obfitej piany, splukując je obfitą ilością wody letniej.

W ten sposób zmyta skóra gwy jest zaczerwienioną, suchą, napiętą, skłoną do pękania, przyskórka, dlatego w tym okolicie się wciera się w nią oleje i pomady.

- 24.** *Zinci oxydati* 5'00,
Unquenti emolientis 25'00.
Mf. Unguentum. S. Maść.
lub:
- 25.** *Chinini puri* 1'00,
Acidi tannici 2'00,
Unquenti emolientis 100'00
Olei resedae
Naphae āā. gtts. III.
Mf. Unguentum. S. Pomada.
lub:
- 26.** *Mercur. praecipit. albi* 5'0
Unquenti emolientis 50'00,
Trae Benzoes 1'00,
Olei rosar. gtts. V.
Mf. Ung. S. Pomada.
lub:
- 27.** *Extr. chinæ* 5'00,
Balsami peruviani 1'00,
Unquenti emolientis 50'00.
Mf. Ung. S. Pomada.

lub:

- 28.** *Medullae ossium* 75'00,
Extr. chin. frig. parat. 10'00
Trae cantharid.
Succi Citri āā. 5'00,
Olei de Cedro
Olei Bergamottae āā. gtts. X
Mf. Ung. S. Pomada.

Skoro przyskórka dostateczni zgrubieje i tkliwość skóry ustąpi trzeba jeszcze przez kilka tygodni w miarę wytwarzających się łusek codziennie lub 3 razy w tygodniu wcierać naprzemiennie powyższe pomady:

- 29.** *Spiritus vini gallici* 100'00,
Acidi carbolici 0'15,
{ *Acidi borici* 3'00, } lub
{ *Acidi salicylici* 3'00, }
Glycerin 1'50.

MDS. Do nacierania.

2. *Alopecia areata*. Leczenie zazwyczaj nie wielkie skutki odnosi.

1) wyciąganie zwątlonych włosów.

2) dobre odżywienie i leki wzmacniające.

3) wcieranie płynów drażniących w połączeniu z przeciwgrzybkowymi.

30. *Trae Benzoes* 2'00,
Acidi salicylici 5'00,
Spiritus vini gallici 200'00.
MDS. Zewnętrznie.

lub:

31. *Trae Aconiti* 1'00,
Trae Capsici 1'00,
Spiritus vini gallici 200'00,
Balsami peruviani 2'00.
MDS. Zewnętrznie.

3) Injekeye pilocarpinu.

32. *Extr. aquos. Pilocarp.* 30'00,
Tinct. cantharid. 15'00,
Liniment saponat. 170'00.
Wcierać w skórę, raz dz.

Amenorrhoea.

Badać dokładnie i szukać przyczyny. Pamiętać o możebności ciąży. W przypadkach Haematometra zabieg operacyjny. Jeżeli przyczyną chlorosis, Serophulosis, Tuberculosis, Anaemia, zastosować odpowiednie leczenie przeciw cierpieniom tym zwrócone.

W przypadkach niedostatecznego rozwoju macicy, albo w przypadkach nadmiernego zwinienia się po porodzie; wstrzykiwania ciepłe, elektryzowania macicy, kąpiele nożne, scarificata części pochwowej powtarzana w czterogodniowych odstępach, szczególnie gdy są molaimina mensturalia. Żelazo wewnętrznie, zmiana powietrza, powietrze górskie, Krynica, kąpiele borowinowe.

33. *Tra Capsici* 3'00,
Rhumi optimi 80'00,
Mixturae gummosae 120'00.
S. Co 3 g. łyżeczkę od kawy.

34. *Extr. aloes* 1'00,
Pulv. myrrhae qu. s. ut. f. pill.
Nr. 50.

S. 3 r. dnia 2—3 pigułek.

35. *Acid arsenic.* 0'06,
Ferri sulph. exsicc. 2'00,
Piper nigr.
Aloes.
Myrrh. āā. q. s. f. pil. Nr. 60.
S. 2 r. dz. pigułek po jedzeniu.

Anaemia.

Jeżeli wystąpi skutek krwotoku lub długotrwałej choroby, podawać leki wzmacniające i podniecające, pożywna dyeta. W razie grożącego zapadu wino Sherry, szampańskie, czarna kawa, eter, oraz:

36. *Aether sulphur.* 10'00,
Camphor. 1'00.
DS. Wstrzyknąć 1—2 wstrzyk.

37. *Olei camphorati* 10'00.
DS. Do wstrzykiwań.

38. *Aether acet.* 10'00.
DS. 10 do 20 kropli co $\frac{1}{2}$ g.

Przy dłużej trwającej A. według wskazań: arsen, żelazo, wino, pobyt na świeżem powietrzu. Wody żelaziste, Krynica, Żegiestów.

39. *Liquor. ferri album.* 50'00.
DS. 3 razy dziennie łyżeczkę.

40. *Ferri hydrog. reduct.* 5'00,
Acid. arsen. 0'20,
Extr. gentian q. s. f. pill.
Nr. 100.

DS. 2 do 3-ch pigułek dzien.

U dzieci:

41. *Liquor. ferri album.*
DS. 5—20 kropli w $\frac{1}{2}$ szklanki mleka.

42. *Trae ferri pomat.* 10'00,
Trae chinæ comp. gtt. X.
DS. 3 r. dzien. po 10 kropli.

43. Sol. arsen. Pearsoni*Aq. amygd. amar. āā. 7'00.*

DS. 3 r. dzien. po 2 krople.

Wody pyrophosforanowo żelaziste. Zob. Chlorosis.

Anaemia cerebri.

Uwzględnić powody (utrata krwi, wyniszczające choroby — biegunki). W razie omdlenia: ułożenie poziome z głową ku tyłowi pochyloną, skrapianie twarzy zimną wodą, rozebranie chorego. U dzieci oprócz powyżej podanych środków, kąpiele z gorzycą, wraz z polewaniem głowy zimną wodą, podskórne zastrzykanie Ol. camphor. eteru.

44. Trae ferri chlorat. 20'00.

DS. 3 r. dz. po 10 kropli.

Anchylostomum duodenale.

Środki przeciwczerwiowe, Santonina, Thymol, zwłaszcza zaś Extr. filic. mar. w dużych dawkach (10—15 gramm.) obok środków czyszczących i lewatyw.

Angina diphtherica.

Wobec setek środków i metod co dzień jako najskuteczniejsze opisanych, należałoby je wszystkie podać. Gdy to jednak niemożliwe, uważamy za stosowne podać tylko ogólnie najważniejszą zalecaną zasadę, notując jednak środki w najnowszych czasach ogłoszone.

Przedewszystkiem odłączyć chorego, dla zapobieżenia rozszerzania tej choroby. Mieszkanie przewietrzać. Ciepłota w pokoju 14—15 R. Dyeta pożywna, rosół, bulion, jaja, galarety mięsne, wino z wodą, herbata z cognakiem i tp. Dużo płynów, lemoniada, woda ze sokiem owocowym. Leczenie rozpocząć lek-

kim środkiem przeczyszczającym, bądź Calomel w małej dawce, bądź Aq. laxativ. rheum. W obec miornej gorączki chinina po 0·20 do 0·50 (rano i wieczór przy wysokich stopniach: antypyryna z cognakiem, również po 0·20—0·50 parę razy dziennie. Zmywania całego ciała wodą z octem. Zimne okłady na głowę. Na szyję okład wysychający, zmieniany co 2 lub 3 godziny. Płukanie z rozczyń: kali chloricum 2⁰/₁₀ Acid. boric. 3⁰/₁₀. Dzieciom mniejszym przepłukiwanie gardła zapomocą strzykawki (z ostrożnością aby podniebienia nie zranić — a w razie oporu, lepiej i tego zaniechać). Pedzlowania niezbyt częste albo sokiem z cytryny, lub też Papayotin (1:20). Inhalacje co godzinę, w nocy co 2 godziny: Acid. boric. 2⁰/₁₀, Aq. calcis na 1/2 z wodą, Kali chloricum 2⁰/₁₀, Sublimat. Z leków do wewnątrz podawanych 1/2—2⁰/₁₀ rozczyń Kali chloricum w odwarze 5⁰/₁₀ kory chinowej. W uporzeczszych i cięższych przypadkach, wcierania szaruchy po 5'00 dziennie w różne części ciała. Na obrzmiałe gruczoły okłady z liquor alum. acetici. Jeżeli błonica w nosie, lekkie przestrzykiwania kw. borowym 3⁰/₁₀ lub kali chlor. 2⁰/₁₀. W razie zapadu, eter, kamfora, czarna kawa, zagrzewanie kończyn, nacierania ciepłym octem, wina mocne, wstrzyknięcie eteru, ol. camphor. Jeżeli błonica przeszła na krtani stósować leczenie podane przy Laryng. crouposa. Powikłania jak: Nephritis (codziennie badać mocz), otitis, Pneumonia, leczyć według wskazań. Przeciw porażeniom: dyeta wzmacniająca, chinina, przetwory żelaza, prąd stały. W czasie całego przebiegu zwracać uwagę: na serce, nerki i błony śluzowe.

Środki podawane do wewnątrz:

- 45.** *Chinin. muriat.* 0'50—1'50,
Ammon. chlorati 1'00,
Aq. dest. 60'00,
Syrup rubid. 20'00.
 DS. 3 r. dz. łyżeczkę.
- 46.** *Antipyrin* 1'50—2'00,
Cognaci 20'00,
Aq. destil. 80'00,
Syrup simpl. 20'00.
 DS. Co 3 godz. łyżeczkę.
- 47.** *Kali chlorici* 0'50—2'00,
Aq. destil. 80'00,
Syrup rubid. 20'00,
 DS. Co 2 godz. łyżeczkę.
- 48.** *Dcti cort. chinae e* 5'00 ad
 100'00,
Natri salicyl. 2'00,
Syrup sacchari 20'00.
 DS. Co 2 godz. łyżeczkę.
- 49.** *Pilocarpin muriatic.* 0'01,
Pepsin 0'20,
Acid. muriat. gtts. V.
Aq. dest. 80'00,
Syrup simpl. 20'00.
 DS. Co godz. łyżeczkę (po ka-
 żdej łyżeczce wina mocne).
- 50.** *Ol. Terebinth. rectif.* 8'00,
Pulv. gum. ar. q. s.
Aq. dest. 120'00,
Syrup simpl. 20'00.
 DS. Co 3 godz. łyżeczkę (po-
 pić mlekiem).
- 51.** *Camphor.* 0'30,
Mixt. gumm. 80'00.
Syrup sacchari 20'00.
 DS. Co godz. łyżeczkę.
- 52.** *Aether. acet.* 5'00,
Ol. cinanom. 1'50.
 DS. Co 2 godz. 3—5 kropli.
 Arak co $\frac{1}{2}$ godz. łyżeczkę aż
 do upojenia.
- 53.** *Kali chlorici* 5'00,
Trac myrrhae 15'00,
Acid. carbol. gtts. V.
Mel despum. 20'00,
Aq. dest. 150'00.
 DS. Co $\frac{1}{2}$ g. po 15 kropli.

Leczenie miejscowe: Okłady z lodu na szyję (w woreczkach gummowych), pić wodę z lodu z dodatkiem wina czerwonego, lody owocowe. Później przy rozpadzie błon lub zgorzeli przejść do ciepłych okładów i kataplazmów. Inni radzą od początku ciepłe okłady i kataplazmy co $\frac{1}{4}$ do $\frac{1}{2}$ godz. zmieniać, pokarmy ciepłe, płukania ciepłe.

Płukania:

Aq. calcis, Acid. salicyl. 1 $\frac{0}{10}$,
Ac. boricum 2 $\frac{0}{10}$, *Kali chloric.* 2 $\frac{0}{10}$, *Sublimat.* 1 $\frac{0}{100}$, *Thymol* $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{10}$, *Menthol* $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{10}$.

Pędzlowania:

Solut. acid. citr. e 10'00:50'00,
Resorcin 3'00: *Glycerin* 30'00.
 S. Co 2 godz. pędzlować.

- 54.** *Acidi salicyl.* 0'50—1'00,
Spir. vini q. s.
Glycerin. 40'00,
Infus cort. Eucalypti 60'00.
 DS. Co g. zwilżać watą zamoczoną w tym płynie, miejsca bł. zajęte.
Chinolin 5 $\frac{0}{10}$ 3 r. dz. zwilżać.
Papayotin 5 $\frac{0}{10}$ co 3 godziny.

- 55.** *Ferri sesquichl.*

Glycerin. aa. 10'00.
 DS. Pędzlowanie 3 razy dz.

Wdychiwania (Inhalacye):

Para wodna.

Acid. carbol. 2:500.

Kali chloric. 1 $\frac{0}{10}$.

Aq. calcis āā. c. Aq. dest.

Acid. lacticum 1 $\frac{0}{10}$.

Sublimat 0'02:200'00.

Resorcin 1 $\frac{0}{10}$. *Glycerin* 1:4.

Wdmuchiwanie:

Cukier proszkowany — obficie i często.

Sól kuchenna (grubo nakładać).

Kali chloricum.

Menthol 1'00. *Sacchari pulv.* 20.
 2—4 r. dziennie.

Flor. sulph., Chin. sulf. āā. 0'20.
 2 r. dz.

Jodoform co 3 godziny.

Angina Ludovici.

W pierwszym okresie należy zastosować zimne okłady, worek z lodem lub przyrząd chłodzący Leitera. W następnych dniach okłady wysychające z płynu Burowa:

56. *Alum. crud.* 40'00,
Plumb. acet. 70'00,
Aqu. dest. 600'00.

Filtra. S. do okładów.

W razie znacznego napięcia lub utrudnionego oddechania głębokie i liczne nacięcia.

Do tracheotomii należy być każdej chwili przygotowanym.

Angina pectoris vide Ste-nocardia.

Angioma.

W przypadkach, w których ubytek po operacji powstały da się w zupełności zeszyć, można guz w całości wyciąć i drogą rychłozrostu przyspieszyć wyleczenie. W przeciwnym razie najlepiej nakłuć guz w kilku miejscach palnikiem termokautera lub galwanokauteru. Z innych sposobów rzadziej używanych, czasami odpowiednim jest wstrzykiwanie kilku kropli zgęszczonego kwasu karbolowego lub sześciochlorku żelaza (na pół z wodą), przyczem najlepiej nowotwór przedtem na czas operacji podwiązać, by zapobiedz dostaniu się tych płynów w ogólny obieg krwi. Czasami można również z dobrym skutkiem próbować elektrolizy. Małe guzy można pendzlować dymiącym kwasem azotowym. Wszystkie te sposoby należy kilka razy w odstępach kilkudniowych lub kilkutydniowych powtarzać. W niektórych przypadkach nadaje się bardzo dobrze podwiązka zwykła lub elastyczna. Mniej odpowie-

dnem jest szczepienie krowianki na tych miejscach, lub stosowanie maści i past żrących.

Antrax. Carbunculus.

Wczesne, głębokie a liczne nacięcia, sięgające aż do tkanki zdrowej. Rany powstałe należy wytamponować gazą jodoformową, zwłaszcza bezpośrednio po operacji, gdyż krwotok bywa dość często wcale znaczny. Na gazę należy przyłożyć watę zamoczoną w roztworze octanu glinowego i pokryć takową ceratką nieprzemakalną. Wino i cognac należy podawać w znacznych ilościach, ewentualnie także.

57. *Coffein. citr.* 1'00,
Aqu. Cinnamomi 150'00.

S. Co 2 godziny łyżkę.

Celem znieczulenia części schorzałej podezas nacięcia, najlepiej ją zamrozić rozpylaczem Richardsona, napełnionym albo eterem siarczanym albo lepiej:

Hydranlyl. Etherem (I. Robbins. et Comp.).

Aphthae.

Pędzlowanie 1⁰/₀ roztworem kali chloricum, 1¹/₂⁰/₀ roztworem acid. tannici, 5⁰/₀ Boraxem.

58. *Succi citri.*
Syrup. rub. Id. āā. 10'00.
S. Do pędzlowań.

59. *Argenti nitrici* 1'00,
Aq. dest. 50'00.
MDS. Do pędzlowania.

Wewnętrznie:

60. *Kali chlorici* 1'00,
Aq. dest. 80'00,
Syrup rubid. 20'00.
MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Uporęczywie trzymające się plamy lapisować. Obok tego zimne napoje, podawanie kawałków lodu, unikanie gorących potraw.

Apoplexia cerebri.

Chorego położyć w łóżku, okład lodowy na głowę, jeżeli osoba krwista, dobrze odżywiona i jest się obecnym prawie na początku udaru, to krew puścić najwyżej 500 gram. lub pijawki za uszami postawić. Nadto dać zaraz lewatywę z octu, mydła, lub soli, chorego rozcierać, synapizma na łydki i piersi. Jeżeli tętno słabe i zapad jest, to podać wino, kawę czarną, kamforę, eter podskórną. Gdy udar minął, to choremu nie pozwalać wstawać z łóżka, okład lodowy, dalej mieć na głowie, stolec regulować, wody gorzkie Hunyady Janos, Morszyńska, dyetę płynną niepodniecającą, a ze środków wewnętrznych digitalis lub Tincta Strophanthi dla uspokojenia akeji serca.

W kilka tygodni po ataku, gdy reakcja zapalna minie, podawać kal. jodatum, elektryzować kończyny porażone, masować, ruchy biernie wykonywać i działać profilaktycznie, usuwając główną przyczynę udaru najczęściej zmiany w sercu i tętnicach.

- 61.** *Camphor. tritae* 1'00,
Aether sulphur. 5'00.
S. Do wstrzykiwań.

Arthritis.

Przedewszystkiem leczenie dyetetyczne. Ograniczenie się co do ilości i jakości pokarmów. Wolno jeść mięso chude, o ile możliwości białe tylko, mleko, jarzyn sporo, unikać tłuszczów i mącznych potraw, niemniej napojów wysokokowych. Do picia szczawny, lub zwykła woda z dodatkiem kwasu. Wskazany jest ruch na świeżem powietrzu, wycieczki w góry, gimnastyka. Ze środków wewnętrznych po-

lecają Lith. carbon. 0'25 2—3 na dzień, Tinctura lub Vinum Colchici po 10—20 kropli 3—4 razy na dzień, Natrium salicylicum lub Antipyrina 2—3 gram. p. die.

W razie silnych bólów wcierać maście z narkotykami, na wewnątrz morfinę lub podskórną.

Następnie picie wód Giesshübler, Bilińska, Vichy, Kissingen, Ems, Neuenahr, Obersalzbrunn, Dürkheim, Homburg, otyłym zaś osobom można polecić Marienbad, Karlsbad.

- 62.** *Chloroform* 10'00,
Aq. Colonien. 20'00.
Tr. Aconiti 40'00.
DS. Do nacierań.
- 63.** *Extrac. Belladon.* 2'00,
Lanolini 20'00.
MfUng. DS. Weieranie.
- 64.** *Lithii jodat.* 0'25,
Extr. et pulv. gent. āā. q. s.
f. pil. 20.
S. 3—4 pig. dziennie.

Ascaris lumbricoides.

Zabraniać pokarmów mącznych, natomiast, mleko, mięso.

- 65.** *Santonin* 0'15 (—0'20),
Ol. ricini 50'00.
MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.
- 66.** *Santoni* 0'03,
Calomel. 0'05,
Pulv. rad. rhei 0'15,
Sacchari 0'20,
Mfp. dtur tal. dos. Nr. 6.
S. Rano i wieczór proszek.
- 67.** *Pulv. sem. cinnac* 4'00,
Pulv. rad. Jalap.
Sacchari āā. 2'00,
Mfp. divid. in dos. Nr. 4.
DS. Co 1/2 godz. proszek.

Po użyciu tych środków, dobrze jeszcze dawać duże lewatywy z wody, lub Sublimatu (1:2000).

Thymol 0'10—0'30 pro dosi.

- 68.** *Jodoform* 0'03,
Natri bicarb. 0'25,
Mfp. dtur. tal. dos. Nr. 5.
 S. 3 razy dz. proszek.
 (Na drugi dzień *Ol. ricini*).

Ascites.

W pierwszym rzędzie leczenie przyczyn (płuca, serce, wątroba). Jeżeli skutkiem A. nadmierne napięcie brzucha, duszność, wykonać punkcję. Leczenie oprócz uwzględnienia przyczyn polega na środkach moczopędnych, napotnych i czyszczących.

- 69.** *Infus digital. e* 1'00,
ad 120'00,
Kali acetici
Trae Strophanti āā. 5'00,
Syrup sple. 20'00,
 MDS. Co 2 godz. łyżkę.
 (Przy wadach serca).
- 70.** *Coffeini natrobenzoici* 0'20,
Sacchari 0'50,
Mfp. dtur. tal. dos. 10.
 S. Co 3 godz. proszek.
 (j. w.).
- 71.** *Infus hbae Adonis vernal e* 5'00
ad 180'00,
Syrup cort. aur. 20'00,
 MDS. Co 3 godz. łyżkę.
- 72.** *Infus Convallar. majal.*
e 5'00 *ad* 180'00,
Syrup cort. aur. 20'00.
 MDS. Co 3 godz. łyżkę
 lub *Tra Convall. maj.* 3 r. dz.
 po 10 kropli.
- 73.** *Det. hb. Equis. e* 15'00,
ad 180'00,
Roob Juniperi 20'00.
 S. Co 2 godz. łyżkę.
 Ciepłe kąpiele na 38° C. do
 40° C. poczem zawijanie
 w koce na 2 godziny.
 Przy *Cirrhos. hepat.*, sztuczna
 sól karlsbadzka.

- 74.** *Natri sulphurici* 50'00,
Natri chlorati 3'00,
Natri bicarb. 6'00,
 Mfp. DS. Rano i wieczór ły-
 żeczkę w szklance ciepłej
 wody.

- 75.** *Calomel* 0'10,
Pulv. fol. digit. 0'05,
Sacchari 0'50,
Mfp. d. tal. dos. 10.
 S. 3 pr. dz. (przez tydzień),
 (Równocześnie do płukania
Kali chloric.).
- 76.** *Gi Gutti.*
Bulb. Scill.
Stibii sulf. aur.
Hb. digit.
Extr. pimpinel. āā. 1'50,
f. pil. Nr. 60,
 DS. 3 r. dz. po 2 pig.

Asphyxia.

Usunięcie przyczyn powodują-
 cych, wyjęcie ciał obcych
 z dróg oddechowych, sztuczne
 oddychanie, drażnienie skóry,
 skrapianie zimną wodą i silne
 wycieranie ciała.

Asthma bronchiale.

Podezas samego napadu, eho-
 rego rozebrać, (zwłaszcza zdjęć
 stanik lub gorset), umieścić go
 w przestronnym pokoju, gdzie
 dobre świeże powietrze. Naj-
 prędzej działają narcotica, podać
 więc na wewnątrz albo Chloral-
 hydrat 2'00 na raz, lub wstrzyk-
 nać morfinę. Mniej pewnie dzia-
 ła morfina na wewnątrz. Polecić
 choremu podczas napadu mocną
 czarną kawę wypić, gorące o-
 kłady lub synapizma na klatkę
 piersiową i łydki. Kilka kropli
 Amylnitritu do wdechania, lub
 Pyridyn na spodeczek wylać i
 tem oddychać. Polecają też Jod-
 kalium w dawkach 1—3'00 na
 dzień, lub *Extr. Quebracho.* Je-
 żeli narcoticum nie może być
 podane a wśród napadu słychać

liczne rzeżenia i świsty i fuczzenia, to podać należy emeticum n. p. apomorfinę podskórnie lub na wewnątrz. W ciężkich napadach można się uciec do narkozy chloroformowej. Po przejściu napadu leczyć chorobę główną i pozostały zwykle po napadzie nieżyt oskrzelowy, odpowiednimi środkami.

77. *Extr. fluid. Quebr.* 25'00.

DS. 2—3 łyżeczki dziennie.

78. *Vini sibiati.*

Tinct. lobel. infl. āā. 5'00,

Morph. mur. 0'10.

DS. 3 r. na dz. po 15 kropli.

79. *Kali jodati* 10'00,

Tinct. Stramm. 8'00,

Extr. liquor. 4'00,

Syrup Scill. 30'00,

Aq. dest. 250'00.

S. 3 r. dz. łyżkę w szklance wody.

9 b. *Amylnitrit.* 5'00.

Ol. foenicul. 10'00.

S. W napadzie 2—5 kropli na lać na chustkę i wdychać.

80. *Natri nitrosi* 2'00,

Aq. dest. 120'00.

DS. 4 r. na dz. łyżeczkę.

81. *Kali jodati*

Tinct. lobel. infl. āā. 10'00,

Extr. opii 0'10,

Aq. destil. 180'00.

DS. Co 2 godz. 1/2 łyżki.

82. *Extr. Bellad.*

Pulv. Belladon. āā. 0'30,

f. pill. Nr. 30.

Na wieczór 1—2 do pigulek.

Radzą też w początku napadu, edzlować w głębi nosa:

83. *Cocain* 1'00,

Aq. dest. 20'00.

Atelectasis pulmonum.

U noworodków ciepła kąpiel zimne polewanie i nacieranie ciała. Dzieci takie należy często nosić, budzić ze snu, i co go-

dzinę karmić. Obok świeżego powietrza, ogrzewać (gorącemi flaszkami w pościeli). U starszych uwzględnić przyczynę: osłabienie po wyczerpujących chorobach, biegunkach, krzywicy, ugniot przez wysięk w opłucnej, nieżyt w drobnych oskrzelach. W tym ostatnim przypadku, środki wymiotne, wino, cognac, łyżeczka herbaty z paru kroplami rumu.

84. *Liquor. ammon. anis.* 1'00,

Aq. destil. 50'00,

Syrup Sacchari 15'00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

85. *Aetheris sulphur.* 10'00.

DS. Jedną lub 2 krople we wodzie.

Balanoposthitis.

I. Bez równoczesnej phimozy: Moczzenie prącia 2—3 razy dziennie w wodzie zwykłej nie bardzo zimnej, lub zmywanie wata zamoczoną w roztworze 1/2 0/0 azotanu srebrowego, 2 0/0 kwasu borowego, 1 0/0 kw. karbolowego lub 5—10 0/0 resorecyny, poczem obsusza się żołądź i napletek wata i zakłada się suchą wata, pod napletek. W razie obecności erozji kauteryzuje się je laseczką lapisu lub roztworem tegoż (1:2).

II. Przy równoczesnej phimozie: Wstrzykiwanie pod napletek strzykawką z końcem pałeczkatwym 1/2 0/0 roztworu azotanu srebrowego, 2 0/0 kwasu borowego, 5—10 0/0 roztworu resorecyny. Gdy napletek sinoczerwony, twarde, a z ujścia jego wydziela się ciecz cuchnąca tj. w razie rozpoczynającej się zgorzeli, przecięcie napletka na sondzie rowkowanej, lub circumcizio. Celem wzmocnienia cienkiej blaszki wewnętrznej napletka i żołądź i zapobieżenia często powtarzającej się balano-

posthitis posypywanie proszkiem:

86. *Tannini puri* 5'00,
Talci veneti 25'00.

Mfp. DS. Posypka.

Blenorrhoea neonatorum.

Zaraz po urodzeniu oczyściwszy oczy szmatką zmaczaną w czystej wodzie, zapuścić parę kropel 2% roztworu argent. nitrici (lub 1% kwasu karb. lub 0·02% sublimatu). Jeżeli jedno oko chore, drugie należy zasłonić opatrunkiem. Co godzinę rozwierać powieki i lekko wycierać odpływającą ropę. W okresie mocnego obrzęku, lodowy okład co 5 minut. Gdy się powieki już marszczą, odpływ ropy obfity pedzlowanie 2% roztworem argent. nitrici. Wkraplanie

87. *Zinci sulphur.* 0'05,

Aq. destil. 10'00,

Trae Opii croc. gttis. tres.

MDS. Dwa razy dz. wkraplać.

Blenorrhoea sacci lacrymal.

Po przecięciu lub dylatacyi dolnego punkciku łzowego wprowadzanie systematyczne co dzień przez 6—8 tygodni sondy Bowmanna zaczynając od Nr. I. lub 2-go i dojść do Nr. 4-go.

Blenorrhoea urethrae.

A. U mężczyzn.

a) *B. acuta anterior.*

Hygiena i dyeta: unikanie męczących ruchów czynnych (bieganie, gimnastyka, taniec, nużące przechadzki) i biernych (jazda wozowa lub konna). Unieruchomienie części płciowych zapomocą suspensoryum. Zabronić spółkowania, przebywania w towarzystwie kobiet, czytania książek pobudzających fantazję pod względem płciowym. Zwiększona pobudliwość płciową, objawiająca się erekcjami i po-

lucjami, w nocy osobliwie występującymi, usmierza się twardeń posłaniem i lekkim przykryciem, uregulowaniem stolca i podawaniem leków pobudliwość płciową obniżających (Patrz: Chorda). Pokarmy podawać w mniejszej ilości łatwostrawne, zaparcia stolca niewywołujące, unikać pokarmów pieprznych, silnie słonych i kwaśnych. Zabronić napojów wysokowych i kw. węglowych zawierających. Zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo przeniesienia wydzielin tryprowej do oka. W celu uniknięcia zanieczyszczenia bielizny, zakładanie waty do napletka.

Leczenie miejscowe środkami balsamicznymi i ściągającymi stosować tylko wtedy, gdy rzerzaczka części przodowej cewki jest niepowikłana, tj. gdy niema równoczesnej rzerzaczki części tylnej cewki, gruczołów Coupera, krokowego, przyjądrzy, lub pęcherza, inaczej bowiem komplikacje te się pogarszają.

Leczenie miejscowe środkami balsamicznymi na wewnątrz podawanymi można tylko wtedy zaraz w początku rzerzaczki zacząć, gdy takowa nie jest bardzo ostra. Wstrzykiwania zaś można dopiero wtedy robić, gdy sprawa rzerzaczkowa przeszła szczyt, tj. wydzieliną traci barwę zieloną, jest mniej gęstą, mleczną. W okresie ostrym przestaje się na leczeniu symptomatycznym. Środki balsamiczne najlepiej podawać w kapsułkach.

88. *Capsularum elasticar. tenentium Bals. Copair.* 0'50. N. 20.

S. 3—6 kapsułek dziennie.

89. *Capsul. elastic. tenent.*

Ol. Santali 0'50. Nr. 20.

S. 3—6 kapsułek dziennie.

90. *Balsami Copaive* 30·00.

S. 2 r. dz. po 20 kropli.

91. *Bals. Copaiiv.* 30·00,

Spir. nitri 7·50,

Trae Opii 1·50.

MDS. 2—4 r. dz. po 20 kropli.

92. *Bals. Copaiiv.* 12·00,

Vitelli ovi tria.

tere c. aq. font. 150·00,

Aq. Cinamon. 30·00,

Syrup Cinamom. 15·00.

S. Co 3 godz. łyżkę.

Wstrzykiwania robią się po oddaniu moczu 3—4 razy dziennie, płyn wstrzyknięty zatrzymuje się w cewce 2—4 minut.

93. *Zinci sulphur.* 0·60—1·00,

Aq. dest.

Aq. rosar. āā. 100·00,

Aq. lauroc. 2·00.

DS. Zewnętrznie.

W okresie końcowym używa się:

94. *Cupri sulphur.* 0·05—0·10,

Aq. destil. 100·00.

MDS. Zewnętrznie.

lub środki z osadem:

95. *Zinci sulphur.* 1·00,

Acetatis plumbi bas. 2·00,

Aq. rosar. 200·00,

Trae Catechu.

Trae Sydenhami āā. 2·00.

MDS. Zewnętrznie.

96. *Bismuthi subnit.* 4·00,

Aq. dest. 200·00.

MDS. Zewnętrznie.

Inne środki używane do in-
keyi:

97. *Thallinum sulphur.* 1·50—
2·00:100·00.

98. *Kali hypermang.* 0·02—0·04:
100·00.

99. *Zinc. sulphocarb.* 0·40—
1·00:100·00.

100. *Acid. carbol* } *āā.* 0·20:
Alumen } 100·00.

101. *Argent. nitricum* 0·05—

0·15:100·00.

Gdy choroba mimo wstrzykiwa-
nia się przewleka z powodu
anaemii lub kaheksyi, podaje
się żelazo z arsenikiem, wodę
Lévico lub Roncegno, lub wy-
syła się chorego do kąpiel że-
lezistych lub morskich.

*Leczenie symptomatyczne w o-
strej rzerzączce:*

Erekeya i bezsenność (p. Chor-
da) Oedema, lymphangioitis:
dyeta ścisła, okłady zimne, wcie-
ranie szarej maści. Przy utru-
dionem oddawaniu moczu lub
zupelnem wstrzymaniu: narcoti-
ca, ciepła kąpiel lub zanużenie
członka w zimnej wodzie,
w ostatecznym razie kateter
elastyczny. Dłż zmniejszenia
ból przy urynowaniu:

102. *Extr. Hyosc.*

Extr. cannab. ind. āā. 0·02,

Sacchari 0·30,

Mfp. tal. dos. Nr. 12.

S. 3 pr. dziennie.

lub:

103. *Det. semin. lini* 500·00,

Syr. Diacodii 10·00.

S. Co 2 godz. łyżkę.

lub według Fourniera:

104. *Natri bicarb.* 5·00,

Sacch. 30·00,

Succi citri gtt. 2.

S. W litrze wody rozpuścić
i w jednym dniu wypić.

b) *Blennorrh. acuta posterior.*

Zachowanie się jak wyżej.
W okresie ostrym lecz. symptom.
a więc przy haematuryi i parciu
na mocz: spokój, dyeta mleczna,
sprowadzać wolny stolec, ką-
piele letnie, injeke. morfin.,
czopki z extr. Bellad., Det. sem.
lini, gdy haematur. nie ustaje:

105. *Liquor. ferri sesquichlor*
2'00,

Aq. dest. 200'00,
Syr. simpl. 15'00.

S. Co 2 godz. łyżkę.

106. *Extr. secal. corn.* 0'10,
Sacchari 0'30,
Mfp. tal. dos. 10.

S. Co 3 godz. proszek.

Dysurię usuwa się czopkami z extr. Bellad., injeke. morfin., w ostateczności kateter elastycz.

Gdy okres ostry minie, parcie się zmniejszy, podać ol. Santali lub bals. Copaive, gdy chory nie znosi, Natr. Salicyl 2—3'00 pro die. Przy bólu w okolicy ledźwiowej a braku białkomoczu:

107. *Terebinth. venetae*
Ol. Therebinth. gallic. āā.
gts. IV.

Dtur. in capsul. gelatin.
tal. dos. 20.

S. 2—3 kaps. dziennie.

Gdy miną objawy podrażnienia: wstrzykiwanie; najlepiej według Diday'a: Kateter Nelatona przy napełnionym pęcherzu wprowadza się tak daleko, by mocza począł odpływać takowym, w tej chwili cofa się kateter o tyle, by mocza przestał odpływać tj. by okienko kat. znajdowało się w części krokowej — teraz wstrzykuje się strzykawką 100 gram. zawierającą przez kateter, posuwając go statecznie ku ujściu cewki, następujące rozezyny:

108. *Acidi carbol.* 1 00,
Aq. dest. 500'00.

lub:

109. *Kali hypermang.* 0'20,
Aq. destil. 500'00.

lub:

110. *Alum crudi.*
Zinci sulphur.
Acid. carbol. āā. 1'00,
Aq. dest. 500'00.

lub:

111. *Argent. nitric.* 0'20,
Aq. dest. 500'00.

Irygacye powyższe robi się z początku co 3 dzień, później co 2 przy pełnym pęcherzu, by płyn użyty w moczu się rozcieńczył i pęcherza nie drażnił.

c) *Blennorh. chron. urethrae.*

I. Forma. Mocz mętny z nitkami tryprowemi (obok ograniczonych miejsc zapalnych bł. śl. cewki, znaczna przestrzeń tejże w stanie przekrwienia biernego).

1) W części przodowej cewki.

Przestrzykiwań zaniechać, do wewnątrz ol. Santali lub

112. *Pulv. Cubebae.*
Bals. Copaive āā. 3'00,
Extr. gentian. q. s. f. pil.
Nr. 30.

S. 6—8 sztuk dziennie.

Przekonawszy się, że zmętnienie moczu nie pochodzi z podrażnienia długotrwałemi wstrz. poleca się dalej rozezyny:

113. *Zinci sulphur.*
Acid. carbol.
Alum. crudi āā. 0'30,
Aq. dest. 100'00.

lub:

Argent. nitr. (0'10:100'00), *Cupr. sulph.* (0'10:100'00).

2) W części tylnej cewki.

Irygacye metodą Diday'a lub kateterem irygacyjnym Ulzmana powyższemi rozezynami.

II. Forma. Mocz czysty z nitkami tryprowemi (ograniczone powierzchowne zapalenie bł. śl.), tu niezbędne zbadanie endoskopem

1) w części przodowej cewki, (najczęściej pars bulbosa). Wkraplanie rozezynów argenti nitrici

(przy wybujałościach lub wrzodach) lub cupr. sulphur. (przy ziarnistościach trachomatycznych) 1:30 zapomocą kateteru Guyona lub aparatu do pędzlowania Ultzmana.

2) Gdy i tylna część zajęta:

114. *Jodoformii 0·05,*

Tannini.

Zinci sulph. 0·02,

Cupri sulph. 0·01,

Arg. nitr. 0·005,

Gelatin alb. q. s. f. supposit.

long. 5 ctm. crass. 0·50 ctm.

Nr. 10.

Czopki te w oliwie umoczone wprowadza się do cewki, przesuwając wzdłuż takowej tak daleko, dopóki się jeszcze w międzykroczu od zewnątrz, wyczuć dadzą. Najlepszy skutek otrzyma się przez wkraplanie kateterem Guyona arg. nitric. 0·10:10·00.

III. Forma. Upośledzenie rozciągliwości cewki, hypertrophia capitis gallinag., prostatorrhoea i neurasthenia sexualis.

Gdy naciek w bł. śl. lub podśluzowej jeszcze wiotki, wywiera się ucisk przez wprowadzanie ciężkich sond metalowych coraz grubszych aż do Nr. 28—30 Chariera, naprzemian z wkraplaniem zapomocą kateteru Guyona rozczyznów arg. nitr. lub cupr. sulph. Gdy naciek zmienił się już w tkankę łączną wprowadza się dilatatory. Przy hypertroph. cap. gallig. prostatorrhoea dobre usługi oddaje psychrofor.

B. Rzerzączka u kobiet.

1) Pochwy.

W pierwszych 7 dniach ostrego zapalenia, nie wprowadzać do pochwy wziernika, chora ma pozostać w łóżku, spłukiwać letnią wodą ropę ze sromu, a między wargi sromne zakładać watę Brunsza, na dolną część brzucha i srom zimne okłady.

Po tygodniu gdy bł. śl. pochwy mniej drażliwa, przepłukiwać pochwę kwasem borowym 20/0 letnim, 2—4 r. dziennie zapomocą kanki macicznej. Skoro wrażliwość bł. śl. o tyle się zmniejszy, że można wprowadzić wziernik, przepłukuje się pochwę sublimatem 1:1000, a następnie pędzluje rozczysem arg. nitrici 1:8 i wprowadza suche tampony z waty Brunsza. Nazajutrz pochwę przepłukać sublimatem, przyczem strupy białe z azotanu srebr. powstałe, się oddzielają. Przepłukiwanie sublimatem odbywa się 8—10 dni 2 r. dziennie. Gdyby obrzmienie bł. śl. pochwy i wydzielanie ropy nie ustawało, kauteryzuje się powtórnie azotanem srebra 1:8.

Do przepłuk. pochwy użyć można zamiast sublimatu:

115. *Sulph. zinci 30·00,*

Acid. borici 20·00,

Alum. cr. 50·00.

S. Łyżączkę do litra wody.

Można tego rozczyynu używać obok sublimatu. Po każdym przestrzyknięciu zakłada się tampony z waty suchej by ściany pochwy od siebie oddalić. Tampony te mogą jednak być napojone środkami ściągającymi:

116. *Acidi tannici 5·00,*

Glycerin. 100·00.

DS. Zewnętrznie.

lub posypane proszkiem:

117. *Alumin. cr.*

Amyli Orizae āā. 20·00.

Mfp. S. Zewnętrznie.

2) Rzerzączka cewki moczowej:

W ostrym okresie leczenie symptomatyczne. Po ustaniu przykrych objawów podmiotowych: wewnętrznie balsamica i injekeye z kali hypermang. lub zincum sulphur. (pęcherz mocz. niepowinien być próżny).

W dalszym okresie pędzlowanie cewki tinct. jodową, rozczynelem arg. nitric 2—5⁰/₁₀.

Blepharadenitis.

Po dokładnem oddaleniu wszystkich strupków (vaseliną i ciepłą wodą) należy na noc smarować przy zamkniętych powiekach wzdłuż całej szpary powiekowej maść z żółtego, białego (zob. hordeolum) lub czerwonego praecipitatu. Ilość maści jak najmniejsza, wcieranie dokładne, czas kuracyi 4—8 tyg. W przypadkach większych wrzodzików na brzegu powiek, przytuszowanie także cum lapide mitigato z następowem zobojętnianiem rozczynelem soli kuchennej. Przytem lecz. przeciwzółzowe.

118. Praecip. rubri 0·20,

Vaselin. flav. 5·00.

Mfu. S. Wetrzeć w powieki na noc.

Blepharospasmus.

Będąc najczęściej jednym z objawów cierpienia spojówki i rogówki (Kerato Conj. phlyctenulosa, ulcera corneae, Trachoma etc.) przedewszystkiem leczenie przyczynowe, które musi być zastosowanem do głównej choroby. Oprócz tego smarowanie maści belladonowej na czoło i zapuszczanie kokainy do worka spojówkowego (jeśli naturalnie wrzodów rogówkowych niema), obok zielonego daszka lub ciemnych konserwów, zmniejszają znacznie dolegliwości:

119. Extracti belladonnae 2·00,
Ung. cinerei 15·00.

MDS. Wielkości ziarna grochu wcierać w czoło co 2 godz.

120. Cocaini mur. 0·20,
Aquaë destilat 10·00,
Sublimati corrosivi 0·001.

MDS. Kokain do ocz.
Zakraplacz.

Bronchiectasia.

Świeże i dobre powietrze, jeżeli można na wsi lub w górach. Odżywienie dobre chorego, odpoczynek od zajęć, unikanie kurzu i dymu.

Leczenie nieżyty oskrzelowego. Jeżeli suchy nieżyt, dawać środki wykrztuśne, apomorphin Senega, ipecacuanh. stib. sulph. aurant. z dodatkiem morfiny, jeżeli wydzielina b. obfita, to środki ściągające, jak Tanina, alun, plumb. acet. na wewnata lub do wziewań, albotież środki balsamiczne, ol. terebinth.

121. Bals. peruv. 5·00,

Aq. dest. 120·00,

Syrup amygdalini,

Mucill. g. arab. aa. 10·00.

DS. Co 2 godziny łyżkę.

122. Balsam. tolutani 5·00,

Gum. mimos. 3·00,

Aq. dest. 150·00,

Syr. balsamici 20·00.

MDS. Co 2 godziny łyżkę.

123. Terpinol 3·00,

Extr. et pulv. liquir. q. s.

Utf. pil. N. 30.

S. 4—5 na dzień.

Wreszcie pobyt nad morzem lub w miejscach klimatycznych.

Bronchitis acuta.

Wskazane jest przedewszystkiem utrzymanie jednostajnej ciepłoty ciała, u starców leżenie w łóżku szczególnie wobec Bronchit. capillar. oraz środki odwodzące na klatkę piersiową (bańki suche). Wewnętrzne środki rozdzielające, wykrztuśne wobec silnego kaszlu suchego, środki odurzające, wody mineralne alkaliczne. — (Bilińska Szcawnicka, Selterska, Emska etc.).

124. Natri bicarb. 5·00,

Morph. mur. 0·10,

Mfp. div. in dos XII.

DS. 3 proszki dziennie.

125. *Inf. rad. Ipec. 0:50:200:00,*
Syr. cort. aurant. 15:00,
 MDS. Co godzina łyżkę.

126. *Inf. Polygal. Seneg. 6:00:*
200:00.

DS. Co godzina łyżkę.

127. *Vini stibiati 15:00,*

DS. 3 razy dnia po 10 kropli.

128. *Natri bicarbon. 5:00,*

Sulph. aur. antimôn. 0:24,

Morph. mur. 0:10,

Mfp. div. in dos. XII.

DS. 3 proszki dziennie.

129. *Morph. mur.*

Apomorphin mur. āā. 0:10,

Aqu. dest. 15:00,

MD. in vitr. nigr.

S. 3—4 r. dnia po 10 kropli.

130. *Pulv. Doveri,*

Sacch. albi āā. 3:00,

Mfp. div. in dos. XII.

DS. 3 proszki dziennie.

131. *Natri benzoici 10:00,*

Trae aconiti gtts. 20,

Aqu. amygd. amar. 8:00,

Syrup codeini,

Syrup de Tolu āā. 30:00,

Aqu. dest. 110:00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

B. chronica. Dobre powietrze, unikanie dymu, kurzu, pożywna dieta, środki lekko przeczyszczające. Jeżeli można, wysłać na zimę do cieplejszego klimatu, w lecie pobyt na wsi lub zdrojowiskach. Inhalacye soli (2%) z dodatkiem Ol. terpent. Ol. pini pumilionis. Picie wód Szcawnickich, Selters., Ems. Expectorantia: Ipeka, Apomorphin. Przy Bronchoblenorrhoea: Ol. terebinth. dziennie dwa razy po 5—10 kropli z mlekiem, lub w kapsułkach. W razie duszności banki suche, synapismy.

Dzieciom z nieżytem oskrzeli bez gorączki, woda Szcawnicka lub Selters. z mlekiem, przy częstym kaszlu:

132. *Inf. ipecae e 0:10 ad 80:00,*

Ammon. muriat. 1:00,

Aq. lauroc gtts. X.

Syrup simpl. 15:00.

DS. Co godz. łyżeczkę.

Nieżyty O. na tle krzywicy lub zożów, wymagają leczenia tranem, żelazem i jodem. Inhalacya z wód alkalicznych, pobyt w miejscach lesistych i górzystych, lub nad morzem. W razie n. O. z gorączką, położyć dz. do łóżka, środki wykrztuśne.

Jeżeli wykrztuszanie skape, Natr. jodat. (0:50:100 w naparze ipeki). Senega (e 5:00:100:00). Wdychiwania pary. Jeżeli wydzielina obfita, dodać do Senegi Liquor amm. anis. W razie ustania wyksztuszania, siniący: flor. benzoos, wino mocne, Cognac, ciepłe kąpiele z zimnemi polewaniami. Dzieci małe często nosić na rękę.

Bronchopneumonia u dzieci.

Środki wykrztuśne, kompressy z wystawej wody co 6 godzin. W razie potrzeby leki podniecające.

133. *Inf. ipec. e 0:20 ad 60:00,*

Liquor. amm. anis 1:00,

Syrup altheae 20:00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

134. *Inf. ipec. e 0:20 ad 100:00,*

Natri Salic. 1:00,

Syrup althea. 20:00.

DS. Co godz. łyżeczkę.

Zreszta leczenie podane pod Bronchitis.

Bubo vide Adenitis inguinal.

Carcinoma mammae.

Wczesne wycięcie całego sutka i wyjęcie gruczołów pod pachą, a w razie ich nieobecności usunięcie całego tłuszczu pod pachą.

W przypadkach nie nadających się już do operacyi, można

próbować wstrzykiwań miąższowych do guza:

- 135.** *Pyocyanini coerulei* 0.1—0.5,
Aq. dest. 50.00,
S. 1—5 strzykawek wstrzykn.

W przypadkach owrzodziałych celem odwonienia najlepiej opłukiwać rozczynek słabym nadmanganianu potasowego lub kreoliny:

- 136.** *Kal. hypermang.* 1.00,
Aq. dest. 50.00.
S. Kilka kropli do szklanki wody.

- 137.** *Creolini* 20.00,
S. Kilka kropli do szklanki wody.

Na wewnątrz można podawać:

- 138.** *Vin. Condurango* 200.00.
S. 1—2 łyżeczek przed jedzeniem.

Carcinoma uteri.

W początkach cierpienia: wycięcie macicy częściowe, a najlepiej całkowite. W przypadkach w których zaś znachodzimy nowotworowy naciek w więzach szerokich, leczenie objawowe: utrzymanie czystości przez wstrzykiwania odrażające:

- 139.** *Kali chloricum* 1:100.
140. *Kali hypermang.* 10.00,
Aq. dest. 150.00.
DS. Pół łyżki na litr wody.
141. *Acidi Carbol.* 20.00—30.00.
Aq. dest. 1000.00.
DS. Do wstrzykiwań.

Gdy plamy krwawe:

- 142.** *Acidi pyrotign. crudi* 300.00.
DS. 3—5 łyżek na litr wody do wstrzykiwań.
143. *Creolini* 20.00.
DS. 10 kropli na litr wody.
144. *Ferri sesquichl. sol.* 10.00.
Aq. destil. 1000.00.
DS. Do wstrzykiwań.

Nadto gdy to nie wystarcza, zakładanie gazy jodoformowej do pochwy.

W przypadkach krwotoków, tamponowanie pochwy.

Gdy znaczniejsze wybujałości i częste krwawienie: wyskrobanie nowotworu i przypieczenie cum ferro candente, thermokauterem i t. d. albo środkami chemicznymi silnie żrącymi.

Wreszcie przeciw bólow należy podawać środki kojące: morfine, opium i t. d. Baczyć na dobre odżywianie, środki gorzkie pobudzające apetyt.

Carcinoma ventriculi.

W przypadkach nie nadających się do zabiegu operacyjnego leczenie jest przypadkowe, zmierzające do podtrzymania sił chorego, zapomocą lekko strawnej a pożywnej diety, oraz usuwania bólów przez podawanie środków odurzających. Prócz tego wskazanem jest podawanie kwasu solnego, którego żołądek rakowato zwyrodniały najczęściej nie wydziela, oraz podawanie przetworów Candurango, przeciw objawom dyspeptycznym. W razie towarzyszącego rozszerzenia żołądka lub krwotoków (vide: Dilatio ventriculi, — haematemesis).

- 145.** *Acid. hydrochlor.* 3.00,
Pepsini german. solub de
Rostock 2.00,
Aq. dest. 200.00,
Syr. simpl. 15.00.
DS. Po każdym jedzeniu 2 łyżki zażyć.
146. *Cort. Condurango* 15.00,
Macera per XII. hor. c. 400.00,
Aq. dest. postea coque ad reman. 200.00,
dein adde:
Acid. hydrochlor 3.00,
Syr. simpl. 15.00.
DS. 3 łyżki dziennie.

147. *Vini Condurango 100'00,*
DS. 3 łyżeczki dziennie.

W razie wymiotów:

148. *Cocaini muriat 0'20,*
Aq. dest. 10'00.

DS. W razie wymiotów 10 kropli zażyć.

W razie bólów:

149. *Morphii mur. 0'10,*
Aqu. dest. 10'00.

MDS. W razie bólów 10 kropli zażyć.

150. *Codeini 0'20,*
Sacch. albi 3'00,
Mfp. div. in dos. X.

DS. W razie bólu jeden proszek zażyć.

Cardialgia.

Znaleść przyczynę bólu i takowa starać się usunąć. Najczęściej: *ulcus ventriculi*, *carcinoma ventriculi*, *chlorosis* i u hysteryczek, *neurastheników* lub jako *crises gastriques*.

W razie napadu ciepły okład na żołądek, synapizm na dołek podsercowy, wstrzyknięcie podskórne morfiny, narcotyca: jak opium z *bismuth. subnitricum*, *Cocaina 0'01—0'02 p. dosi*, *Belladonna*, *Chloroform* i tp. Nadto uregulowanie dyety.

151. *Tinct. opii croc. 5'00,*

Tinct. castor. 10'00,

Tinct. valer. aeth. 15'00.

MDS. 3 r. dz. po 10 kropli.

152. *Morphii mur. 0'005,*

Bismut. subnitr. 0'30,

Mfp. dtur. tal. dos. Nr. 10.

S. W razie bólu co 2 godz. proszek.

153. *Tinct. Strychni,*

Tinct. Opii āā. 5'00.

DS. Co godzinę po 10 kropli w razie silnego bólu.

154. *Argenti nitrici 0'10,*

Sacchari et tragacant. āā. q.
s. f. pill. Nr. 10.

S. 2—3 pig. dziennie.

155. *Atropin sulphur. 0'01,*

Solv. in aq. destil.

Extr. et pulv. liquor q. s. f.
pill. Nr. 10.

S. 1—2 pig. dziennie.

Prąd stały z anodą na dołek podsercowy, lub też przerywany na 5—10 minut. Przepłukiwanie żołądka ciepłą wodą na 38—40°.

Cardiopalmus, Hyperkinesis cordis.

Usunięcie przyczyny, najczęściej stan ogólnie nerwowy, osłabiony lub zatrucie kawą, herbata i tytoniem. Leczenie nadto *blednicy*, *niedokrewności* i ogólnego osłabienia zwykłymi środkami. Podczas napadu przy silnej akcji serca, okład lodowy na serce, spokój, wstrzymanie się od wszelkich podniecających napitków, natomiast przy słabym działaniu serca, podać wino, *cognac*, czarną kawę, herbatę, nadto:

156. *Coffein citrici 0'25,*

Dtur. tal. dos. N. 4.

S. W razie napadu 1 proszek.

157. *Sparteini sulph. 0'05,*

Sacchari 0'30,

Mfp. d. tal. dos. N. tres.

S. W napadzie 1—2 pr.

158. *Trae strophanti,*

Trae digital. āā. 5'00.

DS. Podczas napadu 10—15 kropli raz lub dwa dziennie.

159. *Trochisci nitroglyc. 0'001.*

S. W napadzie pół pastylki lub całą zażyć.

Osobom zaś nerwowym:

Kali bromat. 1—2 gram. na raz lub też:

160. *Trae Valerian. aeth. 10'00.*

S. 3 r. dz. po 15—20 kropli.

Podskórne wstrzykiw. morfiny
 $\frac{1}{2}$ —1 etgrm.

Catarrhus intestinorum acutus.

Wskazane jest leżenie w łóżku, ścisła dyeta, okład ciepły na brzuch, i środek przeczyszczający. W razie silnych bólów, leki odurzające; w razie gdyby po kilku wypróżnieniach po środku czyszczącym biegunka nie ustąpiła, przetwory makowca, także leki zawięrające i ścigające.

Cat. intest. chron.

Leczenie powinno być przy czynowe, uważać należy na dyetę, która powinna być lekko strawna, na uregulowanie stolca, unikanie zaziębień (opaska flanelowa na brzuch). Woda Karlsbadzka, w razie obstypacji środki lekko czyszczące, lewatywy codziennie. Vide: (Obstipatio alvi).

161. *Decoet. rad. Salep 200·00,*

Laudani puri 0·05,

Syr. Diacodii 20·00.

MDS. Co godz. łyżkę.

162. *Mixturae gummos. 150·00,*

Trae Opii simpl. gutt. 20.

S. Co godz. łyżkę.

163. *Cotoini puri 1·00,*

Emuls. amygdal. 60·00.

S. Co 1/2 godz. 2 łyżki zażyć.

164. *Extr. Opii 0·02,*

Tannini 0·10,

Naphtalinae 0·25,

Mfp. d. t. d. XII.

DS. 2—3 proszków dziennie.

165. *Pulv. Doveri 1·00,*

Extr. Colombo,

Sacch. albi āā. 2·00,

Mfp. div. in dos. X.

DS. Co 2 godz. proszek zażyć.

C. i. ac. u dzieci.

Dyeta jak przy Dyspepsyi. Bezwarunkowo nie dawać mleka, natomiast woda z białkiem, kawa żołądziowa, zwracać uwagę na prągnięcie, podawać pły-

ny często po łyżeczce np. wodę z rumem, wystać wodę sodową i Spir. aether. zwłaszcza, gdy są oznaki zapadu. Unikać lewatyw. Jeżeli nieżyt k. z niestrawności Calomel (0·03) pepsyna e. ac. mur.

Jeżeli nieżyt przy normalnem trawieniu się pojawi, można z ostrożnością dać Opiata oseskom 1—3 kropli dziennie.

166. *Trae Coto gtts. V.*

Aq. dest. 50·00,

Trae Opii gtts. duas

Syrup 10·00.

DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Ze środków ścigających Trae: Catehu, Kino, Ratanh. (1—2·00: 50·00, Trae Opii gtts. II co godz. łyżeczkę). Bismut Salicyl 0·10 pro dosi w połączeniu z Pulv. Doveri 0·01, Resorcin (0·20: 100·00), Natr. benz. (1·00:100), Thymol (0·15:100·00 Cognaci gtts. 10). Jeżeli upadek sił występuje, ilość moczu się zmniejsza, kończyny zimne, odstawić leki a pobudzać środkami wyskokowemi, eter, (podskórnio 1·00).

Cat. int. cbron.

Dzieciom sztucznie żywionym podawać rozcieńczone mleko kozie, odgotowane i ostudzone (3 łyżki mleka, 2 wody, 1 wody wapiennej) taką porcyę co 2 g. lub połowę co godzina, śmietanę Biederta, starszym rosóły mocne, Cacao, kawę żołądziową, herbatę z liści orzecha. Wzbronić tłuszców, jarzyn. Pokarmy dawać w małej ilości często. W celu zmniejszenia wzdęcia i pobudzenia do lepszego krążenia, okłady Priesnitza.

167. *Fol. Jugland. 100·00,*

Vini burgund. 500·00,

Macera per 48 horas, adde

Syr. splc. 30·00.

S. Co 3 godz. 1—2 łyżeczki.

168. *Chinin tannici* 0'05—0'10,
Pulv. Doveri 0'01—0'02,
Sacchari 0'15.

Mfp. tal. dos. N. 10. S. 3 pr
dziennie.

169. *Bismut. salic.* 0'05—0'10,
Pulv. Doveri 0'02,
Sacchari 0'15,

Mfp. dt. tal. dos. 10.

S. 3 pr. dz.

Przeciw anaemii woda pyro-
phosphoran. żelazista.

170. *Tannin.* 0'20,
Aq. dest. 80'00,
Vini. Tokay. 15'00,
Glycerin. 10'00,

Trae Opii gtt. tres.

S. Co 3 godz. łyżeczkę.

(Miész. Gerhardta).

Starsze dzieci mogą używać
wody Karlsbadzkiej na ciepło
(Sprudel), wina chinowego i
przetworów żelaza.

Catarrhus pharyngis zobacz
Pharyngitis.

Catarrhus ventriculi acut.

Ostry niezbyt żołądka tylko
wtedy nadaje się lekowaniu,
gdy domyślamy się, że w żołądku
jest jeszcze treść, która takowy
wywołała, dawniej stosowano
w takim razie środki wymiotne,
a potem przeczyszczające, dziś
stosowniej robić przepłukanie
żołądka, poczem chory najmniej
24 do 48 godzin musi zachowy-
wać ścisłą dyetę. W razie gdy
przypuszczamy, że treści w żo-
łądku niema, wystarcza ścisła
dyeta, i tylko gdy cierpieniu
temu żołądka towarzyszy ta
sama zmiana w jelitach, wska-
zane są środki przeczyszczające.
Zresztą leczenie jest czysto przy-
padowe, gdy silne bóle w okolicy
żołądka występują, wskazane są
środki odurzające, w razie pra-
gnienia: kwaska, woda sodowa,
giesshübelska etc.

Jako środki wymiotne:

171. *Pulv. rad. Ipecac.* 2'00,
Div. in dos. VI.

DS. Co kwadrans proszek aż
do wystąpienia wymiotów.

172. *Tartari stibiati* 0'05,

Aqu. dest. 50'00.

W 2-ch porcyach w przeciągu
10ciu minut zażyć.

173. *Apomorphini mur.* 0'10.

Aqu. dest. 10'00.

DS. Podskór. $\frac{1}{2}$ —1 strzykaw.

**Catarrhus ventriculi chroni-
cus.**

1. (*Acidus*).

Dyeta pożywna lekko strawna,
z wykluczeniem potraw korzen-
nych, kwaśnych, tłuszczów, ja-
rzyn, napoi wysokowych i CO₂
zawierających. Wewnętrznie
wskazane są środki alkaliczne,
woda Karlsbadzka, przepłuki-
wania żołądka rozeznami soli
alkalicznych, lub wodą Karls-
badzką, w razie silniejszych
bólów w dołku podsercowym
środki odurzające.

Cat. ventr. chronicus 2) (mu-
cosus).

Wskazana jest dyeta lekko
drażniąca, a więc nieco napoj.
wysokowych, kwasków orga-
nicznych, mięso w możliwym
rozdrobieniu, najlepiej wiec
siekanie. Wewnętrznie środki
gorzkie i kwas solny.

Ad. 1.

174. *Sal. therm. Carolin factic.*
100'00.

S. Na czezo łyżeczkę w $\frac{1}{2}$
szklanki ciepłej wody.

175. *Sal. therm. Carolin origi-
nale olla una.*

S. Co dzień na czezo łyżeczkę
w $\frac{1}{2}$ szklanki ciepłej wody
zażyć.

- 176.** *Natri bicarb.* 15'00,
Magn. carbon. 10'00,
Calcar. carbon. 5'00,
MD. in scatula.
 S. 3 razy dnia na koniec noża
 zażyć.

W razie bólów:

- 177.** *Morph. mur.* 0'10,
Aquae laurocer. 10'00,
MD. in vitr. nigro.
 S. W razie bólu 10 kr. zażyć.

Ad. 2.

- 178.** *Trae Amar.*
Acid. hydrochl. dil. āā. 15'00.
 MDS. Po każdym jedzeniu 20
 kropli w łyżce wody zażyć.

- 179.** *Acid. hydrochl* 3'0),
Pepsin solub. german. de Ro-
stock 2'00,
Aqu. dest. 20'00,
Syr. cort. aurant. 15'00.
 MDS. Po każdym jedzeniu 2
 łyżki zażyć.

Catarrhus vesicae.

W przypadkach ostrych, wi-
 nien chory leżeć w łóżku, na
 brzuch stosujemy okłady wysy-
 chające, dyeta ścisła przewaźnie
 mleczna. Napoje wyskokowe na-
 leży zabronić zupełnie, nato-
 miast tylko podawać wodę so-
 dową, bilińską, Giosshübelską,
 Vichy, Kissingen, Rohitsch, or-
 szadę lub odwar siemienia lnia-
 nego.

- 180.** *Det. sem. lini e* 10'00 ad
 200'00,

Syr. simpl. 20'00,
Tet. opii gtts. XX.

S. Jako napój.

W razie znacznych bólów na-
 leży zastosować środki narko-
 tyczne.

- 181** *Extr. Cannab. indic.*
 „ *Hyosciam aa.* 0'40,
Sacch. alb. 5'00,
Mf. Pulv. div. in dos. N. X.
 S. 3—4 proszki dziennie.

- 182.** *Opii puri* 0'20,
Butyr Cacao q. s. f. l. a.
supposit N. X.
 S. 2—3 czopków dziennie.

- 183.** *Morph. mur.* 0'10,
Butyr Cacao q. s. f. l. a.
supposit N. X.
 S. 2—4 czopków dziennie.

- 184.** *Morph. mur.* 1'00,
Glycerin 5'00,
Aqu. dest. 15'00.
 S. Do wstrzykiwań.

W przypadkach przyostrych i
 przewlekłych:

- 185.** *Det. fol. uvae ursi e*
 20'00 ad 200'00,

Natr. bicarb. 3'00,
Syr. simp. 20'00.

S. Co 2 godz. łyżkę.

- 186.** *Arbutin* 5'00,
Div. in dos. N. X.
 S. 3 proszki dziennie.

- 187.** *Natr. salicyl.* 5'00,
Div. in dos. N. X.
 S. 3—4 proszków dziennie.

- 188.** *Salol.*
Sacch. alb. āā. 5'00,
Mfpulv. div. in dos. N. X.
 S. 2—4 proszków dziennie.

- 189.** *Ac. tannic* 0'5—1'0,
Sacch. alb. 4'00,
Mfpulv. div. in dos. N. X.
 S. 2—4 proszków dziennie.

Jeżeli mocz alkaliczny lub
 obojętny:

- 190.** *Ac. benzoic.* 3'00,
Aqu. dest. 150'00.
 S. Po zakluceniu na 2 razy
 wypić.

- 191.** *Ac. muriat* 0'50,
Aqu. dest. 100'00.
 S. 3 razy dnia po łyżce.

- 192.** *Ac. benzoic* 0'30,
Eleosach. foeniculi 5'00,
Mfp. div. in dos. N. X.
 S. 3—6 proszków dziennie.

- 193.** *Ac. phosphor.* 5'00,
Syr. rub. idei 50'00.
 S. łyżkę do szklanki wody.

W przypadkach uporeczywych przestrzykiwania pęcherza letnimi rozczyznami:

- 194.** *Ac. boric. 30'00,*
Aqu. dest. 1000'00.
S. S. n.
- 195.** *Ac. carbol. 5'00,*
Aqu. dest. 1000'00.
S. S. n.
- 196.** *Resorcín 10'00,*
Aqu. dest. 1000'00.
S. S. n.
- 197.** *Argent. nitr. 0'5—2'00,*
Aqu. dest. 1000'00.
S. S. n.
- 198.** *Acid. salicyl. 3'00,*
Aqu. dest. 1000'00.
S. S. n.

- 199.** *Ac. boric. 30'00,*
Iodoform 10'00,
Aqu. dest. 1000'00.
S. Przed wstrzyknięciem za-
kłuć.

- 200.** *Zinc. sulph. 0'5—1'5,*
Aqu. dest. 1000'00.
S. S. n.

W przypadkach nader uporeczywych i opierających się wszystkim podanym dotąd środkom, należy przystąpić do drenowania pęcherza przez wykonanie urethrotomii zewnętrznej. W razie zatrzymania lub niepełnego wydalania moczu wypada założyć cewnik.

Chalazeon.

Nożykiem kończystym przeciąć od wewnątrz tj. od spojówki w kierunku prostopadłym do wolnego brzegu powieki, następnie treść, palcami dokładnie wycisnąć. Ściśła antyseptyka. Należy więc wypłukać worek spojówkowy przedtem kwasem borowym lub sublimatem.

- 201.** *Acidi borici 6'00,*
Aqu. dest. ferv. 200'00.
DS. Woda borowa do oka.

- 202.** *Sublimati corrosivi 0'02,*
Aqu. dest. 100'00.

DS. Woda oczna Sublimatowa.

Hordeolum. Ciepłe wilgotne okłady (n. p. z bułki maczanej w mleku) a następnie incisia i wypuszczenie ropy. W celu zapobiegnięcia recydywom smarowanie na noc w brzeg powiekowy wolny, następującej maści:

- 203.** *Praecip. flavi 0'20,*
Vasel. fl. 4'00.

DS. Maść na powieki na noc.

- 204.** *Praecip. albi 0'2',*
Vasel. fl. 4'00.

DS. Maść na powieki na noc.

Chlorosis.

Przedewszystkiem usunięcie istniejącej przyczyny bładażki. Pożywienie powinno być b. po-silne, ale łatwo trawiące się. Świeże powietrze, mierny ale systematyczny ruch. Należyte wysypianie się, nieprzeciążanie chorych ani fizyczną ani umysłową pracą. Szczególną mieć uwagę na zaburzenia żołądkowe i jeżeli takowe istnieją, przede-wszystkiem starać się usunąć.

- 205.** *Tinct. malat. ferri,*
" Chin. comp. āā. 25'00,
DS. 2—3 łyżeczki na dzień.

- 206.** *Ferri sulfur. pur.*
Kalii carbon. āā. 15'00,
Gi. Tragacanth. q. s. ut. f.
pill. N. 120.

Consp. pulv. cinam.
DS. 3 r. na dzień 2—5 pig.
(Blauda pigułki).

- 207.** *Ferri sulfur. sicc. 6'00,*
Kali carbon. sic. 5'00,
P. althaeae 3'00,
Mel. crud. q. s. ut. f. pil.
N. 120.

DS. 3 r. na dzień po 2 pig.
(Pigułki Valetti).

208. *Ferri carbon. sacch.*
Sacch. albi,
Natri bicarb. āā. 3'00,
Myrrh. pulv.
Pulv. rad. rhei āā. 2'00,
Mfp. D. ad Scatul.
 S. 2—3 r. na dzień na koniec
 noża.

209. *Ferri oxydati sacch. 10'00,*
Pulv. rad. Gent. 5'00,
Extr. Gent. q. s. ut. f. pil.
N. 100.

S. 3 r. po 2 pigułek następnie
 3—4 do 10.

210. *Ferri reducti 10'00,*
Magn. carbon.
Succ. liquir. āā. 4'00,
Glyc. q. s. ut. f. pil.
N. 100.

S. 3 r. po 2—4 pig. dziennie
 po jedzeniu.

211. *Ferri lactici,*
Sacch. albi,
Eleosacch. cinam n. āā. 0'20,
Mfp. D. tal. dos. N. XX. in
charta cerata.

S. 3 proszki dz. po jedzeniu.

212. *Pyrophosph. ferri et sodae,*
Sacch. albi āā. 0'20,
Mfp. D. tal. dos. N. XX.

S. 3—4 proszki na dzień.

213. *Liqu. ferri album. 50'00.*
 DS. 3 r. po łyżeczce od kawy.

214. *Chinini ferro-citrici 1'00,*
solve in
Vin. malagens. 200'00.

DS. 3—4 łyżek dziennie.

Obok tego przetwory arseni-
 kalne jak Sol. Fovlera, woda
 Levico, Roncegno 2—3 łyżeczki
 na dzień, następnie i 2—3 łyżek.
 Wody żelaziste, Żegiestów, Kry-
 nica, Elster, Francensbad i t. p.

Cholelithiasis.

Leczenie 1mo samej choroby,
 2do napadu kolki wątrobowej.

Ad. 1. Uregulowanie diety,
 ścisła uwaga na oddawanie stol-

ca, z diety wykluczyć należy
 przedewszystkiem tłuszcze i
 kwasy, oraz napoje wysokokowe.
 Prócz tego środki rozpuszczające
 złogi żółciowe, a tu należą wody
 mineralne (Karlsbad, Ems, Vi-
 chy etc.) i środek Duranda.

Ad. 2. Podczas napadu okład
 ciepły na okolicę wątroby, pod-
 skórne wstrzykiwania środków
 odurzających.

215. *Aether. sulph. 15'00,*
Ol. Terebinth. rectific. 10'00.
 DS. 3 r. dnia po 15—20 kropel.
 (Środek Duranda).

216. *Morph. mur. 0'10,*
Aqu. dest.
Glycerini āā. 5'00.
 MDS. Do podskórnych wstrzy-
 kiwań, w jednej strzykawce
 0·01 morfiny.

217. *Natri salicyl. 0'50,*
Extr. bellad. 0'01,
Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.
 S. 4 proszki dziennie w wo-
 dzie sodowej.

Cholera.

W pierwszym okresie choroby
 wskazane są środki przeczysz-
 czające, a z tych przedewszyst-
 kiem Calomel, który ma też
 mieć znaczenie antiseptyczne
 dla treści jelitowej. Po kilku
 obfitych wypróżnieniach, wywo-
 łanych środkami czyszczącym,
 należy podawać przetwory ma-
 kowca. Zresztą leczenie przy-
 padowe, przeciw wymiotom ka-
 wałki lodu do polykania, coca-
 ina. W razie zapadu, środki
 podniecające — obok tego należy
 ze względów zapobiegawczych,
 zwracać baczną uwagę na desin-
 fekcyonowanie stolców i wymio-
 cin chorych, cholera dotkniętych.

218. *Tinct. opii croc. 6'00,*
Vini ipecac. 4'0,
Trae Valerian. aeth. 12'00,
Ol. menthae pip. 1'00.
 DS. 15 kr. w herbacie z mięty.

219. *Camphor.* 1'00,
Aether. acet. 15'00,
Trae opii 3'00.

DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. 10 kropli.

Cholera infantum.

Zapobieganie: w lecie przestrzegać czystości i świeżości mleka; nie odłączać dzieci w lecie (czerwiec, lipiec, sierpień).

W chwili wybuchu choroby; przedewszystkiem nie dawać żadnego pokarmu, nawet piersi, aż do ustąpienia wymiotów. Natomiast: chłodną wodę, źródłaną lub sodową, z kilku kroplami Cognacu często (co 10 minut) po łyżeczce. Wino, nie zawsze dzieci dobrze znoszą.

220. *Liquor ammon. anis.*

Spir. aetheris aa. 7'00.

MDS. Co $\frac{1}{2}$ godz. 3—5 kropel (w wodzie ocukrzonej).

221. *Cognaci* 10'00,

Aqu. dest. 180'00,

Syrup sacch. 10'00.

MDS. Co $\frac{1}{2}$ godz. łyżeczkę.

Czarna kawa, herbata z rumem lub cognakiem, szampan co $\frac{1}{2}$ godz. łyżeczkę, pigułki lodowe. Jeżeli niebezpieczeństwo groźne i objawy zapadu występują: kąpiel z gorczycą (50-60 maki gorczycowej do woreczka, wycisnąć w kąpeli), silne nacieranie, dopóki się skóra nie zaczerwieni, później wytarcie i ogrzana pościel. Kąpiel powtórzyć, gdy dziecko zaczyna na nowo stygnąć. Dalej podskórne wstrzykiwania eteru (1—2 strzykawek na 12 godzin).

222. *Flores benzoës* 0'50,

Spir. aetheris,

Trae aromat aa. 5'00.

DS. Co godz. 3—5 kropli.

223. *Acidi benzoici* 1'00,

Camphor. 0'30,

Spir. aether.

Aqu. dest. aa. 5'00.

MDS. $\frac{1}{2}$ strzyk. na raz.

Jeżeli choroba powstała w dalszym ciągu niestrawności, nieżyty kiszek, wówczas podawać leki ściągające, opium, kreozot.

224. *Calomel.* 0'005—0'01,

Sacchari 0'20,

Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.

S. Rano i wieczór proszek.

225. *Trae ratanhae* 1'00,

Aq. dest. 50'00,

Spir. aether. gtts. X.

Kreosoti gttam unam.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

Gdy zaś przyczyną choroby jest nagromadzenie fermentów i choroba wśród zupełnego zdrowia wybuchła, natenczas stosować:

226. *Creosoti gtts. duas*

Aquae cinamoni 90'00.

DS. Co 3 godz. łyżeczkę.

227. *Natri benzoici* 5'00,

Aqu. dest. 90'00,

Syrup. simpl. 10'00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

228. *Resorcini* 0'10,

Infus. chamomill. 60'00,

Trae opii gtts. duas.

Syrup. simpl. 10'00,

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Gdy po usunięciu groźnych objawów, pozostanie biegunka, powoli wracać do pokarmów. Zob. *Catarrhus intestin.*

Chorda.

1) Dyeta mleczna. 2) Uregulowanie stolca. 3) Zimne okłady i kąpiele systematycznie przeprowadzane, gdyż chwilowo użyte, działają raczej rozdrażniająco: *Antiphrodisiaca*:

229. *Camphor. rasae* 0'20,

Mixt. gummosae 100'00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

230. *Lupulini puri* 0'10,

Sacchari 0'30,

Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.

DS. 3 proszki dziennie.

231. *Lupulini puri* 0·10,
Camphôr. rasae 0·01,
Extr. Lupuli q. s. ut. f. pill.
dtr. tal. dos. N. XII.
 DS. 6 pigulek dziennie.

232. *Lupulini puri* 0·10,
Morph. mur. 0·005,
Sacchari albi 0·30.
Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.
 DS. 3 proszki dziennie.

233. *Natri bromati* 1·00—1·50,
Camphorae rasae,
Lupulini $\bar{a}\bar{a}$. 0·10,
Mfp. dtr. tal. dos. N. 10.
 DS. Rano i wieczór proszek.

234. *Antipyrini* 0·50,
Dtr. tal. dos. N. VI.
 DS. 3 proszki dziennie.

Gdy to wszystko bezskuteczne,
 dajemy iniekcye morfinowe
 (0·01—0·02 pro dosi) lub:

235. *Chloral hydrati* 5·00,
Aqu. dest. 100·00,
Syrup cort. aurant. 10·00.
 MDS. Łyżkę stołową na noc.

Chorea minor.

Dobre odżywianie, pobyt na świeżem powietrzu, gimnastyka lecznicza, chociaż w cięższych przypadkach w samym początku, lepiej dzieci trzymać w łóżku. Zabronić nauki, dozwolnić dużo spać. Jeżeli na tle niedokrewności, błędnicy, reumatyzmu: podawać przetwory chininy i żelaza, w ostatnim przypadku, przetwory Salicylu. Kąpiele letnie (24—26°) prąd stały. Rozpylanie eteru na kręgosłup. W cięższych przypadkach, w celu uspokojenia można podawać chloral, Urethan, Sulfonal, aby wywołać dłuższy sen.

236. *Solut. arsen. Fovleri,*
Trae ferri pómati $\bar{a}\bar{a}$. 5·00.
 DS. 3 r. dnia po 2—3 kropli po jedzeniu. Można postąpić do 5ciu kropli.

237. *Chloral. hydrat.* 4·00,
Natri bromati 2·00,
Aqu. dest.
Syr. aurant. $\bar{a}\bar{a}$. 25·00.
 MDS. 3 r. dz. łyżeczkę.

238. *Natri bromati* 0·20,
Chinini ferrocitrici 0·10,
Sacch. 0·20,
Mfp. Dtr. tal. dos. N. XV.
 DS. 3 pr. dziennie.

239. *Sulfonali* 0·25—0·50,
Dtur. tal. dos. N. V.
 S. Na noc proszek.

Prócz tych środków, zachwalano w ostatnich czasach antipyrinę po 2—3 gramów dziennie (0·50 pro dosi) nie widziałem jednak nigdy skutku.

240. *Propylamini* 1·00,
Aqu. menth. pip. 50·00,
Syrup simpl. 20·00.
 MDS. 3 r. dz. łyżeczkę.
 (Przez 3—4 dni).

241. *Exalgin* 1·00,
Solve in spir. menth. pip.
 5·00.

Aquae tiliae 120·00,
Syrup aurant. 30·00.
 MDS. 3 r. dz. łyżeczkę.

Chorioiditis.

1. *Exudativa plastica:*

Ciemny pokój, lub konserwy dymne, zaniechanie pracy na dłuższy czas, środki czyszczące (sól morszyska, Hunyady), systematycznie przeprowadzone weierania Unguenti cinerei po 2—3·0. Następowo Natrum vel kalium jodatum interne, przez 6—8 tygodni; w razie mętów ciała szklannego, iniekcye podskórne pilocarpini.

242. *Ung. hydrarg. cin.* 30·00,
Div. in part. aequ. N. X.
 DS. Jedną paczkę na raz użyć do weierañ.

Przyczem koniecznem jest płukanie ust rozczyнем:

243. Kali chlorici 10·00,*Dent. tal. dos. N. X.*

DS. Jedną paczkę rozpuścić w $\frac{1}{2}$ litra gorącej wody, a po wystygnięciu całą ilość wypłukać w jednej dobie.

W razie ślinotoku i obrzmienia dziąseł, delikatne pędzlowanie tychże:

244. Tinct. Gallarum 15·00.

DS. 2 r. dz. pędzl. dziąsła.

245. Natri iodati 8·00,*Aqu. dest. 200·00,**D. in vitr. nigro.*

DS. Rano i wiecz. łyżkę stoł.

246. Pilocarpini mur. 0·20,*Aqu. dest. 10·00.*

MDS. Do wstrzykiwań podskórnych.

Rozpoczynać od $\frac{1}{4}$ strzykawki = 0·005 i powoli dojść do pełnej = 0·02, jeżeli chory dobrze poprzednie dawki znosił.

2. Chorioiditis serosa:

Bardzo podobna w swych objawach klinicznych do jaskry zapalnej: leczenie zob. jaskrę.

3. *Chorioiditis suppurativa* leczenie zob. panophthalmitis.

Cirrhosis hepatis.

Leczenie polega na podawaniu środków lekko czyszczących, najlepiej solnych, uregulowanie diety, z której napoje wysokowe wykluczyć należy. Skutecznym bywa przeprowadzenie kuracyi karlsbadzkiej lub marynbadzkiej.

Przeciw nagromadzeniu się płynu w jamie brzusznej, środki moczopędne, gdy te nie są dostateczne i w obec *indicatio vitalis*, nakłóćie powłok brzusznych i wypuszczenie płynu.

Jako moczopędne:

247. Calomelanos 0·10,*Sacch. albi 0·30,**Mfp. Dtur tal. dos. N. XV.*

DS. 5 proszków dziennie.

(Przyczem jednak należy zwrócić baczną uwagę na dziąsła).

248. Theobromini natrosalicyl. 0·50,*D. tal. dos. N. XV.*

DS. 5 proszków dziennie.

249. Inf. fol. Digit. 1·00:200·00,*Liqu. Kali acet. 20·00,**Trae cort. aurant. 25·00.*

MDS. Co godz. łyżkę.

250. Inf. Juniperi 15·00:200·00,*Syr. simpl. 15·00.*

DS. Co godz. łyżkę.

Colica flatulenta.

Uwzględnić powody: niestrawność, nieżyt żołądka, zaburzenia nerwowe, hysteria, zaziębienie, zapalenie błony brzusznej, i t. d. i według tychże, stosować leczenie.

Ciepłe okłady na brzuch, masowanie brzucha, mięta pieprzowa, rumianek, herbata gorąca, *Trae laudani* 5—10 kropli co parę godzin, wstrzyknięcie morfiny, środki przeczyszcz., lewatywy.

251. Aq. chloroform. saturatae,*Aqu. Tiliae āā. 50·00.*

MDS. Co godz. łyżkę.

252. Chloroform 1·50,*Trae Valerian. aeth. 10·00,**Morphii mur. 0·05.*

MDS. Co godz. 10 kropli.

253. Ol. chamomill. gtt. 5,*Aetheris 5·00,**Trae chamomill. 20·00.*

MDS. Co godz. 10 kropli.

U dzieci w pierwszych tygodniach życia, zazwyczaj z powodu niestrawności, u starszych z nieżyty kiszki, zatrzymania stolca, na tle zimnicy, hysterii, czerwliwości (*Helminthiasis*).

W pierwszym przypadku uregulować karmienie, nieuspokajając dziecka pokarmem.

W napadzie wilgotne ciepłe okłady na brzuch, smarować ciepłą oliwą, lub maściami aro-

matycznymi. Wprowadzić do kiszki stolcowej trestkę od lewatywy lub kateter (powyżej sphincter internus). Lewatywy z ciepłej wody z oliwą. Rumianek lub herbata z mięty, łyżeczkami. Starszym dzieciom przykładać płatki nakrapiane rumem, synapizma.

254. *Calomel.* 0'01—0'03,
Sacchari 0'20,
Mfp. dtur. tal. dos. N. V.
S. Co godz. proszek.

255. *Natri benzoici* 0'20,
Aqu. dest.
Aqu. foenicul. āā. 30'00,
Trae laudani gtt. duas.
Syrup simpl. 15'00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

256. *Chloral. hydrat v. Urethan*
0'50,
Aqu. dest. 80'00,
Mucilag. gum. arab. 20'00.

MDS. Na 2 lewatywy.

(W razie długotrwałych boleści lub wystąpienia drgawek).

257. *Trae bellad. gtt. X.*
Aq. lauroc. 10'00.

MDS. 10—20 kropli co godz.
(Na tle nerwowem).

Coica saturnina zob. zatrucie ołowiem.

Combustio.

W lekkich oparzeniach, posypywać pudrem, okłady z wody Goularda, Liquor Burowi, zanurzenie w mydlinach. Ból uśmierza się tryskaniem wody selterskiej z syfona, pędzlowaniem 2% roztworem Cocainy.

Przy oparzeniach drugiego stopnia, przekłuć pęcherze, okłady:

258. *Aq. calcis.*
Ol. lini āā. 50'00.
S. Przykładać na szmatkach.

259. *Jodoformii* 5'00,
Vaselini,
Lanolini āā. 25'00.
Mf. unguentum.

DS. Nałożyć maści na grubość noża i okryć papierem gumowym. Codziennie opatrunek zmieniać.

260. *Aristoli* 3'00,
Ol. olivar. 20'00,
Lanolini q. s. ad 100'00.
S. Maść.

Oparzenia trzeciego stopnia, wynagają uwagi na swobodny odpływ ropy. Opatrunek jodoformowy.

Rozległe oparzenia łagodzi się stałą kąpielą 25—30° R. ciepłą wodę zmienia się 2—3 razy dziennie.

Jeżeli po odpadnięciu strupa, ziarnina wybujała, lapisować, lub dać 1% maść lapisową, a w celu usunięcia bólu, zapędzlować poprzednio Cocainę.

Na rany dobrą ziarniną pokryte stósować maści:

261. *Acidi borici,*
Cerae albae āā. 10'00,
Parafini
Ol. amygd. dulc. āā. 20'00.

262. *Acidi carbol.* 1'00,
Ol. olivar. 25'00,
Cretae alb. q. s. ut f. pasta mollis.

W razie upadku sił przy rozległych oparzeniach: wino, Liquor ammon. anis. 5—10 kropli, wstrzyknięcie eteru.

Comedones.

Wyciskać palcami lub zapomocą kluczyka od zegarka. W razie zadrażnienia skóry, okłady z wody zimnej lub ołwiowej, zmywać środkami alkalicznymi, np. Spir. sapo Kalin, smarowanie przetworami siarki. Pomimo zadrażnienia skóry, nie należy pudru używać, gdyż łątwo tworzą się nowe.

263. *Natri carbonici* 5'00,
Aqu. rosar. 100'00,
Glycerin 50'00,
Extr. mill. flor. gtt. 10.

DS. Do zmywania twarzy.

264. *Kali carbonici* 10'00,
Aqu. dest. 100'00,
Ol. aeth. cinam. gtt. duas.
Ol. aeth. rosar. gtt. unam.

S. Do zmywania twarzy.

Commotio cerebri.

Spokój, zimne okłady na głowę. W razie bezprzytomności, skrapiania wodą, nacierania, synapizmy, lewatywy z octem. Później środki przeczyszczające. W razie zatrzymania moczu, odprowadzić cewnikiem. Dalsze leczenie według objawów.

Condylomata acuminata.

Najpewniejszym środkiem jest usunięcie drogą operacyjną. Kłykciny szypułkowe odcina się krzywymi nożyczkami, bezszypułkowe wyskrobuje się ostrą łyżeczką.

Krwotok ztąd powstały mniejszy, tamuje się przyżeganiem laseczką azotanu srebrowego, osuszywszy poprzednio z krwi watą Bruns'a, krwotok większy, tamuje się Pacquelinem. Inne sposoby następujące:

265. *Acid. nitr. fumantis* 10'00.

DS. Zwilżać kłykciny zapomocą pręcika drewnianego.

266. *Acid. bichloroaceticum* 10'00.

DS. ut. supra.

267. *Ferri sesquichlorati soluti*
 20'00.

DS. Do pędzlowania.

268. *Pulv. frondum Sabinæ,*
Aluminis usti,
Cupr. sulph. sublt. pulv.
 āā. 5'00.

Mfp. Do zasypywania.

269. *Resorcini* 5'00—10'00,
 (20—40‰).

Glycerini,
Vasellini flavi āā. 12'50.

Mf. Pasta. S. Raz dziennie smarować.

Condylomata subcutanea.

1. Wygniecenie przy pomocy paznokci palców wielkich.

2. Wyskrobanie ostrą łyżeczką i przyłożenie waty Bruns'a na miejsca krwawiące.

3. W razie większej liczby obok siebie gęsto ułożonych kłykcin, okład z mydła szarego.

Congelatio.

W świeżych przypadkach nacieranie śniegiem lub zimną wodą, dopóki odmrożona część ciała, do właściwej ciepłoty nie wróci. Przestrzegać wprowadzenia do miejsc ogrzanych. Podać napoje wysokokowe. Pęcherze otworzyć i przyżegać lapissem lub opatrzyć:

270. *Argenti nitrici* 0'30,

Lanolini,
Vaselin āā. 15'00.

S. Maść do opatrunku.

Jeżeli tkanka skóry obumarła, opatrunek jodoformowy, maść borowa, okłady z wody Goularda lub:

271. *Alum. crudi* 1'00,

Plumb. acet. bas. sol. 5'00,
Aqu. dest. 100'00.

DS. Do okładów.

Odmroziny zob. Perniones.

Conjunctivitis blennorrhoeica acuta (gonorrhoeica).

Groźne cierpienie, niebezpieczeństwo zniszczenia rogówki wielkie. Przedewszystkiem zabezpieczyć dotąd zdrowe oko, przez następujący opatrunek. Zapomocą 4 mm. szerokich paszków kitajki angielskiej lub Empl.

animale, zalepić szczelnie szparę powiekową, łącząc górną powiekę z dolną, pionowo przylepianymi szczelnie do siebie przystającymi paskami. Następnie zagłębienia oczodołu szczególnie okolice woreczka łzowego wysłać watą Bruns'a, całość zaś pokryć odpowiednio dużym owalnym kawałkiem płótna, który przylepia się na około za pomocą colodionu do brzegów oczodołu i powleczonej grubą warstwą tegoż, daje pewną osłonę przed dostaniem się wydzieliny z chorego do zdrowego oka. Opatrunek ten należy co dzień zmieniać.

Dopóki jest I-szy okres infiltracji (powieki silnie obrzmiałe, przy dotknięciu twarde, skóra na tychże, ścina, napięta, połyskująca, wydzielina ze szpary powiekowej skąpa, brudnowodnista, spojówka szarawo czerwono naciekła) jedynie silne przepłukiwanie (co $\frac{1}{2}$ godz.) worka spojówkowego, roztworem sublimatu lub boru, ciągle okłady lodowe na oko, pijawki 4—5 na skroni i purgantia są wskazane obok leżenia w łóżku i zaciemnionego pokoju.

W okresie II-gim (barwa skóry powiekowej żywsza, napięcie tejże ustąpiło miejsca licznym fałdom w tejże, spojówka więcej soczysta i czerwona, wydzielina obfita ropna), natenczas wolno dopiero przejść do tuszowania spojówki 2—3% roztworem lapisu; raz na dobę wystarczy, powtórzyć wcześniej nie wolno, aż strup z poprzedniego lapisu w zupełności oddalił się. Przytem dalsze częste przemywanie borem lub sublimatem. Lodowe okłady głównie przez 2 godziny po kauteryzowaniu. Leczenie to stosować do zupełnego wyleczenia. W razie zajęcia rogówki 1% atropin. (zob. Iritis) 2 razy dziennie obok

powyższego leczenia, skrupulatne obmywanie rąk lekarza w 5% karbolu.

272. *Argenti nitr. cryst. 1'50,*
Aqu. dest. 50'00.

DS. Lapis 3% do rąk lekarza.
Pędzelek.

273. *Acidi carbol. cryst. 10'00,*
Aqu. dest. 200'00.

MDS. Karbol 5% do mycia rąk lekarza.

Conjunctivitis blennorrhoeica neonatorum.

Tuszowanie energiczne 2—2 $\frac{1}{2}$ % roztworem Argenti nitrici, spojówek powiekowych raz dziennie, następnie przez 2 godziny okłady lodowe na oczy i częste (co $\frac{1}{2}$ godz.) przepłukiwanie worka spojówkowego 3% roztworem kwasu borowego.

Skrupulatne oddalenie ropy.

Zapobiegawczo należy przed samym porodem przepłukać pochwę rodzącej kw. borowym, dziecku zaraz po urodzeniu zapuścić po jednej kropli 1% roztworem lapisu do obu oczu i nie obmywać powiek wodą w kąpieli, lecz szmatką zmaczaną w wodzie borowej.

Conjunctivitis blennorrhoeica chronica.

Leczenie stosować w zupełności według wskazówek przy: *Coniunctivitis trachomatosa.*

Conjunctivitis catarrhalis.

W przypadkach lżejszych podostrych i chronicznych, zapuszczanie 3 razy dziennie Collyrium przez 4—5 tygodni, zmieniając toż po 2 tygodniach na inne, oko bowiem łatwo przyzwyczaja się i lekarstwo działać przestaje. W przypadkach ostrych i silniejszych chronicznych: tuszowanie spojówki powiekowej przez kilkanaście dni roztworem

1% lapisu, a potem Collyrium. Obmywanie powiek ciepłą wodą rano i wieczór, unikanie kurzu, dymu, silnego gorąca, zakazanie pracy wieczornej, regularny tryb życia, przebywanie na świeżym powietrzu. Wrzód rogówkowy kataralny nie przeciwskażuje użycia lapisu.

274. *Acidi borici* 1:50,

Aqu. dest. 50:00,

Zinci sulphur. 0:20.

MDS. 3 razy dziennie zapuszczać na dolną powiekę 2 krople.

Zakraplacz.

275. *Argenti nitr. cryst.* 0:25,

Aqu. dest. 25:00,

D. in v. n.

DS. Lapis 1% do rąk lekarza.

Pędzelek

276. *Sublimati corrosivi* 0:01,

Aqu. dest. 50:00,

Trac. Opii crocat. gtts 3.

MDS. 3 r. dz. zapuszczać.

277. *Collyri adstr. lutei,*

Aqu. dest. āā. 15:00,

D. in v. n.

S. 3 r. dz. zapuszczać.

Conjunctivitis crouposa.

Przebieg zazwyczaj lekki, komplikacje rogówkowe rzadko występują, przepłukiwanie worka spojówkowego kilka razy dziennie kwasem borowym; w razie silniejszego obrzmienia powiek zimne okłady, po oddzieleniu się błon, zapuszczanie Collyrium z kw. borowego i cynku (zob. Conj. catarrhalis).

278. *Acidi borici* 6:00,

Aq. dest. 200:00.

DS Woda oczna.

Zakraplacz.

Conjunctivitis diphtheritica.

Najważniejsze cierpienie oczne, niszczące zwykle zajęte oko. U nas bardzo rzadkie. Zwykle równocześnie z dyfteryą gardła.

Szczelne zamknięcie odpowiednią opaską oka zdrowego (vide Conjunct. blennorrhoeica); przemywanie częste oka chorego roztworem sublimatu lub kwasu borowego, zasypywanie jodoformem i smarowanie powiek wazeliną, kilka godzin dziennie lodowe okłady i zapuszczanie 3 razy dziennie atropinu (zob. Iritis).

Skoro błona śluzowa z nacieków dyfterytycznych się uwolni ostrożne tuszowanie 1% lapisem raz dziennie. Liczne blizny spojówkowe wymagają po ustąpieniu choroby, następowego leczenia.

279. *Jodoformii subtiliss. pulv.*

10:00.

DS. Proszek oczny.

Pędzelek.

280. *Argenti nitr. cryst.* 0:25,

Aqu. dest. 25:00,

D. in v. n.

DS. Do pedzlowania ócz do rąk lekarza.

Pędzelek.

281. *Sublimati corrosivi* 0:02,

Aqu. dest. 100:00.

DS. Woda oczna sublimatowa.

282. *Acidi borici* 9:00,

Aqu. dest. ferv 300:00.

DS. Woda oczna borowa.

Zakraplacz.

283. *Vaselinæ flavæ* 15:00.

DS. Maść do smarow. powiek.

Conjunctivitis follicularis.

Na pierwszy rzut oka podobna do jaglicy, różni się jednak swą lokalizacją; usadowienie bowiem follikulów, znajduje się przeważnie w dolnym załamku spojówki dolnej powieki, jaglicy zaś głównie na powiece górnej.

Leczenie miejscowe w lżejszych przypadkach polega na zapuszczaniu do worka spojówkowego 3 razy dziennie Colly-

rium plumbi acetici, w cięższych przypadkach, tuszowanie silniejszszym roztworem powyższego środka. Kuracja 5—6 tygodni.

Podstawa żółzowa wymaga również uwzględnienia (zobacz *Conjunct. phlyctenulosa*).

284. *Plumbi acet. basici perf. neutr. 0.25,*
Aqu. dest. 25.00,
Filtra exactissime.

DS. 3 r. dz. po 3 krople do obu ocz zapuszczać.

(Lekarstwo ma być przeźroczyste jak woda i silnie zatykane. Po tygodniu świeże powtórzyć).

285. *Plumbi acet. basici perf. neutri 0.50,*
Aqu. dest. 25.00.

DS. Do pędzlowania ocz, do rąk lekarza.

Pędzelek.

(Po zalapianiu należy dokładnie spłukać lekarstwo ze spojówki wodą).

Conjunctivitis scrophulosa (pustulosa).

W przypadkach zwykłych, zasypywanie raz dziennie w małej ilości (lepiej zamało niż za dużo) kalomelu, lub wprowadzanie maści z hydrarg. praecip. fl. v. album. (zob. *hordeolum*) pędzlem do worka spojówkowego z następowym massowaniem palcem przez powiekę, dotąd, dopóki spojówka powiekowa nie utraci chorobowego przekrwienia (zaczzerwienienia).

W razie komplikacji z katarrem, (silne zalepianie się powiek rano, liczne nitki śluzowe w załamku dolnym, rozpulchnienie spojówki widoczne), lapisowanie 10% roztworem lapisu raz dziennie, a później dopiero Calomel. W razie komplikacji ze strony rogówki należy ostrożnie zasypywać calomel, jeżeli jednak

oko zaczerwienia się silniej, lub też phlyctena dotąd szarawa, przybiera zabarwienie więcej żółtawe lub też powiększa się, zaniechać natychmiast dalszego zasypywania i leczyć dalej, jak zwykły wrzód rogówki (zobacz *Keratitis suppurativa*).

Po zabliznieniu wrzodu rogówkowego przejść do kalomelu.

Keratitis phlyctenulosa maligna, wymaga również powyższego leczenia.

Przytem nie zaniedbać leczenia przeciwżółzowego: Dużo świeżego powietrza, unikanie wilgotnego, dusznego, ciemnego mieszkania, dobre odżywianie (mleko, mięso, jaja, mało mącznych pokarmów, pedantyczna czystość ciała i głowy, hartowanie racjonalne dziecka, zimne zmywanie wodą, gimnastyka). W porze zimowej tran rybi wewnętrznie, w lecie wysyłanie do zakładów kąpielowych (Rabka, Rymanów, Iwonicz).

Podczas używania wody zawierającej jod, środków rtęciowych używać nie można. Również dopóki zapalenie ocz nie jest usuniętem, kąpiele pełne, wstrzymać należy na razie. W razie światłowstrętu zobacz *Blepharospasmus*.

286. *Calomel. v. h. p. et subt. pulv. 6.00.*

DS. Proszek oczny do rąk lekarza.

Pędzelek.

Conjunctivitis trachomatosa (aegyptica, Trachoma).

Choroba bardzo u nas częsta, szczególnie między ludnością żydowską i klas ubogich, wymaga wiele cierpliwości tak ze strony lekarza, jak i chorego do zupełnego wyleczenia. Występuje głównie w formie ostrej i chronicznej.

Ostra forma wymaga codziennego tuszowania spojówek powiekowych 2^o/₁₀ rozcynem lapisu; skoro zaś objawy zapalne (obrzimienie powiek, znaczna wydzielina, silne zaczerwienienie i obrzimienie spojówek) w znacznej części ustąpią, przejść należy do tuszowania codziennego cum cupro sulphurico in substantia. Siny kamyk powinien być należycie wygładzonym.

Chroniczna forma wymaga od początku tuszowania sinym kamieniem, chyba że nadmierna sekrecya śluzu czasowo lapisu wymaga.

Obok powyższego leczenia, należy choremu przepisać sublimat 1:5000-00 aby kilka razy dziennie zapuszczał po kilka kropel do worka spojówkowego. W razie wrzodów rogówkowych, lepiej jest tuszować lapisem, a po zabliznieniu się tychże Cuprum sulphuricum.

Pannus nie wpływa zupełnie na wybór lapisu lub cuprum, decyduje tylko w tej mierze wyż przytoczona okoliczność.

Skrupulatna czystość oczu, unikanie wpływów szkodliwych (zob. Conj. catarrh.) objaśnienie chorego, że choroba łatwo innym udzielić się może; powinien więc mieć osobny ręcznik i pościel do spania.

W razie zajęcia tylko jednego oka, baczna uwaga, aby na drugie choroby nie przenieść. Kuracya trwa czasem rok i dłużej.

Po zupełnem usunięciu objawów chorobowych, przepisać rozczyn Cuprum sulph. do domu i przedstawianie się lekarzowi raz na miesiąc przez czas dłuższy.

287. *Argenti nitrici cryst. 0.50.*

Aqu. dest. 25.00.

S. Lapis 2^o/₁₀ do rąk lekarza.

Pędzelek.

288. *Cupri sulph. 1.00,*
Glycerini 15.00.

S. Raz dziennie zapuszczać po 2 krople do oka chorego.
Zakraplacz.

Contusio.

W pierwszych dniach po udzieniu, zimne okłady (worek z lodem) i spokój; potem należy część chorą masować a po dokonaniem masowaniu najlepiej owinąć bandażem fanelowym.

Convulsiones vide Eclampsia.

Coxitis.

W początkach cierpienia należy zalecić absolutny spokój: pacjent powinien leżeć bez przerwy na wznak na twardym materacu. W okresach późniejszych choroby, w których występuje skłonność do patognomicznego ustawienia kończyny, wypada założyć opatrunek naciągający z przylepca. Jak długo sprawa zapalna trwa, nie wolno na kończynę chorą następować; jeżeli się tedy pozwoli choremu chodzić, to tylko o kulach z podwyższonym obcasem i podeszwą po stronie zdrowej, lub w aparacie Taylora. Kontrakture pozostałe po zapaleniu stawu biodrowego, można usunąć albo forsownie (zabieg o tyle niebezpieczny, że często spowoduje pownowne zaostrzenie się całej sprawy), lub zwolna w aparacie naciągającym. W przypadkach opierających się leczeniu konserwatywnemu, wykonujemy resekcya stawu biodrowego. Rozumie się samo przez się, że podczas całego leczenia energicznie także należy działać przeciwko ogólnemu zakażeniu żółzowemu przez dobre odżywienie, świeże powietrze, kąpiele jodowe i t. p.

Cystitis vide catarrh. vesicae.

Dacryocystitis.

W pierwszych dwóch dniach, założenie silnie uciskającej opaski może chorobę powstrzymać, przyczem bardzo uważać należy, aby oko nie uległo równoczesnemu uciskowi. Skoro jednak uczuwać się daje już choćby niewyraźna fluktuacja, należy przejść od razu do ciepłych wilgotnych okładów, a skoro fluktuacja jest wyraźna, wykonać przecięcie woreczka i wypuścić ropę. Po należytem przestrzykaniu borem lub sublimatem wprowadzić cieniutki zwitek gazy przez rankę do woreczka a koniec jej wystający na zewnątrz, przylepić do skóry poniżej otworu kitajka angielską, nie zalepiając ranki. Procedurę tę co dzień powtórzyć, aż do zupełnego wykleśnięcia całej okolicy woreczka.

Następnie dopiero przejść do wprowadzenia Sondy Bowmanna przez punkt łzowy, (zob. Ble-norrh. sacci lacrim.) nie wprowadzając już gazy, ranka zaś sama się zagoi.

Decubitus.

Największy nacisk należy położyć na profilaxę. We wszystkich przypadkach chorób obłożnych, dłuższy czas trwających, należy się postarać o to, by chorzy leżeli na materacach, na których prześcieradło najmniejszych nie śmie robić fałdów. Jeżeli to tylko jest możliwem, należy choremu zalecać zmianę położenia kilka razy na dzień. Jeżeli mimo przestrzegania tych ostrożności wystąpi na okolicy kości krzyżowej zaczerwienienie, to należy tę część ciała kil-

ka razy w ciągu dnia zmywać octem, sokiem z cytryny lub jakimś przetworem wyskokowym (wódka francuzką), chorego zaś ułożyć na materacu wodnym. Jeżeli wystąpią otarcia lub głębsze rany należy przyłożyć albo opatrunek jodoformowy albo jedną z podanych poniżej maści lub posypek. Skoro się wrzód oczyści, przykładamy maść lapisową. W przypadkach rozległych odleżyn, najlepiej ułożyć chorego na stałe w kąpieli wodnej:

290. *Ac. boric.*

Ol. olivar.

Cerac. alb. āā. 15'00,

Ung. simpl. 100'00.

Mfung. S. Maść.

291. *Zinc. oxyd. 10'00.*

Ung. simpl. 100'00.

Mfung. S. Maść.

292. *Ac. boric.*

Zinc. oxyd. āā. 5'00,

Ung. simpl. 100'00.

Mfung. S. Maść.

293. *Emplastr. cerussae 100'00.*

S. Plaster.

294. *Plumb. tannic. 10'00,*

Ung. simpl. 30'00.

Mfung. S. Maść.

295. *Ac. tannic. 2'00,*

Plumb. acet. bas. 10'00,

Ung. simpl. 50'00.

Mfung. S. Maść.

296. *Camphor.*

Spir. vin. āā. 2'00,

Mucill. gum. arab. 6'00.

Vin. generos. 90'00.

S. Do zmywania rany.

297. *Argent. oleinici 50'00.*

S. Do posypywania.

298. *Argent. nitric. 1'00,*

Bals. peruv. 10'00,

Ung. simpl. 100'00.

Mfung. S. Maść.

Defluvium capillorum vide Alopecia.

Delirium tremens.

Unikać leczenia osłabiającego, upustów krwi, dyeta pożywna, oraz nie wielkie ilości piwa lub wina. Uspokoić chorego środkami nasennymi: opium, chloral, (Kaf-tan tylko w celu ochrony, przeci-w uszkodzeniom, zwłaszcza po operacyach).

Chloral można podawać po 3, 4 do 5 gram. jeżeli niema wady serca. Jeżeli chloral nie działa, lub wada serca istnieje: Tra. Opii w lewatywie, lub Extr. opii 0·03 podskórnie.

299. Amylenhydrat. 6·00,
Aqu. dest. 60·00,
(Morph. mur. 0·02),
Extr. liquor. 10·00.
DS. Na noc połowę użyć.

300. Paraldehydi 4·00,
Aqu. dest. 80·00,
Rum,
Syrup simpl. āā. 10·00.
DS. Połowę na raz użyć.

301. Tinct. capsici 5·00,
Aqu. dest. 180·00,
Syrup aurant. 20·00.
DS. Co 2 godz. łyżkę.

Diabetes insipidus.

Pożywna dyeta, mierne użycie napojów.

302. Infus Valerian e 5·00,
ad 10·00,
Natri bromati 1·00,
Syrup 15·00.
MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

303. Codeini phosphor. 0·20,
Syr. simpl. 30·00.
MDS. 3 razy dz. łyżeczkę.
(Dla dziecka 10 lat).

Diabetes mellitus.

Tylko pożywienie złożone z mięsa, jaj i mleka, to ostatnie

jeżeli procent cukru nie wysoki. Tłuszcze nie są zabronione.

Chleba najwyżej 100—150 grm. na dzień, z jarzyn wolno szpinak, sałatę, zielony groszek i fasolkę, kalafior, szparagi, kapustę; z mącznych jedynie trochę ryżu. Do picia: kawa, herbata osłodzona sacchariną, która nawet w większych ilościach nie szkodzi, kwaskowate wina, wódka, cognac, woda.

Z lekarstw najlepiej jeszcze działa woda Karlsbadzka, potem Vichy, Neuenahr, spore dawki opium do 1·0—2·0 pro die.

Acid. lacticum 5·00—10·00
pro die.

Acid. carbol. według Eb-
steina:

304. *Acid. carbol.* 5·00,
Aqu. dest. 150·00,
Aqu. menth. pip. 50·00.
DS. 3—4 łyżeczki na dzień.

305. Jodoformii
Extr. lactucae sativ. āā. 1·00,
Cumarin 0·10,
ut f. pill. N. XX.
S. 2—3 pigułki na dzień.

306. *Pilocarpini mur.* 0·20,
Aqu. dest. 10·00.
DS. Podskórnie $\frac{1}{2}$ —1 strzyk.
Do osłodzenia płynów używa się pigulek z saccharyny.

Rp. Saccharini 3·00,
Natri carb. sicc. 2·00,
Manniti 50·00,
f. pill. N. 100.
S. Pigułkę na $\frac{1}{2}$ —1 szklanekę
płynu.

W razie coma diabeticum środki podniecające, wstrzykiwanie eteru, ciepła kąpiel ze zlewaniem głowy zimną wodą.

Dilatatio ventriculi.

W przypadkach, gdzie przyczyną cierpienia jest zwężenie odźwiernika czysto bliznowate,

czy nowotworowe, wskazany jest zabieg operacyjny.

Chwilową poprawę osiągnąć można przez systematycznie, dłuższy czas stosowane przepłukiwania żołądka, raz lub 2 razy dziennie.

W razie bólów wskazane są środki odurzające i to lepiej podskórnie niż wewnętrznie, gdyż w wypełnionym i rozszerzonym żołądku trudno ulegają wessaniu.

W razie, gdy przyczyną cierpienia jest zwiózenie ścian żołądka, należy przepisać dyetę pożywną, w małych ilościach a często podawaną z wykluczeniem o ile możliwości płynów; co dzień na czczo uwolnić żołądek zapomocą aspiratora żołądkowego od zalegającej treści, a w razie towarzyszącego nieżytu żołądka, takowy stosownie leczyć.

Skutecznie też działają zabiegi wodolecznicze, mięsienie i prąd indukcyjny, w okolicy żołądka stosowane.

W celu wzmocnienia mięśni żołądka: ipecacuanha 0·02—0·05 w przeciągu 24 godzin, raz w pół godziny po jedzeniu, drugą dawkę (0·01) po całej godzinie.

Przy zaparciu stolca: przed jedzeniem dwie łyżeczki: Sulphat Magnes., Cremor tartari et flor. sulphur, aa. p. aequ. Lewatywy z gliceryny. Jeżeli po jedzeniu występują bóle poleca się 2—4 łyżek wodychloroformowej. Przeciwwzdęciu: kreda, węgiel, magnesia w bardzo małych ilościach.

Diphtheritis vide Angina diphtheritica.

Dysenteria.

W czasie epidemii unikać niesownego pożywienia. Ścisłe odłączać chorych, a zwłaszcza desinfekeya wypróżnień. Chorzy po-

winni leżeć w łóżku, mieszkanie przewietrzać.

Dyeta ścisła, kleik, rosół, mleko. Słabszym można dozwolnić bulionu z jajem, wyciągów mięsnych, wina. Dzieciom mleko z wodą wapienną, kawa żółdziowa, herbata — osłabionym z rumem, wino burgundzkie z kleikiem, starsze dzieci mogą dostawać winnej polewki.

Wszystkie pokarmy należy podawać nieco ogrzane.

Dzieci przy piersi będące dostają pokarm regularnie, lecz wszelkie dodatki odsunąć.

Leczenie rozpocząć należy od środków przeczyszczających, Calomel, Ol. ricini, dorosłym 2—4 łyżek dziennie, dzieciom w emulsyi, lub: Infus rhei.

Później środki ściągające, miejscowo przepłukiwanie kiszki letniemi rozczynami. Starcia około odbytnicy troskliwie oczyszczać i zasypywać pudrem salicylowym.

Codziennie kąpiel ciepła, dorosli jedną dziennie, starsze dzieci 2, ssawcy najmniej 3. Ciepłota kąpeli 27° przez 5—10 minut. Okłady wysychające, kataplazmy, zawijania ciepłe sprawiają ulgę.

Podane tutaj recepty odnoszą się do dzieci, dorosłym dawki większe.

307. Ol. ricini 30'00,
Inf. fol. menth. 60'00,
Gum. arab. 5'00,
Succi citri 10'00.

MDS. Co godz. łyżeczkę.

308. Calomelanos 0'01—0'05,
Sacchari 2'00,
Mfp. dtr. tal. dos. N. V.
S. Co godz, proszek.

Jeżeli stolce nie zawierają już kału, można podawać opium ze środkami ściągającymi, jednak po paru dniach znowu środek przeczyszczający.

309. *Acidi Salicyl* 10'00,
Opii pulv. 0'20,
Mfp. div. in dos. N. XX.
 S. 3—4 proszki dziennie (dorosłym).

310. *Natri Salicyl* 2'50,
Laudani 0'05,
Mfp. div. in dos. N. X.
 DS. 3 pr. dzien. (dzieciom).

311. *Natri Salicyl* 5'00,
Aqu. dest. 80'00,
Trae laud. gtt. V.
Syrup simpl. 20'00.
 MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

312. *Liquor. alum acet.* 30'00,
Aqu. dest. 60'00,
Syrup simpl. 15'00.
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Do lewatyw używa się: sól kuchenna (0·5%), *Acid. salicyl.* (0·5%), *Thymol* (0·10%).

313. *Liquor. alum acet.*
Aqu. dest. āā. 100'00.
 DS. Na 2 lewatywy.

Po lewatywach jakoteż w razie silnego parcia dać czopki:

314. *Butyri Cacao* 0'50,
Trae opii guttam
Mf. supposit.
 S. 2—3 r. dziennie.

315. *Extr. bellad* 0'10,
Morphii mur. 0'05,
Butyr Cacao q. s. f. sup.
 N. V.

S. 1—2 czopków dziennie (dorosłym).

W przypadkach przewlekłych podawać dalej lewatywy i środki lekko ściągające.

W razie zapadu: Cognac, wino, kamfora, eter.

W okresie zdrowienia przechodzić z wolna do pokarmów: jaja, skrobane mięso itd.

316. *Bismut. Salicyl* 1'00,
Pulv. Doveri 0'20,
Sacchari 2'00,
Mfp. div. in dos. N. 10.
 DS. 3 pr. dziennie.

317. *Chinini tannici*
Bismuti salicyl. āā. 1'00,
Laudani 0'10,
Mfp. div. in dos. N. X.
 S. 3 pr. dziennie.

Dysmenorrhoea.

U panien unikać ruchu; bezpośrednio przed i podczas peryodu: zaziębienia, wpływów moralnych szkodliwych. Regulować dyetę. Jeżeli chora anaemiczna lub skrofuleiczna, odpowiednie leczenie stanu chorobowego ogólnego. Leczenie kąpielowe (Krynica).

Podczas boleści spokój, suche ciepło na okolicę podbrzusza, środki kojące jak: lewatywa z *Tra. opii simpl.* (15 kropli na lewatywę) albo *Chloral hydrat* (1·0 na lewatywę). Czopki do kiszki stolcowej, zawierające opium lub morphium, wstrzyknięcie morphiny pod skórę, u osób silnych, krwistych po jednej pijawce na wewnętrznej powierzchni obu ud.

W cięższych przypadkach należy zbadać dokładnie miejscowo narząd płciowy, przez odbytnicę, albo jeżeli możebne przez pochwę i leczyć, jak u osób zameężnych.

Najczęstszą przyczyną bolesnego miesiączkowania, bywa niedrożność przewodu szyi macicy.

Niedrożność pochodzi może ze zmiany położenia macicy jak np. zagięcie tejże, z wrodzonej wąskości przewodu, z krętego przebiegu tegoż.

W tych razach u mężatek zazwyczaj napotykamy równocześnie niepłodność.

W przypadkach takich wskazanem jest leczenie mechaniczne, polegające na wyrównywaniu zagięcia macicy, na rozszerzaniu przewodu szyi macicy sposobem tępym, wprowadzaniu zgłębnika

lub rozszerzaczy, na ten cel zbudowanych do jamy macicy. Jeżeli te sposoby nie prowadzą do celu, wskazanem jest rozszerzenie macicy sposobem krwawym (Hysterostomatia).

W ostatnim czasie polecają:

318. *Extr. hydrast. canad. fluid.*
2 razy dziennie po 25 kropli na 8 dni przed regularnością.

319. *Chloral hydrat. 8'00,*
Kali brom. 16'00,
Aqu. camphor. 200'00.

S. Co 2 lub 4 godz. łyżeczkę.

Dyspepsia nervosa.

Cierpienie to najczęściej stoi w związku z czynnościowym, nadmiernem wydzielaniem soku żołądkowego, lub z niedomogą wydzielniczą żołądka.

Stosownie do tego w 1-szym przypadku wskazane są środki alkaliczne, w 2-gim kwas solny i środki gorzkie.

W innych razach zбочenia w wydzielaniu soku żołądkowego niema, tylko błona śluzowa żołądka jest nadczułą, a w tych przypadkach należy przed jedzeniem podawać środki znieczulające (cocaina) i zapomocą przepłukiwań żołądka zmniejszać przezuculicę błony śluzowej.

Prócz tego należy zwrócić uwagę na ogólny stan chorego, u anemicznych wskazane są środki żelaziste (Krynica, Żegiestów, Francensbad i td.) u neurasteników i hysteryczek skutecznem bywa leczenie wodolecznicze.

320. *Natri bicarbon.*

Magn. carbon.

Kali carbon. āā. 5'00,

Pulv. rad. Rhei 7'00,

MD. in scatula.

S. 3 razy dnia na koniec noża zażyć.

321. *Sal. therm. Carolin 100'00.*
DS. Co dzień rano łyżeczkę w pół szklanki ciepłej wody.

W razach niedomogi wydzielniczej:

322. *Acid. hydrochl. 3'00,*
Pepsini German solub de
Rostock 2'00,

Aqu. dest. 150'00,

Syr. simpl. 15'00.

MDS. Po każdym jedzeniu 2 łyżki zażyć.

323. *Acid. hydrochl. dilut.*

Trae absinthi āā. 15'00.

DS. Po każdym jedzeniu 20 kropli w łyżce wody zażyć.

U anemicznych z niedomogą wydzielniczą:

324. *Trae ferri pomati 25'00,*

Trae Rhei vinosae

Trae amarae āā. 15'00.

MDS. 3 razy dnia po łyżeczkę zażyć.

325. *Ferri carb. sacchar. 5'00,*

Extr. nucis vomicae 0'50,

Pulv. et extr. Rhei āā. q. s.
ut f. pill. N. 100.

DS. 3 razy dnia po 2 pigułki zażyć.

Dyspepsia u dzieci.

Regularne karmienie osesków, jeżeli przyczyną mleko krowie, wrócić do piersi, lub w miejsce tegoż kleik jęczmienny, owsiany, woda cukrzona z białkiem, rosół cielęcy.

Z poprawą stołców zwiększać ilość mleka. Jeżeli są odbijania, czuć kwas z ust, wymioty, stołce serowate: Calomel (0'01—0'03) lub Natrum benzoic. (3^o/₁₀) co 2 godziny łyżeczkę.

W razie wzdęcia bolesnego, wprowadzić kanjkę lub kateter do odbytnicy. Jeżeli wymioty nie serowate, cuchnące, wskazują na brak kwasów: Acid mur. (0'30:50'0) lub:

326. *Pepsin 1'00,*

Ac. muriat. gtt. tres.

Aqu. dest. 90'00,

Syr. simpl. 15'00.

S. Przed pokarmem łyżeczkę.

W razie nagromadzenia się kału w jelitach. Ol. ricini.

Przy Intertrigo towarzyszącym zmywanie wodą mydlaną.

327. *Magnes ustae* 5'00,
Talci praepar. 20'00,
Acid. salicyl. 0'20.

MDS. Do posypywań.

U starszych dzieci:

328. *Trae Colombo*
Trae cascarillae āā. 5'00,
Trae bellad. 2'00,
Trae opii gtts. IV.

S. 5—10 kropli przed jedzeniem.

Dyspepsia u suchotników.

Napoje wyskokowe w miernej ilości, środki gorzkie, kreozyt, Strychnina, Rheum, Gentiana.

Dyspnoe.

Wyszukanie przyczyny powodującej duszność i leczenie jak należy choroby głównej.

W razie większej duszności. otwarcie okna w pokoju, usadowanie chorego na łóżku, skroplenie twarzy zimną wodą, natarcie czoła, twarzy wodą kołońską lub eterem, podanie wina, cognacu, czarnej kawy, wziewanie eteru, roztrarcie nóg i rąk, synapizma na piersi.

329. *Extr. alcohol. Quebracho*
10'00,

Aqu. dest. 200'00,

Succi citr. 20'00.

S. Łyżkę podczas napadu.

Eclampsia infantum.

Uwzględnić przyczyny: Początki chorób ostrych i zakaźnych, zimnica, wpływ przestrażenia, użycie środków odurzających, przepalenie głowy, kolki brzuszne, niestrawność, robaki, choroby dróg moczowych (phimosis), koklusz, skurez głowni, ciała obce w nosie, zranienia.

Wśród samego napadu zimne okłady (woda z octem) na głowę,

co parę minut, lewatywy, gorczyczniki na kark i łydki, w razie długotrwałych drgawek wdychanie chloroformu (ostrożnie!) kilka kropel na chusteczkę trzymać pod nosem. Lewatywy z chloralu.

W razie powtarzających się napadów:

330. *Chloral hydratis* 1'00,
Natri bromati 1'00,
Aqu. dest. 60'00,
Syrup sacchari 15'00.

MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

331. *Chloral hydratis* 0'50,
Aqu. dest. 80'00,
Mucilag. gum. ar. 20'00,

MDS. Połowę do jednej lewatywy.

332. *Urethani*

Sacchari āā. 0'15,

Mfp. dtur tal. dos. N. V.

S. Co 2 godziny proszek w łyżeczce wody.

Jeżeli stolec zaparty:

333. *Calomelanos* 0'30,
Sacchari 2'00,
Mfp. div. in dos. N. X.

DS. Co godzina proszek.

Eclampsia gravidarum et parturientium.

Ciężarną należy włożyć do łóżka, które powinno być przysunięte do ściany i otoczone ze wszystkich stron materacami, aby chronić od obrażeń; przed wystąpieniem szczykościsku wsunąć sterzcący z ust język do jamy ust, i włożyć między zęby drewnianą łyżkę owiniętą w płótno, aby zapobiedz skaleczeniu języka. Podczas napadu nie krępować ruchów, w razie znacznej sinicy: okłady zimne, wypróżnić pęcherz i kışkę stołcową. Injekcje morfiny 0'02—0'03 pro dosi, lub chloral w lewatywie (2'00). Jeżeli napady zbyt częste i przytomność nie wraca, po na-

padzie ciepła kąpiel 38° C., podnosząc zwolna ciepłość do 43° C. W razie wystąpienia objawów oedema pulmonum wprowadzić do macicy cewnik elastyczny, aby wzniecić czynność porodową.

W eclampsia parturientium, jeżeli jest ujście macicy zupełnie rozwarte, szyja balonowato rozszerzona, pęcherz płod. pęknięty, przyspieszyć poród, według położenia płodu i tak: jeżeli położenie czaszkowe ustalone, założyć kleszcze, jeżeli ruchome: zrobić obrót na nóżki i płód wydobyć, jeżeli pół. miednicowe, wyciągnąć płód za nóżki (względnie pośladki). Rozwiązanie matki winno się odbywać w narkozie chloroformowej. Jeżeli jest ujście maciczne za mało rozwarte, to obok tego co się robi w ecl. gravid. Narkotyzuje się rodzącą chloroformem, ile razy występują objawy zwiastunne napadu.

Chloroformować należy i ciężarne pośród eclampsyi, gdyż chloroform osłabia i zmniejsza ilość napadów. Rodzące narkotyzuje się z przerwami tak długo, póki się poród nie skończy. Do rozwiązania przymusowego lub rozszerzenia szyjki sztucznego, nie należy się uciekać, gdyż napady się wzmagają i przyspieszają. Jeżeli eclamp. wystąpi w położu, postępować jak podczas ciąży.

- 334.** Chloral hydrat. 5'00,
Aqu. dest.
Mucilag g. ar. āā. 50'00.
MS. Na 2 lewatywy.

Eczema chronicum. *)

Wskazania:

1) Rozmięczenie i usunięcie strupów jakoteż zgrubiałego czasem modzelowatego przyspórka.

2) Zniesienie chronicznego przekrwienia.

Do rozmięczenia strupów i przyspórka używa się tranu, maści Hebry. Tłuszcze płynne należy kilka razy dziennie napnszczać, maści zaś na płatkach płótna nasmarowane opaskami flanelowemi, ściśle do części schorzałych przystosowane przykładać. Bardzo dobre usługi robi także Emplastrum saponato salicylicum 10%.

W celu usunięcia strupów rozmiękłych: zmywania szarem mydłem, spirytusem mydlanym, mydłem naftolowem. W razie znacznego zgrubienia przyspórka, środki te nie pomagają, używa się tedy okładów z mydła szarego na 24—48 godzin, lub naciera się roztworem kali kaustyci 1:2.

Skoro skóra pod wpływem tych środków stanie się podatną, gładką, nie sącząca, używa się dziegci w celu usunięcia przekrwienia.

- 335.** Olei Rusci
" olivarum āā. 25'00.
MDS. Zewnętrznie.

- 336.** Trae Rusci 1'00.
S. Zewnętrznie.

- 337.** Olei Rusci 20'00,
Spiritus saponato Kalini
50'00,

Glycerini 10'00.
MDS. Zewnętrznie.

- 338.** Olei fagi 10'00,
Glycerini 5'00,
Ung. emolientis 50'00,
Balsami peruviani 2'00.

- 339.** Glycerini 40'00,
Olei rosarum
Olei flor. aurant. āā. gtts. II.
Kali carbonici 2'50.

MDS. Zewnętrznie,
lub maść cynkowa, lub z białego praecipitatu (1:40).

*) Eczema acutum już po korekcie przełożono na stronę 45.

Eczema poszczególnych części ciała.

Eczema capillitii.

Rozmiękczyć strupy tłuszczami (oliwa karbolowa 1^o/₁₀, tran), zmywać w dzień c. spiritu. saponato kalino. W stadium squamosum pędzlowanie cum Tra. Rusci, w ostatek maść cynkowa, praecipitatowa biała (1:40) lub pasta Lassara. (Rp. 350).

Eczema faciei impetiginosum.

Usuwać strupy jak wyżej, po ustaniu sączenia, dziegieć, maść praecipitatowa, cynkowa lub Wilsona. Do dziurek nosowych tampony z gliceryną lub oliwą, ragady przyżęga się lapisem.

Przy eczema powiek:

340. *Praecip. rubri* 0'15,

Ung. emolientis 10'00,

Mf. unguentum.

S. Maść.

Chroniczne eczema brzegu warg ustępuje nieraz dopiero po kilkakrotnem przypaleniu cum kali caustico 1:2, również eczema sutka i brodawki sutkowej.

Eczema chron. scroti.

Unguentum Hebrae, empl. saponato salicylicum 10^o/₁₀. Zmywanie 2 razy dziennie mydłem szarem w kąpieli, gdy sączenie ustąpi, dziegieć.

Eczema perinei et ani.

Unguentum Hebrae, maść boro-wa, przy ragadach w rectum czopki.

341. *Cocaini muriat* 0'02.

lub: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Extr. Belladonae } 0'02, \\ \text{Extr. Opii aquosi } 0'02, \end{array} \right.$

Zinci oxydati 0'15,

Butyri Cacao 1'50,

Mf. Suppositorium dtr. tal.

dos. N. X.

DS. Czopki.

Jeżeli eczema jest podtrzymywane lub spowodowane chorobami wewnętrznymi, należy takowe leczyć, a więc przy skrofulosie dawać tran, usunąć anemię, choroby żołądka etc.

Eczema acutum.

W okresie rozwoju unikanie tarcia bielizny, gorąca, potu, wilgoci a więc: zmywań i kąpieli. Dla ochronienia od potu i tarcia najlepszym środkiem jest puder, do którego dla zapachu nie dodaje się olejków eterycznych, bo drażnią.

342. *Amyli Orizae* 50'00,

Pulv. alum. plumos. 10'00,

Zinci oxydati

Pulv. Ireos florent. āā. 3'00,

Mfp. DS. Puder.

343. *Zinci oxydati*

Magist. Bismut. āā. 5'00,

Cerussae 2'50,

Pulv. talci venet. 5'00.

Mfp. S. Puder.

Puder zmienia się tak często, ilekroć takowy zwilgotnieje i zagrzeje się.

Przy objawach silnego zapalenia (silne obrznięcie, sączenie z uczuciem bólu i napięcia) okłady zimne z:

344. *Plumbi acet basici* 10'00,

Aqu. dest. 500'00.

MDS. Do okładów

lub okłady z liquor Burowi 10^o/₁₀—25^o/₁₀ zmieniając takowe co 2 godziny lub Thymol 1:1000.

Najkorzystniej wszakże prawie zawsze ograniczyć się do samego pudru.

W eczema acutum papulosum wśród którego istnieje swędzenie powodujące drapanie i pogorszenie sprawy chorobowej pędzluje się:

345. *Acidi carbol* 0'50,

Spir. vini gallici 100'00.

MDS. Zewnętrznie.

- 346.** *Acidi carbol* 1'00,
Spir. vini gallici 150'00,
Spirit. lavandulae
 „ *coloniensis* āā. 25'00,
Glycerini 2'50.

MDS. Zewnętrznie.

- 347.** *Olei Rusci* 50'00,
Aetheris sulphur.
Spir. vini rectific. āā. 75'00,
M. fitra adde olei lavandulae 2'00.

MDS. (Tra Rusci) Zewnętrznie.

W stadium decrementi usuwa się strupy olejkiem migdałowym, lub oliwą. Na miejsca sączące daje się 2 razy dziennie maść rozciągniętą na płótnie (na twarz maskę płócienną) i przymocowuje opaskami flanelowymi.

Maści używa się:

- 348.** *Unguent. Diachylon Hebrae* 50'00.

DS. Maść.

- 349.** *Empl. Diachyl. simpl.*
Vaselini āā. 25'00,
Liquefac. misce.

S. Maść lub:

Pasta Lassara:

- 350.** *Zinci oxydati*
Amyli tritici āā. 25'00,
Vaselini puri 50'00,
Acidi salicyl. 1'00.

Mf. Pasta.

S. Maść.

W stadium squamosum naciera się kilka razy dziennie szorstką, łamiącą się skórę tłuszczem i posypuje się pudrem.

- 351.** *Unguenti emolientis* 20'00.
 MS. Maść.

- 352.** *Zinci oxydati* 1'00,
Unguenti simpl. 40'00.

Mf. ung. DS. Maść. Lub Maść Wilsona:

- 353.** *Benzoes pulverisati* 5'00,
Azung. porci 160'00,
Digere cola adde
Zinci oxyd. 25'00.

Mfung. DS. Maść.

Najlepiej wszakże w tym okresie osobiwie w rasie swędzenia używać dziegciu z początku, dając powyższe maści na miejsca dziegciem zapędzowane, później używać samego dziegciu.

Eczema marginatum.

1) bez istniejącego zgrubienia przyskórka: Wcieranie zapomocą pędzla szczecinowatego przez 8—12 dni:

(Maść Wilkinsona):

- 354.** *Olei Rusci*
Lactis sulphur. āā. 25'00,
Sapo viridis
Azungiae porci āā. 50'00,
Pulv. cretae albae 5'00.

Mf. unguent. DS. Maść.

- 355.** *Naphthol* 2'50,
Ungu. simpl. 50'00.

Mf. unguent. DS. Maść.

- 356.** *Chrysarobini* 5'00,
Unguenti simpl. 50'00.

Mf. unguent. DS. Maść.

- 357.** *Naphthol-B* 1'00,
Spir. vini rectific. 100'00.
 MDS. Zewnętrznie.

- 358.** *Sublimati corrosivi* 1'00,
Spir. vini rectific. 100'00.
 MDS. Do pędzlowania.

Lub nacierania dziegciem, trąjodowa.

2) Jeżeli istnieje zgrubienie przyskórka należy takowy zapomocą roztworu kali causticiej 1:2, lub okładów z mydła szarego usunąć, a następnie, gdy się przyskórek odnowi, powyższe środki pędzlem wcierać.

Emphysema pulmonum.

Przeważnie leczenie symptomatyczne.

Unikanie zaziębień, przemoczenia nóg, w ogóle wszystkiego, co może spowodzić lub powiększyć nieżyt oskrzelowy. Główne zadanie leczyć nieżyt oskrzelowy przez pobyt na świe-

żem górskiem powietrzu, picie wód w Ems, Reichenhall, Nauheim, Szczawnica; na wewnątrz Pulv. Doveri, Ammonium muriat, Tannina z morfiną, Stibium sulphurat aurant. z morfiną, apomorphin, Inf. Ipecacuanhae lub radix Senegae, przetwory balsamiczne jak: Balsam peruw. to-lutanum, ol. terebinth. terpinol, terpinhydrat (3:00: na 30 pigułek, z tego 1—3 pigułek dziennie).

Leczenie w gabinetach pneumatycznych lub za pomocą przyrządów Waldenburga lub Geigla i Majera (Würzburg) lub Schnitzlera.

U ludzi otyłych można polecić picie wód Karlsbadzkich lub Kissingen. Przy osłabieniu akcyi serca, podawać obok środków wykrztuśnych i nasercowe. Uważać na wypróżnienia, w razie braku tychże, podać odpowiednie środki.

Dyeta pożywna ale nie wzdymająca.

359. *Apomorphin hydrochl.*
0'05.

Morphii mur. 0'03,
Acidi mur. gtts. X.
Aqu. dest. 180'00,
Da in vitro nigro.

S. Co 3 godziny łyżkę.

360. *Stibii sulphur. aurantiaci*
0'30,

Morph. mur. 0'10,
Natri bicarb. 5'00,
Mfp. div. in dos. N. XV.

S. 2—3 proszki dziennie.

361. *Gutti*

Fol. digit.
Bulb. Scillae
Stibii sulphur. aurant
āā. 1'50,
Extr. Pimpinellae q. s. ut. f.
pil. N. 60.

DS. Co 2 godziny pigułek.

362. *Ol. terebinth.* 2'00,
Aqu. menth. pip. 150'00,
Mucil. g. arab. 30'00.
DS. Co 2—3 godz. łyżkę.

Endocarditis.

Właściwego leczenia niema i ogranicza się tylko do symptomatycznego.

Spokojne leżenie w łóżku, dyeta płynna, niepodniecająca. Na okolicę serca okłady zimne lub worek z lodem.

Na wewnątrz cardiaca, zwłaszcza *digitalis*, *strofantus*, w razie bólu mierne dawki morfiny.

Przy znacznem osłabieniu: kawa czarna z cognakiem, wino mocne, kamfora lub eter podskórnice wstrzyknięty.

Przy gorączce wysokiej, mierne dawki antypyretyków, z obawy groźnego zapadu.

Endometritis.

Ostry nieżyt: spokojne leżenie w łóżku, środki lekko wypróżniające, okłady wysychające na brzuch, wstrzykiwania letnie, niezbyt silnym prądem — zawierające środki desinfeekcyjne: *Acid boricum* (3:100) *Ac. carbolicum* (2:100) i t. d. W razie bólów, czopki *cum laudano* lub *cum morphio*.

Przewlekły nieżyt wymaga jużto leczenia ogólnego w przypadkach niedokrewności, zołzów i t. d. już też leczenia miejscowego.

W tym celu można używać wprowadzania środków żrących przypiekadłem Chiarego, albo za pomocą sondy owiniętej watą i napojonej n. p. *cum Trajodi*, *cum liquore ferri sesquichl.* i t. d. Przepłukiwania macicy za pomocą cewnika Bozemanna, *Olchousena*, i t. d. rozczyznami: kwasu borowego, karbolowego

jak wyżej. Szulze radzi przedtem rozszerzyć macię sposobem tęym. Wprowadzenie rozczynów silniejszych, jak kwas karbolowy 4^o/_o, Cuprum sulphuricum 10^o/_o zapomocą rurki Bandlera w jego wzierniku do jamy macię.

Dawniej wstrzykiwano rozczyn do jamy macię strzykawkami Brauna, Madurowicza. Wprowadzenie do jamy macię przecików zawierających jodoform, tanninę i t. d. Wprowadzanie do jamy macię gazy jodoformowej w postaci długiego paska, którego jedna część wypełnia macię, druga zaś sterczy do pochwy.

Gdy te sposoby nie wystarczają, wyskrobanie jamy macię (Abrasio mucosae).

Owrzodzenia części pochwowej należy goić przyżeganiem zapomocą: nastoju jodowego, azotanu srebrowego w laseczce, Cuprum sulphuricum w kryształkach, Acidum nitricum fumans, który się stosuje ostrożnie za pomocą przecika szklanego albo asbestowego.

W przypadkach dawnych owrzodzeń z przerostem gruczołowym, najlepiej wyskrobać ostrą łyżeczką dno wrzodu i przypiec następnie, do czego użyć można ferrum candens, thermocauter Paquelina, Galvanocauter.

Euuresis nocturna.

Uwzględnić powody: Ascaridy, Oxyuris, Phimosi, pavor nocturnus, zboczenia w odżywieniu, Onania.

Zimne obmywania, kąpiele nasiadowe chłodne od 5—10 minut, na wieczór, wstrzymywać od napojów. Polecać przez dzień wstrzymywać moc.

Polecają unikać spania na wznak, lub ułożenie pacjenta,

aby była podwyższoną miednica. Prąd stały, a mianowicie wprowadzić wąską elektrodę metalową (nasmarowaną oliwą) do odbytnicy (u dziewcząt do pochwy) drugą elektrodę zwilżoną na spojenie kości łonowych lub perineum, prąd słaby można zwolna wzmacniać — elektryzować przez 5 minut.

363. *Atropin sulphur. 0'05,*
Aqu. dest. 30'00.

DS. Po tyle kropli ile dziecko ma lat. o 4 i 7 godzinie wieczorem.

364. *Extr. chinae aqu. sic. 5'00,*
solve in
Aqu. dest. 100'00,
Natri bromati 2'00,
Trae bellad. gtt. X.
Syrup sacchari 20'00.

MDS. 3 razy dziennie łyżkę.

365. *Extr. bellad. 0'05,*
Extr. nuc. vomic. 0'10,
Sacchari 2'00,
Mfp. div. in dos. N. X.

DS. Na noc jeden proszek.

366. *Strychnini nitrici 0'001,*
Sacchari 10'00,
Mfp. div. in dos. aequal.
N. XX.

S. Na noc proszek.

W razie nadczołości pęcherza, podać na noc Chloral na wewnątrz lub też w lewatywie.

Skrofulecznych i źle odżywionych leczyć zarazem chininą i środkami żelazistemi.

Enteritis follicularis.

Zmiana mamki. Odstawione dzieci wrócić do piersi. Śmietana Biederta lub zupa Liebiga za pokarm. Kleik jęczmienny, kawa żółędz., kakao.

Przepłukiwanie kiszki 1^o/_o wodą słoną, Liquorem alum. acetici aa. c. Aq. Toż i do wnętrza.

367. *Liquor. alum. acet.* 30'00,
Aqu. dest. 50'00,
Syrup 20'00.

S. Co 2 godziny łyżeczkę.

Bismut. 0'10—0'20 *pro dosi*
 3—4 r. dziennie.

Chinin tannic. 0'05—0'10
pro dosi.

W razie boleści i parcia *Extr.* opii aq. 0'01 pr. dosi 3—4 r. dz., tra Opii według wieku.

W razie krwawienia *Liquor ferri sesqui* 3—5 kropli kilka razy dz. Wśród zapadu herbata z cognakiem, wino czerwone, *liquor ammon. anis.*

Epididymitis.

Pozostanie w łóżku, ułożenie wysokie scrotum, zapomocą ręcznika, lub poduszeczki trójkątnej, okłady z *acetas plumbi basici* 1⁰/₁₀, by uniknąć wyprysku, okłady zimne (lecz nie lodowe) środki przeczyszczające, na noc maść z *extractum Belladonae* (1:25). Okłady robi się tak długo, dopoki ból trwa (4—10 dni), gdy ból ustąpi lub znacznie się zmniejszy, staramy się o usunięcie wypociny przykładając plaster:

368. *Emplastri hydrargyri*
sapon. āā. 15'00,
leni calore liquefac ut fiat
emplastr. extende supra lin-
teum.

Plaster taki nosi chory 4—5 dni i zdejmuje go w ciepłej kąpieli, przykładając nowy plaster. Po 2—3 tygodniach wypocina ustępuje i pozostaje tylko guzek stwardniały w dolnej części, w celu usunięcia tegoż zapisujemy:

369. *Kali jodati* 2'00,
Jodi puri 0'10,
Lanolini 9'00,
Olei olivar. 1'00.
Mf. Unguentum.
 S. Maść.

Jeżeli chory w łóżku pozostać nie może, koniecznym jest, aby przynajmniej w nocy przez kilka godzin robił okłady zimne, na dzień zaś w celu umożliwienia chodzenia, zakłada się mu *suspensorium Horanda*.

Epilepsia.

Przedewszystkiem starać się wykryć przyczynę padaczki i takąową o ile można usunąć, zwłaszcza przy *reflexepilepsiach*.

Chory nie powinien fizycznie lub umysłowo nateżać się, unikać napojów wysokowych, żyć higienicznie, uważać na regularny stolec, nie pijać kawy, herbaty, mało lub wcale nie palić, unikać wszelkich gwałtownych wzruszeń.

Podczas aury chory powinien położyć się do łóżka, lub na sofkę, porozpinać ubranie i podczas napadu ktoś powinien być obecnym, ażeby chory wśród silnych drgawek nie wyleciał z łóżka i nie potłukł się. Nieraz udaje się napad usunąć, mając przygotowany *Amylnitrit*, kilka kropli na chustkę i parę razy tem oddechać. Czasem zaś kieliszek *cognacu*, *wina*, na razie może wstrzymać napad. Podczas bardzo silnego napadu można robić *inhalacye chloroformowe*.

Jako środki polecane przeciw epilepsji przedewszystkiem: *kali bromatum* po 2—5 do 10 i 15 gm. na dzień, lub *mięszanki bromowe*:

Ammon. bromati,
Natri „
Kali „ *āā.* 3'00—5'00,
Aqu. dest. 200'00.

DS. 2—3 łyżek dziennie, dalej *Curara* podskórnice (0,005).

370. *Curare* 0'10,
Aqu. dest. 10'00,
Acid muriat gtt. unam.
 DS. ¹/₅—¹/₂ strzykawki na raz.

Polecane też jest:

Decoct. artemisiae
e 15'00 ad 250'00,
Kali bromati 10'00—20'00.

Podawać też można Valerianę w proszku (0'50—2'00) pro die, albo jako infusum e 10—15'00 na 200'00. Belladonna w pigułkach np.:

371. Extr. Belladon.

Fol. Bellad. āā. 1'00,
Extr. et pulv. liquir. q. s. ut
f. pill. N. 100.

S. Codziennie 2—3 do 6—7 pigułek.

Następnie Zincum oxyd. od 0'05—0'20 p. dosi, w połączeniu z innymi środkami, lub atropinę na wewnątrz:

372. Zinci oxydati 0'05,

Rad. Valer. 2'00,
Extr. Hyoscyam. 0'06,
Ol. Valerianae 0'05,
Mfp. D. tal. dos. N. X.
Da in charta cerata.

S. 3 proszki na dzień.

373. Atropini sulphur. 0'01,

Aqu. dest. 10'00.

DS. 2—3 razy na dzień po 10 kropli (uważać na źrenice!).

Dalej przetwory arsenikalne jak: Sol. Fowleri, woda Levico, Rocegnio.

Przytem można zastosować procedury hydropatyczne i elektryzowanie, prądem stałym głowy i sympaticus. Podczas zaś status epilepticus można robić inhalacje chloroformowe lub eterowe.

374. Aethyleni bromati

Spir. vini rectific. āā. 5'00,
Aqu. menth. pip. gtt. 2.

S. 2—3 razy dziennie po 5—10 kropli w $\frac{1}{3}$ szklanki mleka.

Epistaxis.

Wstrzykiwanie zimnej wody z rozcżynami alunu, taniny, octu, ferri sesquichlor. 1 $\frac{0}{10}$, soku ze świeżej cytryny itp. Przestrzyki-

wania bezustannie wodą gorącą najmniej + 53° C., aż do ustania krwotoku.

Ucisk zewnętrzny na skrzydło nosa, przyczem głowę chorego naprzód pochylić.

Tamponada nosa zapomoć rurki Belocq'ua. Do tamponady z przodu nosa, polecają zamaczać czop z waty w olejku terpentynowym.

W uporczywych krwotokach nosa podać można Ergotin 0'10 co $\frac{1}{2}$ godziny.

Epulis.

Guz cały wraz z schorzałą częścią szczęki należy usunąć ostrą łyżeczką, dno rany wypalić termokauterem i następnie całą jamę wytamponować gazą jodoformową. Usta należy pilnie płukać antyseptycznym roztworem:

375. Ac. borici 15'00,

Aqu. dest. 500'00.

S. Płukanie.

376. Kali hypermang. 1'00,

Aqu. dest. 50'00.

S. Kilka kropli do szklanki wody.

Erysipelas.

Leczenie ogólne niczem nie różni się od leczenia chorób innych gorączkowych. Przy leczeniu miejscowym, przedewszystkiem wysledzić punkt wyjścia rózży, a więc przy rózży twarzy, zbadać czy niema abscessu z powodu periodontitis i takowy przeciąć, osobliwie zaś dokładnie zbadać jamę nosa i jeżeli tamże znajdują się exkoryacje strupami pokryte, takowe rozmięczyć przez wkładanie tamponów, napojonych oliwą karbolową 1 $\frac{0}{10}$, wkładając waciki z maścią: Hydrarg. praecipit. flavi (0'15:15'00).

Miejsce uległe zapaleniu okłada się suchą watą, lub robi się

się okłady z Plumbum acet. basicum solut. 1% lub z płynu Burrowa. Najpowszechniejszym środkiem jest maść kamforowa.

Lodowych okładów używa się tylko przy różnicy głowy, połączonej z majaczeniami i utratą przytomności.

Erythema multiforme et nodosum.

W przypadkach zwykłego erythema multiforme zaniechać wszelkiego leczenia. Przeciw swędzeniom przy Erythema urticatum et papulatum daje się okłady zimne, lub pędzluje się rozcymem:

377. *Acidi salicylici* 1'00,
Spir. vini gall. 200'00.

MDS. Zewnętrznie i następnie posypuje się pudrem.

W razie bólów stawowych, obrzmienia stawów, lub gorączki, pozostaje pacjent w łóżku, na wewnątrz zaś podaje się: Natrum salicylicum, Antipyrin, Chinin. Wielką ulgę robią w tych razach okłady z lodu, zimnej wody, plumbum acet. basicum solut. 1% W razie gorączki, przypadków gastrycznych, daje się kwaski, antifebrilia, środki przeczyszczające i stosowną dietę.

W razie częstych nawrotów u kobiet badać, czy nie ma jakich zboczeń w narządzie płciowym, leczyć istniejącą chlorosę i zboczenia w narządzie pokarmowym.

Favus.

1) Usunięcie ciałek i strupów woszczynowych, przez polewanie przez 2—3 dni, kilka razy dziennie 1% oliwą karbolową i zmywanie mydłem szarem lub spirytusem mydlanym.

2) Usunięcie grzybków znajdujących się w samym włosie przez epilację.

3) Zniszczenie grzybków znajdujących się w torebce włosowej środkami płynnymi, dostającymi się do torebki.

Metoda: Po wyciągnięciu włosów zmywa się rano i wieczór skórę głowy cum Spiritu saponato kalino. Następnie wciera się w 1/2 godziny po tem po osuszeniu skóry zapomocą pędzla szczerbinowego:

378. *Lactis sulphur.* 5'00,

Trae Rusci

Spir. Lavandulae āā, 50'00,

Glycerini 1'50.

MDS. Zewnętrznie.

By zapobiedz zsychnaniu się skóry, powstającemu po zmywaniu spirytusem mydlanym lub mydłem, wciera się w południe maść, do której dodaje się antiparasiticum.

379. *Acidi salicyl.* 5'00,

Vaselini flavi 35'00,

Olei naphae gtts. V.

Mf. Ungu. S. Pomada.

Ponieważ druga i trzecia generacya odrastających włosów zawiera jeszcze grzybki, należy je wrywać, zmywać głowę spirytusem mydlanym obetrzeć na sucho, wcierać następnie rozcym sublimatu (0'03—0'05:100) a nazajutrz rano wetrzeć powyższą pomadę.

Febris intermittens zob. Intermittens.

Fluor albus = Blenorhoea Vaginae = Catarrhus Vaginae.

Ostry nieżyt: spokojne leczenie w łóżku, lekko wypróżniające środki. Letnie wstrzykiwania wodą przegotowaną z dodatkiem soli kuchennej, kwasu borowego 3:100, i t. d.

Przewlekły niezbyt:
Wstrzykiwania środkami ściągającymi 1—2—3 razy dziennie.

380. *Plumb. acet. b. purum* 2'00,
Dtur. dos. tal. decem.

S. Proszek do litra wody do wstrzykiwań.

381. *Plumb. ac. b. sol.* 100'00.

DS. 2 łyżki na litr wody do wstrzykiwań.

382. *Sulph. Zinci*
Aluminis pulv. āā.

DS. ½ łyżeczki na litr wody do wstrzykiwań.

Sulph. Zinci 1:100, wody
Kali chlor. 1:100, wody.

383. *Creolini* 15'00.

DS. 5—10 kropli na litr wody do wstrzykiwań.

384. *Acidi salicylici* 1'00,
Dtur. dos. tal. decem.

S. Proszek do litra wody do wstrzykiwań.

385. *Acidi pyrolignosi crudi*
300'00.

DS. Trzy łyżki do litra wody do wstrzykiwań.

Do wstrzykiwań do rozczyńców należy używać wody przegotowanej. — Oprócz powyższych wstrzykiwań, gdy nie usuwają cierpienia, należy we wzierniku dobrze oczyścić pochwę i zapędzłować takową np. octem drzewnym, co można powtarzać co 3 dni kilkakrotnie, w tym celu można użyć i innych silniejszych rozczyńców. Po zapędzłowaniu wypłukuje się pochwę wodą i zakłada tampony. Można także używać proszków: *Acidum salicylicum*, *Alumen*, *Zinc. sulph.* i t. d. samych na wacie, albo w połączeniu z *Amylum*.

Wreszcie zalecają: tampony napojone lekami:

386. *Kali jodati* 5'00,
Glycerini 100'00.

DS. Do tamponów.

387. *Tannini puri* 3'00,
Glycerini 100'00.

DS. Do tamponów.

Foetor ex ore.

388. *Coff. tost.* 15'00,
Carbon. lign. 5'00,

Acid. borac. 5'00,

Sacchari 13'00,

Vanilin q. s.

Mf. pastillae pond 0'75.

Trzymać w ustach dopóki się nie rozpuści.

389. *Saccharin*

Natri bicarb.

Acid. salic. āā. 5'00,

Alcohol vini 200'00.

DS. Łyżeczkę na szklanke wody do płukania.

390. *Thymol.* 0'50,

Boracis 1'00,

Spir. vini 2'00,

Aqu. dest. 1000'00.

S. Do płukania.

Fungus umbilici.

Przyżęgać lekko lapisem (codziennie) i posypywać pudrem (ac. salicyl. 0'20:50'00 amyli), lub też Catgutem lub jedwabiem podwiązać u podstawy.

Furunculosis.

Zwrócić uwagę na możliwy diabetes. Kataplaźmy ustawicznie stosowane, dopóki choćby mały guzek zostawał. Wczesne nacięcia, opatrunek jodoformowy. Wśród obfitej furunculosis, ciepłe kąpiele, kąpiele ze sodą (1 klgrm.), dobre odżywianie, chinina, żelazo.

391. *Ichtyoli* 4'00,

Aqu. dest. 15'00.

MDS. Co 3 godz. pędzłować.

Podskórne wstrzykiwanie 3% rozczyńcu kwasu karbolowego ½ strzykawki.

392. *Acid. salicyl.* 7'50,

Empl. saponati 60'00,

Empl. diachylon 30'00.

DS. 2 razy dnia przykładać.

Furunculosis przewodu usznego zewnętrznego.

393. *Mentholi* 5'00,
Ol. olivar. 25'00.

MDS. Raz na dzień wkładać na wacie.

394. *Acidi borici* 3'00,
Alkohol absol. 25'00,

DS. Napuścić do ucha i 10 minut zostawić.

Gangraena pulmonum.

Świeże powietrze, częste przewietrzanie pokoju. Chory powinien leżeć w łóżku na stronie chorej. Dyeta pożywna i podniecająca, jeżeli niema przeciwwskazań.

Podawać na wewnątrz środki wykrztuśne i balsamiczne, oraz robić częste wziewania z ol. terbinth 1,0 — 3,0 na 200 wody lub ol. pini pumilionis polonicae po 10—15 kropli na kieliszek wody do maszynki inhalacyjnej Siegla. Lub też kwas karbolowy 2% do wziewań, ale w takim razie uważać na mocz, czy nie wystąpi zabarwienie ciemne. Również wziewania z Thymol 0.20 z dodatkiem kwasu borowego 3'0 na 100 wody.

Na wewnątrz podać n. p.:

395. *Terpinol.* 3'00.

Natr. benzoici 2'00,
Sacch. albi q. s. ut f. pill.
N. 30.

S. Co 2 godziny pigułkę.

396. *Menthol.* 3'00,

Sacch. albi
Gum. arab. āā. 2'00,
Aqu. dest. q. s. ut. f. pil.
N. XX.

S. Co godzinę pigułkę.

Lub menthol podawać w kapsułkach wyrobu Zachradnika po 1.0 grm. z dodatkiem ol. olivar. 2 0.

Do spłuwaczki przykrywanej szczelnie wlewać 5% kw. karbolowy lub 2% -ej kreoliny.

Gingivitis.

Leczenie przyczyn (Periodontitis Epulis, Stomatitis mercurialis Stomacace). Częste płukanie ust.

397. *Kali hypermang.* 0'05,
Aqu. fontis 200'00.

DS. Płukanie.

398. *Tannini* 3'00,
Spirit. vini rectif. 80'00,
Bals. Hoffman. 20'00.

MDS. Łyżeczkę na szklanke płukania.

399. *Tinct. Ratanhae*
Tinct. Gallar. āā. 10'00,
Tinct. opii 1'00.

MDS. Do pędzlowania.

Glaucoma (Jaskra).

Zaczerwienienie spojówki gałkowej, któremu towarzyszy równoczesne rozszerzenie źrenicy (jeżeli możemy wykluczyć zapuszczenie atropiny) budzi wielkie podejrzenie o jaskrę.

Przy stwierdzonej jaskrze, zapuszczać rozczyń Ezerynu lub Pilokarpinu, z początku, dopóki się objawy nie usmierza, 5—6 razy dziennie, potem 3 razy dziennie a skoro napad zapalny zostanie choć w części usunięty, wykonanie Iridectomii.

Pilokarpina jest lepszą do dłuższego użycia, bo nie ulega tak szybkiemu rozkładowi jak Eseryn.

Pamiętać należy, że zdarza się jaskra prosta (nie zapalna) gdzie jedynym objawem jest podupadanie wzroku.

Atropinu pod żadnym pozorem używać nie wolno, nawet tam, gdzie jest tylko podejrzenie o jaskrę.

400. *Pilocarp. muriat.* 0'20,
Aqu. dest. 10'00.

DS. Krople oczne.
Zakraplacz.

401. *Eserini sulphur.* 0·05.

Aqu. dest. 15·00.

Dt. in v. n.

DS. Krople oczne (szczelnie zatykać).

Glossitis.

W przypadkach ostrych należy podawać lód w kawałkach do połknięcia, na szyję zimny okład.

W przypadkach groźnych wskazane są: liczne głębokie nacięcia i skaryfikacye. Z powodu możliwego ostrego obrzęku głosi, należy mieć narzędzia do tracheotomii pod ręką.

Ropnie przewlekłe, należy rychło otworzyć.

Fisura linguae:

402. *Acid. carbol.* 2·50,

Trae jodi

Glycerini āā. 12·50.

MDS. Do pędzlowania.

Gonitis.

W pierwszym rzędzie należy leczyć przyczynę wywołującą zapalenie stawu, o ile takowa da się wykazać, a więc ogólny reumatyzm stawowy, choroby układu moczopłciowego i t. p. W okresie ostrym zaleca się absolutny spokój w łóżku, ewentualnie opatrunek ustalający. Na wewnątrz podajemy przetwory kwasu salicylowego a zewnątrz preparaty jodowe lub ichtyolowe.

W okresie przyostrem lub przewlekłym, opatrunek uciskający, massowanie, kąpiele ciepłe siarczane.

Zapalenia stawu kolanowego, natury gruźliczej, leczymy według ogólnych prawideł leczenia gruźlicy stawów (patrz Tumor albus).

403. *Trae jodi* 50·00.

S. Zewnętrznie.

404. *Trae jodi*

„ *gallarum* āā. 25·00.

S. Zewnętrznie.

405. *Kal. jodat.* 3·00,

Jodi puri 0·30,

Ungu. simpl. 30·00.

Mf. Ungu. S. Maść.

406. *Kali jodati* 5·00,

Glycer. q. s. ad solut.

Sapon. virid. 50·00.

Mf. ungu. S. Maść.

407. *Natri sulphoichtiolic*

Vaselin āā. 10·00.

S. Maść.

408. *Natr. sulphoichtiol.* 30·00,

Ol. olivarum 100·00.

S. Zewnętrznie.

409. *Natr. sulphoichtiol.* 10·00

—50·00,

Aqu. dest. 100·00.

S. Do okładów.

410. *Ammon. sulphoichtyolici*

10·00,

Chloroform 3·00,

Lanolin 10·00.

Mf. ungu. S. Maść.

411. *Ammon. sulphoicht.* 10·00,

Ac. salicyl. 2·00,

Collod. 100·00,

Ol. ricin. 10·00.

S. Zewnętrznie.

Haematemesis.

Przedewszystkiem należy uwzględnić przyczynę krwotoku. Chory powinien jak najspokojniej leżeć i wstrzymać się od przyjmowania pokarmów przynajmniej 24 godzin, a nieraz 1–2 tygodni.

Jeżeli osłabienie jest znaczne, lub chory od pokarmów wstrzymuje się dłużej, należy podawać odżywcze lewatywy.

Na okolicę żołądka okład lodowy, kawałki lodu do połknięcia i środki przeciw-krwotoczne.

W razie zapadu eter podskórny lub ol. camphoratum.

Gdy wzmagająca się ostra niedokrewność wskazuje, że krwotok nie ustępuje, wstrzykiwano podskórne przetworów sporyszowych.

Po ustąpieniu krwotoków dłuższy czas spokojne leżenie w łóżku, dyeta płynna, mleko zimne łyżkami, a obok tego leczenie przyczynowe.

412. *Tannini puri* 0·50,
Opii puri 0·10,
Sacchar. albi 3·00,
Mfp. div. in dos. N. V.
S. Co 2 godziny proszek.

413. *Liqu. ferri sesquichlor.*
guttas 10.
Aqu. dest. 200·00,
Morph. mur. 0·05,
Syr. simpl. 15·00.
MDS. Co godzina łyżkę.

414. *Extr. Secale cornut* 2·00,
Spir. dilut.
Glycerini āā. 5·00.
DS. $\frac{1}{2}$ do jednej strzykawki podskórnie

Haematocele retrouterina.

Bezwzględny spokój, leżenie w łóżku na wznak.

Badanie miejscowe ostrożne. W czasie wzrostu guza krwawego, worek lodowy na brzuch albo przyrząd chłodzący Leiterra. Przeciw bólowi środki kojące, przyczem należy zwracać uwagę na stan niedokrewności, najlepiej podawać w czopkach:

415. *Extr. opii aquosi* 0·10,
But. Cacao q. s. ut f. l. artis supp. ad anum quinque.
DS. W razie boleści czopek (3—4 dziennie).

Dyeta płynna pożywna, środki wypróżniające. Przeciw niedokrewności środki skrzepiające, wstrzykiwania podskórne eteru albo oleum camphoratum, lewatywy ze słonej wody w stosunku 0·60:1000.

gorączka zwykle nie wysoka, nie wymaga w następnych dniach podawania środków.

Jeżeli w przypadku danym można rozpoznać jako przyczynę,

pęknięcie ciąży zamacicznej, wskazanem jest usunięcie tejże sposobami operacyjnymi.

Skoro ustanie gorączka i guz niezbyt bolesny: leczenie pobudzające wessanie, jak przy „Perimetritis.“

Po ustąpieniu guza najlepiej pozwolić powstać chorej, gdy regularność przebiegnie prawidłowo.

Następne miesiączki powinna się chora szanować.

Haematuria.

Absolutny spokój usunięcie przyczyny, o ile jest wiadomą. Zimne okłady na międzykrocze i nad spojeniem łonowem, (w razie krwotoków pęcherzowych lub cewkowych) lub na okolicę lędźwiową (w przypadkach krwotoków nerkowych). W przypadku gwałtownego krwotoku pęcherzowego, można stosować zimne lewatywy lub wprowadzić do odbytnicy mały kolpeurynter napełniony wodą lodową.

416. *Inf. Secal. corn.*
e. 3·00—8·00 ad 200,
Trae opii gtt. XX.
Syr. simpl. 20·00.

S. Co godzinę po łyżce stołowej.

417. *Extr. Secal. corn.* 1·00,
Sacchar. alb. 2·00,
Mfpulv. div. in dos. N. V.
S. Co 3—4 godziny proszek.

418. *Ergotin Bombelon*
pro injectione.
S. $\frac{1}{4}$ —1 strzykawki wstrzyknąć.

419. *Ergotin Denzel* 25·00,
Boracis 2·50,
Aqu. dest. 72·50,
Filtra!

S. Do iniekcji.

420. *Ergotin Denzel* 2·00,
Aqu. dest. 180·00.
S. Po 2—3 łyżek zażywać.

421. *Ferr. sesquichlorat.* 2'00—
4'00,

Aqu. dest. 200'00,

Syr. rubi idaei 20'00.

S. Co 2 godz. łyżkę stołową.

422. *Ferr. sulph.*

Natr. bicarb. āā. 5'00,

Extr. rad. acori q. s. f. l. a.
pil. N. 50.

S. 5—10 pigułek dziennie.

423. *Plumb. acet.* 0'30,

Opii pur. 0'10,

Eleos. citri 5'00,

Mfp. div. in dos. N. X.

S. 3—5 proszków dziennie.

424. *Tannini puri* 1'00,

Opii pur. 0'20,

Sacch. alb. 5'00,

Mfpulv. div. in dos. N. X.

S. Co 3 godz. proszek.

425. *Extr. hydrastis. canad.*

(*Parke Davis e C^o*) 30'00.

S. 3 razy dnia po 20 kropli.

426. *Hydrastininum mur.* 1'00,

Aqu. dest. 10'00—20'00.

S. $\frac{1}{2}$ —1 strzykawkę wstrzyk-
nąć.

Haemoptoe.

Bezwzględny spokój, ułożenie chorego na krzyżach w łóżku, w pokoju o miernej ciepłocie, przykryć chorego lekko.

Nie pozwolić mu się ruszać i mówić — zwolna oddychać.

Pokarmy tylko płynne, zupełnie chłodne. Wstrzymywać się od kaszlu, a jeżeli kaszel trwa, to spore dawki morfiny 1—2 etgr. na raz. Chorego nie badać. Na piersi lód w worku gumowym lub pęcherzu, połykać małe kawałki lodu. Obok tego na wewnątrz: *Plumb. aceticum* z opium aa. 0.03 na dawkę, lub też *Liqu. ferri sesquichl.* 25 kropli na $\frac{1}{2}$ szklanki wody, z tego łyżkami; lub też *Extr. Secal. cornuti. Pulv. secal. corn. aa.* 2'00 na 30 pigułek, z tego co 2 godz. pigułkę.

W cięższych krwotokach wstrzyknąć ergotynę *Bombelon* $\frac{1}{2}$ —1 strzykawkę na raz lub podać atropinę w dawce 0.0002 lub wstrzyknąć $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ strzykawkę z roztworem 0.01:10.0.

Przy podniesionej akcji serca, radzą *Inf. digitalis*, przez *Leydena* jednak przeciwwskazane.

427. *Ergot.n dialys. Bombelon*
2'00,

Aqu. dest. 20'00,

Acid. carbol. gtts. tres.

MDS. Do wstrzykiwań (1 strzykawkę *Prawatza* zawiera 1 decigr.)

427 b. *Ergotin*

Chinin. sulph. āā. 2'00,

Pulv. fol. digit.

Extr. hyosc. āā. 0'20,

Mf. pil. N. XX.

S. Co 2 godziny pigułkę.

Haemorrhois.

Należy się starać codziennie o należyte wypróżnienie przez podawanie środków lekko przeczyszczających, wodę karlsbadzką i t. p.

Gorące kąpiele nasiadowe, irygacje odbytnicy usuwają czasami cierpienie.

W niektórych znów razach, nadaje się bardzo sonda chłodząca.

Oprócz tego można próbować czopków z ergotyny, chryсорabiny, lewatyw ściągających, wstrzykiwań czystego kwasu karbolowego do guzów.

Jedynie pewnym środkiem jest tylko operacya. Guzy wypadnięte należy odprowadzić do wnętrza, jeżeli jednak już przeszły w stan zapalny lub zgorzelinowy, najlepiej ograniczyć się do posypywania proszkiem jodoformowym i okładów z octanu glinowego.

Przeciwko uporczywemu swędzeniu najskuteczniejsze są zmywania wyskokiem.

428. *Pulv. liquir comp.* 50'00.

S. Łyzeczkę wieczór zażyć.

429. *Sal. thermar. Carolinens.*
50'00.

S. Łyzeczkę w szklance letniej wody rozpuścić.

430. *Extr. secal. corn.* 2'00,
Butyr Cacao q. s. f. l. a.
supposit. N. X.

431. *Chrysarobin* 0'80,
Jodoformii 0'30,
Extr. bellad. 0'60,
Vaselin. 15'00.

Mf. ungu. S. Maść.

432. *Chrysarobin* 0'08,
Jodoform 0'02,
Extr. bellad. 0'01,
Butyr Cacao 2'00,
Glycerin. q. s. f. supposit.
Dtr. tal. dos. N. X.

433. *Chrysarobin* 0'08,
Jodoform 0'02,
Extr. bellad. 0'01,
Tannin. 0'30,
Butyr Cacao 2'00,
Glycerini q. s. f. l. a. sup-
posit.
Dtr. tal. dos. N. X.

Helminthiasis.

Zob.: *ascaris*, *oxyuris*, *taenia*.

Herpes.

H. Zoster. Pęcherzyki utrzymać aż do uschnięcia, posypując pudrem, nie robić nigdy okładów, bo te macerują przyskórek i odsłaniają warstwę skóry brodawkową. Na owrzodzenia b. bolesne przy herpes Zoster haemorrhagicus używa się maści z dodatkiem środków kojących.

434. *Cerae albae* 3'00,
Olei olivar. 10'00,
Leni igne misce adde
Extr. opii aquosi
(„ *bellad.*) 0'15.
Mf ungn. S. Maść.

W celu usunięcia bólów neuralgicznych wśród stad. prodro-

morum i wśród przebiegu choroby, w bezsenności, daje się morfin na wewnątrz, iniekcje morfinowe, chlorał, zewnętrznie plaster:

435. *Empl. de Meliloto* 25'00,
Extende supra linteam, con-
sperge pulver Laudani 2'00.
S. Plaster.

Neuralgie po herpes zostające wymagają prócz środków kojących, także środków wewnętrznych: Chinin, Solutio Fowleri.

Herpes labialis i progeneralis.

Pęcherzyki jak najtroskliwiej utrzymywać przez przysypywanie pudrem.

Herpes tonsurans.

Wskazania patrz: Favus.

Herpes tonsurans capilitii.

Przez kilka dni zapuszcza się kilka razy dziennie miejsce schorzałe oliwą karbolową 1⁰/₁₀, zmywa się cum Spir. saponato kalino i wyrывa się włosy szczypczykami. Następnie naciera się skórę rozczynelem sublimatu (0'3—0'5:100) lub weiera się plyn:

436. *Lactis sulphur.* 5'00,
Trae Rusci
Spirit. vini gallici aa. 50'00,
Glycerini 1'00.
MDS. Zewnętrznie.

Herpes tonsurans tułowia.

W postaci pęcherzykowej lub chrostkowej nie wymaga leczenia, bo się sam organizm pozbywa grzybków.

Herpes tonsurans maculosus.

Sposób Hebry:

Przez 6 dni naciera się 2 razy dziennie mydło szare, bez zmywania warstwy poprzedniej, przez następne 6 dni, pozostaje

mydło na skórze, 12-go dnia chory bierze kąpiel. Kaposi poleca wcierać przez 3 wieczory.

437. *Sapo viridis* 100·00,
Naphthol-B 4·00.

Maść ta pozostaje na skórze 8 dni, 12-go dnia kąpiel. Środek ten poleca bardzo Prof. Rosner.

Można także używać maści Wilkinsona.

438. *Ol. Rusci*

Lactis sulph. āā. 25·00,

Saponis viridi

Arungiae porci āā. 50·00.

Mf. ungu. S. Maść.

Maść tę wciera się przez 4 wieczory, pozostaje przez 4 dni a 9-go dnia daje się kąpiel.

Hordeolum zob. **Chalazeon.**

Hydrocephalus.

H. acutus. Zimne okłady, wcieranie szaruchy (po 2·0—4·0 dziennie) na głowę i kark, wewnętrznie podać Calomel (0·01—0·05 co godzinę).

Dzieciom silnym można postawić 2—4 pijawek.

W razie drgawek chloral (0·50—1·0 pro dosi). Synapizm na łydki i kark.

Leczenie krzywicy i żołądów.

H. chronicus. Leki moczopędne (*Kali aceticum*, *Juniperus*) leki przeczyszczające. Wypuszczenie wody (punkcja) nie wiele rzuca. Somma radzi leczyć działaniem słońca na głowę: codziennie 1/2 godziny do 50 minut.

Hyperaemia cerebri.

Uwzględnić przyczyny i te usuwać: nadużycia trunków, przeciążenie pracą umysłową, ucisk na szyję, grę na instrumentach dętych, wady serca, rozedma płuc i t. p.

Zimne okłady na głowę, środki przeczyszczające, dyeta.

U dzieci: Pijawki za uszami, zimne okłady na głowę, środki czyszczące (*Calomel-Rheum*, *Jalapa*), lewatywy, pryszczidla na łydki. W razie drgawek lewatywy z chloralu (0·50—1·0).

Hyperemesis gravidarum.

Zbadać dokładnie ciężarną w celu czy się nie da wykazać przyczynowe cierpienie: tyłopochylenie, tyłozgięcie ciężarnej macicy, lub inne zmiany narządu płciowego, lub innych organów jak niezbyt żołądka, białkomocz, i w takich razach leczenie przyczynowe.

W przypadkach, gdzie żadne zmiany wyraźne wykazać się nie dadzą, należy używać środków zrazu łagodniejszych, później coraz silniejszych, z tych, które bywają zalecane i tak:

439. *Mag. Bismuth* 1·50,

Natri bicarb.

Sacch. albi āā. 2·00,

Mf. pulv. div. in dos. X.

DS. 3 razy dnia proszek.

440. *Kali bromati*

Natri bromati

Ammon. bromati āā. 3·00,

Aqu. dest. 200·00,

D. in vitro. nigro.

S. Rano i wieczorem po łyżce w wodzie sodowej.

Uregulowanie i zmiana diety, picie śniadania w łożku, jedzenie z rana pokarmów ostrych j. n. p. kawałek śledzia, albo picie cognaku zaraz po przebudzeniu. Dyeta mleczna, podawanie pokarmów chłodnych, woda sodowa, wody mineralne alkaliczne, połykanie kawałeczków lodu. Kawa mrożona, lody, wino szampańskie przy jedzeniu. *Stomachica*, *Pepsyna*, kwas solny.

441. *Cerium oxalicum.*

1—2 pigulek (po 0·05) na dzień.

442. *Cerium valerianicum.*

5 pigulek po 0·05 dziennie.

443. *Cocaini muriat* 0·10,
Aqu. dest. 100·00,
 DS. Co ½ godz. pół łyżeczki.

444. *Cocaini muriatici* 0·10,
Aqu. dest. 10·00.
 DS. 3—4 razy dziennie 10—15 kropli.

445. *Menthol* 1·00,
Spiritus vini 20·00,
Aqu. dest. 150·00.
 S. Co godzinę łyżkę.

446. *Aqu. laurocer.* 10·00,
D. in l. nigra.
 S. Kilka razy dnia po 10 kropli na lodzie.

Narkotyki jak opium, morfin, chloral, jużto przez usta, już też podskórnice lub w lewatywach.

Lodowe okłady, synapizma, rozpylanie eteru na okolicę żołądka.

W cięższych przypadkach odżywianie przez odbytnicę.

Gdy te środki nie prowadzą do celu, pomazywanie części pochwowej rozczynek azotanu srebrowego (1:10) lub laseczką. Stosowanie na część pochwowa belladonna lub coćainy.

Rozszerzenie palcem szyi macicy, w sposób aseptyczny, (zabieg ten ostrożnie, gdyż grozi poronieniem).

Gdy chora nie zatrzymuje zupełnie pokarmów i zachodzi obawa o życie, wskazanem jest, wzniecenie poronienia co jednak *ex consilio* winno być postanowione.

Hyperidrosis.

Azillae, genitalium, palmae manus i lżejsze stopnie potu stóp, ustępują przy zmywaniach następującymi środkami:

447. *Tannini* 1·00,
Spirit. vini rectif. 250·00.
 DS. Zewnętrznie.

448. *Sublimati corross.* 1·00,
Aqu. dest. 400·00.
 DS. Zewnętrznie.

449. *Decoet. cort. Quercus*
 20·00 *ad* 500·00.
 DS. Zewnętrznie.

450. *Kali hypermang.* 1·00,
Aqu. dest. 400·00.
 MDS. Zewnętrznie.

W niektórych przypadkach potów rąk i stóp, robi dobre usługi zmywanie rozczynek:

451. *Naphthol* 10·00,
Spir. vini gallici 175·00,
Spir. coloniensis 25·00.

MDS. Zewnętrznie.

Obok tych środków używa się pudru, który w miejsca stykające się z sobą z watą zakładamy.

452. *Acidi Salicyl.* 5·00,
Alum. 2·00,
Acidi tannici 3·00,
Amyli tritici 90·00.

S. Pudrować stopy i posypywać obówie wewnątrz.

W wyższych stopniach potów stóp, najlepsze usługi oddaje maść Hebry, na wypranem starem płótnie rozprowadzona. Płatek namaszczonej musi dokładnie przylegać do stopy, między palce daje się waciki z maścią, w ten sposób chory po wdzianiu skarpetki na wierzch, może bez dolegliwości oddawać się zwykłym zatrudnieniom.

Po 24 godzinach zmienia się maść, bez obmywania stóp, ściera się tylko dawną maść watą.

Leczenie takie trwa 10—14 dni. Po upływie tego czasu używa się pudru.

Ze środków wewnętrznych używanych przeciw potom są następujące:

453. *Agaricini* 0·005,
Extr. et pulv. Acori q. s. ut f. pil. dtr. tal. dos. N. XII.
 DS. 3 pigułki dziennie.

454. *Atropini sulph.* 0·007,
Extr. et pulv. Liquirit q. s. ut f. pil. X.
 DS. 2 pigułki dziennie.

Z innych środków wewnętrznych, tonica, roborantia, diuretica.

Owrodzenia smarować 5% maścią resorcynową.

Hysteria.

Zwrócić uwagę na zmianę w poszczególnych organach, zwłaszcza w narządzie moczopłciowym i starać się istniejące zbroczenia usunąć.

Chorą leczyć psychicznie i starać się zyskać zaufanie. Jeżeli jest anaemia, chlorosa, to odpowiednio leczyć. U osób wynędzniałych dobre skutki daje metoda Weir-Mitchella.

W cięższych przypadkach, chorego umieścić w odpowiednim zakładzie i leczenie systematycznie przeprowadzić.

W mniej wybitnych, leczenie w zakładach wodoleczniczych, zimne nacierania, kąpiele letnie i inne procedury. Elektryzowanie prądem stałym, lub faradycznym także nieraz dobre skutki daje.

Ze środków wewnętrznych wszystkie nervina, jak asa foetida, Castoreum, Valeriana, Camphora bromata, Zincum valerianicum i wiele innych. Obok tego pobyt na wsi, w górach lub kąpielach morskich, higieniczne życie, dyeta pożywna niepodniecająca.

W ostatnich czasach polecają, zwłaszcza Francuzi, hypnozę i Suggestyę, jako czynniki lecznicze przy hysterii.

Podczas napadu hysterycznego raptowne zlanie wodą twarzy, silny prąd elektryczny, chłodna kąpiel, Chloral w lewatywie lub na wewnątrz. W razie bezsenności Sulphonal 1—2 grm. lub Chloralamid 2—3 grm. na noc.

455. Sulfonali 1—2'00,
Dtr. tal. dos. 6.

S. Na noc proszek, popić znacznie większą ilością herbaty lub rosołu.

456. Amylen hydrat. 5'00,
Aqu. dest. 60'00,
Syrup aurant. 10'00.

S. na noc połowę.

Ichthyosis.

Usunięcie twardych blaszek przyskrórkowych zapomocą tłuszczów (oliwa, tran) maści Wilkinsonsona, którą się na noc naciera razem z mydłem szarem, a rano się zmywa. Kąpiele bardzo 5% maść naftolową, którą się 1—2 razy dziennie naciera, a co 2-gi dzień mydłem naftolowym zmywa. Skoro skóra pod wpływem tych środków stanie się podatną i gładką, staramy się utrzymać ją w tym stanie, przez kąpiele i wcieranie tłuszczów obojętnych. Na wewnątrz podaje się chinin, żelazo, arsenik, Pilocarpin.

Icterus.

Leczenie powinno być przede wszystkim zastosowane do przyczyny cierpienia, (vide *Catarrhus gastro-duodenalis, Cholelithiasis, Cirrhosis hepatis, Carcinoma hepatis etc.*) Z resztą leczenie przypadkowe, w razie bólów w okolicy wątroby, okład ciepły i wstrzykiwania podskórne morfiny.

Śwędzenie skóry łagodzą ciepłe kąpiele i zmywanie 2% kwasem karbolowym.

Dyeta przeważnie mleczna i rosołowa, (unikać mięsa).

W nowszych czasach używano z dobrym skutkiem wlewania zimnej wody w 1-szym dniu na 12—13° R., w 2-gim 15—16° 3 i 4-go dnia 18—20°, w ilości 1—2 litrów. U dzieci również tak-

samo, płynu jednak nie więcej jak jeden litr.

Ileus.

Jeżeli przyczyną niedrożności jelit jest zwężenie, okręcenie, uwiąznięta przepuklina, nie wiele można się spodziewać z leczenia środkami wewnętrznymi, należy przystąpić do zabiegu operacyjnego, przedtem jednak należy przez podawanie przetworów makowca uspokoić gwałtowne ruchy jelit i zapomocą dużych lewatyw próbować przywrócić drożność. Gdy powodem niedrożności jelit jest uwiąznięta przepuklina, należy starać się ją odprowadzić (vide Hernia incarcerata). Jeżeli niedrożność jelit pochodzi z wglóbenia, udaje się często zapomocą przetworów makowca i lewatyw drożność przywrócić. W nowszych czasach polecają prócz tego, wypróżnienie żołądka zapomocą aspiratora żołądkowego.

Gdy te środki nie skutkują, nie należy długo zwlekać z zabiegiem operacyjnym.

Gdy przyczyną cierpienia jest zaparcie kału, a niema objawów zadrażnienia otrzewnej, należy podawać środki przeczyszczające w dużych dawkach, w razie przeciwnym lub, gdy środki czyszczące nie skutkują, przetwory makowca, okład lodowy na brzuch, kawałki lodu do połknięcia, zresztą leczenie przypadowe.

Impetigo vide: Eczema faciei impetiginosum.

Influenza.

W czasie epidemii zapobiegawczo brać po 0.25 chininy. Gdy choroba wybuchnie, środek przeczyszczający (Calomel 0.50 pro dosi, dzieciom 0.05—0.10). Dalej leczenie objawów, środki prze-

ciwgorączkowe. Chinina, Antipyryn, szczególnie, gdy bóle głowy zbyt silne. Natr salicylicum (zwłaszcza dzieciom).

Przeciw nieżytom oskrzeli Inf. Ipec. cum Natro et Codeina.

Starcom zaraz podać wina i środki wzmacniające.

Insolatio

Zdjęcie sukien, ochładzanie ciała, tryskanie zimną wodą. Po ocuceniu duże ilości kawy, herbaty. Kąpiel. W razie zapadu, sztuczne oddychanie, amoniak do wachania.

Intermittens.

W czasie napadu leżenie w łóżku. Podczas dreszczu, ogrzewanie, wśród gorączki chłodzenie. Przed napadem wiadomym, na 5 godzin chinina.

Częste napady wymagają zmiany miejscowości, unikania surowych owoców.

457. Chinin muriatici 0.50,
Dtur. tal. dos. N. V.

S. Przed napadem proszek.

Przez kilka dni chociażby napad się nie powtórzył, rano i wieczór po proszku.

Jeżeli chory chininę wymiotuje, można ją dać w lewatywie z krochmalem lub:

458. Chinini muriat. 0.50,
Glycerin.

Aqu. dest. āā. 2.00,
(Disp. sine acido).

S. Wstrzyknąć pod skórę.

Przy dłuższem trwaniu:

459. Decoct. cort. chinæ
e 10.00 ad 180.00,

Sol. arsen. Fowleri 1.00,
Syrup Sacchari 20.00.

MDS. 4 łyżki dziennie.

460. Sol. arsen. Fowleri 5.00,
Trae chinæ comp. 15.00.

S. Rano i wieczór po 5 kropli. postępować co dzień o jedną kroplę, aż do 20-tu.

Dzieciom :

Chinini muriat. 0'30—0'50.

Jeżeli wymiotują dać w lewatywie lub czopkach.

461. *Chinin muriatici* 0'25,

Butyri Cacao 0'50,

Mf. supposit dtur. tal. N. IV.

S. Przed napadem na 3 godz. czopek, a później, po jednym przez kilka dni.

462. *Chinin tannici*

Sacchari āā. 2'00,

Mfp. div. in dos. N. VI.

DS. 3 proszki dziennie, co godzinę jeden.

463. *Chinini muriat.* 0'50,

Acid. tartar. 0'30,

Syrup simpl. 60'00.

DS. 2 lub 3 łyżeczki w małej ilości czarnej kawy parę razy dziennie.

464. *Trae Helianthi* 1'00,

Aqu. dest. 5'00.

DS. 3 razy dziennie po 10—20 kropli.

465. *Sol. arsen. Pearsoni*

Trae chinae āā. 5'00.

MDS. 3 razy dziennie po 2—3 kropli.

Intertrigo.

Utrzymywanie czystości skóry i przed zamoczeniem chronić.

Dzieciom tłustym pudrować we fałdach skóry.

466. *Acidi Salicyl.* 0'50,

Alum. plumosi

Amyli āā. 25'00.

Mfp. S. Puder.

467. *Kali sozojodolici* 5'00,

Talci 50'00.

Mfp. S. Puder.

Zakładać we fałdy skóry płatki posmarowane jedną z poniżej podanych maści. Kąpiele letnie na 26° z dodatkiem otrąb lub Bolus alba (50—100).

W przypadkach uporczywych z dodatkiem Sublimatu (0'50).

Na częściach płciowych i odbytnicy pedzłowanie Sublimatem (0'50:100 aquae).

468. *Acidi borici* 0'50,

Lanolin 50'00,

Vaselin 10'00.

Mf. ungu. S. Przed posmarowaniem oczyścić skórę.

469. *Acidi salicyl.* 0'20,

Lanolin 20'00.

Mf. Unguentum.

470. *Ichtyoli* 0'30,

Lanolin 30'00.

Mf. Unguentum.

471. *Cocain oleinici* 0'50,

Lanolin 18'00,

Ol. olivar. 2'00.

Mf. Ungu. S. W razie silnego świądu posmarować.

Przed smarowaniem maści oczyścić skórę z resztek proszków lub maści, maść 2 razy dziennie nakładać.

Do zmywań.

472. *Aqu. Plumbi*

Aqu. boric. 5⁰/₁₀ āā. 100'00.

DS. Zewnętrznie.

Iritis.

Zapalenie tęczówki występuje w następujących formach: Iritis plastica, serosa, suppurativa, lub forma mieszana z dwóch poprzednich.

Leczenie jest następujące:

1) Zapuszczanie atropinu z początku co 2 godziny, aż osiągnie się maksymalne rozszerzenie źrenicy, a obecne tylne przyczepiny ulegną rozerwaniu.

Przy Iritis plastica, dobrze jest zapuszczać atropin z Cocainą w celu rozerwania synechii, po tem zaś sam atropin, który w dalszym przebiegu choroby 3 razy dziennie zapuszczać należy, a po ustąpieniu choroby jeszcze przez 3 tygodnie raz dziennie.

Iritis serosa wymaga od początku tylko 2 razy dziennie as

tropinu i badania napięcia ocznego.

2) Ciemny pokój, lekko przeczyszczające środki, przebywanie dużo w łóżku, lekkie wieczorne poty.

W razie bólów w nocy, iniekcya morfiny w skroń.

3) Ciepłe okłady wilgotne z mąki siemienia lnianego, robione przez cały dzień, wpływają lecząco na chorobę i kojąco na bóle; wcieranie maści belladonowej w skroń co 2 godziny w razie bólów.

4) Uwzględnienie przyczyny: Syfilis, wcieranie Ungu. cin. systematycznie przeprowadzone. Rheum, Natr salicylicum wewnątrznie; diabetes: sól karlsbadzka; przy żołądach: jod.

Jeżeli źrenica mimo energicznego atropinizowania rozszerzyć się nie chce, postawić na skroń 4—5 pijawek.

473. *Atropini sulph.* 0.05,
Cocaini muriat. 0.10,
Aqu. dest. 5.00.

MDS. Atropina do oka. Zakraplacz.

474. *Atropini sulph.* 0.05,
Aqu. dest. 5.00.

DS. Atropina do oka.

475. *Morphii muriat.* 0.10,
Aqu. dest. 10.00.

DS. Morfina 1% do iniekcji podskórnych — do rąk lekarza.

476. *Ung. hydrarg. cin.* 15.00,
Extr. belladonnae 2.00.

MDS. Maść belladonowa na czoło.

477. *Ung. hydrarg. cin.* 30.00,
Div. in p. aequ. N. X.

DS. Szara maść do wcierań.

478. *Kali chlorici* 10.00,
Aqu. dest. 500.00.

DS. Płukanie do ust.

479. *Natri salicyl.* 10.00,
Aqu. dest. 200.00.

DS. 2 łyżki dziennie.

480. *Natri jodati* 8.00,
Aqu. dest. 200.00.

D. in v. n.

DS. 2 łyżki dziennie.

481. *Farinae sem Lini* 100.00.

DS. Mączka do okładów.

Dla dzieci:

482. *Natr. jodati* 4.00,
Aqu. dest. 200.00.

D. in v. n.

DS. 2 łyżeczki dziennie z mlekiem słodkiem.

Ischias.

Przyczynę wynaleść i takową usunąć.

Jeżeli na tle malaryi, to chininę, arsen; jeżeli wskutek zaziębienia: kąpiele ciepłe, łaźnia parowa, leżenie w łóżku, ciepłe utrzymywanie nóg, środki odwodzące, wzdluż nerwu kulszowego, jak: suche bańki, Tinct jodi, synapizma, vesicatoria, obok tego massage, prąd elektryczny stały (anoda na miejsce bolesne), rozpylanie eteru przyrządem Richardsona, na wewnątrz antypi ynę, Natr. Salicylicum, phenacetynę, antifebrinę, salol, betol, kali jodatum w dawkach kilkagramowych dziennie.

W razie silnych bólów iniekcye morfiny. Można też wstrzykiwać:

483. *Acid. hyperosmici* 0.10,
Aqu. dest. 10.00.

S. $\frac{1}{4}$ strzykawki Prawatza.

Jeżeli neuralgia się zmniejszy i chorego można wysłać do kąpiel to: Swoszowice, Krzeszowice, Lubień, Cieplice czeskie, Trenczyn, Piszczany, Busk.

W przypadkach ciężkich uciec się można do naciągania nerwu.

484. *Antipyrin.*

Chinini muriat. āā. 0.50.

S. 3 proszki dziennie.

485. *Betoli* 3'00—5'00,
Sacchari 3'00,
Mfp. div. in dos. N. X.
 S. 4 proszki dziennie.

486. *Salol* 0'50—1'00,
Sacchari 0'25,
Dtr. in capsul. amylac.
 S. 3 proszki dziennie.

Kephalhaematoma.

Pokryciem z waty chronić guz od urazów. Nie robić nacięć, tylko w razie ropienia.

Keratitis.

1) Zapalenie rogówki ropne (Keratitis suppurativa).

W lżejszych przypadkach leczenie ambulatoryjne: Przepłukanie raz dziennie worka spojówkowego rozczynek sublimatu 1:5000'00 zasypanie drobno-miałkowego jodoformu i założenie opaski. Procedurę tę powtarzać co dzień, aż do zupełnego wyleczenia.

W cięższych przypadkach przepłukiwania sublimatem co 2 godziny, jodoform, atropin 1% kilka razy dziennie i ciepłe wilgotne okłady z siemienia lnianego (zob. Iritis) na noc opaska, ciemny pokój i łóżko.

Skoro powyższe leczenie zawodzi, wypalenie części rogówki nacieklonych ropą, a więc żółtawo zabarwionych, galvano- lub termokauterem, lub też keratotomia Saemisch. Po wyleczeniu należy dłuższy czas jeszcze nosić opaskę.

W razie obecności ciała obcego w rogówce, wydobycie tegoż bezzwłoczne.

2) Zapalen. rogówki miazszowe (Keratitis parenchymatosa diffusa).

W okresie 1-szym progressy (zaćmienia zwiąszają się, nastrzykanie rzaskowe, powierzchowna rogówki jakby drobno pokłuta, światłowstręt i łzawienie)

nie można używać środków drażniących i jedynie ciemne, dynamiczne okulary litera C., zapuszczanie atropinu 3 razy dziennie (zob. Iritis), zasypywanie bardzo małej ilości jodoformu raz dziennie. Zakazać pracy oczyma, ograniczenie ilości światła, jednak nie zamykanie w ciemnym pokoju. Jod wewnętrznie lub w razie nabytej kiły wcieranie Ungu. ciner. à 3'00 (zob. Iritis) są wskazane, a przy tem jak najlepsze łatwo strawne a niepodniecające odżywianie.

W okresie 2-gim (objawy zdrażnienia i zaczerwienienia oka zupełnie ustąpiły, zaćmienie rogówki od obwodu zaczyna ustępować, rogówka na powierzchni gładka) przejść należy do środków lekko drażniących, raz dziennie zaczynając od Calomelu i zmieniając co jakiś czas (zob. Maculae corneae).

3) Keratitis phlyctenulosa (zob. Conjunct. phlyctenulosa).

Zapalenie rogówki występujące, jako następstwo cierpienia spojówek (Trachoma, Phlycteny, Ulcus corneae catarrhalis, Blepharorrhoea) wymagają głównie przyczynowego leczenia i są w odnośnych rozdziałach uwzględnione.

Laryngitis acuta.

Pobyt w dobrze przewietrzonym mieszkaniu, najmniej mówić, co, 6 godzin okład wysychający. Środki napotne (herbata lipowa, lemoniada). Woda Szezwnicka, Selterska z mlekiem. W celu zmniejszenia kaszlu narcotica. W razie silniejszego zapalenia środki przeczyszczające, okłady lodowe, pigułki z lodu, synapizm na szyję.

487. *Dct. alth. e* 10'00 ad 200'00,
Morphii mur. 0'05,
Syrup Sacchari 20'00.
 DS. Co 2 godz. łyżkę.

- 488.** *Natri benzoic.* 15'00,
Syrup terebinth. 50'00.
Syrup tolutan. 15'00.
 MDS. Co 2 godz. łyżkę.
- 489.** *Sal. ammoniaci* 5'00,
Aqu. dest. 500'00.
 S. Do inhalacyi.
- 490.** *Natri borici* 10'00,
Aqu. dest. 500'00.
 S. Do inhalacyi.
- 491.** *Natri bicarb.*
Natr. chlorat. āā. 5'00,
Aqu. dest. 500'00.
 S. Do inhalacyi.
- 492.** *Aqu. lauroc.* 5'00,
Spir. vini rectif. 50'00—100'00.
 S. Łyżeczkę do inhalacyi.
- 493.** *Acid. carbol.* 0'50—1'00,
Cocain hydrochl. 0'25,
Glycerin 50'00,
Aq. 450'00.
 S. Do inhalacyi 3 razy dzien.
 U dzieci zob. Pseudocroup.

Laryngitis chronica.

Wzbronić nadużywania głosu, wychodzenia wśród niepogody, palenia tytoniu, używania napojów wysokowych. Polecieć w razie zoiżów kąpiele słone (w domu), pobyt w okolicach górzystych i lesistych, zwłaszcza gruzliczym, a również picie mleka, żetycy, kefiru.

Otyłym zalecieć picie wody Karlsbadzkiej, Marienbadzkiej.

W razie podrażnienia do kaszlu, duszności: narcotica.

- 494.** *Ammon. muriat.*
Succi liquor āā. 5'00,
Aqu. dest. 120'00,
Morph. mur. 0'03.
 S. Co 2 godz. łyżkę.
- 495.** *Zinci sulphur.* 1'00,
Aqu. dest. 500'00.
 S. Inhalatio.
- 496.** *Alumin crudi* 5'00.
Aqu. dest. 500'00.
 S. Inhalatio.

- 497.** *Tannin.* 3'00—5'00,
Spir. vini rectif. 50'00,
Aqu. dest. 500'00.
 S. Inhalatio.
- 498.** *Ol. Juniperi*
Ol. Terebinth. āā. 10'00.
 S. Po 10—20 kropli do inhalacyi.
- 499.** *Ol. pini pumilion.*
Ol. juniperi āā. 10'00.
 S. Po 10—20 kropli do wziewania.
 Do wdmuchiwania:
Alum. crud.
Tannin. pur.
 Pędzlowania:
- 500.** *Argent. nitr.* 1'00—5'00,
Aqu. dest. 50'00.
 S. Do Pędzlowania.
- 501.** *Zinci sulphur.* 2'00,
Aqu. dest. 20'00.
 S. Do pędzlowań.
- 502.** *Jodi puri* 0'50,
Kali iod. 1'00,
Glycerin 50'00.
 S. Do pędzlowań.

Laryngitis crouposa.

W początku niezytu, czem się dławiec rozpoczyna, dać dziecko do łózka i stosować środki wykrztuśne, w połączeniu z Kali chloricum, Kali carbonicum. W celu zachowania sił dziecka dać pożywną dyetę — skrobane mięso, jaja, winną polewkę, mleko z herbatą, cognakiem.

Nie używać ani upustu krwi, ani pijawek, pryszczycydel, ani środków wymiotnych! Lekkie środki przeczyszczające.

Aby zapobiedz wytwarzaniu się błon, zimne okłady na szyję, połykanie lodu lub lodów. Inhalacye z aparatu Siegla, już to z wody wapiennej, już to z podanych niżej środków, z początku co 3 godziny.

Obok tego improwizowana parówka t. j. okrywa się pewną małą przestrzeń pokoju przesćcieradłami szczelnie. W takiej budce trzyma ktoś dziecko, aby wdychało parę, zrobioną przez puszczenie rozpalonego żelaza do wody w naczyniu na podłożu stojącym — powtórzyć parę razy dziennie.

W celu pobudzenia do rychlejszego odrywania się błon, robi się wcierania z szaruchy 3 razy dziennie, a to można połączyć z mięsieniem krtani. Podawanie dużo napojów. Inhalacje częste, w pokoju utrzymywać dużo pary.

W razie silnej gorączki chinina, po 0·20—0·30 jużto w proszkach, w roztworze do wewnątrz, jużto w lewatywie, dawszy poprzednio lewatywę odczyszczającą. Gdy występują objawy ścieśnienia krtani, (stenosis) przy czem i błony zaczynają się odrywać, dawać środki wykrztuśne.

W razie upadku sił: wino, cognac, czarna kawa z rumem, kamfora. Jeżeli przy wdechu i wydechu słycać rżżenia z odrywających się błon, wtenczas można dać środek wymiotny.

Gdy się jednak ścieśnienie krtani wzmaga, występuje zapadanie dołków nadobojczykowych, zaciąganie się dołka podsercowego, bezgłos i napady duszności — nie zwlekać z wykonaniem Tracheotomii lub intubacji.

503. *Inf. ipecac. e 0·20 ad 80·00,*
Kali chlorici 1·00,
Syrup rubid. 20·00.
MDS. Co godz. łyżeczkę.

504. *Ungu. hydrgr. ciner.*
Lanolin āā. 6·00,
Mfung. div. in dos. N. VI.
S. 3 razy dnia po jednej sztuce wetrzeć w szyję.

505. *Ammon. muriatici 1·00,*
Aqu. dest. 200·00.
DS. Do inhalacji.

506. *Acidi lactici 2·00,*
Aqu. dest. 300·00.
DS. Do inhalacji.

507. *Sublim. corrosivi 0·05,*
Aqu. dest. 300·00.
DS. Do inhalacji.

Używa się również do inhalacji:

Kali chlorici 2⁰/₁₀, Acid. borici 2⁰/₁₀, Resorcini 1⁰/₁₀.

508. *Infus. ipecac. e 0·20 ad 100·00,*
Pilocarp. muriat. 0·01,
Syr. Rubi idaei 15·00.
MDS. Co pół godziny łyżeczkę.

509. *Inf. Senegae e 3·00 ad 80·00,*
Liquor amon. anisati 1·00,
Syrup simpl. 15·00.
MDS. Co godz. łyżeczkę.

510. *Inf. ipecac.*
e. 1·00 ad 50·00,
Tart. emetic. 0·05,
Syrup rubid. 10·00.
MDS. Co 5 minut łyżeczkę aż do wymiot.

Leukaemia.

Przyczyna niewiadoma. Leczenie prawie zawsze bez skutku.

Podawać należy chininę z żelazem, lub z dodatkiem arszeniku. Po dłuższym użyciu zmienić na ol. eucalyptusowy i piperynę, lub polecić pić wodę Levico lub Rencegno.

Próbowano robić wstrzykiwania do mięszu śledziony.

Ergotyny 0·50—1·0, lub Sol. arsen. Fowleri. Żywić chorego forsonnie, pobyt na świeżem powietrzu, mierny ruch, zresztą leczenie symptomatyczne.

- 511.** *Piperini* 5'00,
Ol. eucalypti e foliis rec.
 10'00,
Chinin muriat. 4'00,
Extr. et pulv. liquir. g. s. ut
f. pil. N. 100.
 S. 4—8 pigulek dziennie.

- 512.** *Trae eucalypti* 50'00.
 DS. 2—3 łyżeczki na dzień.

Lichen scrophulosorum.

Poprawienie odżywienia, pobyt na świeżem powietrzu, suche mieszkanie, wewnątrznie tran.

- 513.** *Jodi puri* 0'10,
Olei jecoris aselli 150'00.
 MDS. Rano i wieczór łyżkę.

W celu szybszego ustąpienia wysypki, naciera się skórę 2—3 razy dziennie tranem i układa się pacyenta między kocami wełnianymi.

Lichen ruber.

Jedynym środkiem usuwającym tę chorobę jest arsenik, który należy podawać przez 6—9 miesięcy, by zapobiedz nawrotowi choroby.

- 514.** *Pillularum arsenic. asiaticarum Hebrae* N. 100.

DS. Z początku 3 pigułki dziennie, co 4-ty dzień podwyższa się dawkę dzienną o jedną pigułkę, dochodząc do 8 nawet do 10 dziennie, trzymamy się tej ilości dotąd, dopóki sprawa w znaczniejszej części nie ustąpi, następnie schodzi się do 6 pigulek dziennie, które się przez 3—4 miesięcy używa.

Szybciej działają lecz od reedywy nie zabezpieczają:

- 515.** *Solut. arsen. Fowleri* 4'00,
Aqu. dest. 20'00,
Acid. carbolicum 0'40.

DS. Co 2-gi dzień wstrzyknąć całą strzykawkę Prawaza —

Unna podaje maść, którą się 2 razy dziennie wciera:

- 516.** *Sublimati corrosivi* 0'10,
Acid. carbol. 2'00,
Unguenti Hebrae 50'00.
 Mf. ungu. S. Maść.

W razie swędzenia używa się kąpeli siarczanych, sodowych i naciera się skórę płynem:

- 517.** *Acid. salicyl.* 2'00,
Spirit. vini gallici 100'00,
Glycerini 6'00.

Następnie posypuje się pudrem.

Lupus vulgaris.

Dopóki lupus występuje w formie plam lub guzków odosobnionych wystarcza wypalenie c. nitrate argenti in substantia, guziczek przebija się aż do tkanki łącznej zdrowej.

Jeżeli już są wystające rozleglejsze nacieki: wyłyżeczkowanie i wypalenie Pacquelinem, lub gdy naciek bardzo znaczny, przykłada się przez 8—10 dni maść pyrogallusową 10% tak, by maść dniem i nocą stykała się z naciekiem, lub używa się emplastrum hydrargyri.

Iniekcye limfy Kocha z początku w ilości (0'001). Chory musi być w tym razie pod ścisłą obserwacją lekarza.

Lupus erythematosus.

Poprawienie odżywienia (tran, żelazo, arsenik).

Miejscowo: zmywanie codziennie c. spiritu saponato kalino, na noc emplastrum hydrargyri.

Lymphangioitis.

Usunięcie przyczyny (otwarcie ropnia, oczyszczenie rany pierwotnej, zdjęcie strupa, pod którym się ropa zatrzymuje i t. p.). Na część zajętą chorobą, okłady wysychające z octanu glinowego. Dyeta pożywna, wyskok w znaczniejszej ilości.

518. *Alum. crud.* 40'00,
Plumb. acet. 70'00,
Aqu. dest. 600'00.
Filtra!

S. Do okładów.

Lymphoma.

W pierwszym rzędzie leczenie przyczynowe (*serophulosis*, *pseudoleukaemia* i t. p.).

Na zewnątrz z początku wypada stosować maść jodową a w razie nieskuteczności tejże, zwłaszcza jeżeli gruczoły okazują dążność do ropienia, najlepiej takowe wyluszczyć lub wyskrobać ostrą łyżką. W przypadkach t. zw. *lymphoma malignum* najskuteczniejszym jest leczenie zapomocą przetworów arsenu.

Na wewnątrz należy podawać *Sol. arsen.* *Fowleri* lub wody arsen zawierające (*Ronecgn.*, *Levico*, *Srebrenica*), do mięszu zaś gruczołów wstrzykiwać codziennie po kilka kropli *Sol. arsen.* *Fowleri*. W niektórych przypadkach, w których arsen zawodzi, działają bardzo dobrze wstrzykiwania kwasu nadosmowego.

519. *Sol. ars. Fowleri*
Trae ferr. pom. āā. 10'00.

S. Codziennie przed obiadem od 2 kropli począwszy o 2 krople wzmagać dawkę aż do 50 a potem znów o 2 krople codziennie zmniejszać.

520. *Sol. ars. Fowleri* 10'00.

S. Do wstrzykiwań.

521. *Ac. hyperosmic.* 0'10.
Aqu. dest. 10'00,
D. in vitro nigro.

S. Do wstrzykiwań.

522. *Jodol* 5'00,
Vaselin 50'00.

Mf. ungu. S. Maść.

Lyssa.

Rany nie wysysać! Wyciąć okolice miejsca ukąszonego, przyżęgać rozpalonem żelazem lub kali caustic., lub acid. carbol. pur., oraz dobrze opatrzyć. Gdy wścieklizna wybuchnie, można próbować wstrzyknięcia *Curary*.

523. *Curare* 0'20,
Aqu. dest. 5'00,
Acid. mur. gttam.

MDS. Na 5 wstrzyknięć.

Chloral, *morfina* podskórnie użyta, *chloroformowanie* służą do uspokojenia.

Maculae corneae.

Plamki rogówkowe są to większe lub mniejsze zaćmienia po przebytem zapaleniu.

W celu wyjaśnienia stosować środki lekko drażniące (raz na dzień) zaczynając od *kalomelu* i zmieniać je co kilkanaście dni.

524. *Calomelanos v. h. p. et subtiliss. pulv.* 10'00.

DS. Proszek oczny, pędzelek.

525. *Praecip. flavi vel albi* 0'20,
Vasel. fl. 4'00.

DS. Maść. Wprowadzić pędzelkiem za powieki i lekko masować przez powieki palcem.

526. *Trae Opii crocati* 5'00.

DS. Krople oczne, zakraplacz.

527. *Ol. therebint. rectific.*

Glycerini āā. 5'00.

MDS. Krople oczne (środek *Dondersa*).

Malleus.

Zmianę pierwotną wycina się i wypala kwasem azotowym, przy nacieku miękkiem stosuje się szaruchę i okłady ciepłe z płynu *Burowa*, jeżeli naciek zbity robi się głębokie naciecia. Na wewnątrz spore ilości *alkoholu*, *chinina*.

Mania

Odosobnienie chorego, spokój bowiem zabezpiecza chorego i otoczenie. Dyeta pożywna mięsna.

Tylko w razie silnego podrażnienia mózgu (zrywań, zgrzytania zębami, przy zwięzieniu źrenic) można stawiać pijawki i podać środki przeczyszczające. Kąpiel, lodowe okłady. Jeżeli przeważa podrażnienie płciowe Kali bromatum 4—10:0. Jeżeli mania skutkiem opilstwa: morfina, opium.

Przy objawach anaemii mózgu wino, piwo, chlorał.

Mastitis.

Uniesienie piersi na chustec lub bandażem, okłady z liquor alum acetici, wcierać maść belladonową.

Dyeta skąpsza, środki przeczyszczające, wody gorzkie: Hunyady Janos — a silniejsze czyszcze tylko wtedy, gdyby zaprzestano karmienia. Jeżeli chębotanie wybitne: przecięcie i opatrunek aseptyczny.

Melancholia.

Największy spokój, położyć chorego do łóżka.

Czuwać aby chory sobie lub otoczeniu szkody nie zrobił. Dyeta pożywna, w razie potrzeby sztuczne karmienie. Środki nasenne, opium, sulfonal, letnia kąpiel 26—28 R.

528. *Sulfonal* 1:00,

Dtur. tal. dos. N. V.

S. Na noc proszek w gorącym mleku lub rosole.

Mastodynia.

Podwiązanie gruczołu, obłożycie poprzecznie watą. Wstrzykiwanie morfiny w okolicę bolesną.

529. *Chloroformii* 5:00,
Ol. camphorati 15:00,
Mf. liniment.

DS. Do wcierań.

Meningitis cerebro-spinalis epidem.

Leczenie objawów. Lód na głowę i na kark; pijawki, bańki wzdłuż kręgosłupa. Wcierać szaruchy. Wstrzykiwanie morfiny, chlorał i natrum bromatum. Natrum jodatum (1—2 gramów dziennie). Przeciw gorączce: Antipyrina, wobec obrzęku stawów acid. Salicyl.

Przeciw wymiotom pigułki lodowe, Cocain. muriatic. (1:10, po 5 kropli).

Meningitis simplex.

Zimne okłady na głowę, wcierać szaruchy (2:00—4:00) w tyłogłowie i kark. Do wewnątrz Calomel (0:01—0:03 co godzinę), pryszczycła — starszym dzieciom i silnym można postawić pijawki. W razie drgawek chlorał w lewatywach. Przeciw wymiotom pigułki lodowe. Po uspokojeniu unikać gwaru, rażącego światła; dyeta z początku ścisła, później pożywna.

Przetwory jodowe, Natrum jodatum 1% co 2 godziny łyżeczkę, wcierać 10% maści jodoform.

Meningitis tuberculosa.

Jeżeli dzieci chudną, gruczoły obrzmiewają dawać chinę z żelazem i wcierać jod w gruczoły. Gdy choroba wybuchnie, leczenie według objawów. W pierwszych chwilach przeciw podrażnieniu mózgu natr. bromat. (1—2 gm. pro die) zimne okłady na głowę. Pokój zaciemnić. Lewatywy i środki przeczyszczające. Pokarmy podawać często w małych ilościach. Baczość na oddawanie moczu.

530. *Calomelanos* 0'30—0'50,
Sacchari 2'00,
Mfp. div. in dos. N. 10.
 DS. Co 2 godz. proszek.

531. *Kali v. Natr. jodat.* 1'00
 —2'00,
Aqu. dest. 100'00,
Syrup Sacchari 20'00.
 MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

532. *Natri bromati* 1'00—2'00,
Aqu. dest. 100'00,
Syrup Sacch. 20'00.
 MDS. Co 2 godz. 2 łyżeczki.

W razie wielkiego rozdrażnienia lub drgawek:

533. *Chloralhydrat.* 1'00,
Natri bromat. 1'00,
Aqu. dest. 80'00,
Syrup rubid. 20'00.
 MDS. Co godz. łyżeczkę.

534. *Urethani* 1'50,
Natri brom. 0'50,
Aqu. dest. 100'00,
Syrup simpl. 15'00.
 MDS. Co godzinę łyżeczkę.

535. *Jodoformii* 2'00,
Lanolin
Vaselin āā. 10'00.

Mf. ungu. DS. Wcierać na tyłogłowie.

Po obcięciu włosów przy skórze posmarowawszy przykryć cienką ceratką.

Metritis.

W przypadkach ostrego zapalenia macicy: spokojne leżenie w łóżku, u osób silnych kilka pijawek na okolicę podbrzusza, zimne okłady, worek lodowy. Scarificatio części pochwowej macicy.

Środki solne wypróżniające. W razie bóleści maść:

536. *Extr. bellad.* 2'00,
Vasellini flavi 30'00.

Mf. ungu. DS. Zewnątrznie.

537. *Extr. opii aquosi* 0'10,
But. Cacao q. s. ut f. l. artis suppositoria ad anum N. V.
 DS. Co 3—4 godz. czopek.

Po ustaniu bólów, okłady wysychające na brzuch zamiast lodu.

W przypadkach przewlekłego zapalenia: unikanie pracy fizycznej natężającej, gwałtownego spółkowania, uregulowanie stolca (środki solne, Cascara Sagrada, Hunyady Janos).

U niedokrewnych podawanie żelaza. Jeżeli równocześnie miesiaczkowanie zbyt obfite:

538. *Extr. Hydrastis Canad. fabricationis Parke et Davis*
 40'00.

D. in l. guttatoria.

S. 3 razy dnia po 20 kropel.

Leczenie miejscowe: pomazywanie części pochwowej we wzierniku co 2—3 dni cum Trajodi, albo Ichthyolem. Tampony w przypadkach świeżych.

539. *Ammon. sulpho ichthyol.*
 5'00,

Glycerini 200'00.

DS. Do tamponów lub

540. *Kali jodati* 5'00,
Glycerini 100'00.

D. in v. nigro.

S. Do tamponów.

Nakłuwanie co kilka dni części pochwowej we wzierniku, massage.

W przypadkach zastarzałych Amputatio portionis vaginalis.

Nadto w porze letniej, w przypadkach świeżych, gdy powiększenie macicy znaczne, leczenie kąpielowo zdrojowe: Iwonicz, Rabka, Ciechocinek, Rymanów. W późniejszych okresach: Krynica, kąpiele morskie.

Metrorrhagia.

Dokładne wykazanie przyczyny krwotoku.

W przypadkach krwotoku porodowego z macicy, jeżeli przyczyną złe kurczenie się tejże: nacieranie dna macicy przez powłoki brzuszne ręką, okłady zimne na brzuch, Secale cornutum przez usta, w lewatywie lub podskórnie. Wstrzykiwania gorące na 40°. Uciskanie macicy dwuręczne.

Jeżeli przyczyną są pozostałe części łożyska, błon, skrępy: usunięcie dokładne tychże.

W przypadkach pęknięcia ujścia zewnętrznego macicy: tamowanie miejscowe krwawienia przez podwiązanie, ucisk, tamponadę, zeszyście pęknięcia.

Jeżeli przyczyną — nowotwory macicy — usunięcie tychże sposobem operacyjnym, a na razie podezas krwotoku tamponada pochwy po przestrzyknięciu tejże rozczyntem środka przeciwnilnego j. n. p. 2% rozczynt kw. karbol.; 1:2000—4000 rozczynt sublimatu i t. d. Do tamponowania najlepiej użyć kulek waty oczyszczonej zamoczonej w glicerynie, pierwsze kulki owinąć gazą jodoformową.

W przypadkach gwałtownych wstrzyknięcie do jamy macicy rozczyntu Liquor ferri sesquichlor. strzykawką Madurowicza lub Brauna, przyczem warunek konieczny, aby kanał macicy był dostatecznie drożny, aby rozczynt mógł przez szyję macicy do pochwy spływać. (Postępowanie obosiecznie ze względu na możebność dostania się rozczyntu do jamy brzucha).

Równocześnie zwalczanie powstającej ostrej niedokrewności: ułożenie spokojne, poziome, ciepłe okłady na głowę, chłodne napoje, wino, kawa czarna, cognac, rum, Tinct, cinam, Tra ferri acet. aeth. Wstrzykiwania podskórne eteru, ol. camphoratum, wstrzykiwania podskórne

większych ilości rozczyntu soli kuchennej 0.6:1000; lewatywy z tegoż rozczyntu.

Bandaże na kończyny, ucisk na tętnicę główną przez powłoki brzuszne.

Migraena.

Uwzględnić: ogólne osłabienie, choroby nerwów, chor. narządów trawienia, zbożenia płciowe. W czasie napadu spokój. Masowanie czoła i skroni (można użyć maści z mentholem lub cocaineą). Smarowanie przęcikiem z mentholu.

541. *Chinin. muriat.* 0.25,
Coffeini natro salic. 0.10,
Sacchari 0.20,
Mfp. dtur. tal. dos. N. 10.
DS. W czasie napadu co godzinę proszek (użyć 2 lub 3).

542. *Antipyrin* 0.50,
Dtur. tal. dos. N. 10.
DS. Jak wyżej.

543. *Phenacetin* 0.50,
Chinin. 0.20,
Mfp. dtr. tal. dos. N. 10.
S. Jak wyżej.

544. *Natri Salicyl.* 0.50,
Dtur. tal. dos. N. 10.
DS. Jak wyżej.

545. *Coffeini citrici* 1.00,
Phenacetin 2.00,
Sacchari 1.00,
Mfp. div. in dos. N. 10.
DS. Co 2 godziny proszek.

Podskórne zastrzyknięcie Ergotyny (Bombellon) 0.25. Chlorałhydrat 1—2 gram. w lewatywie.

Do dalszego leczenia można użyć:

546. *Chinin. muriat.* 5.00,
Pulv. fol. digital. 1.50,
Extr. gent. et pulv. q. s.
f. pil. N. 30.
DS. Na noc pigułkę.

547. *Solut. arsen. Fowleri* 5'00,
Trae ferri pomat. 10'00.
 MDS. Rano i wieczór po 5 do
 10 kropli.

548. *Ammon. bromati* 1'00,
Kali bromati
Natri bromati āā. 2'00,
Aqu. dest. 180'00,
Syr. aurant. 20'00.

MDS. 3 razy dziennie łyżkę.

Morbili. Odra, Kur.

Niemowleta i chorowite dzieci oddzielić. Jeżeli przebieg prawidłowy nie trzeba uciekać się do lekarstw. Pokój ostrożnie przewietrzać, ciepłota od 15—16° R. okrycie średnio ciepłe, lekkie przysłonięcie okien, jeżeli jest światłowstręt.

Dyeta w czasie gorączki ścisła, po jej przebyciu pożywna, za napój lekkie kwaski, lub wody (szczawowy alkaliczne). Dopóki trwa łuszczenie nie wypuszczać dzieci z łóżka mniej więcej 8—14 dni nie wypuszczać z pokoju, zwłaszcza, gdy są objawy nieżyty.

Przeciw nieżyto wi spojówek wystarczają przemywania 2^o/₀ kw. borowego. Silny świąd uspakaja się nacieraniem tłuszczami. Silny kaszel wymaga podania naparu ipecac. ze środkami narkotycznymi, wzięwania pary wodnej, napoje ciepłe, odwar ślazu i t. p. W razie biegunki dyeta i opium.

Wysokie gorączki i majaczenia, uśmierzać zimnemi okładami na głowę. Chinina — antypyryna, Natr. salicylicum.

Wśród upadku sił, stygnięcia kończyn: wino, cognac, camphora, Acid. benzoicum.

Przeciw drgawkom: Chloral w lewatywach (0'50:50) kali bromatum (2:100) co godzinę łyżeczkę.

Jeżeli gorączka przewleka się ponad 4 dni, zwrócić uwagę na przelyk, uszy i nerki.

Powikłania: błonica, dławiec, nieżyt oskrzeli, zapalenie płuc, leczyć według wskazówek odpowiednio podanych.

549. *Codeini phosphor.* 0'02,
Linctus gummosi 50'00,
Syrup Altheae 30'00.

MDS. Co 2 godziny łyżeczkę w razie silnego kaszlu.

550. *Infus. ipecac. e* 0'20 *ad*
 100'00,
Tinct. laudani gttss. duas.
Liquor ammon. anisat. 1'00,
Syrup althae 20'00.

MDS. Co godzinę łyżeczkę.

Morbus Basedowi.

Regularne, higieniczne życie, unikanie zmęczenia fizycznego i umysłowego, wstrzymanie się od nadużywania a nawet od picia alkoholików, herbaty, kawy. nadmiernego palenia. Pobyt na świeżem powietrzu, zwłaszcza w górach lub nad morzem.

Na okolicę serca okład zimny lub lód, zwłaszcza podczas silniejszej akcji serca, oraz digitalis lub strophantus w miernych dawkach.

U chorych osłabionych, anemicznych: żelazo, chinina, arsen, procedury wodolecznicze, obok systematycznego stosowania prądu galwanicznego na sympaticus (ganglion supremum i processus mastoidei).

Przetwory bromowe i nervina, woda Levico Roncegno, Żegiestow, Krynica, Elster, Francensbad.

Morbus Brighti.

Jeżeli mamy do czynienia z ostrym Morb. Brighti, to chory powinien bezwarunkowo leżeć w łóżku, w jednostajnej ciepłej temperaturze. Dyeta złożo-

na z mleka, kleików, rosółów, lekkich zupek, trochę kaszki, lub ryżu w mleku. Do picia wodę selterską, bilińską, gieshübelką, ubogim zaś zwykłą wodę z dodatkiem cytryny lub kwasu, uważać przytem by stolce były regularne.

Na okolicę nerek stawiać bańki suche, nawet cięte lub pijawki, jeżeli mocz bardzo krwawy i zawiera wiele białka.

Jeżeli opuchliny są znaczne, to polecić kąpiele gorące zaczynając od 28° R. do 30° i 32° R. po 15—45 minut, ze zlewaniem na głowę, następnie zawiązać chorego w koce na 1—2 godzin, żeby się dobrze poccił. Jeżeli chory czuje się w kąpieli bardzo osłabionym, dać można kieliszek wina. Albo też urządzić choremu w łóżku sztuczną parówkę za pomocą przyrządu opalanego spirytusem. Obok tego można dawać mierne dawki cardiaców, jak digitalis, strophantus lub coffein dla połączenia działania napotnego z moczopędnem. Wstrzykuje się też pilocarpinę po 0·01—0·02 na dawkę, uważając jednak czy nie nastąpi zapad. Obok napotnych i moczopędnych polecają silne środki przeczyszczające jak colocynth, Jalapa, gumi gutti, Rheim.

W razie przypadków mocznicy, kąpieł gorących ze zlewaniem zimnemi, silny laxans, podskórnie eter lub kamfora, albo też do lewatywy Hydras chlorali 2—3 gramów lub Acid. benzoicum po 0·3 co 2—3 godziny. Zob. Uraemia.

Jeżeli okres przewlekły, chory nie koniecznie ma leżeć w łóżku, zwłaszcza jeżeli opuchliny nieznaczne.

Dyeta przeważnie mleczna, 2—4 litry mleka, jaja, mięso, ja-

rzyny, żadnych alkoholików i korekcyj.

Do picia wody: Bilińska, Gieshübel lub woda z kwaskami. Unikać zmęczenia fizycznego, odziewać się ciepło, nie narażać się na niepogodę i zmiany temperatury.

Choremu należy polecić mierne dawki tanniny lub Plumb acet, Ferr. sesquichloratum obok ciepłych kąpieł, mniej energicznie stosowanych jak w okresie ostrym i zawijania w koce. Nadto podawać diuretica: Coffein 1·0—1·50 p. die, theobrominum w tych samych dawkach, digitalis, adon. vernalis z dodatkiem Liq. kali acet. 15—20 na 200. W razie zaparcia stolca, środki przeczyszczające.

Morbus maculosus Verlhofii.

Lekka pożywna dyeta, spokój w łóżku, kwaśne napoje (kawa, herbata wzbronione). (Leczenie krwotoków zob. Epistaxis, Haematemesis).

551. *Det. Chinae reg. e.* 10·00
ad 180·00,

Acid. sulphur. dil. 3·00,

Syrup s. 20·00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

552. *Extr. secal. corn.* 1·00,

Aqu. dest. 100·00,

Syr. sacch. 20·00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Morphinismus.

Najlepszą metodą, powolne odzwyczajanie, z początku do połowy lub trzeciej części, później w przeciągu 10—20 dni zejść do 0 morfiny, w końcu wstrzykiwać Aq. destil., dając natomiast cokolwiek morfiny do wewnątrz, lub małe wstrzyknięcia Codein hydrohl. lub extr. opii aqu.

Dobre żywienie, mleko z cognakiem, mocne wina, kąpiel 28° R.

Przeciwno bezsenności brom z makowcem, Amylenhydrat, Hypnon, unikać Chloralu.

Wpływ moralny, usunięcie powodów, jakie doprowadziły do Morf., chronić od powtórzenia się choroby.

Przeciwskazanie do odzwyczajania morfiny stanowi tylko bolesna ciężka choroba, gdzie morfinu mniej szkodzi.

Morpiones zob. pedic. pubis.

Mydriasis (rozszerzenie źrenicy).

Towarzyszy zwykle porażeniu accomodacyi; przyczyny, prognoza i leczenie takieżsame, jak przy paralisis accomodationis.

Myelitis.

W ostrej:

Ułożenie chorego równo w łóżku, najlepiej na poduszkach powietrznych. Bańki cięte lub pijawki w samym początku choroby, po tem Tra. jodi, wcierki z Ung. cinereum 3—4 grm. p. die i jednocześnie kali jodatum, jeżeli była lues, a nawet jako środek przeciwwzapalny.

Uważać przy tem na ślinotok, lodowe okłady na stos pacierzowy. Równocześnie silne środki przeczyszczające: Kalomel, Jalapa, Senna. Uważać na odleżyny, na zatrzymanie moczu.

W przewlekłej formie:

Kąpiele ciepłe, wyjazd do Cieplic, Gasteinu, Trenczyna, Wildbadu, Swoszowic, Piszczan, Lubienia itp. wód. Elektryzowania prądem stałym i faradycznym. Na wewnątrz kali jodatum z 10:200, 2 łyżki dziennie. Arg. nitricum 0·01—0·02 w pigułkach, arsen po 0·001 lub Ergotyne po 0·10—0·50 2—3 razy dziennie (skutek jednak wątpliwy).

Myringitis.

Jeżeli ból duży 1—2 pijawek na Tragus, gdy widać tworzący się ropień, nacięcie. W razie miernego bólu wcierać w okolicę ucha:

553. *Morphii muriat.* 0·30,
Ol. hyosc. 15·00.

jako też włożyć do ucha watę napojoną kilkoma kroplami tego rozczynu.

Leczenie zapalenia B., jak przy Otitis media acuta.

Nephritis zob. Morb. Brighti.

Nephrolithiasis.

Zalecić wody alkaliczne (Karlsbad, Vichy, Ems). Zabronić zbytniego pożywiania mięsa, za to więcej jarzyn, mleka, w ogóle dużo płynów.

Napoje wysokokowe w małej ilości; kwaśne napoje i potrawy wzbronione. Miernie używanie ruchu.

Przeciw krwotokom z nerek Ergotin, Tannin. Przeciw kolce nerkowej, narcotica: Morfina, Opium, dalej Urethan 3—4·0 dziennie. Ciepłe kąpiele, bańki suche, nacieranie oliwą z chloroformem, ciepłe okłady. Wstrzykiwania morfiny.

554. *Butyl Chloral* 5·00,
Aqu. dest. 120·00,
Spir. vini rectific. 10·00,
Glycerin 2·00.

DS. 2—3 łyżek jedna po drugiej.

555. *Lithii carbon.*
Natri bicarb. āā. 0·50,
Tal. dos. N. X.
S. 3 pr. dziennie.

Neuro-retinitis (Zapalenie nerwu wzrokowego i siatkówki).

Cierpienie objawiające się jedynie podupadaniem bystrości

wzroku rozpoznawanem być może jedynie wziernikiem. Obok ograniczenia światła jużto okularami, jużto w pewnych formach zapalenia, ciemnym pokojem i zakazanie pracy, wymaga przedewszystkiem leczenia przy czynowego a więc: Syfilis (secundaria) wcierania ungu. cinereum; diabetes: Karlsbad, albuminuria: mleczna kuracya itd.

Rheuma i leukemia dają również powód do zapalenia siatkówki. Choroby mózgu prowadzą tak zwaną tarczę zastoinową.

Neuralgia intercostalis.

Elektryzowanie, wcierania kojących maści. Wstrzykiwania morfiny lub antypiryny. Jeżeli przyczyną jest liszaj (herpes) pudrować lub smarować maścią cynkową.

556. *Chloroformii 10'00,*
Ol. hyosc. cocti
Ol. olivar. āā. 20'00.
MDS. Do nacierań.

557. *Veratrini 0'50,*
Chloroformii 10'00,
Spiritus 50'00.
MDS. Do nacierań.

558. *Antipyrin.*
Aqu. dest. āā. 5'00.
MDS. 1 lub 2 strzykawki wstrzyknąć w okolicę bólu.

Neuralgia trigemini, Proso-palgia.

Uwzględnić i leczyć przyczyny: anaemia, histerya, zimnica, choroby ucha, zębów itp.

Wycięcie blizny ugniatającej nerw. Leczenie przymiotu, zatrucia ołowiem.

559. *Chinin muriat. 0'59,*
Dtur. tal. dos. N. X.
S. Jeden proszek przed napadem.

560. *Solut. arsen Fovleri 10'00.*
DS. 3 razy dziennie od 3—5 kropli po jedzeniu.

W razie bólu powstałego z przeziębienia:

561. *Natri Salicyl. 5'00,*
Aqu. dest. 180'00,
Syrup aurant. 20'00.
MDS. Co godz. łyżkę.

562. *Butyl chloral 2'00—3'00,*
Spir. vini rectif. 10'00,
Glycerin 20'00,
Aqu. dest. 120'00.

MDS. 3—4 łyżek na raz.
(Dawki według stopnia bólu i indywidualności chorego).

563. *Extr. Gelsemii fluid. 10'00.*
DS. Co $\frac{1}{2}$ godz. po 5 kropli.
(Najwyżej 3 dawki).

564. *Antipyrin 0'50,*
Dtur. tal. dos. N. 10.
DS. Rano i wieczór proszek.

565. *Veratrin. 0'15,*
Morphii acet. 0'10,
Ungu. cerei 10'00.
Mf. ungu. S. Wcierać w miejsca bolące.
Elektryczność, naciąganie lub wycięcie kawałka nerwu.

Noma.

Najglówniejszym czynnikiem leczniczym jest pożywna i podniecająca dyeta.

Części zgorzelą dotknięte należy przypalić zgęszczonymi kwasami lub sześcioclorkiem żelaza, najlepiej jednak lapisem lub termokauterem.

Do opatrunku najlepiej nadaje się jodoform lub płatki waty maczane w kreolinie. Usta należy pilnie płukać, lub wymywać rozczyznami przeciwnilnymi (3%) woda borowa, słaby rozczyzn nadmagnezianu potasowego, 3% kwas salicylowy itp. Ubytki powstałe, wymagają najczęściej po zupełnem zablżnieniu, zabiegów plastycznych.

Obstipatio alvi habitualis.

Usunąć przyczyny cierpienia, środki lekko czyszczące, dyeta mieszana, u chorych, którzy znoszą mleko, dawać takowe w sporých ilościach.

Obok tego zabiegi hydropatyczne, mięsienie, codzienne lewatywy, wody mineralne: Karlsbad, Marienbad, Hunyady Janos.

566. Pulv. liquir comp. 40'00.

Ce dzień na noc $\frac{1}{2}$ — jednej łyżeczki.

567. Trae Rhei vinos

Extr. fluid. Cascar. Sagr.
āā. 25'00.

DS. 2 razy dnia po $\frac{1}{2}$ —1-dnej łyżeczki.

568. Extr. Aloë aquos.

Extr. taraxaci āā. 5'00,
f. pil. N. 50.

S. Rano i wieczór po 1—2 pigulek.

569. Trochisci compressi e Rheo
à 0'50 N. 50.

DS. Co dzień na noc 1—3 pastylek.

570. Trochisci compressi e Cascar. Sagrad
à 0'50 N. 50.

S. Co dzień na noc 1—3 pastylek.

571. Sal. therm. Carolin. 100'00.

DS. Co dzień na czczo łyżeczkę w $\frac{1}{2}$ szklanki ciepłej wody.

572. Natri bicarb.

Magnes carbon. āā. 10'00,
Pulv. rad. Rhei 7'00.

DS. 2 razy dnia na koniec noża.

573. Podophyllini 0'37,

Extr. aloes
Extr. rhei āā. 3'00,
Extr. taraxaci q. s. f. pil.
N. 40.

S. Na noc 1—3 pigulek.

Przy uporczywym zaparciu, wlać przez wysoko do rectum

wprowadzoną sondę: 70 gr. aeter sulph. z 300 gr. Aq. foeniculi.

Dzieciom:

U osesków, zmiana mamki, odsunąć dodatki mączne, woda z cukrem lub extractem słodowym. U starszych regularne żywienie, mieszany pokarm, unikać środków rozwalniających. Lewatywy ze słonej chłodnej wody (14^o R.), płynu do 1 roku 100—200 gr., starszym do 500 gr.

W razie koniecznej potrzeby, oseskom: Rheum cum magnesia 2 r. dziennie na koniec noża, starszym Aq. laxat. 2—3 łyżeczki dziennie, Trae rhei vin. 1—2 łyżeczki, opaski z chłodnej wody na noc, po poprzednim massowaniu brzucha. Ext. fluid. Cascar. Sagr., rano i wieczór po 10—15 kropli.

574. Extr. Casc. Sagr. 5'00,

Aqu. dest. 50'00,
Syrup zingib. 20'00.

S. Na noc łyżeczkę.

Odontalgia.

Jeżeli z powodu pruchnienia zęba i zapalenia nerwu: płukanie w celu oczyszczenia, osuszenie jamy w zębie i założenie kwasu karbol. czystego na kuleczkę waty.

575. Morphii mur. 0'03,

Spir. vini rectific. 5'00,
Chloroformii 20'00.

MDS. Na kulce z waty włożyć do jamy zęba.

576. Extr. opii

Camphor. tritae
Bals. peruv. āā. 0'50,
Masticis 1'00,
Chloroformii 10'00.

S. Kulczkę waty w tym rozczynnie zmazaną włożyć do zęba.

Periodontitis: płukanie zimną wodą, zimne okłady. Tra jodi do pędzlowania dziąsła około

chorego zęba, 1—2 razy dziennie. Jeżeli bóle się zwiększają, przejść do okładów ciepłych, płukania kojące.

577. *Decoct. altheae* 200'00,

Trae opii 2'00,

Aqu. menth. pip. 10'00.

DS. Płukanie.

Z powodu zwioteżenia dziąseł: usunąć kamień ze zębów i płukanie środkami ściągającymi.

578. *Acidi tannici* 4'00,

Spir. vini rectific. 80'00,

Bals. vitae Hofm. 20'00.

MDS. Łyżeczkę na szklanke płukania.

579. *Infus. fol. Salviae* 200'00,

Spir. cochlear.

Trae myrrhae āā. 25'00.

MDS. Woda do ust.

Jeżeli ból bez wiadomej przyczyny: antipiryn, phenacetin, Natr. salicylicum 0'75, co 1/2 godz.

580. *Cocaini oleinici* 1—2'00,

Ol. olivar. 10'00.

DS. Kilka kropli ogrzanego płynu wpuścić do ucha.

Oedema glottidis.

Uważać na czystość powietrza, unikać pyłu, dymu, zakazać rozmowy. Przy nieznacznym obrzęku, można dać inhalacje z Acid. tannicum, Kali bromatum, płukanie roztworami środków ściągających lub też pedzłowanie c. Arg. nitrico (1:20) raz dziennie. Łykanie pigulek z lodu, zimne lub wysychające okłady na szyję, wcieranie szaruchy. Środki przeczyszczające oraz wymiotne. Znaczniejsze obrzęki wymagają nacięć (scarificatio) przy pomocy wżiernika.

W ostateczności Tracheotomia.

Oedema pulmonum.

Leczenie głównej choroby w odpowiedni sposób.

Przy pierwszych objawach obrzęku płuc ostrego, podać środki podniecające akcyę serca jak: czarna kawa, cognac, grog, wino, kamfora, piżmo. Podskórnie wstrzyknąć eter, ol. camphoratum lub coffeinę.

Zewnętrznie położyć na piersi i łydki synapizma, rozcierać nogi i ręce, dać choremu kąpiel i zlewać głowę i piersi zimną wodą.

Jeżeli chory jest krwisty, można puścić krew, zwłaszcza w obrzęku płuc wśród spraw zapalnych.

Nadto można dać lewatywę ze środków ostrych jak: Decoct colocynt., octu, rozczyntu soli itp.

Jeżeli niebezpieczeństwo na razie minęło, dawać cardiaca i digitalis, coffeinę, theobrominę, Sparteinę Tra stroph. — Po tem leczyć główną chorobę i zwracać uwagę na pierwsze objawy zastoinowe.

581. *Infus. flor. arnicae*

e 15'00 *ad* 120'00,

Camphor. trit. 1'25,

Mucil. g. mimos. 20'00.

Mf. emulsio S. Co 1/2 godziny łyżkę.

Omphalitis.

Opatrunek przeciwnilny (salicylowy, jodoformowy) okłady z letniej wody (2% maść salicylowa z waseliną), ropnie wcześniej otwierać.

Onania (Masturbatio) Samogwałt.

Zapobiegać wypryskom na częściach płciowych, oxyuris; nieprzykrywać dzieci pierzaną pościelą. Wzbraniać nieobyczajnych rozmów, czytania. Ręce wśród nocy kazać trzymać na kółdrze.

Leczenie polega na wpływie moralnym, z środków ostate-

icznych w razie potrzeby, obrzeżenie, względnie przypiekanie lechtaczki.

Przeciw niedokrewności przetwory chinowe, żelazo, pobyt na świeżym powietrzu, gimnastyka.

Onychia.

Po stłuczeniach okładki z Aqu. Goulardi, Liquor alum. acet. Kąpiele sublimat. (0:50:1000:00).

Wrastającą część paznokcia zwilża się ogrzanym 40% rozczyntem potażu. Po kilku sekundach górna warstwa mięknie tak, że łatwo, ale tylko szkłem, zeszkrobać można. Następnie dalej zwilżać i skrobać, dopóki nie będzie, jak cienki papier. Wówczas podnosi się tę część paznokcia szczypcami do góry i odcina nożyczkami.

Oophoritis.

Schodzi się z leczeniem perimetritis.

Otalgia.

Leczenie zależne od przyczyny. Wskutek zimnicy: chinina, jednak w przebiegu nieżyty lub ropienia ucha środkiem szkodliwym.

W przebiegu syfilis: kali jodatum.

Zwrócić szczególną uwagę na spróchniałe lub źle wprowadzone sztuczne zęby. W każdym razie można użyć maści kojących, wkraplać Cocainę.

Otitis.

a) *Ot. externa circumscripta*
(v. *Furuncul.*)

W pierwszej chwili leczenie poronne, w pobliżu furunkulów robi się lekkie nacięcia (jak przy szczypaniu) i napawia maścią (Resorcin 2:00 Lanolin 20:0) kilka razy dziennie. Przewód uszny wypełnia się również maścią a

w pobliżu Tragus zakłada się watę borową. W dalszym okresie kataplazmy do przewodu usznego, oraz za muszlą ucha. Częste przepłukiwanie ciepłą wodą, wprowadzanie pary do ucha. Wczesne przecięcie, przed tem można dla uniknięcia bólu wielkiego wstrzyknąć 10% rozczyntu Cocainy. Po ustaniu krwawienia, przestryknąć i watą wysuszyć ucho, po czem 5% maścią borową wysmarować.

582. *Cocaini muriat.* 0:20,
Aqu. dest. 10:00.

DS. Watę napojoną kilku kroplami włożyć do ucha.

583. *Veratrini*

Morphii muriat. āā. 0:10,

Lanolin

Vaselin āā. 7:00.

Mf. ungu. DS. Wcierać w okolicę ucha.

Jeżeli ból bardzo silny nie ustaje, podskórne wstrzyknięcie morfiny.

b) *Otitis exter. diffusa.*

U silnych osób pijawki (na Tragus, nie na proc. mastoid). Ustawiczne przepłukiwanie ciepłą wodą a jeżeli i to bez skutku, kataplazmy do przewodu usznego, na proc. mastoideus i przed muszlą uszną, (lecz nie jeden duży kataplazm na całe ucho).

Kataplazmy tylko parę godzin przykładać, poczem założyć watę napojoną gliceryną. W razie silnego bólu wkraplanie Cocainy i zewn. maści kojące lub też podać morfynę i chloral wewnętrznie.

Jeżeli pojawi się ropienie, przestryknąć 1—3 razy dziennie i oczyścić ucho watą.

Następnie wdmuchiwać kwas borowy, wkraplać 5% rozczynt kw. borowego, a w uporczywych ropieniach, pędzlowanie rozczyntem Arg. nitrici 1:30.

Otitis media.

Dopóki trwa ból, postawić na Tragus 1—2 pijawek, wkraplać 10% roztwór Cocainy. Jeżeli się błona bębenkowa wypukła, przekłuć (Paracentesis).

W razie obrzęku proc. mastoid.: kataplazmy, wcieranie szaruchy,

Częste przestrzykiwania lub wkraplanie ciepłej wody do ucha.

Po przebicu bębenka 2 razy dziennie przestrzykać ucho i równocześnie przedmuchiwanie według metody Politzera.

Chory powinien być w łóżku, gdy potrzeba, płukać gardło, brać środki napotne. Na wewnątrz podać w razie silnego bólu morfinę — chloral — kali bromatum, zewnętrznie stosować kojącą masę (zob. Otitis exter).

Po kilku dniach ropienia wdmuchiwanie kw. bórowego raz na dzień a jeżeli to nie zmniejszy wydzieliny, wkraplać środki ściągające.

584. *Zinci sulphur.* 0·20,
Aqu. dest. 20·00.

MDS. Po przestrzykaniu ucha wlać kilkanaście kropli nieco ogrzanego płynu.

W razie cuchnącego odpływu, przestrzykiwanie 2% kw. karbolowym lub kali hypermang. 0·50:100·0.

Ozaena (Rhinitis catarrh. acuta).

Jednostajna ciepłota, zaprzestanie kąpieli.

W zatłokane przewody nosa u ssawców napszczać pędzelkiem 2% roztwór Cocainy 3 razy dziennie. Starszym przestrzykać roztworem sody lub soli — (łyżeczke na 1/2 litra wody) lub alunu (1/2 łyżeczki na 1/2 litra).

Pędzlowanie maścią z praecipit. rubri (0·50:10·0), kwasu bórowego 5%; podawać środki napotne.

Wdmuchiwać:

585. *Bismut. salicyl.* 5·00,
Talci 2·00.

Mfp. S. 2 razy dziennie wdmuchiwać do nosa.

586. *Cocain mur.* 0·50,
Aqu. dest. 10·00.

MDS. Watę zamoczoną w płynie co 5 godzin wkładać.

Wziewanie do nosa pary z kamfory lub:

587. *Zinci sulphur.* 2·00,
Thymol 0·20,
Menthol 0·30,
Alcohol. absol. 50·00,
Aqu. dest. 120·00.

DS. Rozpylaczem wtryskiwać do nosa 2 razy dziennie.

588. *Saloli* 5·00,
Acidi borici 3·00,
Acidi salicyl. 0·50,
Thymol 0·20,
Talci pulv. 10·00.

Po przestrzykaniu nosa wodą karbolową 1% i osuszeniu, wdmuchiwać do nosa.

Ozaena chronica.

Uwzględnić: ciała obce, polipy, nowotwory, zatrzymaną ropę, strupy, dalej: przymiot, zołzy. Przystrzykiwania jak powyżej.

Kali chloricum 5—10·00:500·00,
Resorcin 10·00:500·00,
Kali hypermang. 0·30:300·00.

Zołzowatym pędzlować rozroczynem Lugola.

589. *Jodi puri* 0·15,
Kali jodati 0·50,
Aqu. dest. 300·00.

Bliższe wewnętrzne ściany nosa, pędzlować balsamem peruwiańskim, w głąb zakładać tampony z waty, napojone balsa-

mem — raz dziennie. Usuwa to cuchnienie z nosa.

Wdmuchiwanie Aristolu. Ozaena syphil: przestrzykiwanie sublimatem (0·01:100·0) z dodatkiem gliceryny.

590. *Praecip. rubri* 0·15,
Vaselin
Lanolin āā. 15·00.

Mf. ungu. S. Zapuszczać pędzlem do nosa.

Oxaluria.

Dyeta przeważnie mięsna, mleczna, unikanie mącznych pokarmów, jarzyn, octu, cytryn, wina.

Ze środków leczniczych: picie wód: Vichy, Karlsbad, Elster, Salzbrunn, Wildungen.

Na wewnątrz: lith. carb, lith. salicylicum, Natr. carbon po 0·50—1·0 dziennie w wodzie selterskiej.

591. *Natri bicarb.* 10·00,
Lith. carb. efervescentis 50·00.
Mfpulv. Div. in dos. N. XX.

S. r. i. w. proszek w szklance wody.

592. *Natri bicarb.* 2·00,
Lith. carbon.
Kali carbon. āā. 0·50,
Aq. flor. naph.
Syr. simpl. āā. 20·00,
Aqu. dest. 300·00.

DS. Przez dzień wypić (rozczyn Ewicha).

Oxyuris vermicularis.

Lewatywy z wody, czosnku roztartego w wodzie (garść na 1 litr) z $\frac{1}{2}$ $\frac{0}{00}$ roztworu sublimatu, lub też lewatywa z czystego tranu.

593. *Butyri Cacao* 3·00,
Calomelanos 0·05,
Mf. supposit. Dtur. tal. dos.
N. V.

S. Na noc jeden czopek.

Panaritium.

Należy jak najrychlej głęboko aż po kość przeciąć i w ranę wprowadzić pasek gazy jodoformowej, celem zapewnienia odpływu wydzieliny i zapobieżenia przedwczesnemu zlepianiu się brzegów rany. Kawałki kości obumarłe należy wyjąć.

Pannus.

Nie będąc samoistną chorobą, nie wymaga odrębnego leczenia; należy leczyć jedynie chorobę wywołującą tenże jak: trachoma, Conjunct. serophulosa et blennorrh. chron. (Zob. odpowiednie rozdziały). Łuszcza zaś sama powoli ustąpi.

Zbytecznym więc jest mówić, iż łuszcza jaglicowa innego, a powstająca na tle skrofulicznego również innego leczenia wymaga.

Paralysis.

Wykrycie przyczyny porażenia, czy obwodowe czy ośrodkowe. Leczenie przedewszystkiem głównej choroby.

Najeźstsza przyczyną lues, a wtedy wciierki z unguent. cinereum i kali jodatium.

W razie przyczyny reumatycznej — polecić ciepłe kąpiele siarczane. Cieplice czeskie lub węgierskie, Piszczany — masowanie, elektryzowanie prądem stałym lub przerywanym stosownie do rozpoznania.

Na wewnątrz pilocarpin 0·01 na dawkę lub podskórnie, lub strychnin. sulfur. 0·10 na 10·0 z tego $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ strzykawki co 2-gi dzień.

Paralysis agitans.

Choroba nieuleczalna. Można jednak zmniejszyć trzęsienie za pomocą środków, podskórnie wstrzykiwanych:

594. *Sol. arsen. Fovleri* 2'00,
Aqu. dest. 4'00.

DS. $\frac{1}{2}$ strzykawki. Na wewnątrz
też sol. arsen. Fovleri po 4
—6—10 kropli na dzień.

Ciepłe kąpiele, elektryzowa-
nie, kali jodatium lub bromat. i
inne nervina.

Polecają też wstrzykiwania z:

595. *Hyosciamin mur.* 0'01,
Aq. dest. 10'00.

DS. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ strzykawki; lub na
wewnątrz:

596. *Hyosciamin* 0'02,
Pulv. et extr. liquir. q. s. ut
f. pil. N. XX.

S. 1—2 pigułki dziennie,

Paralysis nervi facialis.

Wykrycie przyczyny i lecze-
nie tejże, a więc: lues, ropnie
lub gruczoly, tumory, (exostozy)
uciskające nerw, zmiany w uchu
(otitis interna).

Jeżeli przyczyną porażenia
zazębienie, to środki napotne,
ciepłe okłady, ciepłe kąpiele,
unikanie przeciągów, na we-
wnątrz pilocarpin. mur. 0'01 lub
podskórnie.

Elektryzowanie n. facialis,
przeważnie prądem stałym, pó-
źniej i faradycznym, massage.

Podskórno wstrzykiwanie
strychniny:

597. *Strychnin. sulfur.* 0'10,
Aqu. dest. 10'00.

DS. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ strzykawki co 2-gi
—3-ci dzień.

Paralysis progressiva.

Przy pierwszych objawach u-
sunąć chorego od zajęć, dać mu
umysłowy i fizyczny wypoczy-
nek. Dyeta pożywna ale nie pod-
niecająca, życie pod każdym
względem higieniczne.

Jeżeli była dawniej lues, to
energiczna kuracja rtęciowa
przez wciěrki 2—3 grm. na raz,
obok tego kali jodatium.

Jeżeli by nawet i nie było
lues, to przecież należy spróbo-
wać wciěrki, bo czasem bywają
polepszenia, a nadto chorzy nie
chcą się do lues przyznawać.

Zresztą kąpiele letnie, zimne
wycierania, prąd stały na głó-
wę, na wewnątrz kali jodatium
lub Ergotin po 0'1—0'50, 2—3
razy dziennie. Rzadko kiedy
bywa skutek z leczenia.

Paralysis accomodationis.

Ciepienie bardzo uporezywe,
często nie ustępujące.

Przyczyny obwodowe jak trau-
ma, rheuma, sztuczne (atropin)
lub też centralne jak: cierpienia
mózgu i rdzenia pacierzowego.

Przedewszystkiem leczenie
przyczynowe; lokalnie zapu-
szczanie raz dziennie 1 kropli
0'5% roztworu pilocarpiny i elek-
tryzowanie słabym prądem sta-
łym. Zakazanie pracy.

Porażenie accomodacyi atro-
pinowe, samo ustępuje.

598. *Pilocarp. mur.* 0'05,
Aq. dest. 10'00.

DS. Krople do oka.

Zakraplacz.

Paraphimosis.

Odprowadzenie natychmiasto-
we załupka. W razie trudności,
okłady z zimnej wody, z wody
Goularda, a w razie znacznego
obrzęku nacięcie.

Paresis vesicae.

Należy choremu polecić, by od-
dawał mocz w regularnych, nie
zbyt wielkich odstępach. Jeżeli
oddawanie moczu jest zupełnie
niemożliwem lub jeżeli po sa-
mowolnem oddaniu jeszcze pe-
wna ilość moczu w pęcherzu po-
zostaje, należy założyć 2—3 razy
na dobę cewnik.

Przeciwno osłabieniu pęcherza,
o ile ono nie jest objawem cho-

roby ośrodków nerwowych, zaleca się leczenie hydropatyczne, kąpiele nasiadowe chłodne, zmywania, zimne lewatywy, stosowanie prądu stałego, i przerywanego, masowanie a na wewnątrz przetwory strychninowe.

599. *Strychnin. nitric. 0'01,*
Sacch. albi 4'00.
Mfpulv. div. in dos. 10.
S. 1—3 proszki dziennie.

600. *Strychnin. sulph. 0'10,*
Aqu. dest. 10'00.
S. Do iniekcji.

Parotitis.

Okłady wysychające z wody ciepłej lub octanu glinowego, na wewnątrz środki lekko przeczyszczające. W przypadkach ropnych weznie nacięcia.

Pavor nocturnus.

Dyeta niedrażniająca, nie dawać kawy, herbaty, napojów wysokowych. Zimne zmywania, kąpiele, gimnastyka. Nie pobudzać wyobraźni opowiadaniem. Na noc nie dawać wiele jeść, sypialnię miernie oświetlić. W razie niedokrewności chinina, żelazo, a w potrzebie na noc cokolwiek soli bromowej, chloralu, urethanu. Opium przeciwskazane.

601. *Chloralhydrat*
Natri brom. āā. 1'00,
Mucilag. g. ar.
Syrup rubid. āā. 15'00,
Aqu. dest. 80'00.
DS. Na noc łyżkę.

602. *Urethani 2'00,*
Aqu. dest. 80'00,
Syrupi 20'00.
DS. Na noc łyżkę.

Pediculi capitis.

Po obcięciu włosów, wymyć głowę roztworem sody, następnie

wysmarować albo naftą czystą lub z dodatkiem balsamu peruwiańskiego.

603. *Ol. petrae 50'00,*
Bals. peruv. 20'00.
MDS. Do smarowania głowy.

Po dokładnem nasmarowaniu związać głowę na 12 godzin, po czem należy kilka razy przemyć i wyczesać gęstym grzebieniem.

Pediculi pubis, Morpiones.

Na wieczór posmarować albo czystą maścią szarą, lub też

604. *Ol. petrae*
Unguent. cinerci āā. 10'00,
Bals. peruv. 5'00.
Mf. ung. S. Do smarowania.

Na drugi dzień kąpiel i oczyszczenie mydłem. Po 8 dniach leczenie powtórzyć, aby zniszczyć z gnid powstałe młode.

Pediculi corporis seu vestimenti.

Wymagają kąpeli i leczenia powstałych podrażnień skóry. Ubrania należy wyparzyć lub też napuścić 1—2% roztworem sublimatu.

Pemphigus.

Dobre odżywianie, na wewnątrz żelazo, chinina, Sol. ars. Fovleri a unikać leków osłabiających organizm (pigułki Morisona) leczenie ręciovowe.

W pemphigus pruriginosus kąpiele dziegciowe, t. j. naciera się skórę dziegciem a w 1/2 godz. po tem daje się kąpiel letnią przynajmniej godzinę trwającą. W przypadkach Pemphigus vegetans, daje się kąpiele sublimatowe (5—8 gr. na kąpiel). Przy zmianach w jamie ust, płukanie c. acido borico 2%₀. Ekorkoryacje pokrywa się płatkami z maścią cynkową lub ochładzające maści.

- 605.** *Lanolin anhydrici* 10'00,
Adip. benzoïn. 20'00,
Liqu. plumb. subacet 30'00.
 Mf. Ungu. S. Do smarowań.

Pericarditis.

Przedewszystkiem spokój, chory powinien leżeć w łóżku, mało się ruszać, na okolicę serca worek lodowy. W razie silnych bólów parę pijawek. Na wewnątrz *Inf. digitalis e.* 1'00 ad 200'00. co godzinę łyżkę, lub inne jak *gorączki* podawać antypyrinę, *phenacetinę* lub *antifebrinę* w połączeniu z *coffeiną* dla uniknięcia zapadu. Jeżeli bóle trwają, dać *morfinę*, *chloralhydrat*, lub *sulfonal* na noc. *Dyeta* przy tem płynna, niepodniecająca, uważać na regularne stolce. — Jeżeli okres zapalny minął, stosować resorbentia: okłady ciepłe, pędzlowanie jodyną, *diuretica* jak: *coffeina*, *diuretina*, *digitalis*, *Tra. strophanti* itp. a *dyeta* w ówczas *posilna*, lekko podniecająca.

W uporeczywych przypadkach można zrobić punkcję i aspirację przyrządami *Potainę* a lub *Dieulafoy*, lecz rzadko kiedy chory się na to zgodzi.

- 606.** *Infus. fol. digit.*
 e 2'00 ad 180'00,

Syrup simpl. 20'00.

MDS. Co 2 godz. 2 łyżki.

- 607.** *Tinct. Strophanti* 1'00.

DS. 3 razy dz. po 10 kropli.

Po ustaniu gorączki, gdy *exsudat* zostaje:

- 608.** *Infus. juniperi o* 15'00
 ad 200'00,

Liqu. Kali acet.

Oxymel Scillae āā. 15'00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

- 609.** *Infus. hb. digitalis*
 e 1'00 ad 150'00,

Kali acet 5'00,

Syrup simpl. 20'00.

DS. Co 2 godz. łyżkę.

Dzieciom:

Inf. digitalis e 0'10 : 100'00,
Coffein 0'05—0'10 pro *dosi*
 1—2 razy dziennie.

- 610.** *Trae Convallar* 10'00.

DS. 3 razy dz. po 5—10 kropli.

Perimetritis.

W okresie ostrym:

Spokojne leżenie w łóżku, okłady lodowe na okolicę bolesną, w razie znacznej boleści i gwałtownych objawów u osób silnych 5—6 pijawek nad okolicę pachwinową, *dyeta* ścisła, płynna, nadto wewnętrznie: *Tra opii simpl.* po 10 kropli kilka razy dziennie albo:

- 611.** *Extr. opii aquos.* 0'10,
But. Cacao q. s. ut f. l. artis suppositoria ad anum
 N. V.

DS. Co 3 godziny czopek użyć.

(Gdy nasilenie objawów się zmniejsza rzadziej).

Gdy ciepłota opadnie, środki łagodnie wypróżniające: *lewatywy* z wody z dodatkiem 2 łyżek *ol. ricini* albo z dodatkiem łyżki *gliceryny*. *Czopki glicerynowe*, *oleum ricini* wewnętrznie.

Gdy objawy ostrego zapalenia ustąpiły, okłady wysychające, po nastąpieniu bolesności: kąpiele nasiadowe ciepłe, z dodatkiem $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ kilo soli na kąpiel.

- 612.** *Trae jodi*
 „ *gallarum* āā. 20'00.

DS. Do pędzlowania.

- 613.** *Ammon. sulpho-ichtyol*
 5'00—10'00,

Vaselini flavi 50'00.

Mf. ungu. DS. Zewnętrznie.

- 614.** *Ammon. sulpho-ichtyol*
 5'00—10'00,

Glycerini 200'00.

MDS. Do tampon. codziennie.

W przypadkach przewlekłych, mięśnienie.

615. *Kali jodati* 10'00,
Gelatini q. s. f. l. art. glo-
buli vaginales N. X.

DS. Raz dnia gałkę użyć lub:

616. *Jodoformii desodorati* 3'00,
But. Cacao q. s. ut f. l. art.
globuli vaginales N. X.

DS. Raz dnia gałkę użyć.

Periostitis.

Spokój, pedzłowanie nastojem jodowym, okłady wysychające z octanu glinowego. W przypadkach ropnych, szerokie przecięcie ropni. Jeżeli przyczyną zapalenia okostnej szczęki jest zęb schorzały, należy go wyjąć.

Tam, gdzie istnieje podejrzenie o sprawę kiłową, należy stosować plaster rtęciowy, a na ewentualnie towarzyszące owrzodzenia przykładac masę rtęciową, na wewnątrz zaś podawać przetwory jodowe.

617. *Kal. jodat.* 5—10'00,
Aqu. dest. 200'00.

S. 3 łyżki dziennie.

618. *Natri jodati* 5'00—10'00,
Aqu. dest. 200'00.

S. 3 łyżki dziennie.

619. *Empl. hydrarg. extens.*
 $\frac{1}{4}$ m.

S. pokrajać na paski i przykładać na miejsca zgrubiałe.

620. *Merc. praecip. rubri* 1'00
—3'00,

Ungu. simpl. 50'00.

Mf. ungu. S. Masę.

Peritonitis.

Przedewszystkiem chory powinien zachować bezwzględny spokój; dyeta ściśle płynna. Wewnętrznie należy podawać przetwory makowca, a w razie silnych wymiotów kawałki lodu do połknięcia i cocainę. Zewnętrznie środki przeciwzapalne, okład lodowy, pijawki. Gdy okres ostry minie okłady wysychające lub ciepłe.

W przypadkach surowiczego zapalenia z przebiegiem chronicznym, może być czasem wskazane wypuszczenie płynu z jamy brzusznej a nawet t. z. tualeta jamy brzusznej.

Peritonitis chronica, zwłaszcza u dzieci, wymaga dobrego odżywiania, wcieranie szarego mydła na ściany brzucha, kąpiele solne (Iwonicz, Rabka), Punkeya.

Do wewnątrz: żelazo, jod z żelazem, Syrup ferri jodati.

P. tuberculosa: leczyć według tychsamych zasad; punkeye wykonywać tylko w ostateczności.

621. *Laudani pur.* 0'02,
Sacch. albi 0'30,
Dtur. tal. dos. XII.

S. 3 pr. dziennie.

622. *Cocaini mur.* 0'15,
Aqu. dest. 10'00.

DS. W razie wymiotów 10—15 kropli zażyć.

623. *Emuls. commun.* 200'00,
Aqu. lauroc. 5'00,
Morph. mur. 0'05,
Syr. splc. 10'00.

MDS. Co godz. łyżkę.

W razie parcia na stolec:

624. *Morphii mur.* 0'01,
Extr. bellad. 0'02,
Butyri Cacao 1'00,
f. suppos. dtur. tal. dos. X.

S. W razie parcia jeden czopek użyć.

Perniones. Odmrożenie.

Przemywania ałunem boraxem, pedzłowanie tinct. jodową, rozcieńczonym kwasem cytrynowym lub octowym.

625. *Aluminis*
Boracis aā. 5'00,
Solve in
Aqu. rosarum 300'00,
Trae benzoës 15'00.

DS. Do zmywań.

626. *Boracis* 5'00,
Ung. spl. 25'00.
Mf. ungu. S. Maść na odmroż.

627. *Ol. camphorati* 2'00,
Lanolini 20'00.

Mf. ungu. S. Do nacierań.

628. *Aristolii* 1'00,
Aether. sulph. 10'00,
Collodii 30'00.

MDS. Do pędzlowań.

629. *Medullae ossium* 30'00,
Acid. mur. conc. 20'00,
Ungu. althaeae 80'00,
Extr. opii aquos
Camphorae rasae āā. 1'00,
Terebinth. venet. 15'00.

Mf. ungu. S. Do smarowań.

630. *Cocain hydrochl.* 0'20,
Lanolin 10'00.

Mf. ungu. S. Wcieranie.

Na owrzodzenia opatrunki jodoformowe, maść z azotanu srebra itp.

Pertussis. Koklusz. Ksztusiec.

Oddzielić dzieci zdrowe, zwłaszcza małe. Dyeta pożywna, karmić zaraz po wymiotach. Pobyt na świeżem powietrzu, oddychanie zgęszczonem powietrzem, zmiana miejsca pobytu. Rozpylanie 5% kw. karbol. w mieszkaniu. — Przy napadach dobywać palcem w szmatkę zawiniętym wydzielinę.

W razie wystąpienia zapalenia płuc (napady czasem ustają) dawać leki wykrztuśne:

Inf. ipecac. c. Natro benzoico.

631. *Trae bellad. gtts.* 2—5,
Mixtur. gummos. 100'00,
Syrup simpl. 15'00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

632. *Chloral hydratis* 0'50,
Ammon. v. Natri bromati 2'00,
Aqu. dest. 100'00,
Mixtur. gumm.

Syrup rubid. āā. 15'00.

MDS. Co 3 godz. łyżeczkę.

633. *Cocain mur.* 1'00,
Aqu. dest. 10'00.

MDS. Do pędzlowań, przelyku i krtani.

634. *Morphii mur.* 0'01—0'02,
Aqu. dest. 60'00.

Syrup althaeae 15'00.

MDS 3razy dziennie łyżeczkę.

635. *Chinini muriat.* 0'50,
Natr. bicarb.

Sacchari āā. 1'50,

Mfp. div. in dos. 10.

S. Co 3 godz. proszek.

636. *Trae alcohol. rad. aconit-*
Trae bellad. āā. gtts. 10,

Aqu. amygdal. amar. 1'00,

Aqu. dest. 100'00,

Syrup aurant. 20'00.

MDS. 3—4r. dziennie łyżeczkę.

637. *Antipyrin.* 1'00,
Terpinhydratis 1'00,

Aqu. tiliae

Syrup aurant āā. 50'00.

MDS. 4—5r. dziennie łyżeczkę.

638. *Codeini mur.* 0'05,
Linct. gumm. 60'00,

Syrup althaeae 30'00.

MDS. 3—4 łyżek dziennie.

639. *Antipyrin* 0'50—1'00,
Aqu. de Vichy 80'00,

Syrup rubid. 20'00.

DS. Używać zaraz po napa dzie łyżeczkę. — Wyżyć w ciągu 24 godzin.

640. *Det. hbae Thymi*
10'00 ad 200'00,

Ammon. bromat. 2'00,

Syrup althaeae 20'00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

641. *Bromoformii* 5'00.

DS. Dzieciom

do roku życia 2—3 kropli,

od 2—4 lat 3—4 „

do 8 lat 4—5 „

3 razy dziennie podać w łyżeczce wody.

Ponieważ bromoform perełkami osiada, uważać, aby dzieci połknęły (Br. należy chronić

przed światłem, a gdy zezerwie-
nieje, odrzucić).

642. *Acidi benzoici*

Bismut. salicyl. āā. 5'00,
Chinin sulph. 1'00.

Mfp. DS. 2 r. dziennie wdmu-
chiwać do nosa.

643. *Acidi borici*

Coff. tost. āā. 5'00.

Mfp. DS. 2 razy dzien. wdmu-
chiwać do nosa.

644. *Thymoli 1'00,*

Spir. vini rectific. 250'00,
Aqu. dest. 750'00.

DS. Do inhalacji.

Pharyngitis.

W niezżytach lekko przebiega-
jących, wystarczą płukania sło-
ną wodą, ślazem itp., zabronić
palenia tytoniu i trunków.

W cięższych przypadkach uży-
wać wdychiwania z ałunu, ac.
tannic. Pędzlować roztworem la-
pisu (1:20) ac. tannicum (1:15).

645. *Alum crudi 10'00,*

Aqu. dest. 500'00.

DS. Płukanie.

646. *Kali hypermang. 0'10,*

Aqu. dest. 500'00.

DS. Płukanie.

647. *Kali chlorici 10'00,*

Aqu. dest. 500'00.

DS. Płukanie.

648. *Jodi puri 0'15,*

Kali jodati 0'50,
Glycerini 50'00.

MDS. Do pędzlowania.

649. *Trae myrrhae 15'00,*

„ pimpinell 2'50,
Ol. menth. pip. gtts. V.

MDS. 15—20 kropli na szklan-
kę płukania. W razie zna-
cznej bolesności, pędzlowa-
nie 5⁰/₁₀ rozc. Cocainy.

Phimosi.

Jeżeli phimosi jest skutkiem
zapalenia, to w wielu przypad-

kach udaje się ją usunąć lecze-
niem przeciwzapalnym: spokój,
ułożenie członka podwyższone,
zimne okłady, przestrzykiwanie
kwasem borowym 2⁰/₁₀ pod na-
pletkę, by wydzielinę przy istnie-
niu balanitis, trypra, wrzodu
miękkiego lub twardego usunąć.
W razie, gdy phimosi jest wypły-
wem kiły, utrzymuje się uporeczy-
wie, a niema objawów zgorzeli,
przedsiębiorze się energiczną ku-
racją ręciovą, w takim razie
wraz z ustępowaniem zmian ki-
łowych napletka i phimosi u-
stępuje. W razie grożącej zgo-
rzeli, skutkiem wzajemnego uc-
isku obrzmiałej żołądki na na-
pletkę, operacyjne zniesienie
phimosy.

Metody operacji:

1) Rozcięcie wewnętrznej blasz-
ki napletka. Naciąga się ile mo-
żności zewnętrzną blaszkę na-
pletka na żołądki, napińając
w ten sposób brzeg napletka,
który się w linii środkowej na
długość 1/2 etm. nacina, przy
dalszem naciąganiu napletka na
żołądki, przecina się wciąż na-
pinającą się blaszkę wewnętrzną
dopóki napletek nie da się zu-
pełnie odprowadzić.

2) Przeciawszy na grzbiecie
członka obie blaszki napletka,
zeszywa się blaszkę napletka
wewnętrzną z zewnętrzną.

3) Circuncisio: Cięcie jak wy-
żej, aż do sulcus coronarius,
wzdłuż tego ostatniego prowa-
dzi się cięcie tak, by z blaszki
wewnętrznej napletka jaknaj-
więcej, z zewnętrznej jaknaj-
mniej wyciąć.

Pityriasis versicolor.

650. *Trae Veratri viridis 30'00.*

DS. Do pędzlowania na noc.
Następnego dnia zmyć wodą
mydlaną.

- 651.** *Acidi salic.* 3'00,
Sulphur. praecip. 10'00,
Lanolin
Vaselin āā. 50'00.

DS. Wieczorem nasmarować, rano zmyć wodą z mydłem.

Pleuritis.

Chory ma leżeć w łóżku, pożywienie płynne, zwłaszcza jeżeli jest gorączka. Suche bańki na okolicę zajętą zapaleniem opłucnej, jeżeli bardzo silny ból, to nawet 1—2 pijawek. Po tem okład lodowy, lub wysychający. Z resztą leczenie wyczekujące, co najwyżej jakiś kwas do picia, małe dawki chininy. W razie męczącego kaszlu, morfina. Jeżeli się wypocina nie wytwarza, to pozostać przy tem leczeniu, co najwyżej pędzlowanie przez kilka dni cum Tra. jodi i nie pozwalać choremu wychodzić dopóki tarcie istnieje i stan podgorączkowy się utrzymuje. Z resztą trzeba leczyć chorobę zasadniczą, najczęściej nacieki szczytowe. Jeżeli zaś jest już znaczna wypocina, to obok okładów wysychających można założyć ciepłe kataplazmy. W okresie, kiedy już wypociny nie przybywa, pędzlowanie jodyną, vesicantia. Na wewnątrz *Natr. salicylicum* po 3—4 grm. dziennie, diuretica jak: *Inf. digitalis*, *Theobrom. natro salicyl.* po 4—5 grm. dziennie, *Coffeinum natro salic.* 1—1.5 dziennie, *Calomel*, *Adonis vernalis* 6'00 na 200'00., *Tra. stroph.*, *Kali nitricum* itp. Nadto można próbować środków przeczyszczających, jeżeli nie ma przeciwwskazania: *Kali. jodat.* 10'00:200'00 na wewnątrz 2—3 łyżek pro die.

Tam, gdzie wypocina ropna, tam należy zrobić resekcję żebra i ropę wypuścić, jeżeli zaś chory nie chce, to przynajmniej punkcję i aspirację płynu przyrzą-

dem Potaina lub Dieulafoy. Punkcja nadto jest wskazana, jeżeli znaczna bardzo duszność grozi życiu chorego.

Po przebyciu zapalenia opłucnej, wyjazd na świeże powietrze, w góry, odżywianie forsowne, gimnastyka odpowiednia i leczenie w gabinetach pneumatycznych.

Zresztą leczyć należy chorobę główną, która dała powód do zapalenia opłucnej, a tą jest najczęściej gruźlica płuc.

- 652.** *Dect. cort. chinae*
e 10'00 ad 150'00,
Natri salicyl 3'00,
Syrup aurant. 20'00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę.

Dzieciom *Natr. salic.* 0'10—0'30 pro dosi. Co 2—4 godz.

- 653.** *Chloroformii* 10'00,
Ol. hyosc.
Ol. olivar. āā. 20'00.

S. Do nacierań.

Przy pozostałym eksudacie:

- 654.** *Decoct. ononidinis*
e 15'00 ad 200'00,
Oxymel Scillae 20'00.
 DS. Co 2 godz. łyżkę.

- 655.** *Natr. chlorat.* 5'00,
Lithii chlorat. 1'00,
Aqu. petroselin 130'00,
Syrup menth. 200'00.

S. Co 2 godz. łyżkę.

Pneumonia.

Leków swoistych przeciw pneumonii nie posiadamy. Leczenie więc przeważnie dyetetyczne. Chory powinien leżeć w dużym pokoju o jednostajnej temperaturze, dyeta tylko płynna: bulion, rosół, mleko, winna polewka, wino, rosół z jajem, do picia jakiś kwas lub limoniada,

W pierwszym okresie zapalenia płuc można postawić suche bańki, zwłaszcza, jeżeli jest kłócie w piersiach, przy bardzo silnem

kłuciu nawet 2—3 pijawek i okład lodowy lub wstrzyknięcie morfiny. Przy silniejszym kaszlu, męczącym chorego, nieznaczne dawki narkotyków. Jeżeli gorączka bardzo wysoka lub trwa długo, należy przeciwdziałać przez zmywanie ciała letnią wodą lub pół na pół wodą z octem, dalej środki przeciwgorączkowe jak: antipyrinę 1'00—2'00 lub phenacetinę ale lepiej z dodatkiem coffeiny 0'15—0'20 na dawkę, lub też obok antipyretyków dać jeszcze cognac lub mocne wino. Przy słabem tętnie, lichecki akcji serca podać digitalis, strophanthus lub sparteinę.

W objawach zapadu na wewnętrznie camphora 0'1 w kieliszku wina lub podskórnie strzykawkę ol. camphorat.; wreszcie, podskórnie eter.

656. *Infus Valerianae*
e 5'00 ad 200'00,
Aether sulph. 2'00,
Syr. aurant. 20'00.

S. Co godzinę łyżkę.

Chorem, przyzwyczajonym do nadużywania wysokoku, należy nie szczędzić wina, cognacu, ażeby nie wybuchło delirium. W razie delirium, opium, morfina lub chloralhydrat (2—3 grm.).

W okresie rozdzielania się nacieku: środki wykrztuśne, rozdzielające jak: woda selterska, szcawnicka.

657. *Infus. ipecac.*
e 0'30 ad 180'00,
Aqu. lauroc. 2'00,
Syr. altheae 20'00.

S. Co 2 godziny łyżkę.

Infus. senegae
e 10'00 ad 200'00,
Natri benzoici 1'00,
Liquor ammon. anis. 2'00,
Syrup simpl. 20'00.

S. Co 2 godziny łyżkę.

Pulv. Doveri 0'25, 2 lub 3 dawki, *Stib. sulfur. aurant* á 0'01—0'02 na dawkę, 2—3 razy na dzień itp. W razie trudnego rozdzielania się nacieku: okłady wysychające, okłady ciepłe, kataplazmy, dyeta pożywna, wino cognac.

U dzieci: regularne żywienie, mleko, rosoly, do napoju kwaski, *Acid mur.* 1⁰/₁₀. *Ac. phosph.* 1⁰/₂ 9⁰/₁₀ zimne okłady na głowę. Środków przeciwgorączkowych silnych a zwłaszcza digitalis unikać.

Przeciw objawom ze strony mózgu lub żołądka: *Calomel* (0'05—0'10). W razie zapadu, osłabienia serca, czarna kawa, cognac, szampan, kamfora. Weznie znacznego spadku ciepłoty, wino. Po przełomie choroby środki wykrztuśne.

Pneumonia catarrhalis zob.
Bronchopneumonia.

Poliomyelitis anterior acuta.

Rzadko można widzieć pierwszy okres, w tym razie zimne okłady na głowę i kręgosłup, środki przeczyszczające (*calom.*). W drugim okresie t. j. (porażenia) pędzlowanie jodem, prąd stały (po 5 minut), (Anoda szeroka na kręgi szyjne, katoda guziczkowa na porażone mięśnie. *Gimnastyka lecznicza*, środki wzmacniające: żelazo, podskórne wstrzykiwania strychnin. *mur.* (0'001) pro dosi 2 razy na tydzień. Nacierania części porażonych wyskokowymi, aromatycznymi przetworami. W końcu leczenie ortopedyczne.

Pollutiones.

Uwzględnić: *Phimosi*, *Balanitis*, *Urethritis*, *Obstipatio*, *Helminthiasis*, *Onanię*, *Anaemię*. Dobre odżywianie, unikanie wybryków in *Baccheo et Venere*. Pościel niezbyt miękka i lekkie przykrycie. Kąpiele nasiadowe

letnie na 20—25°. Elektroterapia. Hydroterapia. Kąpiele rzeczne. Pobyt na świeżem powietrzu, wezżeśne wieczrze, unikać spania na wznak.

Nerwowym: Natrum bromatum 2—3 grm. dziennie, osłabionym chinina, żelazo, arsen.

658. *Extr. secal. corn.* 5'00,
Sacchari 15'00,
Mfp. div. in dos. N. 20.

DS. Rano i wieczór proszek.

659. *Ferri bromati* 0'30,
Natri brom. 5'00,
Aqu. dest. 60'00,
Syrup cort. aur. 30'00.

DS. Rano łyżkę, wiecz. 2—3.

Processus puerperalis.

Zapobiegać przeniesieniu zakażenia z osób chorych na zdrowe. Ściśle aseptyczne postępowanie podczas porodu, unikanie niepotrzebnego częstego badania rodzącej.

Gdy występuje po porodzie gorączka lekka do 38° C. a tętno spokojne, odchody rozłożone: przestrzykiwanie pochwy 1—2 razy dnia rozczynami: kw. karbolowego, kw. borowego, Creoliny, Thymolu. Posypanie owróżdzeń w przedsonki i na międzykroczu jodoformem, opatrzenie gazą jodoformową. Antipyretica zaciemniają obraz chorobowy i nie przynoszą korzyści.

Gdy są objawy podrażnienia otrzewnej; lód na brzuch, opium per anum. Środki rozwalniające (Ol. ricini, Calomel) podawać można, gdy nie ma zdrażnienia otrzewny.

Gdy ciepłota i tętno się podnosi po użytem postępowaniu: przestrzykiwanie jamy macicy środkami przeciwnilnymi (Acid boricum 3^o/₁₀, Acid calbol. 2—5^o/₁₀ itd.) zapomocą cewników Boze-manna, Fritscha, Olstausena,

2—3 razy dziennie. Gdy po dwóch dniach ciepłota nie opada, postępowania tego zaniechać.

Po rozwinięciu się gorączki połogowej, postępowanie Rungego: mocne wina 1—2 butelek dziennie, cognac. Gdy skłonność do wymiotów, wino szampańskie z lodu.

660. *Cocaini muriat.* 0'10,
Aqu. dest. 100'00.

DS. Co pół godz. łyżeczkę.

Gdy wstręt do wina, to cognac, rum.

661. *Spir. vini cognac. optimi*
Aqu. dest. āā. 60'00,
Vitell. ovi unius
Syr. simpl. 20'00.

DS. Co pół godz. 1—2 łyżek.

Mleko, herbata, czarna kawa, silne rosoły, Beeftea; do napoju: woda z dodatkiem białka kurzego jednego jaja na szklankę (przecedzić). Gdy tętno szybkie: Coffeina interne. Jeżeli nie ma podrażnienia otrzewny, kąpiele letne (22—24° R.) 5—10 minut 1—2 razy dziennie.

Postępowanie przeciwgorączkowe: Gdy ciepłota dochodzi do 39·5° C., zmywania całego ciała kilka razy dziennie, gdy dochodzi do 40° C. zawijanie w mokre, w letniej wodzie maczane prześcieradła; zawijanie takie można powtórzyć 2—3—4 razy, aż do opadnięcia ciepłoty, 1—2 razy dziennie. Zimny okład na głowę. Uważać na tętno i w razie zapadu, środki podniecające.

Proctitis.

Leczenie ogranicza się do stosowania lewatyw oczyszczających i zawierających środki ściągające i przeciwnilne, obok tego z powodu towarzyszącego parcia na stolec czopki ze środkami odurzającymi i letnie ką-

piele nasiadowe. Najważniejszym jest jednak leczenie przyczynowe.

662. *Zinci sulph.* 1'00,
Dent. tal. dos. X.

DS. Jeden proszek w pół litra wody letniej rozpuścić i użyć jako lewatywy.

663. *Acid. tannici* 0'05,
Butyri Cacao 1'00,
Mf. supposit. dent. tal. dos.
N. X.

DS. 2—3 czopki dziennie.

664. *Morph. mur.* 0'01,
Extr. Bellad. 0'02,
Butyri Cacao 1'00,
f. supposit. dent. tal. dos. X.
S. 2—3 czopki na dobę użyć.

Prosopalgia vide Neuralgia trigemini.

Prurigo.

Leczenie wewnętrzne:

665. *Acid. carbolic* 5'00,
Extr. et pulv. gent. q. s. ut
f. pil. N. 50.
Consp. pulv. Lycopod.

DS. 3—5 pigulek 2 razy dnia.

Jeżeli choroba jest wpływem anaemii, kaheksyi lub zolżów, to podawać na wewnątrz: tran, jod, żelazo. W lecie Rabka, Iwonicz.

Leczenie zewnętrzne:

Kąpiele siarczane lub zwykłe z dodatkiem Sol. Flemenckx. Nacierania maścią Wilkinsona przez kilka lub kilkanaście dni. Nacierania dziegciem i zmywanie tegoż w kąpieli. W ostatnich czasach z bardzo dobrym skutkiem używa się maść Naftol-B u dorosłych 4—5% u dzieci 2%. Maść tę naciera się pędzlem szczeciniowym, zasypuje pudrem i zostawia na noc, z rana bierze chory kąpiel. W bardzo łagodnych przypadkach u dzieci, ką-

pie się codziennie dziecko w wodzie przepuszczonej przez otęby, po kąpieli naciera się skórę białem, a czasem tylko wobec silniejszej reakcyi przez 8—10 dni maścią naftolową 2%.

Prurigo ferox.

Przez 8—14 dni zmywanie skóry mydłem szarem w kąpieli i następnie nacieranie maścią Wilkinsona. Później należy przez 6 tygodni nacierać skórę cienką warstwą maści naftol. (4—5%).

W dalszym ciągu, kiedy swędzenie znacznie ustąpi, 2 razy w tygodniu kąpiel letnia i nacieranie skóry białem. Po kilku miesiącach wystarczy to raz na tydzień wykonać.

Pruritus cutaneus.

Leczenie przyczyn wywołujących: choroby żołądka, wątroby.

Kąpiele zimne, siarczane ze sodą, alunem.

666. *Natr. salic.* 5'00,
Aqu. dest. 180'00,
Syrup rubid. 20'00.

MDS. 3 razy dzien. po 2 łyżki.

Obmywanie 3% roztworem spirytusowym mentholu.

667. *Cocaini* 1'00,
Mentholi 1'00,
Lanolin 50'00.

MDS. Do nacierania.

668. *Menthol.* 2'50,
Bals. peruv. 5'00,
Ung. Wilsonii
Lanolin aa. 50'00.
Mfu. S. Do nacierania.

Pruritus senilis.

Kąpiele z otębami, zmywania wodą gorącą (40°), do której dodać roztworu:

669. *Acid. carbol* 4'00,
Aceti arom. 200'00.

2 łyżki, po czem zapudrować.

670. *Bismut salicyl* 20·00,
Amyli 90·00.
MDS. Puder.

Pruritus vulvae.

Uwzględnić przyczyny: Vulvitis, vaginitis, obstipatio, Diabetes. Unikać drapania, kąpiele nasiadowe (24—26°), okłady z wody karbol. 3%, Sublimat (0·50:1000·00).

671. *Chloroformii* 5·00,
Ol. olivar. 50·00.
MDS. Do pędzlowań.

672. *Natri subsulphur.* 30·00,
Acid. carbol. 5·00,
Glycerini 20·00,
Aqu. dest. 500·00.
MDS. Do obmywań rozgrzewszy poprzednio plyn.

673. *Cocain* 1·00,
Lanolin 20·00.
Mf. ungu. S. Do smarowań.

Pseudocroup-Laryngitis stridula.

Wziewanie pary wodnej lub słabych rozczyńców soli, Natr. carbon., Ammon. mur. jużto z inhalatora, jużto trzymając dzieci nad parą. Ciepłe okłady na szyję, kataplaźmy. Podawać dużo ciepłych napojów, herbaty, mleka, w ostateczności środki wymiotne.

674. *Inf. ipecac. e* 2·00 ad 40·00,
Tart. stib. 0·05,
Syrup 10·00.
MDS. Co 10 minut łyżeczkę.

675. *Cupri sulphur.* 0·20,
Aqu. dest. 40·00,
Syrup 15·00.
DS. Co 10 minut łyżeczkę.

Dzieci skłonne do P. w czasie niepogody trzymać w domu.

Psoriasis.

Leczenie musi być wewnętrzne i zewnętrzne.

Leczenie wewnętrzne:

676. *Solutio Fowleri*
Trae malatis ferri āā. 10·00.

Z rozczyńców powyższego daje się po obiedzie i po kolacyi z początku po 6 kropli, 4-gc dnia zwiększa się dawkę o 2 krople pro die, zwiększając następnie co 3 dni dawkę o 2 krople, dochodzi się aż do 24 kropli pro die. Odtąd zwiększa się dawkę co 5 dni o 2 krople i dochodzi się do tej ilości, przy której, zmiany w sposób widoczny zaczynają ustępować (zwykle przy 40-tu kroplach pro die) i teraz w ten sam sposób zmniejsza się dawkę stopniowo, schodząc do początkowej ilości.

Można także podawać arszenik w postaci pigulek.
(*Pillulae asiaticae*).

677. *Acid. arsen.* 0·75,
Pulv. piper. nigri 6·00,
Gummi arab. 1·50,
Rad. altheae pulv. 2·00,
M. c. aq. dest. q. s. ut f. pil.
N. 100.

Pigulek nżywa się albo po obiedzie i kolacyi lub bezpośrednio przed niemi. Rozpoczyna się od 2 pigulek pro die, które się przed obiadem zażywa. Co 5-ty dzień podwyższa się dawkę o jedną pigułek pro die, dochodzi się do 8—10 pigulek dziennie.

Skoro się dojdzie do 5-ciu pigulek, rozdziela się je na dwie dawki, t. j. 3 pigułki po obiedzie 2 po kolacyi i t. d.

W razie wystąpienia biegunki, bólu brzucha, nudności, zmniejsza się ilość pigulek.

Jeżeli chodzi o szybkie usunięcie zmian robi się iniekcye z Śol. Fowleri.

678. *Sol. arsen. Fowleri* 2·00,
Aqu. dest. 10·00.
MDS. Do iniekcji, jedną strzykawkę Prawaza.

Z innych środków wewnętrznych mniej skutecznych są używane:

679. *Aq. picis*

Aq. fontis āā. 250·00.

MDS. $\frac{1}{2}$ litra dziennie wypić.

680. *Acid. carbol.* 10·00,

Extr. et pulv. Liquir āā. q.
s. ut f. pil. N. 100.

DS. 5—10 pigułek dziennie.

Leczenie zewnętrzne:

Wskazania: 1) usunąć łuski, 2) znieść naciek, 3) usunąć zaczerwienienie.

Co do 1-go: zmywania mydłem szarem 5—6 krotnie połączone z kąpielą.

Co do 2-go: — Środki liczne, najlepszy kwas pyrogalusowy.

681. *Acidi pyrogal.* 10·00,

Ung. simpl. 100·00.

Mf. ungu. S. Maść.

Uważać na objawy zatrucia, charakteryzują się one moczem oliwkowym.

W celu usunięcia zaczerwienienia, przepisuje się dziegieć, (który się wciera pędzlem szczytnym) pozostawia się przez godzinę na skórze a następnie daje się kąpiel.

W celu uniknięcia zatrucia przy rozległych zmianach na skórze, pędzluje się tylko częściej miejsce schorzałych, później dopiero wszystkie.

Psoriasis skóry głowy:

Usuwa się łuski oliwą, następnie zmywa się 2 razy dnia spirytusem mydlanym i wciera się następnie pomadę.

682. *Hydrarg. praecip. albi*

1·00,

Ungu. emolient. 12·00.

Mfungu. S. Pomada.

Po 8—10 dniach robi się to tylko raz dziennie.

W wyjątkowych razach leczenia to nie pomaga, wtedy używany naftolu.

683. *Naphtol-B* 15·00,

Vaselini albi 100·00,

Sap. viridis 20·00.

Mf. S. Maść.

Pustula maligna (Anthrax).

W celu zniesienia napięcia i uwolnienia ropy, zrobić kilka głębokich cięć krzyżujących się, przepłukać kwasem karbolowym 4%, między brzegi nacięć założyć paski gazy jodoformowej i posypać jodoformem, nadto robi się okład wysychający z płynu Burowa, zamoczywszy w nim watę Brunsza, na wierzchu daje się papier kauczukowy, lub ceratkę i przymocowuje bandażem.

Pyaemia.

Należy usunąć pierwotne ognisko lub przynajmniej zapewnić wydzielinie należyty odpływ.

Pożywienie winno być podawane w formie łatwo strawnej a posilnej; cognac, stare wino. Ogniska przetutowe należy ryć i otworzyć i ropę z nich wypuścić. Z lekarstw najlepiej ograniczyć się do przetworów chininu i coffeiny.

684. *Coffein citr.* 1·00,

Aqu. cinamon. 150·00.

S. Co 2 godziny łyżkę zażyć.

Pyelitis.

Jeżeli jest okres ostry zapalny: Chory ma leżeć w łóżku, dyeta tylko płynna, przeważnie mleczna, najlepiej mleko pół na pół z wodą wapienną, picie wody: Bilińska, Giesshübler, wystrzegać się kawy, herbaty, korzennych zapraw i napitków wysokowych.

Przy cierpieniu przewlekłym dyeta mniej ścisła, z unikaniem jednak, wszelkich napojów wysokowych i korzeni.

Ze środków wewnętrznych można polecić odwar: Foł. uvae ursi 15·0 na 300·0 z tego co godzina łyżkę, lub filiżankami pić. Lub arbutini 2—3 grm. pro die w proszkach (środek drogi mało skuteczny).

Ol. ligni Santali 3 razy pro 10—15 kropli w kawie lub mleku.

Kali chloric. 4—6·0 na 200·0 z tego co godzinę łyżkę.

Dobrze też działa Tannina z opium :

685. *Tannini* 0·30,

Opii 0·02,

Mfp. d. tal. dos. N. X.

S. 3—4 proszki dziennie.

Polecić też można do picia wodę sodową kwaśną (Rząca i Chmurski). Kąpiele nasiadowe ciepłe, okłady wysechające, w razie bólów na wewnątrz lub podskórnie morfinę. Zresztą trzeba leczyć główną przyczynę choroby.

Rschitis. Krzywica.

Najwięcej pomaga bacność na pielęgnowanie i żywienie. Dzieci z krzywicą powinny być jak najwięcej na powietrzu, ubranie lekkie, zamiast pierza materace z włosia, przy Cranio-tabes: poduszczyka z włosia z wyciętym otworem na główkę. Przy skrzywieniach kręgosłupa i załamaniu kończyn, niepozwalając dzieciom bez podpory siedzieć, a próby ze stanieniem i chodzeniem bardzo ostrożnie zaczynać. W razie obfitych potów zmywać ciało kilka razy gąbką zamoczną w zimnej wodzie i dobrze wyciśniętą, a zwłaszcza tyłogłowie. Matka słaba nie powinna karmić dziecka z krzywica.

Dziecko z krzywicą powinno już w 4-tym miesiącu dostawać nieco solonego rosołu, o ile można, nie dawać pokar-

mów skrobiowatych. Po odłączeniu głównym pokarmem (po ósmym miesiącu) mięso z wyjątkiem wieprzowego, jaja, nieco wina, mleko.

Starszym dzieciom nie dawać wiele legumin a zwłaszcza cukrów.

Drugim ważnym czynnikiem są kąpiele, jeżeli nieżyt oskrzeli nie przeszkadza.

Daje się w połączeniu ze słodem ($\frac{1}{2}$ litra) i solą ($\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ do 1 funta na 20 litrów) z dodatkiem ziół aromatycznych, sole żelaziste w razie anaemii, na tydzień 2—3 razy (26° R.), nigdy na noc.

Regulować objawy niestrawności, jużto dodatkiem kwasów lub alkalii. Nieżyt oskrzeli leczyć naparem Ipecac, Senegae, Liquor ammonii anis.

Kurczowi głóśni energicznie zapobiegać, (zob. Laryngospasmus). Skrzywienia kończyn wymagają leczenia gimnastycznego, ortopedycznego, szyn, gorsetów i tp. — U małych dzieci najlepiej rozpocząć leczenie żelazem.

Aqu. pyrophosphatis ferri et sodae.

3 r. dziennie łyżeczkę, dalej :

Trae ferri chlorati gttss.

5—10.

3 razy dziennie.

686. *Ferri phyrophosphor.* 0·05
—0·10,

Sacchari lactis 0·20,

Mfp. dtur. tal. dos. N. 15.

S pr. dziennie.

687. *Calcii phosphor. pulv.*
30·00.

Parę razy dziennie na konioce noża do pokarmów.

688. *Bismut subnitrici*
Carbonat calcar. āā. 1·50,
Mfp. div. in dos. N. 10.

S. Co 4 godziny proszek (w razie uporczywego nieżyty przewodu pokarmowego.

689. *Ol. jecor aselli* 2'00—4'00,
Mucilag. gum. arab.
Aqu. dest. q. s. f. l. a.
Mixt. oleosa col. 80'00,
Syrup simpl. 10'00.
 DS. 3 razy dz. łyżkę.

690. *Ol. jecor aselli* 150'00,
Limaturae ferri 20'00,
stent in macerat per 24 ho-
ras, deinde decant.
 DS. Rano łyżeczkę.

691. *Phosphori* 0'01,
Ol. amygdal. dulc. 30'00,
Gum. arab.
Sacchari āā. 15'00,
Aqu. dest. 40'00.
 DS. Jedną łyżeczkę na dzień.

692. *Phosphori* 0'01,
Ol. jecor aselli 100'00.
 DS. 1—2 łyżeczkę dziennie.

693. *Phosphori* 0'01,
Lipaniū 30'00,
Pulv. gi ar.
Sacchar. āā. 15'00,
Aqu. dest. 40'00.
 DS. 1—2 łyżeczki dziennie.

694. *Phosphori* 0'06,
Alcohol. 20'00,
Spir. menth. 0'50,
Glycerin. 60'00.
 DS. 3 razy dziennie po 6 kropli. -- (Co tydzień o kroplę więcej aż do 10).

695. *Butyri recent.* 200'00,
Kali jodati 0'15,
Kali bromati 0'50,
Natri chlorati 5'00,
Phosphori 0'01.
 Tę ilość użyć w ciągu 3 dni, kilka razy dziennie podając na chlebie.

Ranula.

Przeprowadzić nitkę jedwabną przez torebkę. Wycięcie przedniej ściany torbiela i przyżeganie lapisem. (Drugiej metody unikać u małych dzieci — gdyż przez to nie mogą ssać).

Rheumatismus articularum acutus.

Chory bezwarunkowo ma tak długo pozostać w łóżku, dopóki gorączka nie minie, obrzęki się nie zmniejszą i bóle nie ustąpią.

Ze środków najprędzej działających polecam: Antipyrinę, z Natr. salicylicum po 0'50, dziennie takich proszków 4—6. Jeżeli obawiamy się zapadu po silnych dawkach antipyriny, to lepiej dodać do każdego proszka 0'15 Coffeiny natrosalicylici.

Dalej stosować można samo Natr. salicyl. 5'0—6'0 pr. die, Acid. salicyl. 4'0—5'0 pr. die, Phenacetin po 0'50, 4—5 proszków dziennie — Antifebrin po 0'25—0'50, 3—4 proszki na dzień, Salol 1'0, 5—6 proszków na dzień, Betol 0'3—0'5, 3—4 razy na dzień.

Nadto okłady lodowe na bolesne stawy, lub ciepłe okłady. Pędzlowanie jodyną i zawijania w watę. Smarowanie stawów mieszaną chloroformową lub ichtyolem.

Nadto leczenie wszelkich powikłań w odpowiedni sposób, zwłaszcza zapalenń wsierdzia, opłucnej i t. p.

Jeżeli jest okres przewlekły, to obok środków wyżej wymienionych i kali jodatum 2—3'0 pro die, polecić ciepłe kąpiele, pędzlowanie jodyną, massage stawów maścią jodową, ruchy bierne lub wysłać chorego do czeskich Cieplic, Trenczyna, Piszczan, Swoszowic, Krzeszowic, Truskawca, Buska i t. d.

696. *Ichtyoli* 10'00,
Ungu. parafin. 90'00.
 Mf. ungu. DS. Maść.

697. *Ichtyoli* 5'00,
Ungu. emolient. 50'00.
 Mfungu. S. Wcieranie.

698. *Ammon. sulfoichtyol*
Spir. aether. āā. 10'00,
Collodii 20'00.
 DS. Do pedzlowania stawów.

699. *Trae Colchici 10'00,*
 „ *Aconit. 3'00,*
 „ *Opii 2'00,*
 DS. 3—4 r. po 15—20 kropli.

700. *Exalgin 2'50,*
Alcohol menth. 15'00,
Aqu. dest. 190'00,
Syrup simpl. 30'00.
 S. Co godzinę łyżkę.
 (Jedna łyżka 0'20 Exalg. 0'80
 pro die).

Rheumatismus musculorum.

Na wewnątrz można podać mierne dawki *Natr. salicylicum*, *Antipyriny*, *Phenacetyny* a obok tego działać miejscowo przez wcieranie maści kojących, mięszanki chloroformowej. Kąpiele ciepłe, łaźnia parowa, massage, prąd elektryczny, kąpiele siarczane, Cieplice w Czechach, na Węgrzech i t. p. miejscowościach.

701. *Chloroformii*
Glycerini āā. 50'00.
 DS. Wcieranie.

702. *Trae Bellad. 1'50,*
Bals. vitae Hoffman. 80'00,
Chloroformii 20'00.

DS. Do wcierania.

703. *Veratrin 0'30,*
Chloroform 15'00,
Mixt. oleos. balsam. 80'00.

DS. Do wcierania.

704. *Spir. sapon 30'00.*
Trae opii 2'00.
 DS. Do wcierania.

Sarcomphalus.

Przyżęgać codziennie lapisem i zasypywać pudrem salicylowym (0'25:50'0). Większe narośle podwiązać jedwabiem lub Catgutem.

Scabies.

Po kąpieli i wymyciu szarem mydłem, wcierać przez parę wieczorów jedną z podanych maści. Głównie nasmarować grzbiet rąk i nóg i miejsca gdzie najwięcej lubią się gnieździć świerzby na na 3-ci dzień kąpiel.

705. *Flor. sulphur.*
Ol. Fagi āā. 20'00,
Sapon. virid.
Axungiae āā. 40'00,
Cretae albae pulv. 5'00.
 Mf. ungu. S. Do nacierań.

706. *Naphtoli 15'00,*
Ungu. simpl. 100'00,
Sapon. virid. 50'00,
Cretae albae 5'00.
 Mf. ungu. S. Do nacierań.

707. *Styrac. liquid. 5'00,*
Petrolei 20'00,
Bals. peruv.
Flor. sulphur. āā. 2'50,
Spir. Sapo. Kalini 10'00.
 Mf. ungu. S. Do nacierań.

708. *Ol. Lavandulae*
Ol. Caryophyllor āā. 1'50,
Kali carbon. 35'00,
Lactis sulphur. 100'00,
Axungiae v. Lanolin q. s. ut
f. unguentum.

Dla dzieci:

709. *Bals. peruv.*
Sulphur depur. āā. 5'00,
Vaselinæ 50'00.
 Mf. ungu. S. Do nacierań.

710. *Styrac. liquid.*
Ol. olivarum āā. 50'00.
 MDS. Do nacierań.

711. *Naphtoli 4'00,*
Sapo Kalin 25'00,
Axungiae 50'00,
Cretae albae 5'00.
 Mfu. S. Do nacierań.

Również skuteczne natarcie czystym balsamem peruwiańskim. Suknie i bielizna muszą być wyparzone.

W praktyce ubogich używa się Solutio Vleminckx, natarcie dwukrotnie.

Scarlatina.

Ścisłe odłączenie chorych aż do zupełnego złuszczenia t. j. 5—6 tygodni, poczem należy mieszkanie odwieńczyć, okna, podłogi wymyć 5% kw. karbolowym. Dzieci szkolne w mieszkaniu będące, do szkoły nie posyłać.

Pokój troskliwie przewietrzać, ciepota 13—14° R. wystarcza, bieliznę można często zmieniać.

Za pożywienie: mleko, rosół, po ustąpieniu gorączki dyeta pożywniejsza lecz nie zaraz mięsna. Za napój podawać można czystą wodę, kwaski.

Płukanie gardła częste 2% kw. borowym, 2% kali chloricum. W razie silnej gorączki zimne okłady na głowę, chinina, antypyrina (ostrożnie), Natr. salicyl.

Na obrzeki gruczołów okłady z liquor alumunii acet., wcierańa szarej maści. Skoro tylko wystąpi chęłbotanie, przecinać.

Drgawki, majaczenia uspakać okładami z lodu, lewatywami z chlorału (0:50:50:0).

Wśród objawów zapadu, osłabienia serca, Cognac, mocne wino, czarna kawa, kamfora.

Powikłania z błonicą (dyfterya), wysiękiem w opłucnej, błony brzusznej, zapaleniem stawów, chorobami ucha, rakiem wodnym, zapaleniem nerek — zob. odpowiednie rozdziały.

712. *Chinini muriat.* 0:30,

Dtur. tal. dos. 10.

S. Rano i wieczór proszek.

713. *Antipyrin* 0:25,

Dtur. tal. dos. N. X.

S. Co 4 godz. proszek.

714. *Natr. salicyl.* 0:30,

Dtur. tal. dos. N. X.

S. Co 3 godz. proszek.

715. *Natr. salicyl.* 5:00,

Aqu. dest. 100:00,

Syrup rubid. 20:00.

MDS. Co 2 godz. łyżeczkę.

716. *Liquor ammon. anis.*

Aether. sulphur. āā. 5:00.

MDS. Co 2 godz. po 10 kropli w czarnej kawie.

717. *Camphorae* 0:50,

Spir. vini

Aqu. dest. āā. 5:00.

MDS. Do podskórnych wstrzykiwań.

718. *Acidi benzoici* 0:20,

Sacchari 2:00,

Mfp. div. in dos. N. X.

S. Co 2 godz. proszek.

Od początku szkarlatyny należy mocz codziennie badać. Od pierwszej chwili zapalenia nerek podawać dużo mleka.

Przy zaparciu stolca 2—3 dawek Calomelu; w razie bólu w okolicy nerek, postawić 6—10 suchych baniek. Dopóki w osadzie z moczu znajduje się wiele ciałek krwi i wałeczków, nie dawać leków moczopędnych, lecz ściągające.

719. *Acidi tannici* 0:50,

Chinin. sulphur. 1:00,

Sacchari 2:00,

Mfp. div. in dos. N. 6.

S. 3 proszki dziennie.

720. *Chinini tannici* 4:00,

Div. in dos. N. X.

S. 3 razy dziennie proszek.

721. *Solut. acid. tannici*

2:00 ad 100:00,

Solut. natri bicarb. q. s. ad react. alcal.

Syrup rubid. 20:00.

MDS. Co 3 godziny łyżeczkę.

W razie silnego krwawienia:

722. *Liquor ferri sesquichl.*

gtts. X.

Aq. cinamom.

Syrup simpl. āā. 50:00.

S. Co godz. łyżeczkę.

Jeżeli się pojawia znaczna pu-
chlina, lub ucisk na płuca, po-
dawać wcześniej leki moczopę-
dne a przy towarzyszącej anae-
mii żelazo n. p. Tra. ferri po-
mati, 3 r. dzien. po 15 kropli.

723. *Infus. fol. digital.*
e 0'20 ad 100'00,
Liquor Kali acet. gtt. XX.
Syrup simpl. 15'00.
MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

724. *Deti equiset. e 3'00 ad 100'00,*
Liquor Kali acet. gtt. XX.
Syrup simpl. 15'00.
MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

Można też używać w razie
dłużej trwającej puchliny, ką-
pieli na 29° R., 5—10 minut i za-
wijania w koce na 2—3 godzi-
ny; przeciwwskazanie stanowi
tylko stan zapalny płuc lub osła-
bienie serca, w kąpieli dawać
zimne okłady na głowę.

Uraemia: zob. pod tytuł. Ne-
phritis i Uraemia.

Sclerosis (wrzód twardy
p. Syphilis).

Scorbutus.

Dobre powietrze i dobre po-
żywienie, podawać dużo zielo-
nej jarzyny (sałata, szpinak itp.)
owoce, lemoniada z cytryn. Mle-
ko w dużych ilościach. Wino,
piwo. Letnie kąpiele. Płukanie
ust roztworami lekko ściągają-
cemi (kali chloricum, acidum bo-
ricum). Pędzlowanie: Tra. Myr-
hae, Tra. ratanh. Nacieki krwa-
we smarować oliwą z chloroformem.
W ciężkich przypadkach
leki pobudzające, kamfora eter,
wino często podawać.

725. *Det. cort. chinæ e 10'00*
ad 150'00,
Acidi sulphur. dil. 2'00,
Syrup rubid. 20'00.
MDS. Co godz. łyżkę.

W razie krwotoków:

726. *Liquor ferri sesquichl. 2'00,*
Aq. cinamom. 200'00,
Syrup Sacchari 20'00.
MDS. Co 2 godziny łyżkę.

Dzieciom:

727. *Liquor ferri sesquichl.*
gtts. X.
Trae opii gtt. 1—5,
Aqu. dest. 100'00,
Syrup simpl. 20'00.

MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.

Leczenie następowe wymaga
dłuższego podawania: żelaza,
przetworów chinowych, dobrego
żywienia i kąpieli.

Scrophulosis.

Dzieciom małym przy piersi,
jeżeli się pokażą gruczoły po-
większone, zacząć dodawać oso-
lone rosoły. Starsze dzieci ży-
wić mięsem, mlekiem, kawą żo-
łądziową, dać nieco wina czer-
wonego, owoce, jarzyny lżejsze.
Suche mieszkanie przewietrza-
ne. Kąpiele, zmywania wodą są
koniecznymi.

Dzieci tłuste powinny dosta-
wać pożywienie chude, łatwo
strawne, mleko, mięso, ekstrakt
mięsny, używać dużo ruchu.

Dzieci blade, chude, mogą uży-
wać więcej tłuszczów, tutaj więc
podać tran, najlepiej w porze
jesiennej i zimowej, Lepiej od-
żywionym tran z dodatkiem Trae.
jodi. Zaprzestać jednak tranu
przy braku apetytu, biegunce,
gorączce. Tran dawać w godzi-
nę po jedzeniu 1/2—1 łyżki, ma-
łym dzieciom w emulsyi, po 3
tygodniach zrobić przerwę kil-
kudniową.

Jeżeli dzieci nie znoszą tranu
lub są przeciwwskazania, poda-
wać przetwory jodu z żelazem,
herbatę z liści orzecha, masło
jodo-bromowe (zob. rachitis),
ekstrakt słodowy (1—2 łyżeczek
2 razy dziennie).

W lecie pobyt na świeżem powietrzu, wody mineralne jodobromowe lub słone — (Iwonicz, Rabka, Rymanów) tak do kąpieli jak i do picia.

Kąpiele ze soli z dodatkiem soli iwoniczkiej, rabezańskiej (po $\frac{1}{2}$ —1—2 funtów), kąpiel na 27° R. przez 15—20 minut.

W obrzmiale gruczoły wetrzeć na wieczór łyżeczkę mydła szarego (Sapo kalin) i zmyć rano i tak przez szereg dni dopóki nie będzie większej bolesności.

Choroby towarzyszące jak: Conjunctivitis, keratitis, Otitis i t. p. obok ogólnego leczenia leczyć miejscowo (zob. pod odpowiednimi rozdziałami).

728. *Ol. jecor. aselli* 10'00,
Mucil. gum. ar. g. s.
Aqu. dest. 60'00.
Syrup Melissae 10'00.
MDS. 3 razy dzien. łyżeczkę.

729. *Syrup ferri jodati* 20'00,
Syrup sacchari 40'00.
MDS. 3 razy dzien. łyżeczkę.

730. *Kali arsenicos solut.*
Aq. cinamom. āā. 10'00.
MDS. 3 razy dziennie po 3—6 kropli.

731. *Ferri jodati sacchar.* 0'50,
Sacchari 5'00,
Mfp. div. in dos. N. XX.
S. 3 proszki dziennie.

732. *Trae jodi gtts.* X.
Kali jodati 1'00,
Aq. menth. pip.
Glycerin. āā. 50'00.
MDS. 3 razy dzien. łyżeczkę.

733. *Ol. jecor. aselli*
Aq. Calcar. āā. 100'00,
Mf. linim. adde
Trae chinae comp. 20'00,
„ *Rhei vin.* 15'00,
„ *Calami* 5'00.
MDS. 2—3 razy dziennie łyżeczkę do 1 łyżki.

Seborrhoea.

Rozmięczenie strupów oliwą, tranem i następne zmywania mydłem szarem.

seborrhoea capillitii zob.

Alopecia e seborrhoea.

seborrhoea glandis penis.

Zmywanie wodą borową 2 $\frac{0}{10}$ i zakładanie waty z maściami ściągającymi.

734. *Zinci oxydati* 0'25,
Ungu. simpl. 20'00.
Mf. ungu. DS. Maść.

Obok leczenia miejscowego, leczenie środkami wewnętrznymi istniejącej anaemii, dyspepsy, żołądka, a więc tran, wody żelaziste, Roncégno (2—4 łyżek dziennie) rheum, wody alkaliczne.

Singultus.

Uwzględnić powody:

Anaemia, hysterya, choroby przewodu pokarmowego, zimne lub gorące okłady, synapizmy na okolicę żołądka, elektryzowanie nerv. phrenici. Jako pojedynczy środek może służyć: Wetknąć palce do uszów i silnie przyciskać, równocześnie podawaną wodę powoli przetykać.

Również z dobrym skutkiem polecają: wstrzymać oddech po głębokim wdechu.

735. *Trae Valerian. aether.*
Trae nuc. vomicae āā. 5'00.
MDS. Po 10 kropli na cukrze.

736. *Chloral hydratis* 2'00,
Aqu. dest. 50'00,
Mucilag. gum. arab.
Syrup aurant. āā. 20'00.
MDS. Co godzinę łyżkę.

737. *Codeini phosphorici* 0'03,
Aq. lauroc. 20'00.
MDS. Co godzinę po 10 kropli (dla dziecka od 2—5 lat).

Soor.

Czyste utrzymanie ust, przeżywać po pokarmach, dobre powietrze.

Po usunięciu mechanicznem grzybków (miękkim płótnem zwilżonem w zimnej wodzie) pędzlować:

738. *Kali hypermang.* 0'12,
Aqu. dest. 15'00.

MDS. Do pędzlowania.

739. *Saccharini* 1'00,
Spir. vini 50'00.

DS. Łyżeczkę rozpuścić w $\frac{1}{2}$ szklanki wody i 5 r. dzień pędzlować.

740. *Resorcin.* 0'50,
Aqu. dest. 90'00,
Syrup 10'00.

MDS. Co 2 godziny łyżeczkę.
(Dla dziecka od 1—2 lat).

Do przemywania ust: Borax (1'50:100'0 Aq. destill.) kali chloricum, Bicarb. sodae (0'50:150'0).

Spasmus glottidis.

U dorosłych tylko jako objaw hysteryi, wówczas skrapianie twarzy zimną wodą.

741. *Chloral hydratis* 4'00,
Natr. bromati 2'00,
Aqu. dest. 100'00,
Syrup rubid.
Mucilag. gum. arab. āā. 20'00.

MDS. Co 2 godziny łyżkę.

U dzieci:

W chwilach napadu włożyć wszy palec do ust dziecka, dotknąć nagłośni, przez co wzbudza się wymioty, poczem następuje głęboki wdech.

Tryskać zimną wodą na twarz. Dziecko trzymać na rękach, zrzuciwszy wszystkie ubrania. Po napadzie unikać podrażnienia dziecka, chronić przed silnem światłem i łoskotem. Jeżeli się napady powtarzają co parę godzin lewatywę z rumianku, sa-

meo, lub z dodatkiem Asa foetida (0'50 jako emulsia z żółtkiem).

Uwzględnić powody: zaburzenia w trawieniu, niezbyt krtani, początek chorób zakaźnych, głównie zaś krzywicę (zob.).

742. *Chloral hydratis* 1'00,
Natr. bromati 2'00,
Aqu. dest. 60'00,
Syrup rubid.

Mucil. gum. ar. āā. 15'00.

MDS. Co 3 godziny łyżeczkę.

743. *Ammon. bromati* 1'00,
Urethani 1'00,
Aqu. dest. 80'00,
Syrup simpl. 20'00.

MDS. Co godzinę łyżeczkę.

744. *Infus. Valerianae*
e 10'0 ad 100'00,
Trae asae foetid. 2'00,
Vitell. ovi unius.

MDS. Na 2 lewatywy.

745. *Antipyrin* 0'12,
Dtur. tal. dos. N. 6.
S. Co godzinę prosek.

Spermatorrhoea.

Leczenie przyczynowe przy istnieniu kamieni pęcherzowych lub chorób kiszki odchodowej. Leczenie rzerzączki, unikanie wzruszeń płciowych, nadmiernej pracy umysłowej i fizycznej. Kąpiele morskie lub rzeczne, leczenie hydropatyczne.

Pożywienie strawne, nie używać napojów wysokokowych, kawy, herbaty. Wieczera powinna być wcześniej spożywaną i nie obfitą. Poślanie łóżka twarde, przykrycie lekkie, leżenie nie na wznak, lecz na bok.

W anaemii żelazo, chinina.

Przy neurasthenii — Natrum bromatum 3—4'0 pro die czasem dobrze działa.

746. *Extr. secalis corn.* 1'00,
Sacchari albi 3'00,
Mfp. Div. in dos. N. X.

DS. 3 proszki dziennie.

Miejscowo: Wprowadzanie grubych sond metalowych lub używanie psychroforu.

Spina bifida. Tarń dwudzielna.

Chronić od urazów, założywszy opatrunek ochronny, zdarza się bowiem dobrowolne wyleczenie.

Nakłócie worka i wstrzyknięcie jodu lub wyłuszczenie worka.

Stenocardia.

Leczenie samego napadu polega na wygodnem ułożeniu chorego w jasnym niedusznym pokoju, usunięcie uciskającego ubrania — podać choremu trochę czarnej kawy, łyżkę wina lub cognacu.

Podskórnie wstrzyknąć morfinę lub wziewać trochę chloroformu.

Na okolicę serca synapizma, okład gorący, rozcierać kończyzny, dać lewatywę z soli. Można też wziewać kilka kropli Amylnitritu lub Pyridin.

Polecają też na wewnątrz wśród napadu: Nitroglicerynę z roztworem 0·01 na 10·0 z tego 10—20 kropli na raz, lub pastylki nitroglicerynowe po 0·001 wyrobu Beldowskiego, Mutniańskiego i innych.

Następnie leczyć chorobę przyczynową, najczęściej więc: wady sercowe, choroby nerwowe i zatrucia przewlekłe tytoniem, kawą, herbata.

Stomatitis aphthosa vide Aphthae.

Stomatitis catarrhalis.

Czyste utrzymywanie jamy ustnej, wynywanie ust chłodną wodą. Pędzlowanie: 2% kwasem borowym, 1% roztworem kali chloric. Dzieciom starszym zimne pokarmy, mleko z lodu. Wyrwać psujące się zęby, które są częstym powodem St.

747. *Boracis* 5·00,

Mel. rosat. 20·00,

Aq. rosar. 10·00.

MDS. Do pędzlowania.

Stomatitis ulcerosa. Stomacace.

Pędzlowanie pojedynczych owrzodzeń roztworem kali hypermang (0·12:15·0) 5—6 razy dzien.

748. *Acidi borici* 1·00,

Kali chlorici 0·75,

Succi citri 15·00,

Glycerini 10·00.

DS. Do pędzlowań.

Wewnętrznie: kali chloricum (1·0—3·0 na 120·0 Aquae pr. die).

749. *Decoct. cort. chinæ*

e 5·00 *ad* 100·00,

Kali chlorici 2·00,

Syrup simpl. 20·00.

MDS. Co godzinę łyżeczkę.

Stomatitis mercurialis.

Zaprzestać używania przetworów rtęci. Płukanie 2% roztworem kali chloric., 3% kwasem borowym, 2% kw. salicylowym, Sublimat 1:4000 do płukania.

Pędzlowanie owrzodzeń roztworem Tra jodi aa. cum Tra gallarum.

Struma.

Na wewnątrz podajemy mierne dawki jodu i wód jodowych lub gąbki morskiej zawierającej jod; na zewnątrz zaś stosujemy masę jodową.

Jeżeli leczenie to nie odnosi skutku, usuwamy cierpienie drogą operacyjną i to albo przez wstrzykiwania mięszone (jodu i jodoformu) lub przez podwiązanie tętnic, wyłuszczenie, resekeyę i t. p.

750. *Kal. jodat.* 5·00—10·00,

Aqu. dest. 200·00.

S. 3 łyżki dziennie.

751. *Natr. jodat.* 5'00—10'00,
Aqu. dest. 200'00.

S. 3 łyżki dziennie.

752. *Kal. jodat.* 5'00,
Jodi puri 0'50,

Ungu. simpl. 50'00.

Mf. ungu. S. Maść.

753. *Kali jodati* 5'00,
Glycerin q. s. ad solut.

Sapon virid. 50'00.

Mf. ungu. S. Maść.

754. *Spongiae tostae* 5'00,

Div. in dos. N. X.

S. Rano i wieczór proszek.

755. *Trae jodi* 30'00.

S. Do wstrzykiwań.

756. *Jodoformii* 1'00,

Aether sulph. 5'00,

Ol. olivar. 9'00.

S. Do wstrzykiwań.

757. *Jodoformii* 1'00,

Aeth. sulph.

Ol. olivar. āā. 7'00.

S. Do wstrzykiwań.

Sudamina, Miliaria. Potówka.

Unikać zbyt ciepłego ubierania dzieci w lecie. Posypywać pudrem lub:

758. *Amyl. oriz.*

Zinci oxydati āā. 10'00.

DS. Puder.

Sycosis.

Gdy skóra naciekła, pokryta strupami, krostami i guzkami, należy włosy jaknajkrócej obciąć i na rozmięczenie strupów przykładać oliwę lub maść Hebry. Po zmyciu strupów zarost ogolić, włosy szczypekami powyrywać, skórę następnie 2 razy dnia mydłem szarem zmywać, a po zmyciu nacierać sublimatem 1—2:1000. W 1/2 godziny po tem przykłada się znowu maść Hebry; ropnie istniejące otworzyć. Leczenie to trwa tak długo, dopóki naciek nie ustąpi i nowe chrosty nie występują.

W niższych stopniach Sycosis, zarostu się nie goli, lecz wyrывa się włosy, weiera się sublimat, a po tem maść z praecipit. album 1:20.

Syphilis universalis.

I. Kiła nabyta.

A. Kiła pierwotna.

Wycięcie zmiany pierwotnej, jeżeli usadowienie jej na to pozwala, z zabraniem jaknajobfitszem zdrowej tkanki lub wypalenie cum Kali Kaustico.

Gdy wycięcie zmiany pierwotnej nie nastąpiło:

a) Ekoryacya czysta polyskujaca, obmywanie takowej rozczyntem sublimatu 1:1000 i następnie, przykładanie raz dziennie emplastr. hydrargyri americanum supra linteum extens.

b) Wrzód lub ekoryacya z zagłębieniem w centrum, szarą wypociną pokryte:

Zmywanie rozczyntem sublimatu 1:1000 i zasypywanie jodoformem lub jodolem (bezwonny, lecz mniej skuteczny od jodoformu). Gdy powierzchwnia wrzodu pod wpływem tych środków się oczyści, przykłada się empl. hydrargyri americanum.

c) Wrzód fagedeniczny lub dyfteryczny: Obmywanie kwasem karbolowym 2% i zasypywanie jodoformem, na wewnątrz środki wzmacniające, unikać środków merkurialnych.

Leczenie ogólne środkami merkurialnymi w okresie kiły pierwszorzędnej może mieć miejsce:

1) Gdy pacjent jest zresztą zupełnie zdrow.

2) Gdy dyagnoza kiły pierwotnej jest zupełnie pewną.

3) Gdy zmiany pierwotnej nie wycięto.

4) Gdy zmiana pierwotna nie komplikuje się z fagedenizmem lub dyfteryą.

Ilość rtęci wprowadzona do organizmu nie może być znaczną, najlepszem w tej mierze preparatem jest:

759. *Hydrargyri oxydulati tannici* 5'00,
Glycerini puri 1'50,
Extr. et pulv. Liquir. āā. 4'00.
Mfpil. N. 100.

DS. 3—6 pigulek dziennie.

760. *Hydrargyri oxydulati tannici* 0'10,
Acidi tannici 0'05,
Extr. opii aquosi 0'005,
Sacchari albi 0'20,
Mfp. Dtur. tal. dos. N. XX.

DS. 2 proszki dziennie.

Preparat ten używa się tak długo, dopóki stwardnienie zmiany pierwotnej nie ustąpi. Inne preparaty w tym celu używane na wewnątrz są: Sublimat 0'01 pro die, protojoduretum hydrargyri 0'20 pro die.

Dyetetyka przy używaniu rtęci czy to na wewnątrz, czy przez weierania lub injekeye:

Chory nie powinien się narażać na zaziębienie, nie przeciążać się pracą ani fizyczną ani umysłową, nie palić tytoniu, prowadzić życie spokojne, dobrze się odżywiać i wysypiać. Mieszkanie powinno być nawet w zimie wietrzne. Pokarmów kwaśnych i trudnostrawnych należy unikać. Stolec powinien być raz dziennie. Jama ust i zęby powinny być jaknajczystiej utrzymywane.

Do płukania daje się:

761. *Kali chlorici* 10'00,
Aqu. dest. 500'00.

MDS. W ciągu doby wypłukać.

762. *Kali chlorici* 40'00,
Aluminis crudi 20'00,
Acid. borici 6'00.

DS. Łyżeczkę od kawy, do szklanki wody do płukania.

Jako proszek do zębów zapisuje się:

763. *Calcariae carbon.* 30'00,
Camphorae rasae subtilissime pulver. 3'00,
 MS. Proszek do zębów.

Do pędzlowania dziąseł po wymyciu jamy ust używa się:

764. *Trae Ratanhae Trae Myrrhae āā.* 25'00.
 DS. Pędzlowanie.

Intoksykacja rtęcią objawia się jako: *Enteritis*. W tym razie należy natychmiast przestać używać podawanego dotąd preparatu rtęciowego, podać łyżkę olejku rycinowego a następnego dnia laudanum 3 razy dz. po 0'02, dopóki biegunka nie ustąpi.

Stomatitis mercurialis 1-szy stopień (dziąsła obrzękłe, rozpulchnione, odstają nieco od zębów. broczą przy dotknięciu, sprawiają ból przy żuciu). W tym stopniu nie potrzeba usuwać preparatów rtęciowych i przestrzegać tylko pilnego płukania ust.

2-gi stopień (obok powyższych objawów: obrzęk języka, ślinotok, smak metalowy w ustach, cuchnienie z ust, chwianie się zębów). Usunąć preparat rtęciowy, dokładne wietrzenie mieszkania, płukanie ust

765. *Tannini puri* 5'00,
Aqu. dest. 400'00,
Spir. vini gallici 100'00.
 MDS. Płukanie.

Pędzlowanie dziąseł cum:

766. *Tra Ratanhae „ Gallarum āā.* 25'00.
 MDS. 3 razy dz. pędzlować.

Celem usunięcia przykrew woini z ust:

767. *Chlorinae liquidae* 10'00,
Aqu. dest. 500'00,
Mellis rosati 50'00.
 MDS. Płukanie.

3-ci stopień (naciek na dziąsłach, policzku, języku, przechodzący w nekrozę i wrzody). Usunięcie natychmiastowe używanego dotąd preparatu rtęciowego, świeże powietrze, dobre odżywianie.

Do płukania:

768. *Camphorae rasae subtil.*
pulv. 3'00,
Emuls. amygdal 300'00.

MDS. Płukanie.

jakoteż płukanie dziąseł powyższym roztworem taniny. Największą ulgę jednak sprawia obok płukania przyżeganie owrzodzeń azotanem srebrnym w rozczynnie (1:2) lub in substantia.

Jeżeli się rtęci w kile pierworzędnej nie podaje, należy przed wystąpieniem kiły wtórorzędnej przygotować pacjenta do następnego leczenia, usunąć anaemię, podając żelazo z arsenikiem, przygotować jamę ust do leczenia przyszłego rtęciowego, a więc zęby karyetyczne wyrwać lub zaplombować, odzyszczać od palenia tytoniu.

Przetworów jodu używa się w kile pierwotnej tylko wtedy, gdy gruczoły limfatyczne są zbyt powiększone, jak się to zdarza u ludzi skrofalicznych.

B. Kiła drugorzędna.

Leczenie rtęcią wskazane w przypadkach kiły plamistej, guzkowej i łuskowej. W wysypkach chrostkowych tylko wtedy stosuje się leczenie rtęcią, gdy takowa jest wynikiem złośliwego jadu a nie słabej konstytucji, w tym ostatnim przypadku należy najprzód ogólne odżywienie poprawić.

Metody leczenia:

1) Środki wewnętrzne p. kiła pierwotna.

2) Iniekcje podskórne, do których wskazania następujące: Ła-

godna forma kiły wtórorzędnej, lub gdy pacjent ze względów towarzyskich wcierań robić nie może, lub w porze zimowej, wczasie wcierań, w domu pozostawać nie może.

Najpewniejszym środkiem jest Sublimat.

769. *Sublimati corrosiv 0'10,*
Natr. chlorati 1'00,
Aqu. dest. 10'00.

MDS. Iniekcye.

Z roztworu powyższego wstrzykuje się co dzień jedną strzykawkę Pravaza, zwykła i najmniejsza ilość iniekcji w leżbie dwudziestu.

3) Wcierania szarej maści.

Wskazania:

a) W przypadkach, w których podawanie przetworów rtęci na wewnątrz dla słabego przewodu pokarmowego są przeciwwskazane, a iniekcje sublimatowe dla neurastenii nie mogą być robione.

b) W przypadkach ciężkiego przebiegu kiły, niebędącego następstwem słabej konstytucji.

c) W przypadkach odnawiającej się kiły drugorzędnej, jeżeli takowa występuje w formie cięższej od 1-go wybuchu.

d) U ciężarnych i dotkniętych gruźlicą płuc.

e) Gdy wystąpią zmiany w organach ważnych dla życia lub grożące oszpecceniem.

Do jednego wcierań używa się u dorosłych 3'00—4'00 szaruchy u dzieci 1'00.

Sposób robienia wcierań:

Przed rozpoczęciem wcierań bierze chory kilkakrotną kąpiel, zmywając ciało mydłem, w celu otworzenia ujęć gruczołów potnych i łojowych. Przed wcieraniem korzystnym jest spocenie się chorego pod przykryciem, co nie powinno mieć miejsca po

uskuteczniomem wcieraniu. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wcierania, osusza się z potu część ciała, w którą ma być wcieranie robione.

Przy wcieraniu nie należy całą ilość szaruchy mającej być wtartą na raz wcierać, lecz ubierać z niej po troszce (wielkości soczewicy) i zajmować jaknajwiększą powierzchnię skóry.

Wcieranie odbywa się tak długo, dopóki palec przeprowadzony po miejscu wcierania pozostawia smugę jaśniejszą (20—30 minut w jedną połowę ciała).

Miejsce wcierań:

Wcierać po $\frac{3}{2}$ grm. szaruchy w jedną połowę:

- I, dzień obie łydki
- II. „ oba uda
- III. „ prawy bok klatki piersiowej i prawa połowa brzucha,
- IV. „ lewy bok klatki piersiowej etc.
- V. „ plecy (jeżeli nie sam pacjent robi wcierania).

Wcierań używa się najmniej 20, najwięcej 50.

Prof. Rosner jest zdania, że najrzadziej występują zmiany 3-rzędne, jeżeli się mimo braku recydyw zastosuje po 6 miesiącach powtórne leczenie wcieraniem w liczbie 20, a po roku trzeci raz robi się 20 wcierań.

Jod używa się w kile 2-rzędnej:

1) Przy równoczesnem zakażeniu zołzowem.

2) Gdy po wyleczeniu zmian kiłowych 2-rzędnych na skórze występują na błonach śluzowych, kłykciny sączące.

3) Gdy oprócz zmian na skórze i bł. śluzowych występują zmiany chorobowe w układzie kostnym. Najlepszym przetworem jodu jest:

770. *Natri iodati* 10'00,
Aqu. dest. 200'00.

MDS. 2 łyżki stołowe dziennie (w mleku) zażyć.

771. *Natri iodati* 10'00,
Glycerini 1'00,
Extr. et pulv. Quassiae āā.
q. s. ut f. pil. N. centum.

DS. Rano i wiecz. po 5 piguł.

772. *Jodoformii subt. pulver.*
2'00,

Extr. Quassiae q. s. ut f. pil. N. 20.

DS. Rano i wiecz. jedną pig.

Leczenie zmian miejscowych w kile 2-rzędnej,

Kłykciny sączące stanowiące znaczne nacieki wystające, w stolcu i na częściach rodnych, pędzluje się sublimatem 1:100, w jamie ust sublimatem 1:600 lub kwasem chromowym 2‰. Kłykciny z mniejszym naciekiem, płaskie, pozbawione przyskórka, pędzluje się roztworem azotanu srebrowego 1:30; skoro się pokryją przyskórkiem, usuwa się resztę nacieku plastrem merkurialnym, który się codziennie zmienia.

773. *Empl. hydrargyri*
Empl. saponati āā. 15'00,
Extende supra lintcum.

Iritis syphilitica.

Obok leczenia ogólnego wymaga także wczesnego zapuszczenia atropinu, by się synechie nie wytworzyły.

Psoriasis palmaris et plantaris:

Okłady wysychające w celu rozmiękczenia i usunięcia przyskórka pokrywającego naciek — ten zaś ostatni ustępuje pod plastrem rtęciowym.

Chrostkowe nacieki skóry głowy i brody, po usunięciu strupów oliwą, naciera się maścią:

774. *Mercur. praecipit. albi*
2'00,
Sublimati corrosivi 0'10,
Vaselini 20'00,
Olei rosarum gtt. tres.
S. Pomada.

C. Kiła 3 rzędna.

Wskazania:

W formach lżejszych daje się jod, w cięższych rtęć a nawet rtęć i jod.

Leczenie miejscowe w kilę 3-cio rzędnej:

Ozaena syphilitica:

Przepłukiwanie nosa 2^o/₁₀ kwasem borowym, słabym roztworem kali hypermanganicum (0'20:500) i pędzlować roztworem:

775. *Jodi puri* 0'20,

Kali iodati 2'00,

Glycerini 20'00.

MDS. Zewnętrznie.

Sarcocele syphilitica.

Plaster rtęciowy.

Periostitis.

Sprowadzająca silny ból wymaga pędzlowania jodem.

776. *Trae. jodi*

„ *Belladonae*

„ *Gallarum* āā. 10'00,

MDS. Zewnętrznie.

Gdyby ten roztwór drażnił skórę, daje się wtedy do pędzlowania roztwór:

777. *Jodi puri* 0'20,

Kali iodati 5'00,

Glycerini puri 20'00.

MDS. Zewnętrznie.

Kilaki skórne.

Tak wrzodzące jak nie wrzodzące, ustępują pod plastrem rtęciowym. Przy kilakach nie wrzodzących, często nawet wobec już istniejącej fluktuacji może nastąpić resorpcya, wrzo-

dziejące goją się także pod plastrem rtęciowym lub jodoformem.

Zdarzają się przypadki kiły, w których ani jod, ani rtęć skutków nie wywierają, a to są wypadki ciężkiej złośliwej kiły u indywidualów kachektycznych, często przedtem energicznie rtęcią leczonych.

W tych razach w pierwszym rzędzie starać się musimy o poprawienie stanu ogólnego. Działanie to wzmacniające posiada Decoetum Zittmanni. Pod wpływem tego środka poprawia się apetyt, wygląd chorego i waga ciała się zwiększa.

Sposób podawania tego środka jest następujący:

Na czczo w łóżku wypija chorey 300 gramów Decoet. Zittmanni fortius, ciepłego, a tę samą ilość Decoet. Zittmanni mitius chłodnego, po południu.

Przy używaniu tego środka należy unikać wszelkich pokarmów mogących wywołać biegunkę.

U niektórych ludzi po wyleczeniu kiły środkami rtęciowymi, rozwija się anaemia i uporczywie się utrzymuje. W przypadkach tych przepisuje się kąpiele parowe z tuszami, 2 razy na tydzień, lub wysyła się takich chorych do kąpiel siarczanych lub zakładu hydropatycznego (nigdy wobec jeszcze istniejących zmian kiłowych).

II. Kiła dziedziczna.

W pierwszych czterech tygodniach występującą kiłę, leczy się kąpielami sublimatowemi:

778. *Sublimati corross.*

Ammon. muriat. āā. 2'00,

Aqu. dest. 100'00.

MDS. Do jednej kąpeli.

Jeżeli dziecko ma 6tygodni lub więcej, robi się w cierania z szaruchy.

U dzieci 6-tygod.	0.30	pr. dosi
" " 8	0.40	" "
" " 10	0.50	" "
" " 12	1.0	" "

Usta należy wymywać kwasem borowym 1%.

Mniej pewnie działa według prof. Kosnera Calomel na wewnątrz podany.

779. *Calomel. laevigati* 0.15,
Sacchari lactis 4.00,
Mfp. Div. in dos. N. XII.

DS. Rano i wieczór jeden proszek w mleku podać.

Po 6 dniach robi się pauzę, i znów przez 6 dni podaje się Calomel, aż do ustąpienia zmian chorobowych.

Środek ten wywołuje często bardzo katar przewodu pokarmowego, czego wcierania nie czynia.

W ostatnim czasie polecają:

780. *Hydrarg. thymol. acet.* 1.00,
Glycerin 10.00,
Cocain mur. 0.10.

S. Raz na tydzień wstrzyknięcie wśródnięśniowe, w całości 10—12 strzykawek.

781. *Hydrarg. oxydulati nigr.*
pur. 1.00,
Ol. olivarum 10.00.

S. Co 2-gi dzień strzykawkę (30—40 wstrzyknięć).

782. *Hydrarg. salicyl.* 1.00,
Paraffin. liquid. 10.00.

DS. Co 5 dni wstrzyknąć w pośladek.

783. *Hydrarg. salicyl* 1.00,
Vasellini 30.00.

Mfu. S. Na wrzody syf.

784. *Hydrarg. salicyl* 1.00,
Magnes carb. 20.00.

S. Puder.

Empl. hydrarg. oleinic.

Plastrem tym pokrywa się kolejno: przedudzia, ramiona itp. większe części na 8 dni poczem kąpiel i nowy plaster.

Syphilis congenita p. Syphilis. Tabes dorsualis.

Jeżeli tabes na tle kiłowym, to wciěrki i kali jodat.

W innych przypadkach kąpiele letnie lub ciepłe, procedury hydropatyczne, elektryzowanie stośu pacierzowego, prądem galwanicznym, mniej polecane prądem faradycznym.

Na wewnątrz Arg. nitricum 0.01—0.02 w pigułkach, kali jodat 10:200, Arsen po 0.001, Ergotyna po 0.1—0.5 2—3 razy dziennie, Fosfor po $\frac{1}{10}$ miligr. do 1 miligr., w rozczyinach olejstych, mały dają rezultat dodatni.

Wieszanie chorego sposobem Moczukowskiego i Charcota.

Zresztą leczenie symptomatyczne zwłaszcza kojenie bólu środkami narkotycznymi, phenacetina po 0.50 2—3 razy dziennie, exalgina po 0.25 2 do 3 proszków na dzień, antipyrina 1.0, 3—4 na dzień, wstrzykiwania morfiny.

Chorych zamożniejszych wysłać do Nauheim, Teplitz, Wildbad, Ragaz, Pyrmont, Elster, Gastein, a przedewszystkiem Rehme.

785. *Liniment volat* 30.00,
Chloroform 20.00.

MS. Do nacierań.

Taenia.

Leczenie poprzedzić środkami czyszczącym, zachować dyetę. Polecają dnia poprzedniego pokarmy słone: śledzie, szynkę, sałatę, poziomki. Rano na czczo można nieco osłodzonej czarnej kawy. Po użyciu lekarstwa powinien chory spokojnie leżeć, aby uniknąć wymiotów.

786. *Extr. filic mar.*

Pulv. rad. filic. mar. āā. 10.00,
f. l. a. boli N. 10.

Consp. cynamom.

S. W przeciągu 2 godzin użyć.

787. *Ol. Crotonis gttam unam*
Chloroform. 4'00,
Glycerin 30'00.
 DS. Użyć na czczo.

788. *Extr. filic. mar. aether.*
8'00,
Calomelanos 0'80,
Div. in capsul. N. XVI.
 S. Na czczo co 5 minut kapsułkę w łyżce wody osłodzonej.

Jeżeli po 2 godzinach po użyciu ostatniej kapsułki tasiemiec nie odchodzi, dać 80'0 Syrup aetheris, a gdyby jeszcze po 2 godzinach dalszych nie odszedł podać 40'00 *Ol. ricini* w czarnej kawie.

789. *Flor. Koso 30'00,*
Kamalaе 15'00,
Extr. fil. mar. aeth. 4'00,
Mel. depur. q. s. f. boli
N. 60.

DS. Na wieczór 30, rano 10—20 sztuk użyć.

790. *Pelletierin tannic. 1'00,*
solve in
Infus. sennae 100'00.

DS. W małych dozach użyć w przeciągu $\frac{1}{2}$ godziny.

Najlepsza pora do leczenia tasiemca jest wówczas, gdy odchodzą większe kawałki. W czasie osłabienia, ciąży, karmienia, miesiączki, nie należy rozpoczynać leczenia.

Dzieciom przed ukończeniem 1 roku życia nie wolno spędzać tasiemca; również w czasie ząbkowania.

791. *Extr. filic. mar. 5'00,*
Mucilag. gum. ar. 10'00,
Syrup simpl. 15'00.

MDS. Na 2 razy użyć.

792. *Koussini 1'00,*
Extr. filic. mar. aeth. 5'00,
Pulv. althaeae q. s. f. pasta
div. in dos. N. 3.

DS. Co $\frac{1}{2}$ godziny doza.

793. *Kamal. 3'00,*
Pulpae tamarind. 20'00,
Mf. elect.

DS. Rano w przeciągu $\frac{1}{2}$ godziny na 2 razy użyć.

794. *Pelletierin tannici 0'30,*
Aqu. dest. 40'00,
Syrup rhei 10'00.

MDS. W przeciągu $\frac{1}{2}$ godziny na 2 razy użyć.

Po użyciu środków wymienionych należy dać w godzinę 20—30 gramów olejku rycyn. najlepiej w mocno osolonym rosole.

Skuteczne też bywają nasiona dyni (*Semina cucurbitae maximaе*) utarte z cukrem na emulsią (100 gramów), użyć w ciągu dnia, na 2 razy, po 3 godzinach po 2 dawce nieco *ol. ric.*

Tetanus.

Usunięcie powodów: oczyszczenie ran i wrzodów, wydobycie ciał obcych, odszczepów kostnych.

Wstrzykiwania podskórne w pobliżu rany co 2 godz. 0'02 acid carbol. Wstrzykiwać morfinę w małych dawkach, chloroformowanie. Chloral w lewatywach lub wewnątrznie z Cognakiem.

795. *Sulphonali 1'00,*
Dtur. tal. dos. N. 5.

S. 3 do 4 pr. dziennie (rozpuściwszy w 200 gramach herbaty lub rosolu).

796. *Urethani 1'00,*
tal. dos. N. 6.

2 do 3 razy dziennie proszek we wodzie.

797. *Pilocarpin hydrochlor.*
0'10,

Aqu. dest. 10'00.

MDS. Do wstrzykiwań (2—3 strzykawek dziennie).

Acid salicyl. w dużych dawkach, kali bromatum 5—10 grm. dziennie.

W razie osłabienia serca, podskórne wstrzykiwanie eteru, kamfory.

798. *Antipyrin* 0·50,

Dtur. tal. dos. N. X.

DS. Co 3 godziny proszek.

Tic douloureux zob. **Neuralgia trigemini.**

Trichinosis.

Środki przeczyszczające: infus Sennae, Calomel, Glycerina co godzina łyżkę. Benzyna w kapsułkach żelatynowych po 0·50 do 5 gramów dziennie.

Bóle mięśniowe łagodzić zastrzyknięciem morfiny, kąpiele ciepłe, wcierania chloroformu.

799. *Benzin* 6·00,

Mucilag. gum. arab.

Solut. Succ. liquir. conc.

āā. 25·00,

Aqu. menth. crisp. 100·00.

MDS. Co 2 godziny łyżkę.

800. *Benzoli* 0·50,

ad capsul. gelat. N. 50.

Rano na czczo i popołudniu po 5 kapsulek, w godzinę po każdym zażyciu łyżeczkę pulv. rad. rhei et pulvis liquir comp. aa p. aequ. kuracya ma trwać kilka dni.

Trismus et Tetanus neonatorum.

Główną uwagę zwrócić na pępek, opatrunek przeciwnilny.

Chloral po 0·05 pro dosi, kilka razy dziennie, w mleku, wlać do nosa lub w lewatywie (w podwójnej dawce) Sole bromowe po 0·50 na dzień. Conium hydrobromicum (aż do 0·05 pro die). Ciepłe kąpiele 28° R. kilka razy dziennie. Karmić mlekiem również przez nos.

Tuberculosis laryngis.

Dobre żywienie, szanowanie głosu. unikać pyłu i t. p. szko-

dliwości. Zaraz z początku cierpienia kreozot do wewnątrz, prócz tego żelazo, arsen; zamóżnych wysłać na zimę na południe na Rivierę, do Wenecyi, Kairu, w lecie Görbersdorf, Davos.

801. *Resorcin* 5·00,

Aqu. dest. 500·00.

S. Do inhalacyi.

802. *Jodoformii* 2·00,

Acid. borici 1—8·00.

S. Do wdmuchiwań.

803. *Morphii muriat.* 1·00,

Pulv. gum. ar.

Sacch. lactis 3—5·00.

S. Do wdmuchiwań.

804. *Cocain muriat.* 1·00,

Sacch. lactis 2·00.

S. Do wdmuchiwań.

805. *Cocain mur.* 0·50—1·00,

Aqu. dest. 10·00.

S. Do pędzlowań.

806. *Acidi lactici* 20·00.

Aqu. dest. 20—40—80·00.

S. Do pędzlowań.

Tuberculosis pulmonum.

W przypadkach dziedzicznie obciążonych, należy zwrócić całą uwagę na higieniczne wychowanie, przebywanie jak najwięcej na świeżem powietrzu, gimnastyka, wysypianie się, dobre odżywianie, nie obciążanie pracą umysłową lub fizyczną, unikanie zaziębień, hartowanie skóry przez zimne nacierania słoną wodą, zwłaszcza: szyi i klatki piersiowej.

W pierwszych początkach suchot przedewszystkiem uważać na podniesienie odżywienia chorego, forsownie go żywić. Polecić picie mleka w lecie, tranu w zimie, tłuszczów jak najwięcej, o ile tylko żołądek znośi. Pobyt kilkomiesięczny w górskim powietrzu podczas lata, na zimę zaś polecieć wyjazd do jednej ze stacyi klimatycznych

Ze środków leczniczych stosować kreozot, guajakol, arsen, zresztą leczenie symptomatyczne jak przy bronchitis.

W późniejszych okresach obok powyższych poleceń pilną uwagę mieć na pojawiające się krwiotłucia i stosownie je wstrzymać. Zmniejszać wydzielanie płuciu przez środki balsamiczne, usuwać gorączkę przez podawanie miernych dawek antypiretyków, jak antypiryny po 0·50^t 2—3 proszki na dzień, w razie potrzeby, toż samo phenacetiny lub antifebriny po 0·25.

Usuwanie mocnych potów przez zmywanie ciała winnym octem, cognakiem, wodą kolońską lub na wewnątrz cognac z mlekiem, lub atropina po 0·001 na noc, Agaricin bardzo słabo działa.

807. *Acidi agaricin 0·01—0·05,*
Sacchari 0·30,
Mfp. dtur. tal. dos. X.
S. 2 proszki dziennie.

808. *Extr. fluid. hydrast. Canad.*
10·00.
S. Na wieczór 30 kropli.

Przeciw krwotokom bezwzględny spokój, okład lodowy na piersi, polykanie lodu, pokarmy tylko chłodne, wstrzyknięcie Ergotini Bombelon 0·50 do 1·0 na raz, podanie większych dawek morfiny dla zapobieżenia kaszlowi.

Przy tętnie przyspieszonym dać: *Fol. Digitalis 0·05* z morfiną 0·01 co 2—3 godz. proszek. Albo *Ferrum sesquichloratum 25* kropli na $\frac{1}{2}$ szklanki wody i z tego co godzina łyżkę.

W ciężkich przypadkach krwotoku, wstrzyknąć atropinę 0·10: 10·0 z tego pół strzykawki na raz, lub *Acid. sclerotinici 1:10* wody, z tego co godzinę strzykawkę.

Przeciw biegunce leki osłabiające z dodatkiem opiatów:

Plumb. acet.

Laudani aa. 0·03.

(na dawkę, 2—3 razy dziennie).

Pigułki kreozotowe używać bez balsamu tolutańskiego. Dziennie można dojść do 3 grm.

(Z wyrobów krajowych: pigułki Bełdowskiego i Mańkowskiego, z zagranicznych dobra są Jaspersa (Berlin). W rozczyźnie dobrze jest zapisywać kreozot z *Tra amara* lub *Tra gent.*

809. *Kreozoti e bit. fagi 3·00,*
Trae gent. 30·00.

DS. Po jedzeniu 20—30 kr. w kieliszku wody lub wina.

810. *Kreozoti e bit. fagi 1·00,*
Trae gent. 2·50,
Spir. vini rectific. 25·00,
Vini Xerens 100·00.

DS. 3 razy dziennie po łyżeczce w szklance wody.

Pigułki guajakolowe po 0·05 wyrobu Bełdowskiego i Zachradnika, w tych samych dawkach co kreozot.

U dzieci: Niedozwalać suchotnicom karmić dzieci, zmywania chłodne, na lato pobyt w górzystej lesistej okolicy. Przeciw gorączce Chinin (0·25—0·30) *Acid. salicyl. 0·25* pro dosi.

811. *Acid. salicyl. 2·00,*
Aqu. dest. 100·00,
Cognaci 5·00,
Syrup 20·00.

DS. Co godzinę łyżeczkę.

812. *Kreosoti gtt. 5·00,*
Aqu. dest. 70·00,
Syrup 15·00.

DS. Co 3 godziny łyżeczkę.

813. *Kreosoti 1·50,*
Solv. in Ol. amygd. 30·00,
Gu. ar. 20·00,
Aqu. dest. 80·00,
Syr. amygd. 20·00.
Mf. emuls.

DS. 2 razy dzien. łyżeczkę.

814. *Guajacol* 1'00,
Trae chinæ 2'00,
Vini Malac. 100'00.

MDS. 3 razy dziennie łyżeczkę po jedzeniu.

W razie krwioplucia: spokój, lodowe okłady na klatkę piersiową.

Plumb. acet (0'03 pr. dos) kilka razy dziennie.

Extr. secal. cornuti, przy kaszlu Codeina, morfina. W razie biegunki Aq. Calcis z mlekiem.

Tumor albus.

W pierwszym okresie zaleca się absolutny spokój kończyny zajętej, staw należy ustalić w położeniu prawidłowym, (opatrunk gipsowy lub organtynowy).

Kąpiele słone lub słono-jodowe ułatwiają osiągnięcie wyniku korzystnego. W przypadkach dalej posuniętych, ograniczamy się u dzieci, do operacji mniejszych atypowych (wyskrobanie tkanek schorzałych Arthrotomia), w wieku zaś późniejszym zmuszeni zwykle jesteśmy decydować się na resekcyę stawu a często i amputacyę.

Główny nacisk w tego rodzaju chorobach należy położyć na poprawę ogólnego stanu odżywienia.

Tyloma. Modzel, Clavus. Od-cisk.

Zeskrobać zgrubiałą warstwę, wypuścić ropę, opatrunek, później maść lub plastry.

815. *Acid. salicyl.* 5'00,
Collodii 50'00,
Extr. canab. ind. 1'00.

MDS. Przez kilka dni pędzlować.

816. *Praecipit. albi*
Zinci oxyd. āā. 2'00,
Ungu. simpl. 20'00.
 S. Maść na modzele.

817. *Empl. Diachyl.* 15'00,
Aeruginis
Camphorae āū. 1'00.
 Mf. emplastrum.

Typhlitis et Perityphlitis.

Leczenie zewnętrzne polega na stosowaniu środków przeciwzapalnych i odwodzących, okład lodowy, pijawki, smarowanie jodyną. W przypadkach gdy chory nie znosi okładów lodowych — okład wysechający.

Wewnętrznie przetwory mawkowca a w razach gwałtownych bólów, podskórne wstrzyknięcie morfiny. Dyeta wyłącznie płynna, bezwzględny spokój.

Gdy okres zapalenia minie, środki przyspieszające wessanie wypociny są wskazane, więc: okłady ciepłe, wcierania maści jodowych. Jeżeli stolce w tym okresie dobrowolnie nie nastąpią, należy je ułatwić za pomocą lewatyw. Zresztą leczenie czysto przypadkowe, w razie silnych wymiotów, kawałki lodu do polykania, Cocaina.

Wrazie zapadu napoje wysokowe, eter podskórnie.

818. *Trae opii simpl.* 10'00.

DS. 3 razy dziennie. po 5—10 kropli.

819. *Extr. opii* 0'02,
Sacchari albi 0'30,
Dent. t. dos. XII.

DS. 3 proszki dziennie.

W razie silnych wymiotów:

820. *Cocain muriat.* 0'20,
Aqu. dest. 10'00.

MDS. W razie wymiotów 10 kropli zażyć.

821. *Morph. mur.* 0'10,
Aqu. dest.
Glycerini āā. 5'00.

DS. Do podskórnych wstrzyknień (w jednej strzykawce 0'01 morfiny).

Jako przyspieszające wessanie:

822. *Ung. Kali jodati 25'00.*

DS. Do weierania.

823. *Kali jodati 2'00,*

Extr. bellad. 0'50,

Ung. simpl. 30'00.

MDS. Do weierania.

W razie parcia na stolce lub moez :

824. *Morph. mur. 0'20,*

Butyri Cacao 10'00,

Mf. l. a. supposit. N. X.

S. 2—3 na dobę użyć.

Typhus.

Leczenie przypadowe, polegające na zwalczaniu zagrażających objawów.

Gorączkę należy obniżać za pomocą chłodnych zmywań całego ciała, wodą czystą lub z dodatkiem octu, letniemi kąpielami i środkami przeciwgorączko. wymi ale ostrożnie i niezawsze.

Skrzepiać akcyę serca napojami wysokowymi a gdy te nie są dostateczne, środkami nasercowymi.

W razie silnej biegunki, przetwory makowca i środki ściągające; w razie zaparcia stolca w pierwszym okresie choroby, środki czyszczące, w późniejszych okresach lepiej lewatywy stosować.

W razie krwotoków jelitowych okład lodowy na brzuch i środki przeciwkrwotokowe.

Przytem należy pamiętać o należytem przewietrzaniu mieszkania i dyecie, która powinna być wyłącznie płynna, zwłaszcza mleko, rosoly, wino czerwone.

W razie nieżyty oskrzeli, hańki suche.

825. *Chinin. mur. 0'40,*

Dtur. tal. dos. XII.

S. 2—5 pr. dziennie.

826. *Natr. salicyl 5'00,*

Aqu. dest. 200'00,

Syr. simpl. 15'00.

DS. Co 2 godziny łyżkę.

Gdy chodzi o znaczne obniżenie ciepłoty ciała:

827. *Antipyrin 0'50,*

Dtur. tal. dos. X.

DS. Co godzinę proszek aż do obniżenia ciepłoty.

828. *Phenacetin 0'50,*

Dent. tal. dos. X.

DS. Co godzinę proszek aż do obniżenia ciepłoty.

W razie silnej biegunki:

829. *Decoct. salep 0'50 ad 200'00.*

Trae opii simpl. gtts. 10,

Syr. rub. Idei 15'00.

DS. Co godzinę łyżkę zażyć.

830. *Chinin mur. 2'00,*

Pulv. Doweri 3'00,

Mfp. div. in dos. XII.

DS. 3 proszki dziennie.

831. *Mixt. gum. 200'00,*

Extr. Laudani aquos 0'10.

MDS. Co godzinę łyżkę.

W razie zapadu:

832. *Camphor. trit. opt.*

alcohol. 0'05,

Coffeini natrosalicyl. 0'10.

Chinini mur. 0'20.

Mfp. Dent. tal. dos. XII.

DS. 4—5 proszków dziennie.

833. *Naphtol-B*

Bismuth. salicyl āā. 0'20.

Mfp. S. 10 proszków na 24 godziny w razie biegunki.

834. *Naphtol-B*

Magnes. salicyl āā. 0'20.

S. ut supra.

(w razie zaparcia stolca).

Nareszcie w razie silnego podrażnienia mózgu:

Natri bromati 0'50,

Sacchari 10'00.

Rozpuściwszy we wodzie, wypić w ciągu dnia.

- 835.** *Camphor.* 0·50,
Chloralhydrat. 1·00,
Aqu. dest. 60·00,
Vitell. ovi unius.
 S. Co 2 godziny łyżeczkę.

Typhus exanthematicus

według tych samych prawideł.

Dzieci małe karmić wyłącznie piersią, lub odpowiednio rozcieńczonem mlekiem, starsze dostają herbatę z mlekiem rosół z jajem.

Gdy gorączka ustaje Cacao, rosół z tapiocą.

Pragnienie gasić kwaskami (*Ac. mur.*, *Ac. phosphoricum* 1:200 — z syropem, co godzinę łyżeczkę) przemywać usta 3% boraxem.

Na początku choroby Calomelem przeżyścić (0·02—0·05 pro dosi).

Ze środków przeciwgorączkowych:

Chinin 0·25—0·50 do wewnątrz lub w lewatywie, Antipyrin (1:120 z dodatkiem Cognacu 10·0) co 2 godziny łyżeczkę.

W razie czyszczenia:

Bismuth 0·10—0·20 *pro dosi*,
Chinin. tannicum.

Przeciw krwotokom: okład lodowy na brzuch, liquor ferri sesquichl, ergotin.

Przeciw bezsenności, rzucaniu się — lewatywy z chloralu (1—2·0 na dawkę).

W razie osłabienia serca, stygnięcia kończyn: czarna kawa z Cognakiem, eter podskórnie, szampan.

Ulcera.

Przy wrzodach cuchnących i zgorzelinowych najlepiej nadaje się posypka jodoformowa i zmywania kreoliną. Z maści zalecają się jodoformowa, arystolo-

wa a gdy się wrzód zupełnie oczyści, maść lapisowa, boro-wa, cynkowa. Na wrzody kiłowe należy stosować maść rtęciową, przeciw wrzodom skrófulicznym najlepiej i najpewniej użyć ostrej łyżki, a następnie ranę leczyć jodoformem. Płaskie wrzody rakowe można usunąć przez wyskrobanie i następowe przypalenie ługiem potasowym (po poprzednim zatamowaniu krwotoku).

Rozległe wrzody wymagają dość często zabiegu operacyjnego (okrojenie, transplantacya przyskórka, operacye plastyczne lub wreszcie amputacya). Przeciw wrzodom żyłkowym należy radzić noszenie opaski gumowej Martina.

836. Creolin 20·00.

S. Kilka kropli do szklanki wody.

837. Jodoform

Sacch. lact. āā. 5·00.

S. Zewnętrznie.

838. Jodoformi 2·00,

Ungu. simpl. 20·00.

Mf. ungu. S. Maść.

839. Aristol 1—2·00.

Ungu. simpl. 20·00.

840. Argent. nitr. 1·00,

Bals. peruv. 10·00,

Ungu. simpl. 100·00.

Mf. ungu. S. Maść.

841. Ac. boric.

Ol. olivar.

Cerae alb. āā. 15·00,

Ungu. simpl. 100·00.

Mf. ungu. S. Maść.

842. Zinc. oxyd. 10·00,

Ungu. simpl. 80·00.

Mf. ungu. S. Maść.

843. Kali caust. in bāc. fus.

5·00,

D. in vitro epistom. vitro clauso.

Ulcus contagiosum. (Wrzód miękki).

Zasada jest, by wrzód miękki zamienić na ranę czystą; środków żrących nie należy używać: jeśli gruczoly limfatyczne sąsiednie są bolesne, lub gdy do wrzodu przystąpiła dyfterya lub fagedenizm. By wrzód zamienić na ranę czystą używa się środków żrących, z których najlepszym jest sulfas cupri 1:3. Wypalenie tym rozczynem powtórzyć należy w odstępach 3 godzinnych 3 do 4 razy. Po odpadnięciu strupa w przeciągu 24—48 godzin pokazuje się dno czyste, wtedy zasypuje się jodoform lub jodol i watę zakłada. Gdy po pewnym czasie dno czyste, brodawkowate, ropy nie wydzielą, przykładą się maść z azotanu srebrowego.

844. *Nitratis argenti 0'10,*
Balsam. peruv. 1'00,
Vaselin. flav. 10'00.
Mf. ungu. S. Maść.

Fagedenizm i dyfterya.

Środków żrących się nie używa, lecz oczyszcza się dokładnie wrzód wodą borową 2⁰/₁₀ lub sublimatem 1:1000 2—3 razy dziennie i zasypuje jodoformem. Jeżeli przyczyną tych komplikacyj jest kacheksya lub anaemia należy używać odpowiednich środków wewnętrznych obok leczenia miejscowego.

Ulcus corneae (zob. Keratitis).

Ulcera intestini tuberculosa.

Leczenie czysto przypadkowe, polega na podawaniu środków odurzających wewnątrznie lub w postaci wstrzykiwań podskórnych, w razie silniejszych bólów na podawaniu przetworów mawkowca wraz ze środkami ściągającymi i przeciwniepalnymi z powodu zwykle towarzyszącej biegunki. Przytem należy starać się podnieść odżywienie chorego zapomocą odpowiedniej diety.

845. *Tinct. opii simpl. 10'00.*
DS. 2—3 razy dnia po 5—10 kropli.

846. *Laudani puri 0'02,*
Tannini 0'10,
Naphtalini 0'25,
Sacch. alb. 0'30,
Mfp. dent. tal. dos. XII.
DS. 2—3 proszki dziennie.

847. *Extr. opii 0'02,*
Resorcini 0'20,
Sacch. alb. 0'30,
Mfp. dent. tal. dos. XII.
DS. 2—3 proszki dziennie.

Ulcera laryngis syphilitica.

Leczenie ogólne przeciwkiłowe. W dysphonii przy kile drugorzędnej.

848. *Kali jodati 10'00,*
Kali brom. 20'00,
Aqu. dest. 200'00,
Syrup cort. aur. 100'00.
S. 2 łyżki dziennie.

849. *Calomelanos 1'00,*
Pulv. gummosi 5—10'00.
S. Do wdmuchiwania.

850. *Sublimati 0'20,*
Aqu. dest.
Spir. vini aa. 20—50'00.
Do Pędzlowań.

851. *Jodi puri 0'50,*
Kali jod. 1'00,
Glycerini 50'00.
S. Do pędzlowań.

Ulcus ventriculi. Wrzód żołądka okrągły.

Leczenie polega na podawaniu środków alkalicznych, czy to w postaci wód mineralnych, czy też soli alkalicznych.

Korzystne wyniki leczenia dają przepłukiwania wodą karls-

badzką lub rozczykami soli karlsbadzkiej prawdziwej lub sztucznej, które mają i tę zaletę, że je stosować można i w rączach, gdzie picie wody karlsbadzkiej z innych powodów jest przeciwwskazaniem. W razie silnych bólów lub wymiotów środki odurzające są wskazane, w razie krwotoków żołądkowych postępowanie lecznicze jak przy Haematemesis. Obok tego postępowania leczniczego dyeta powinna być pożywna a lekko strawna z wykluczeniem wszelkich napoi wyskokowych lub CO₂ zawierających, kwasów, tłuszczów i pokarmów korzennych. Gdy chorego z powodu silnych bólów, gwałtownych wymiotów lub żołądkowych krwotoków nie można stosownie żywić, wskazane są lewatywy odżywcze.

Często towarzyszące zaparcie stolca usuwać należy lewatywami.

852. *Sal. therm. Carolin.* 100·00.
DS. Codziennie na czczo łyżeczkę w $\frac{1}{2}$ szklanki letniej wody zażyć.

853. *Natr. bicarb.*
Magn. ustae aa. 15·00.
MDS. 3—4 razy dziennie na koniec noża zażyć.

854. *Natr. bicarb.* 5·00,
Morph. mur. 0·10,
Mfp. div. in dos. XII.
DS. 3 proszki dziennie.

855. *Morph. muriat.* 0·10,
Aqu. laurocer. 10·00.
DS. W razie bólów 10 kropli zażyć.

856. *Codeini* 0·02,
Natr. bicarb. 0·50,
f. p. dent. t. dos. XII.
S. 2—3 proszki dziennie zażyć.

857. *Magister. bismuth.* 5·00,
Codeini 0·20,
Mfp. div. in dos. X.
S. 3 proszki dziennie.

858. *Morph. mur.* 0·10,
Aqu. dest.
Glycerini aa. 5·00.

MDS. Do podskórnych wstrzykiwań. W jednej strzykawce 0·01 morfiny.

Uraemia.

Starszym, dobrze odżywionym, mierny upust krwi, dzieciom kilka pijawek za uszami. Zimne okłady na głowę, środki silnie czyszczące. Lewatywy z octu i wody. W razie silnych, długotrwałych drgawek lekkie zachloroformowanie, lewatywy z chlorału. Jeżeli są objawy zapadu, tętno szybko, nieregularne, kończyny chłodne, wino, camphora podskórnice, kąpiel ciepła (30° R.) i zawijanie w kocę. *Pilocarpin* (0·005—0·01) 2 razy dziennie, jednak ostrożnie, bo czasem wywołuje zapad.

859. *Chloral hydrat.* 3·00,
Aqu. dest. 150·00.
S. Do lewatywy (starszym).
Dzieciom 0·50—1·0:50·0.

Urticaria.

Usuwać przyczyny wywołujące; z zewnętrznych: ukąszenie owadów, pląskwy, uwzględnienie niezłyty żołądka, zaburzenia płciowe i t. d.

Zmywania zimną wodą, pudrowanie, kąpiele z dodatkiem sody, alunu, sublimatu, wątroby siarczanej. W celu usunięcia swiądu: zmywanie octem, eterem, 1—2% kw. karbolowym.

860. *Spir. lavand.* 100·00,
Spir. vini gall. 150·00,
Aether. sulphur. 2·50,
Aconitini 1·00.
MDS. Do nacierania.

861. *Chloralhydrat* 5·00,
Aqu. laurocer. 50·00,
Aqu. dest. 200·00.
DS. Do nacierania.

862. Chinin. muriat.

Ergotin āā. 0'05,
Extr. bellad. 0'002,
Glycer. q. s. f. pil. 1. tal. N. 10.
 DS. Co 3 godziny pigułkę.

863. Tinct. strophanti 10'00.

S Dwa razy dziennie po 10 kropli.

Vaginismus.

Usunięcie zmian chorobowych miejscowych jak owrzodzeń, zapalenia i t. d. jeżeli się znachodzą. Poprawa stanu ogólnego i podawanie środków uspakajających ustrój nerwowy. Gdy objawy nie zbyt jeszcze gwałtowne a przyczyną choroby jest niedokładny stosunek płciowy, wpływ moralny, środki znieczulające miejscowo, aby umożliwić coitum.

864. Cocaini muriat. 1'00,

Aqu. dest. 3'00,
Spir. vini rect. 2'00.

DS. Do pędzlowania albo:

865. Extr. bellad. 1'00,

Vaselini 15'00.

Mf. ungu. DS. Na wacie między wargi na noc zakładać. Zасыpywanie jodoformu. — Rozszerzanie powolne wnijścia pochwowego rozszerzaczami.

Jeżeli przypadki gwałtowne: wycięcie błony dziewiczej i nagłe rozciągnięcie wnijścia pochwowego sposobem tęnym po poprzednim zachloroformowaniu chorej.

Variola.

W okresie zwiastunów przeczyszczenie. Przewietrzać pomieszkanie, ciepłota pokoju 14—15° R., lekkie przykrycie chorego, dyeta pożywna płynna, mleko, mocny rosół z żółtkiem. Dużo wody, orszada, woda z winem. Przeciw bólom głowy lo-

dowe okłady. Napięcie skóry łągodzić smarowaniem tłuszczów (oliwa, vaselina, 5% maść borowa). Kąpiele ciepłe a gdy to nie możebne zmywania ciepłą wodą, zwłaszcza t arz i powieki. Płukania: 2% Kali chloricum, 3% kw. borowy.

866. Kali chloric. 5'00, solve in

Infus. flor. tiliae 300'00,
Trae laudan. 1'00,
Mell. rosati 10'00.

DS. Płukanie.

867. Tannin. puri 1'00,

Alumin. 0'50,
Kali bromat. 5'00,
Mucilag. gum. ar. 25'00,
Aqu. dest. 200'00.

DS. Płukanie.

Przeciw wymiotom pigułki lodowe lub wstrzyknięcie morfiny w okolicę dołka podsercowego.

W razie bezsenności:

868. Chloralhydrat 5'00,

Aqu. dest. 50'00,
Syrup rubid.
Mucilag. gum. ar. āā. 20'00.

DS. połowę na raz użyć.

869. Sulfonali 1'00,

Dtur. tal. dos. N. 5.

S. Na noc proszek w herbacie lub rosole.

Zaraz po wybuchu wysypki dać na głowę, twarz i szyję maskę z płótna, pozostawiwszy otwory na nos, oczy i usta, posmarowaną pastą:

870. Acid. carbol. 3'00,

Amyli
Ol. amygdal. dulc. āā. 50'00.

Resztę ciała smarować często:

871. Acid. Salicyl 3'00,

Amyli 30'00,
Glycerin neutr. 70'00.

Mf. Pasta.

A oprócz tych środków:

872. *Ol. amygd. dulc.* 15'00,
Syrup flor. aurant. 30'00,
Aqu. lauroc. 10'00,
Chinin. hydrochlor. 0'50,
Solve in acid. hydrochlor. q.
s. f. emulsio.

S. Co kwadrans do $\frac{1}{2}$ godziny
 po kilka kropli (Leventaner
 z Konstantynopola),

Wstrzymuje też rozwój wy-
 sypki Cocaina. jużto 3—4 wstrzy-
 knięć podskórnych rozczyne-
 m 2%, już też (0,20:125 mixt. gum.)
 w przeciagu 24 godzin podana.
 Ciepłota ma spadać szybko i roz-
 wój wysypki ustaje.

W osłabieniu serca: kamfora,
 wino, cognac na pół z wodą
 z żółtkiem i cukrem, co godzina
 łyżkę. Ropnie wczesnie otwierać.

Verucca.

Najlepiej wyciąć nożyczkami
 lub wypalić c. acido nitrico fu-
 manti, ferro sesquichlor., soluti-
 one Plenckii (Rp. Sublimati cor-
 rosivi, aluminis, cerussae, cam-
 phorae, spiritus vini aa 5,00) lub
 kw. octowym. Do wewnątrz po-
 dawać arsen 3 razy dziennie po
 2 krople.

873. *Acid. salicyl.* 5'00,
Acid. boric. 10'00,
Calom. 30'00.

DS. 3 razy dziennie wetrzeć
 w brodawkę.

Vitia Cordis.

Stosowne żywienie, mleko,
 mięso bez korzeni, osobom chu-
 dym więcej tłuszczów, otyłym
 tychże zabronić.

Wzbronione również napoje
 wyskokowe, prócz lekkich win.
 Ruch, a mianowicie po równi,
 lub po miernych wzniesieniach
 gór, z wyjątkiem, gdy chorzy
 dostają duszności, zawrotów gł-
 wy, lub nieregularności tętna.
 gimnastyka lecznicza, kąpiele

solne letnie. Unikać wzruszeń.
 Uregulować stolce.

Wobec braku kompensaty:

874. *Infus. digitalis e* 1'00
ad 150'00,
Syrup simpl. 20'00.

MDS. Co 2 godz. łyżkę,

875. *Trae digital.* 2'50,
Aqu. lauroc. 8'00.

MDS. 3 razy dz. po 15 kropli.

876. *Pulv. fol. digitalis*
0'50—1'00,
Sacchari 3'00,

Mfp. div. in dos. N. 10.

S. Co 2 godziny proszek.

Jeżeli po użyciu Digital. tetno
 mocniejsze, regularniejsze, ilość
 moczu większa, to przestać na
 parę dni podawać.

877. *Trae strophanti*
Aqu. lauroc. aa. 10'00.

S. 3 razy dz. po 10 kropli
 (Dzieciom od 5—10 lat do
 5 kropli dziennie).

878. *Coffeini citrici* 0'50,
Dtur. tal. dos. N. X.

S. Rano i w południe proszek
 Na noc nie podawać, aby
 nie wywołać bezsenności.

879. *Coffeini natro-benz.* 1'00,
Sacchari 3'00,
Mfp. div. in dos. 10.

S. 3 proszki dziennie.

880. *Infus. adonis. vern. e* 5,00,
ad 180'00,
Syrup rubid. 20'00.

S. Co 2 godziny łyżkę.

881. *Sparteïn. sulphur.* 0'10,
Aqu. dest. 180'00,
Syrup sacchar. 20'00.

MDS. Co 2 godziny łyżkę.

Przeciw puchlinie (zob. ascites)
 nacięcia obrzękłej skóry, jużto
 lancetem lub małym trójgranicem,
 po czem opatrunek aseptyczny.
 W razie duszności, gorczyzniki
 na okolicę serca, moczenie nóg
 w gorącej wodzie, wstrzykiwanie

morfiny, w razie silnego bicia serca blaszanka z zimną wodą na okolicę serca.

882. *Tinct. lobeliae* 5·00,
Aqu. lauroc. 10·00.

DŚ. Co godzinę 10 kropli.

Przy objawach obrzęku płuc:

883. *Inf. flor. arnicae* e 7·50
ad 150·00,
Liquor ammonii anis. 2·00,
Syrup aurant. 15·00.

MDS. Co godzinę łyżkę.

884. *Flor. benzoës* 2·00,
Camphor. 0·50,
Sacchar. 3·00,
Mfp. div. in dos. N. 10.

Ś. Co 3 godziny proszek.

Na pobudzenie apetytu środki gorzkie (*Tra amar.* *Tinct. chin.* comp.) *acid. mur.* Przy omdleniach, zawrotach głowy skutkiem anaemii mózgu, wino, eter,

Vulnus.

Ranę należy wmyć jednym z podanych poniżej rozczyńców przeciwnilnych i to tem energiczniej, im większe podejrzenie na zanieczyszczenie. Części obumarłe najlepiej od razu usunąć. Naczynia krwawiące należy podwiązać, okłóć itp. a ranę, o ile to jest możliwem i w danym przypadku dozwołonem, zespoić zapomocą szwów po ewentualnem założeniu sączków. Na wierzch należy położyć opatrunek przeciwnilny a całą część chorobą dotkniętą, wedle możności ustalić.

Wobec ran postrzałowych należy się w zasadzie ograniczyć do desynfekcyi okolicy rany i pokrycia jej opatrunkiem przeciwnilnym.

885. *Ac. carbol.* 10—50·00,
Aqu. dest. 1000·00.

S. Woda karbolowa 1—5‰.

886. *Sublim. corros.* 1·00,
Aqu. dest. 1000·00,
S. Sublimat 1‰₁₀₀

887. *Sublim. corros.* 1·00,
Acid. tartar. 5·00,
Aqu. dest. 1000·00.
S. rozczyzn kwaśny sublim. 1‰₁₀₀.

888. *Aseptol* 30—50·00,
Aqu. dest. 1000·00.
S. 3—5‰ rozczyzn aseptolu.

889. *Zinc. chlorat.* 80·00,
Aqu. dest. 1000·00.
S. 8‰ rozczyzn chlorku cynku.

890. *Thymol.* 1·00,
Aqu. dest. 1000·00.
S. Rozczyzn tymolu 1‰₁₀₀.

891. *Ac. salicyl.* 3·00,
Aqu. dest. 1000·00.
S. Przed użyciem ogrzać.

892. *Acid. boric.* 30—40·00,
Aqu. dest. 1000·00.
S. 3—4‰ rozczyzn kwasu borowego.

893. *Creolin* 20·00.
S. Kilka kropli do szklanki wody.

894. *Jodoform* 5·00.
S. Do posypywania ran.

895. *Jodoform*
Sacchar. lact. āā. 5·00.
S. Do posypywania ran.

896. *Jodoform* 2·00,
Collod. 20·00.
S. Collodium jodoformowe.

897. *Jodol* 1·00,
Aeth. sulph. 5·00,
Collod. 10·00.
S. Collodium jodolowe.

898. *Jodoform* 2·00,
Aeth. sulph. 20·00.
S. Eter jodoformowy.

899. *Jodoform* 2·00,
Glycerin 20·00.
S. Zawiesina jodoformowa.

900. *Jodol* 2·00,
Aeth. sulph. 20·00.
S. Eter jodolowy.

Na rany pokryte czystą ziarniną, stosujemy maść lapi-sową:

901. *Argent. nitr.* 1·00,
Bals. peruv. 10·00,
Ungu simpl. 100·00.
 Mf. ungu. S. Maść.

Opatrunek przeciwgnilny składa się z gazy antyseptycznej (jodoformowej, jodolowej, sublimatowej lub t. p.) z warstwy wysysającej (wata Brunsa, wełna drzewna, worki napełnione trocinami itp.) i z opaski ustalającej i przytrzymującej.

Vulvo - Vaginitis.

Troskliwe oczyszczenie części płciowych, ciepłe kąpiele nasiadowe. Przestrzykiwania pochwy sublimatem (0·10%), kw. karbol. 1—2%, Zinc. sulph. (0·50%), ałunem (5%) 3 razy dziennie. Zasyпки jodoformem lub pręciki jodoformowe Nadżerki na war-gach sromnych opatrzyć maścią salicylową lub pudrem salicylowym zasypać. Ropnie przecinać.

Przyczyny, jak anaemię, zoży leczyć środkami żelazistemi, jodowymi, tranem itp.



NOWE LEKI.

Acidum camphoricum.

Białe, krystaliczne igielki, smaku kwaśnego, w letniej wodzie (8:100) w ol. tłustych i wysokoku łatwo rozpuszczalne. Działa ściągająco na bł. śluzowe. W laryngitis i tracheitis $\frac{1}{4}\%$ rozczyń do rozpylania. W ostrym niezycie bł. śluz. nosa tampon napojony 2% rozc. Działa również przeciw potom suchotników (1—2^o na noc).

(100 grm 4 złr.)*

Aethyl pyocctanimum.

Działa silniej, niż pyocctanina (zob.) Prof. Stilling poleca przy chirurgicznem leczeniu guzów.

Aethylenum bromatum.

Środek mocno trujący, odróżnić należy od Aethylum bromatum. Dr. Donath w Peszcie poleca go przeciw epilepsyi.

Rp. *Aethyleni bromati* 5^o00,
ad emuls. oleos 100^o00,
Ol. menth. pip gttss. 2.

z tej emulsyi 2—3 r. dz. po 30 kropli w $\frac{1}{3}$ szklanki wody z cukrem. Co drugi dzień postępować po 10 kropli więcej, aż do 70. Dzieci od 8—10 lat rozpoczynają od 10 kropli. W razie podrażnienia żołądka (odbijania), zmniejszyć dawkę lub dodać 0·10 Extr.

opii, do emulsyi. Można też podać w kapsułkach.

Rp. *Aethyleni bromati* gttss. 3.
Ol. amygdal. dulc. gttss. 6.
Dtur. tal. dos. in capsul. gelatinosis N. 100.

S. 2 razy dz. po 2—4 kapsułek.

Amylenhydrat. Amylenum hydratum.

Płyn przezroczysty, oleisty, zapachu kamfory i mięty. Rozpuszcza się w 8 cz. wody. Przeciw bezsenności w dawce 3—5 grm. w wodzie ocukrzonej, piwie, kapsułkach lub lewatywie. Działa słabiej, niż chloral, silniej od Paraldehydu. W przypadkach, gdzie chcemy koić ból, podać go można z dodatkiem morfiny. Sen następuje w $\frac{1}{2}$ godziny po użyciu i trwa 7—9 godzin.

Pro dosi: 4^o00, pro die 8^o00.
(100 grm. 2 złr.).

Rp. *Amylen hydrat.* 7^o00,
Aqu. dest. 60^o00,
Extr. liquir. 10^o00.

MDS. Przed spaniem połowę.

Antiseptol. (Cinchoninum jodosulfuricum)

zawiera 50% jodu, proszek bez zapachu, rozpuszczalny tylko w wysokoku i chloroformie. Słu-

*) Ceny przy niektórych lekach podane, wyjęte są z cennika miesięcznego: Pezoldta et Süssa we Wiedniu.

ży jako środek antyseptyczny i zastępuje jodoform.

Anthrarobinum.

Działa podobnie jak Chrysarobina, lecz słabiej i powolniej, za to zaś o wiele mniej szkodliwa i znacznie tańsza. Kwalifikuje się przeto do użycia na twarz i części płciowe, Z dobrym skutkiem stosowano przeciw:

Herpes tonsurans, *Pityriasis*,
Erythema, *Eczema marg.* i t. d.

Rp. Anthrarobin 10'00,
Ol. olivar. 30'00,
Lanolin 60.

W roztworze wyskok. 10:80, lub 10⁰/₀ roztworze gliceryny, wreszcie z Collodium 1:10.

Aristol.

Różowo-żółty, prawie bezwonny proszek. Nie rozpuszcza się ani we wodzie, ani w wysokoku, natomiast w eterze i chloroformie. Zawiera 45⁰/₀ jodu. Używa się w chorobach skóry, owrzodzeniach i wszędzie może zastąpić Jodoform. Zapisuje się w postaci zasyпки, maści, przecików, czopków.

Rp. Aristol 0'30,
Sapo Kalin. 30'00,
Aether 5'00,
Alkohol 5'00.

Mf. ungu. S. Maść na wole.

Wetrzeć na wieczór i okład wysychający.

Rp. Aristoli 3'00,
Ol. oliv. 20'00,
Lanolin 80'00.

Mf. ungu. S. Na oparzeliny.
(100 grm. 11 złr.).

Benzanilid.

Proszek biały kryształiczny, w wodzie nierozpuszczalny. Środek przeciwgorączkowy, polecany w praktyce dziecięcej. Cie-

plota spada jak przy antyfebrynie, a jej podwyższenie się powolniejsze. Dla dzieci w proszkach z cukrem pro dosi 0'10 do 0'40, dorosłym 0'60 do 1'00.

Benzolguajacol czyli **Benzosol.** (*Acidum benzoic.* i *Guajacol*).

Proszek bezbarwny, używany w miejsce kreozotu przy gruźlicy płuc. Zapisuje się w proszkach z *eleosacch. menth.* po 0'25—0'80 trzy razy dziennie po jedzeniu.
(100 grm. 6 złr. 75 ct.).

Betolum. *Betol.* *Naphthosolol.*

(Połączenie kwasu Salicylow. z Naphtolem). Proszek bez smaku i zapachu. Środek antyseptyczny i przeciwgorączkowy. Kobert poleca B. przeciw reumatyzmowi stawów i nieżytowi pęcherza. Dawka: 0'30—0'40 cztery razy dziennie w pigułkach lub opłatku. Zewnętrznie przeciw rzerzączce w postaci przecików 1 cz. Betolu. 4 części Butyr. Cacao.

100 grm. 2 złr. 40 ct.

Bismut subbenzoic. v. **benzoicum.**

Biały delikatny proszek, używany zamiast jodoformu, zwłaszcza jako zasyпка na wrzód miękkiej. Finger poleca zasypywanie wrzodu 2 razy dziennie przez 3—6 dni. Pierwsze posypanie sprawia nieco pieczenia.

Bromoforn.

Płyn przezroczysty, słodkawy, w wysokoku łatwo rozpuszczalny, w wodzie opada w perłkach na dno i nierozpuszcza się. Specyfik na koklusz. (Jak i inne specyfiki zawodny) zob. *Pertussis*.

(100 grm. 1 złr. 60 ct.)

Bromol = Tribromphenol.

Jeszcze przez Rademackera używany środek, obecnie polecony przeciw dyfteryi do pędzlowań 1:25 gliceryny. Jako maść na owrzodzenia 1:10 maści. Przy cholera infantum 0'005—0'015.

Butylchloralum.

(Falszywie Crotonchloral hydratem zwany). Krystaliczne blaszki, aromatycznego smaku i zapachu. Rozpuszcza się we wodzie dość trudno (1:20), łatwo w wyskoku.

Środek nasenny i kojący, zwłaszcza w newralgiach n. trigemini (co 2 godz. po 0'20—0'40). Jako nasenny (0'50—2'00). Zewnętrznie: przeciw bólow zębów wraz z równą ilością kw. karbolowego.

Bryonia alba.

Polecona w ostatnich czasach przeciw krwotokom. Extractum w pigułkach po 1—2—3'00 pro die. Tinctura 2—3'00 pro die.

Cantharidinum.

Istota składowa z kantaryd powodująca powstawanie pęcherzy. Dawniej używano jej jako środka przyszczałego zamiast kantaryd. Obecnie sole kantarydiny zaczęto stosować przeciw gruźlicy — zamiast Tuberculiny. — Rzecz wymaga jeszcze badań, zdarzały się bowiem już po paru iniekcjach zapalenia pęcherza i nerek.

Chloramid zob. Chloralformamid.**Chloralformamid = Chloralamid = Chloralum formamidatum.**

Bezbarwne kryształy smaku nieco gorzkiego, we wodzie ła-

two rozpuszczalne. Łagodny lek nasenny. Używa się w bezsenności przy neurastenii, gruźlicy itp. chorobach, którym nie towarzyszą bólesci. 4'00 pro dosi 8'00 pro die. Sen następuje w 1/2 godziny, trwa 7—9 godzin.

Rp. Chlor. amid. 10'00,

Aqu. dest. 120'00,

Syrup rub. 30'00.

DS. Przed spaniem 2—4 łyżek.

Przy dłuższem używaniu dużych dawek pojawia się wysypka z towarzyszącą gorączką.

Chloralurethanum = Uralium.

Powstaje przez rozpuszczanie urethanu w roztworze chloralu. Środek nasenny, dobry, zwłaszcza dla suchotników, nerwowych i umysłowo chorych.

Dawka 2—3'00 pro dosi (w opł.).

Cornutin.

Według Koberta, najskuteczniejszy alkaloid sporyszu. Silnie trujący. Używa się przy krwotokach po poronieniu. — Metro Menorrhagii.

Dawka 0'005—0'01 w pigułkach.

Cytysinum.

Alkaloid z Cytisus Laburnum, silna trucizna, działa podobnie jak Curare i Strychnina. Środek dotąd niewypróbowany.

Dermatol.

Proszek barwy szafranowej, bezwonny, nierozpuszczalny, Jestto połączenie bismutu z kwasem gallusowym. Użyć go można w miejsce jodoformu, a mianowicie: na oparzeliny, owrzodzenia, na rany, w otoku usznym itp. jakoteż zdaniem Liebrechta zamiast bismutu w uporeczywych biegunkach i owrzodzeniach kiszki. Dr Gläser wyraża takie zdanie o Dermatolu: 1. zupełnie nietrujący, 2. niedrażniący, 3.

dobry antyseptyk, posiada własności osuszające i dobrze się daje zachować.

Dawka do wewnątrz do 2 grm. pro die.

*Rp. Dermatol 20·00,
Talci veneti 70·00,
Amyli 10·00.*

S. Do posypek (przeciw potowinóg).

*Rp. Dermatol 10·00,
Lanolin 80·00,
Vaselin 10·00.*

Mf. ungu. Maść na wrzody.
(100 grm. 2 złr. 40 ct.).

Diuretin.

Środek moczopędny. Jestto połączenie Theobrom. (48⁰/₁₀) z Natr. Salicyl. Proszek biały w wodzie rozpuszczalny. Działa moczopędnie, nie wpływa ani na serce, ani narząd oddechowy i nie drażni nerek. Stosuje się w przewłocznych chorobach nerek, mianowicie przeciw puchlinie.

Dawka 1—2 grm. pro dosi do 6 lub 7 grm. pro die.

*Rp. Diuretin 5·00,
Aqu. dest. 90·00,
Aq. menth. pip. 100·00,
Syrup simpl. 10·00.*

DS. Co 2 godziny łyżkę.
(100 grm. kosztuje 7 złr.).

Euphorinum = Phenylurethanium.

Proszek rozpuszczalny w mieszaninie wody z wyskokiem (np. winie) Środek przeciwgorączkowy. Działanie trwa 5—7 godzin. Rozpoczynać dawkę od 0·10 i można postąpić do 1—1·50 pro die. W reumatyzmie dawki 1—2·0 usuwają ból, gorączkę i obrzmienia.

Dawka 0·50 do 1·00 pro dosi, 1—2·00 pro die.
(100 grm. 7 złr.).

Europphen. (Isobutylortocresoljodid).

Delikatny żółty proszek rozpuszczalny w wysokoku chloroformie, eterze i oliwie. Środek antyseptyczny, posiada zupełnie te same własności, co jodoform, przewyższa go jednak tem, że jest bezwonny.

Exalginum = Methylacetanilid.

Krystaliczne białe igielki, bez smaku i zapachu, w zimnej wodzie trudno rozpuszczalne, łatwiej w ciepłej. Obniża cokolwiek ciepłość ciała, działa jednak głównie kojąco. Nie wpływa na krążenie i oddychanie (jedynie powyżej 0·75 bywa lekka sinica). Używa się w nerwobólach zwłaszcza twarzy, u osób anaemicznych i dotkniętych kiłą. Przy migrenie bez skutku. Działa też dobrze w reumatyzmach, kolce nerkowej. Chorea itp.

Dawka 0·10—0·25 dwa lub więcej razy dziennie, do 1·50 pro die. Podaje się jako proszek w opłatku lub np.

*Rp. Exalgin 2·50,
Alcohol menth. 15·00,
Aqu. dest. 190·00,
Syrup 30·00.*

DS. Co 2 godz. łyżkę (1 łyżka zawiera 0·20 exalg.).
(10 grm. 70 ct.).

Guajacol.

Płyn barwy żółtawej, ostrego, aromatycznego zapachu. Zmniejsza podrażnienie do kaszlu, ułatwia wykrztuszanie. Używany zamiast kreozotu w gruźlicy płuc.

*Rp. Guajacoli 7·50,
Tinct. Chinae 20·00,
Vini malacens 1000·00.*

DS. Łyżkę lub 2 przy każdym jedzeniu do 1 gram pro die.

Rp. Guajacoli 3'00,
Ol. jecor. aselli 200'00.

S. 3 razy dz. łyżkę po jedzeniu, lub też w kapsułkach gelatynowych, albo, gdy po pewnym czasie chorzy znosić nie mogą, w lewatywie:

Rp. Guajacoli 2'00,
Ol. amygdal. 20'00,
Gum. ar. 10'00,
F. emul. adde
Aqu. dest. 950'00.

S. Na 4 lewatywy.

Gnajakolum benzoicum,

Można użyć w większej od poprzedniego dawce. Identyczny z Benzozozolem.

(100 grm. 4 złr.).

Hydracetinum = Pyrodinum.

Białe, bez smaku kryształki, w wodzie trudno, w wysoku łatwo rozpuszczalne, używa się przeciw reumatyzmowi i w chorobach gorączkowych, Ischias, po 0'02—0'05 dwa razy dzień. Również przeciw Psoriasis w maści 10⁰/₀. Środek trujący, wywołuje czasem Haemoglobinurię, żółtaczkę, zapad.

Hydrargyrum benzoicum.

Proszek biały, krystaliczny, bez smaku i woni w wodzie nierozpuszczalny; łatwo natomiast w wysoku i roztworze soli kuchennej. Używa się do okładów na wrzody syfilityczne w równej ilości ze solą (0'10:25'00—50'00).

Rp. Hydrarg. benz.
Vaselin aa. 1'00,
Ol. Paraffini 8'00.

S. Do inj. podskórn.
(10 grm. 30 ct.).

Hydrargyrum carbolicum.

Środek przeciwkiłowy podaje się w pigułkach po 0'02—0'03,

3 razy dziennie. Dzieciom po 0'004—0'005 dwa razy dziennie.

Rp. Hydrarg. carbolici 1'20,
Extr. liquor.
Pulv. liq. aa. 3'00,
Mfpil. 60. Obduc. Bals. tolut.
S. 2—4 pig. dziennie.

Hydrargyrum B. naphtholicum.

Polecony na rany zadawnione, wysypki skórne itp. Bliższych opisów dotąd nie ma.

Hydrargyrum salicylicum.

Podaje się do wewnątrz po 0'01 0'025 w pigułkach 2—3 razy dz. przy czem poleca się popić ciepłym mlekiem.

Do iniekcji podskórnych, oraz do okładów, zasypek, maści na wrzody syfilityczne, Condylom. lata. itd.

Rp. Hydrarg. Salicyl. 1'00,
Extr. et pulv. liquor. q. s.
f. pil. 60.

S. 3 razy dziennie po jedzeniu 1—2 pig. (Schadek).

Rp. Hydrarg. Salicyl. 0'20,
Mucilag. g. ar. 0'30,
Aqu. dest. 60'00.

S. Do wstrzyk. wśródmięśn.

Rp. Hydrarg. Salicyl.
Kali carbon. aa. 0'10,
Aqu. dest. 10'00.

S. Do podskórnej iniekcji.

Rp. Hydrarg. Salicyl. 1'00,
Vaselin 30'00.

Mf. ungu.

Rp. Hydrarg. Salicyl. 1'00,
Magnes carbon. 20'00.

S. Zasypka. (Plumert).
(100 grm. 2 złr. 80 ct.).

Hydrargyrum thymoloaceticum.

Środek przeciwkiłowy w dawkach 0'005—0'01. W ostatnim cza-

sie używał Tranjen (w Bułgarii) tego przetworu w celu leczenia gruźlicy. Brak dotąd doświadczeń.

Rp. Hydrarg. thymol. acet. 1·00,
Glycerin 10·00,
Cocain. hydrochl. 0·10.

S. Do wstrzykiwań wśródmięśniowych, 1 strzykawka pro dos., raz na tydzień. (Według Loewenthala potrzeba do zupełnego wyleczenia Syfilis 8—10 zastrzyknięć).

Hydrastininum.

Białe krystaliczne igielki, rozpuszcza się trudno we wodzie, łatwo w wyskoku, eterze. Lepiej używać ol. hydrochloricum. Falk używał z dobrym skutkiem przy Endometritis, Dysmenorrhoea, nieregularnej miesiączce co dzień po $\frac{1}{2}$ strzykawki, 10% rozczyntu t. j. 0·05.

Rp. Hydrastinin. hydrochl. 1·00,
Aqu. dest. 10·00.

S. $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki dziennie w razie krwotoku.
(1 grm. 2 złr. 20 et).

Hydroxylaminum. H. hydrochloratum.

Używa się w chorobach skórnych w miejsce chrysarobiny i kwasu pyrogallusowego, przeciw psoriasis, lupus, w rozczyntu 1% wysokowym. Srodek trujący wymaga wielkiej ostrożności.

Rp. Hydroxylamin mur. 0·20—
0·50,

Spir. vini 100·00,

Calcar. carb. q. s. ad neutr.

S. Do pędzlowań.

Hyoscin, H. muriaticum, H. hydrobromicum, H. hydrojodic.

Rozszerza źrenicę również, jak atropin, tylko prędzej, działanie jednak trwa krócej. Używa się

do zakraplań 1:1000 do 1:400; z pierwszego rozczyntu wkrapla się 10—15 kropli, z drugiego 4—6 kropli. Gdzie chodzi o uspokojenie podrażnienia umysłowo chorych, ma działać wybornie, pisze Rabów. Chorem takim dawał zazwyczaj w wodnym rozczyntu (a nie podskórnym).

Rp. Hyoscin. hydrojod. 0·01,
Aqu. dest. 10·00.

Pierwsza dawka 8 kropli ($=\frac{1}{3}$ mlgr.) we wodzie, mleku lub winie, później można dojść do 12 kropli a nawet 16 pro die. H. działa silniej, niż Hyoscyamina.

(1 grm. 4 złr.).

Hyoscyaminum.

Alkaloid z hyoscyamus niger, w postaci błyszczących igielek, bez woni, ostrego smaku. Zwyczajnie sprzedają go w proszku zanieczyszczonym Hyosciną. Używa się jako mydriaticum, zamiast atropiny.

Jako środek nasenny w chorobach umysłowych od 1—3 miligramów, jako anodynum i antispasmodicum, $\frac{1}{2}$ —1 miligr. w pigułkach, przeciw astmie, kokluszowi, epilepsji.

(1 grm. 6 złr.).

Hypnalum.

Połączenie antypyryny z chloralem. Kryształy bez smaku i zapachu, rozpuszczające się w 5—6 częściach wody. Srodek nasenny, nie posiada złego smaku i żrących własności chloralu (1 gram $=$ 0·45 chloralu i 0·55 antypyryny). Dawka 0·50 do 1·00. działa silniej, niż równa ilość chloralu. Szczególniej stosowny dla dzieci.

(10 grm. 1 złr. 20 et.).

Bonnet podaje następujący przepis:

Rp. Hypnali 10'00,
Aqu. dest. 65'00,
Aq. flor. aurant. 5'00,
Spir. vini 40'00,
Tinct. cort. aur. 20'00,
Syrup simpl. 60'00,
Trae croci gtt. 2.
 MDS. 1—2 łyżek użyć.

Rp. Chartreuse 4'00,
Aqu. dest. 15'00,
Hypnal 1'00.
 S. Na raz użyć.

Bardet.

Jodolum.

Żółtawo biały proszek w wodzie trudno rozpuszczalny (1:5000) zawiera 89% jodu, bez smaku, ze zapachu podobny do tymolu. Jako antyseptyk do zasypek. Do wewnątrz, jako środek przeciwkiłowy 1'00 pro die. Ma tę wyższość nad jodoformem, że jest bez woni i mniej trujący. Nie tworzy takiej skorupy, jaka bywa przy jodoformie. W okulistyce używa się w formie maści 2:10, przeciw Conj. chron. et granulosa.

(100 grm. 7 złr.)

Jodantipyrinum.

Działa raz jako antipyrin, to znowu jak sól jodowa. W durze i gruźlicy działa jak antipyrina. Dotąd niewyjaśniono, czy ma wyższość nad czystą antipyriną. Dawka 0:50—1:50.

Jodantifebrinum.

Środek zupełnie zbyteczny.

Jodophenin.

Witkowski przypisuje temu środkowi własności przeciwpratkowe, dotąd nie podano jednak w jakim kierunku.

Jurubeba.

Środek przeczyszczający, w chorobach wątroby i śledziony,

okazał się według badań Koberta zupełnie bezskutecznym.

Lipanium.

Składa się z oliwy i 6% wolnego kwasu tłuszczowego. Używa się zamiast tranu i posiada tę zaletę, że dzieci chętnie ją biorą, a skutkiem kwaśnego oddziaływania dobrze się trawi. (Tran jednak zawsze skuteczniejszy i nigdy Lipanią zastąpić się nie da).

Lobelinum.

Z liści lub nasienia Lobel. infl. Płyn żółty, oleisty, ostrego smaku. Używa się częściej jako *Lobelinum sulphuricum* (proszek żółtawy) przeciw astmie i nieżyłtowi oskrzeli.

Dawka: 0'05—0'10 pro dosi 0'20 pro die, dzieciom 0'01—0'05. Środek niepewny.

Methacetinum = Para = Acetanisidin.

Proszek różowawy, bezwonny i bez smaku w wodzie rozpuszczalny. Środek przeciwgorączkowy, kojący bóle nerwowe silniej, niż phenacetyna. Działa poniekąd antyseptycznie. Używano z skutkiem przy gruźlicy, tyfusie, reumatyzmie stawów. Dawka: dzieciom 0'20—0'30, dorosłym 0'30—0'40.

Methylalum.

Płyn bezbarwny, lotny, łatwo w wodzie rozpuszczalny, smaku aromatycznego, piekącego, zapach jakby eteru octowego zmieszanego z chloroformem.

Zewnętrznie w linimentach i maściach 5:30 jako środek łagodzący ból. Do wewnątrz: w stosunku 1:150; jakoteż do wstrzykiwań podskórnych, Ma być doskonałym środkiem nasennym. Używa się przeciw nerwicom

żołądka i kiszek, przy delirium tremens, i jako odtrutka przy otruciu strychniną.

Dawka: 1—5 grm. — podskórnie 0·10 (bez dodatku) co 2 godziny. (Wstrzykiwania są bolesne).

Methylacetanilid zob. **Exalgin**.

Morrholum.

Produkt tranu, zawierający znaczne ilości jodu, siarki i fosforu. Gorzki, aromatyczny. Działa jak tran.

Dawka 0·20 (5·0 tranu) w kapsułkach, dla dzieci 4, dla dorosłych 6 sztuk dziennie.

(100 grm. 1 zlr. 60 ct.).

Myrtholum.

Jest częścią składową olejku z liści myrtus communis. Ciecz jasna dość znośnej woni. Podaje się w zgorzeli płuc i cuchnącej wydzielinie z oskrzeli. Najlepiej używać w kapsułkach napełnionych po 0·15 myrtolem. Co 2 godziny 2 kapsułki. Skutek często zdumiewający.

(100 grm. 4 zlr. 50 ct.).

Naphthalolum zob. **Betol**.

Natrium paracresotinicum.

Działanie podobne do kw. salicylowego. Demme podawał dzieciom przy gościeu stawowym. pneum. catarrh; Typhus abd. z dobrym skutkiem, stosując małe dawki (0·10 co 2 godz.):

Mianowicie zaś:

od 2—4 lat 0·1—0·25 p. d. 0·50—1·0 p. die
 „ 5—10 „ 0·25—1·00 „ 2·50—3·0 „
 „ 11—16 „ 1·0—1·50 „ 3·50—4·0 „

W razie zapadu: (wyjątkowo) Cognac z wodą.

Najlepszy skutek okazał się przy Catarrhus gastro intestinalis acut. u dzieci, podawano następującą mieszaninę:

Rp. Natri paracresotinici 0·10—
 0·20,

Tinct. Opii gttss. 2.

Cognac 1·00,

Syrup gummosi 5·00,

Aqu. dest. 25·00.

DS. Co 2 godz. łyżeczkę.

Oleum Hydrargyri vel cinereum.

Gęsty olej złożony z 3 części rてci utartej z Lanoliną i dodatkiem 4 części ol. olivar. Używa się do podskórnych wstrzykiwań przy leczeniu kily. Przed użyciem należy olej ogrzać. Wstrzykiwania skutecznie się co 5 lub 8 dni po 0·10 do 0·15. Do wyleczenia wystarcza podobno 2—3 tygodni.

Oleum Gurjun.

Balsamum G. Murell poleca go w miejsce Bals. Copaive, gdyż nie sprawia pieczenia w przełyku, i biegunki, ani wysypki nie wywołuje. Służy też jako śr. wyksztusny przy Bronchitis, w chorobach skóry, zwłaszcza Elephantiasis.

Dawka 2—4·0 dziennie 2 lub 3 razy. W celu poprawienia smaku zapisuje się na 2 części balsamu, 10 części ekstraktu słodow.

Orexinum v. O. hydrochloricum.

Bezbarwne błyszczące igiełki, rozpuszczają się we wodzie łatwo; smaku gorzkiego. Zostawiają uczucie pieczenia na języku i w przełyku. Polecona jako Stomachicum przy braku apetytu, blednicy, gruźlicy, osłabieniach i t. p. Wywołuje uczucie głodu.

Dawka 0·20—0·50 pro die, już to w opłatku, już w pigułkach.

Ze względu na drażniące właściwości, należy popić większą ilością rosółu, herbaty, mleka,

lub kawy. Najlepiej zażywać między 8—9 godz. rano, gdyż skutek pojawia się w 3—4 godzin.

Doświadczenia Dra Podgórskiego w Szpitalu św. Łazarza wykazały niejednostajność działania.

(O. hydrochlor 10 gr. 1 złr. 40 ct.).

Orthinum, O. hydrochloricum.

Środek przeciwgorączkowy. Ostrzegają jednak przed używaniem onegoż Prof. Kobert i Unverricht, gdyż sprawia dreszcze, nudności, wymioty.

Phenocollum hydrochloricum

czyli Amido-acet-para-Phenitidin, nowy środek przeciwgorączkowy i przeciwgośćcowy.

Proszek biały, rozpuszcza się w 16 cz. wody. Prof. Mering spostrzegł po jedno-gramowej dawce (u chorych z zapal. płuc i tyfusem) spadek ciepłoty o 2^o C. bez zapadu i sinicy. Działanie trwa 2 godziny, podwyższanie się ciepłoty występuje bez dreszczu i bez potów. W reumatyzmie po 5 gm. pro die, zmniejsza ból.

Dawka 0.50—1.00 pro dosi (co 2—4 godziny), do 5.00 pro die.

Phenylurethan zob. Euphorinum.

Photoxylinum.

Rodzaj Collodium z wełny drzewnej, pozostawia grubszą i mocniejszą warstwę.

Picrotoxinum.

Środek mocno trujący zalecony przeciw padaczce, eclampsyi. Odtrutka na morfinę.

Dawka w pigułkach po 0.001—0.005.

Piperazidinum (hydrochloricum).

Przedstawia się w postaci krystalicznych igiełek, łatwo w wodzie rozpuszczalnych. Posiada smak sالميaku — rozpuszcza znaczną ilość kwasu moczowego. Ma być głównie działającym składnikiem odmładzającej sperminy Brown-Sequarda.

Zob. Sperminum.

Podophyllotoxinum.

Głównie działający składnik *Podophyllum peltatum*. Bardzo silnie trujący.

Pyoctaninum.

(Z greckiego pyon: ropa, kteino zabijam). Są to barwiki aniliny. (P. coeruleum: Methylviolet, P. aureum: Auramin).

Środki antyseptyczne, sprawiają rychłe powstawanie strupów i zabliznienie. P. coeruleum używa się w substancji w roztworze 1:1000—1:100, jako zasypka (2^o/_o), w maści (2^o/_o) na ropiejące rany, eczem i t. p.

P. aureum używa się w okulistyce.

Plamy z Pyoctaniny oczyszcza się spirytysem mydlanym.

(10 grm. 42 ct.),

Pyridinum.

Płyn bezbarwny, przenikliwej woni. Używa się przeciw astmie do inhalacji. wachając go od czasu do czasu z flaszki. Polecają też przeciw rzerzączce:

Rp. Pyridini 0.03,

Aqu. dest. 90.00.

DS, Raz na dzień wstrzyknąć.

Rademaker twierdzi, że do uleczenia potrzeba 3—4 iniekcjy.

(100 grm. 70 ct.)

Pyrocinum zob. Hydraceticum.

Salipyrinum vel Antipyrinum salicylicum.

Jestto biały i bezbarwny proszek krystal. trudno w wodzie rozpuszczalny.

Środek przeciwgorączkowy, zwłaszcza przy reumatyzmie stawowym zachwalany. Sprawia czasem wysypkę.

Dawka pierwsza 2·0 następnie co godzina po 1·0, do 6·0 pr. die. (100 gr. 5 złr. 70 ct.).

Salolum = Phenolsalicylat.

Biały proszek krystaliczny, bez smaku i zapachu, w wodzie nierozpuszczalny, natomiast łatwo w wyskoku i eterze. Środek antyseptyczny i przeciwgorączkowy. Mocz po użyciu S. zabarwia się jak przy karbolu. Używa się przeciw cholerze, dysenteryi, w chorobach pęcherza, reumatyzmie. Jako antyseptyk w proszku, w maściach podobnie jak jodoform.

Dawka 0·50—1·0 pro dosi (w oplatku) do 5·0 dziennie.

(100 grm. 2 złr.).

Simulo.

Owoc z Capparis coreacea. Tinkturę z nasion polecają przeciw hysteryi i padaczce.

Solaninum.

Środek przeciwkurczowy zwłaszcza przeciw bólom u tabetyków w dawce 0·025—0·03 jako nasenny, w pigułkach, proszkach. Podskórnie w roztworze wodnym po 0·01.

Jestto środek mocno trujący.

Solvinum.

Środek mocno trujący, służy do rozpuszczenia Salolu, Naphtolu, kamfory, przy przyrządzaniu maści.

Somnal.

Środek nasenny. Według badań Lutze'go okazało się, że jest szczerym Chloralurethanem, rozpuszczonym w wyskoku. Dawka 2—4 grm. na noc, w wodzie oczkzonej.

(100 grm. 2 złr. 10 ct.).

Sozjodolum.

Połączenie jodu z karbolem. Kryształki bez zapachu, łatwo rozpuszczalne we wodzie, wyskoku i glicerynie. Środek antyseptyczny, w miejsce jodoformu używany.

Przeważnie jednak polecane są następujące połączenia:

Hydrargyrum sozjodolicum, proszek pomarańczowej barwy (31% Hdrgr. i 38% Jodu). W maściach 1:50 do 1:10.

Lithium sozjodol. w reumatyzmie stawów.

Rp. Lithii sozjodol 0·50—1·00,
Sacchari 1·00,
Tal. dos. 20.

S. 3 pr. dz.

Kalium sozjodol. przeważnie w maściach i proszkach.

Rp. Kali sozjodol 3·00,
Lanolin 30·00.

Mfu. S. Maść na rany i oparzenia.

Rp. Kali sozjodol 5·00,
Talci venet 50·00.

S. Puder. Przeciw potom nóg, eczema, do wdmuchiwania do nosa.

Natrium sozjodol. Łatwo rozpuszcz. we wodzie.

Rp. Natri sozjodol 2·00,
Aqu. dest. 200·00,
Aqu. colon. 20·00.

S. Woda na włosy, do przemywania głowy.

Zincum sozjodol. do zasypek (10:100) lub n. p.

Rp. Zinci sozod. 2'00,
Aqu. dest. 100'00,
Glycerin 5'00.

S. Do przestrzyk. ucha.

Przetwory sozodolu używają się głównie do opatrunku ran, w chorobach skóry, krtani, ucha: wewn. przeciw reum. stawów. (Sozod. natr. 100 gm. 4 złr. 80 c.).

Spermin.

Brown, Séquard podał w r. 1889 wiadomość, że płyn wyciśnięty z jąder młodych zwierząt (psów, królików, szczurów itd.) wstrzyknięty podskórnie człowiekowi, wywołuje podniecenie czynności nerwowych i mięśniowych, zwłaszcza zaś odmładza zwieźdniałych starców, podnieca czynności płciowe itp. Znaleźli się gorliwi zwolennicy, lecz również i przeciwnicy. Kobert mniema, że wspomniane działanie wymaga jeszcze dowodów, a z literatury wiadomy mu jeden przypadek, w którym podniecenie czynności płciowych się uwydatniło, był to jednak chory na priapismus.

Parke i Davis puścili w handel sperminum hydrochloricum, która używa się w ten sposób:

Rp. Spërmini hydrochlor 0'10,
Aqu. dest. 8'00,
Glycerin 2'00.

S. Dziennie 1—2 wstrzykawkki.

Głównie działającym czynnikiem sperminy ma być piperazidinum (zob.).

Strophantin.

Główny składnik z nasienia Strophantusa. Jestto środek bardzo trujący i z powodu braku pewnych doświadczeń, niepowinien być jeszcze używanym.

Sulfonalum.

Środek nasenny. Biały, krystaliczny proszek, bez smaku i za-

pachu, rozpuszcza się w 500 cz. wody zimnej a w 15 gorącej. Środek nieszkodliwy. Działa nie tak szybko, jak chloral, lecz za to dłużej, lepszy od Amylenhydratu lub Paraldehydu. Używany w chorobach umysłowych, nerwowych (Trismus neonator. (po 0·20 w lewatywie). Przy Diabecie zmniejsza ilość cukru w moczu. Przeciw potom u suchotników. Dawka 0·25—0·30 w opłatku co ½ godziny 3—5 razy. Chorym umysłowo 2—3'00. Diabetykom 1—2 grm. Najwyższa dawka 4'00 pro dośi 8'00 pro die.

Rp. Sulphonali 4'00,
Aqu. dest. 100'00,
Syrup aurant 20'00.

DS. Połowę na raz użyć.
 (100 grm. 1 złr. 80 ct.).

Terpinhydrat.

Środek wykrztuśny. Kryształki trudno w wodzie rozpuszczalne (1:200 zimnej, 1:22 ciepłej) smak i zapach nieco korzenny. Używa się w niezżytach oskrzeli, zwłaszcza przy rozedmie płuc i w suchotach. Dawka 0·10—0·30 w pigułkach i proszkach do 2'00 pro die.

(100 grm. 1 złr.).

Rp. Terpini hydrati 2'00,
Spir. vin.
Aqu. dest.

Syrup Sacch. āā. 50'00.

DS. Co 3 godz. łyżkę.

Polecają też w mieszaninie z antypyriną jako specyfik przeciw kokluszowi, z niepewnym jednak skutkiem.

Terpinolum.

Płyn bezbarwny, lotny, w wodzie nierozpuszczalny. Środek wykrztuśny w niezżytach dróg oddechowych w celu zwiększenia wydzieliny. Dawka 0·10 pro dośi.

*Rp. Terpinoli**Natri benzoici* āā. 1'00,*Sacch. q. s. f. pil.* 10.

S. 5—6 pigulek dziennie.

(100 grm. 1 złr. 80 ct.)

Thiol = Ichtyolum germanic.

Używa się w chorobach skóry podobnie, jak Ichtyol, jednak temu ostatniemu w dobroci nie-dorównywa.

Thioresorcinum.

Proszek bez zapachu i smaku, ma służyć, jako środek antiseptyczny w miejsce jodoformu. Działa czasem trująco.

Tribromphenol zob. Bromol.**Trionalum et Tetronalum.**

Kryształy bez smaku i woni w ciepłej wodzie, wysokoku rozpuszczalne. Środek nasenny.

Dawka 1—3'00 pro dosi 4'00 pro die.

(10 grm. 2 złr.).

Uralium zob. Chloralurethanium.**Urethan.**

Białe kryształy bez woni, rozpuszczają się łatwo we wodzie, wysokoku i eterze. Łagodny środek nasenny, zwłaszcza dla starców i dzieci.

Dawka 1—2—5'00 dla dorosłych, 0'50 dla dzieci (w wodzie ocukrzonej) lub:

Rp. Urethani 0'50,*Aq. flor. tiliae**Aq. flor. aur.**Syr. Sacch. āā.* 20'00.

MDS. Co godzinę łyżeczkę.

(10 grm. 30 ct.).



Ważniejsze krajowe i zagraniczne Zakłady:
zdrojowo-kąpielowe,
wodolecznicze, galaktoterapeutyczne, klimatyczne,
kąpieliska morskie i sanatoria.

Skrócenia: C. = Celsius.

L. Zkł. = lekarz zakładu.

L. L. = lekarze.

m. = miasto.

mtr. = metrów.

n. p. m. = nad powierzchnią morza.

St. k. ż. = stacya kolei żelaznej.

St. klim. = stacya klimatyczna.

w. = wieś.

Zkł. = zakład.

Abbazia przy morzu Adryatyckiem, obecnie modna St. klim. zimowa. Lek. Dr. Bulikowski.

Abano górne Włochy, 10 kiln. od Padwy, 31 mtr. n. p. m. cieplice słono jodobromowe, 36–82° C.

Aachen = Akwizgran Prusy nadreńskie, 176 mtr. n. p. m. najsilniejsze cieplice alkaliczno muryjatyczno siarczane, 45–50° C. urządzenia kąpielne i na porę zimową.

Acqui Pijemont, 140 mtr. n. p. m. liczne słono siarczane cieplice zdroje, 36–82° C.

Adelheidsquelle = Heilbrunnen Bawaryja, 774 mtr. n. p. m. szczawa jodobromowo słona, przeważnie do rozsyłki używana.

Aix-les-Bains Sabaudyja, 288 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 45° C. znakomite balneotechniczne urządzenia kąpielne, przez cały rok do użycia.

Ajaccio Korsyka, St. klim. zimowa.

Akwizgran zob. Aachen.

Algier północ. Afryka St. klim. zimowa.

Amélie-les-Bains Francyja, 222 mtr. n. p. m. słynne z balneotechnicznych swych urządzeń i z łagodnego klimatu cieplice siarczane, 64° C. przez cały rok do użycia.

Arco Tyrol południowy, 93 mtr. n. p. m. St. klim. zimowa, niedawno zaprowadzona.

Arnstadt Turyngija, 300 mtr. n. p. m. silna jodobromowa solanka, 24⁰/₀ soli kuchen. zawierająca.

Aussee Styryja (Salzkammergut), 650 mtr. n. p. m. silna solanka, 24.5⁰/₀ soli kuchennej zawierająca.

Baden pod Wiedniem 218 mtr. n. p. m. cieplice ziemno siarczane, 26—33. 7^o C.

Baden w Szwajcaryi 382 mtr. n. p. m. cieplice ziemno słono siarczane, 48^o C.

Baden-Baden w W. Ks. Badeńskim, 200 mtr. n. p. m. cieplice solankowe, 65—68^o C. najwytworniejsze i najliczniej uczęszczane niemieckie zdrojowisko, klimat bardzo łagodny, licznie używane jako St. klim. przejściowa.

Badenweiler w W. ks. Badeńskim, 422 mtr. n. p. m. Cieplice obojętne, 26.6^o C. klimat łagodny.

Bagnères de Luchon Francuja (depart. gór. Garonny), 628 mtr. n. p. m. pyrenejskie cieplice siarczane, 16—68^o C. znakomite balneotechniczne urządzenia.

Bardyjów = Bartfeld półn. Węgry, na pograniczu Galicyi, 310 mtr. n. p. m. szczawy wapniowo żelaziste, urządzenia balneotechniczne przestarzałe.

Baréges Francuja, Pyreneje, 1232 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 18—42^o C.

Bex Szwajcaryja, 440 mtr. n. p. m. silna solanka 17⁰/₀, tudzież St. klim. przejściowa.

Birsztany Litwa (gubern. wileńska), solanka 0 do 3⁰/₀, wysokość nad p. m.?

Biaritz Francuja, w zatoce Biskajskiej, kąpielisko morskie.

Bocklet Bawaryja, 1 godz. od Kissingen, 195 mtr. n. p. m. silne żelaziste źródło, bardzo zamożne w kwas węglowy.

Bordarka wieś, pół godz. od Kijowa, zakład kumysowy.

Bordighera półn. Włochy, nad zatoką genueńską, St. klim. zimowa, rywalizująca ze sąsiednią San-Remo.

Bormio = Worms górne Włochy, 1375 mtr. n. p. m. cieplice obojętne, 35—40^o C. Pora kąpielowa tylko w Lipcu i Sierpniu.

Botzen połud. Tyrol, 260 mtr. n. p. m. St. klim. i winogradowe uzdrowisko.

Buda = Ofen = Budapest stolica Węgier, cieplice słabo siarczane, 45—63^o C. wspaniałe urządzenie t. z. Kaiserbad, pensjonat w zimowym sezonie od osoby 2 zlr dziennie. W pobliżu Budy są bardzo liczne źródła wód gorzkich, najważniejsze: Hunyady, Attila, Deak, Rakoczy i Wiktorya.

Bourbonne les Bains Francuja, (Wogezy), 272 mtr. n. p. m. silne słone cieplice, 58—66^o C.

Burkut Galicyja (obwód Kołomyjski), szczawa alkaliczno-żelazista, dojazd arcy trudny.

Busko Król. polskie (powiat Stopnicki), Zakład zdrojowo-kąpielowy wód solno alkaliczno siarczanych, Dr. Dobrzański dzierżawca zakładu, J.L. Dr. Dymnicki, Grabowski, Majkowski, L. zakł. i Szpitala, tudzież Dr. Sulimirski.

Burtscheid Prusy nadreńskie, niedaleko Akwizgranu, cieplice z akwizgrańskimi identyczne, 59—74° C.

Cairo = Kair (Afryka Egipt), St. klim. zimowa, powietrze gorące, umiarkowano wilgotne, rano i wieczór gwałtowny spadek ciepłoty.

Cannes Francja, tuż nad morzem Śródziemnym, St. klim. zimowa znakomita.

Canstatt Król. wirtemburskie, 218 mtr. n. p. m. solanka O do 2^o/₀, 8—20° C. niemiecka St. klim. przejściowa.

Carlsbad = Karlsbad Czechy, 386 mtr. n. p. m. naj-słynniejsza cieplice alkaliczno glauberskie, 42—73° C. Dr. Dr. polacy: Hasewicz, Prof. Jaworski, Kretowicz, Rosenberg, Stiche i Tugendhat.

Catania Sycylia, najcieplejsza miejscowość w Europie, St. klim. zimowa.

Charlottenbrunn Szląsk pruski, 440 mtr. n. p. m. szczawa ziemno żelazista.

Churwalden Szwajcaryja, 1217 mtr. n. p. m. St. klim. górską.

Caunterets Francja, (dep. wysok. Pyrenejów), 992 mtr n. p. m. słynne cieplice siarczane, 15—55° C.

Ciechocinek Król. polskie, st. k. ż. warszaws. bydgoskiej, solanka 0¹/₂—4^o/₀, Dr. Dr. Certowicz, Lewenstein, Lubowski, L. Zkl. Pajewski, Ruppert, Stockmann, Tannenbaum i Wolberg.

Cieplice czeskie = Teplitz - Schönau Czechy, 220 mtr. n. p. m. słynne cieplice obojetne, 32—48° C.

Cieplice trenczyńskie = Trenczyn-Trencsin-Teplitz Król. węgierskie, 259 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 38—40° C. L. Dr. Filipkiewicz.

Cieplice warażyńskie = Töplitz-Warasdin = Waraždyn Kroacyja, 274 mtr. n. p. m. cieplice ziemno siarczane, 57° C.

Colberg = Kołobrzeg Prusy pomorskie, kąpielisko morskie i solankowe 4—5^o/₀ soli kuchennej zawierające, wzajemnego połączenia obu rodzajów kąpiel nastarczające.

Contrexeville Francja (Wogezy), 342 mtr. n. p. m. wybitnie ziemne źródła.

Cranz = Kranzkuhren po polsku **Koło** Prusy zachodnie, 4 mile od Królewca, morskie kąpiele, bardzo uczęszczane przez Polaków.

Cudowa = Kudowa Szląsk pruski, 412 mtr. n. p. m. szczawy alkaliczne. ziemno żelaziste.

Davos dwie obok siebie miejscowości: Davos-Dörfli i Davos am Platz, Szwajcaryja, 1570 mtr. n. p. m. najznakomitsza klimatyczna alpejska zimowa St. przez cały rok do używania. Pensjonat od osoby 10—15 frank. dziennie. Od dwóch lat jest tu dobrze urządzone Sanatorium Dr. Turbanna.

Dieppe Francja (Normandyja), wyborne morskie kąpielisko.

Driburg Westfalia, 200 mtr. n. p. m. szczawy alkaliczno ziemno żelaziste.

Dorna = Watra zwykle **Dorna**, Bukowina w Karpatach, wysokość n. p. m.? silne szczawy alkaliczno żelaziste.

Druskieniki Litwa (guber. grodzieńska), 17 kilm. od St. k. ż. warszawsko petersburskiej, 200 mtr. n. p. m. solanka 1%, L. L. Bujakowski i Szepietowski.

Družbaki, niemiec. **Rauschenbach**, węgiers. **Felső-Ruszbach**, dwie wsie: Družbaki niżnie i wyżnie, Węgry (Spiż), wysokość n. p. m. ? cieplica wapniowa, 24. 2^o C. już w r. 1541 opisana przez Wernhnera, a po polsku w r. 1640 przez Petricęgo, w 17 wieku przez magnatów polskich licznie odwiedzane.

Eaux-Bonnes Francja (depart. doln. Pyrenejów), 748 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 32. 0 C.

Eaux-chaudes Francja (depart. doln. Pyrenejów), 675 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 11—36^o C. o 6 klm. od poprzednich odległe.

Elster Saksonja, 457 mtr. n. p. m. alkaliczno słono żelaziste wody, identyczne z Franzensbadem, wyborne balneotechniczne urządzenia, L. Zakł. Dr. Flehsig, znany balneolog, tudzież polak Dr. Błociszewski.

Ems Ks. Nassauskie. 91 mtr. n. p. m. słynne cieplice słono alkaliczne, 28—46^o C. nader wielki export ich wód.

Ernsdorf zobacz **Jaworze**.

Eugenejskie źródle Włochy w zachodniej stronie Padwy, dawniejsze podmorskie wulkaniczne wzgórza, ujawniły tu liczne i silne cieplice ziemno słone, 60—70^o C. w miejscowościach: Abato, Bataglii i St. Pietro Montagnone.

Fachingen Prusy (okrąg rządowy Wiesbaden), 112 mtr. n. p. m. wyborna czysta alkaliczna szczawa, zamożna w kwas węglowy, mnogo rozsyłana do dyetetycz. i leczniczego użycia.

Falkenstein Prusy (prowincja Hessen-Nassau), 440 mtr. n. p. m. Sanatorium dla chorych piersiowych, wzorowo urządzone, kierownik Dr. Dettweiler, pensjonat od osoby 7—11 marek dziennie.

Fellthalquellen Karyntyja, 598 mtr. n. p. m. proste alkalicz. szczawy, z niemieckich najzamożniejsze w dwuwęglan sodowy.

Flinsberg Szląsk pruski, 528 mtr. n. p. m. szczawy alkalicz. żelaziste, tudzież St. klim. górską leśną.

Frankenhausen Turyngija, 115 mtr. n. p. m. solanka 2%, Sanatorium dla skrofulicz. dzieci od 2 do 4 lat, za czterytygodniowy pobyt 60 mrk. od chorego.

Franzensbad Czechy, 3¹/₂ kilm. od m. Eger, zkał dawna nazwa Eger-Franzensbad, 423 mtr. n. p. m. alkaliczno słono żelaziste szczawy, zamożne w kw. węglowy, wzorowe balneotechniczne urządzenia kąpielne. LL. polacy: Dembicki, Kittel i Rosner Jan.

Fürstenhof Styryja, prywatny folwark przy m. Kapfenbergu, 533 mtr. n. p. m. Zkł. hydropatyczny Dra Czerwińskiego, przeważnie przez Polaków uczęszczany, pensjonat 30 do 40 Zlr. tygodniowo od osoby.

Gainfahn przy m. Vöslau pod Wiedniem, 200 mtr. n. p. m. Zakł. hydropatyczny Dra Friedmanna, pensjonat 50 Zlr. tygodniowo od osoby.

Gais Szwajcaryja (kant. Appenzell), 935 mtr. n. p. m. najdawniejszy zkl. galaktoterapeutyczny, pensjonat 4—6½ frank. dziennie od osoby.

Gastein = Wildbad-Gastein i Hof-Gastein po pols. Gastuń Austryja (X. Salzburgskie), 960 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 24—48° C. klimat czysto alpejski.

Giesshübl-Puchstein pod Karlsbadem, Czechy, 340 mtr. n. p. m. prosta szczawa alkaliczna, export roczny do dyetetyczn. użytku około 4 milionów flaszek. Jest tu Zkl. hydropatyczny.

Gleichenberg Styryja, 284 mtr. n. p. m. szczawy alkalicz. muryatyczne, klimat łagodny, urządzenia balneotechniczne wzorowe, LL. polacy: Brühl i Bulikowski.

Gmunden Austryja górna, 415 mtr. n. p. m. St. klim. powietrzna letnia, kąpiele solankowe z wody słonej Ebensee, 24% soli kuchen. zawierającej.

Goczalkowice Szląsk pruski, ¼ godz. od St. k. ż. Pszczyzny (Pless), 266 mtr. n. p. m. solanka jodobromowa, 3% soli kuchennej, znaczny export steżonej solanki i soli zdrojowej.

Görbersdorf Szląsk pruski, 540 mtr. n. p. m. Sanatorium dla chorych piersiowych, ś. p. Dra Brehmera, obecnie pod kierunkiem Dra Wolffa, cały rok otwarte. Pensjonat czterotygodniowy 300 marek. Obok poprzedniego zakładu jest drugi Dra Römplera nieco tańszy.

Gräfenberg Szląsk austriacki, 580 mtr. n. p. m. przez swego założyciela Priessnitza najdawniejszy i powszechnie znany Zkl. hydropatyczny.

Griess połudn. Tyrol, 670 mtr. n. p. m. ¼ g. od Botzen, St. klim. zimowa i uzdrowisko winogradowe.

Griesbach W. ks. Badeńskie, 496 mtr. n. p. m. szczawy alkalicz. żelaziste.

Grodzisko Król. pols., St. k. ż. warszaw. wiedeńskiej, wysokość n. p. m.? Zkl. kąpielow. leczniczy, dom zdrowia z wygodami, żywienie dyetetyczne z kuchni zakładu, L. i właściciel Zkl. Dr. Bojasiński, konsultant Dr. Rzeczniewski.

Hall Górna Austryja, 376 mtr. n. p. m. jodobromowa solanka 1%.

Hall austr. Tyrol, 537 mtr. n. p. m. solanka 26%, urządzenia kąpielne liche.

Hall = Schwäbisch Hall król. Wirtemberg., 190 mtr. n. p. m. solanka 2,4%.

Hallstadt Austryja (Salzkammergut przy Ischlu), solanka 27%, wysokość n. p. m.?

Harkany połud. Węgry, wysokość n. p. m.? cieplice siarczane, 62° C. Szczególną własnością tutejszej cieplicy jest wydobywający się z niej tleno siarczek węgla (Kohlenoxydsulfid), który zapalony pali się niebieskawą barwą.

Helgoland wyspa m. północnego, znakomite kąpielisko morskie.

Herkulesbad zobacz **Mehadia**.

Homburg Ks. Nassauskie (okrag rządowy Wiesbaden), 189 mtr. n. p. m. zdroje żelazisto glaubers. i żelazisto słone, klimat dobry a urządzenia wspaniałe.

Hyeres Francya, 1 godz. od Toulonu, 100 mtr. n. p. m. St. klm., dzienne wahania ciepłoty gwałtowne, przeto dla chorych piersiowych miejscowość nieodpowiednia.

Inowrocław po niemiecku **Inowrazław** Ks. Poznańskie, m. powiatowe, od r. 1876 urządzony Zkł. silnych kąpiel solankowych 25⁰/₀, własność Towarzystwa akcyjnego, zawiązanego staraniem Dr. Dr. Wilkońskiego, Grabowskiego i Rakowskiego.

Interlaken Szwajcarya (kant. Bem), 568 mtr. n. p. m. St. klim. podalpejska i uzdrowisko galaktoterapeutyczne.

Ischl Austryja (Salzkammergut), 484 mtr. n. p. m. solanka 24⁰/₀, klimat łagodny, wilgotno ciepły.

Iwonez Galicyja, St. k. ż. transversalnej, 410 mtr. n. p. m. szczawy jodobromowo słone, opisywane od r. 1630, około 400 pokojów gościnnych, 3 gmachy łazienkowe z 114 wannami do kąpieli, źródł. Belkotki słynny gazem bagiennym łatwo zapalnym, L. Zkł. Dr. Dembicki, tudzież Dr. Kaden.

Jastrzębie niemiec. **Königsdorf-Jastrzemb** Szląsk pruski, 250 mtr. n. p. m. wody słone brom zawierające.

Jaszczurówka Galicyja w Tatrach przy Zakopanem, adzynencya wsi Poronina, 908 mtr. n. p. m. jedyna polska cieplica obojętna 21⁰ C. kąpiele w zbiorniku, hotel wygodnie urządzone. W b. r. miał tu powstać Zkł. hydropatyczny pod kierunkiem Dra Chwistka.

Jaworze niemiec. **Ernsdorf** Szląsk austryjcki u stóp Beskidu, 1 mila od Bielska, 360 mtr. n. p. m. Zkł. wodolecznicy i żętyczny, kierownik Dr. Kowalski.

Johanisbad Czechy, 600 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 29⁰ C. St. klim. powietrzna letnia.

Juliusbad Brunświk, 317 mtr. n. p. m. solanka 6⁰/₀, St. klimatycz. powietrzna na lato.

Karlsbad zobacz **Carlsbad**.

Kaltenleutgeben Austryja, 2 godz. od Wiednia, pierwszorzędny w Austryi Zkł. hydropatyczny, własność Prof. Dra Winternitza, mogący współcześnie pomieścić około 900 chorych, racjonalnie i wzorowo prowadzony, pensjonat od osoby 50 Złr. tygodniowo.

Kamionka Podole rosyjs. miasteczko nad Dniestrem, jedyne polskje uzdrowisko winogradowe.

Kissingen Bawaryja, 190 mtr. n. p. m. pierwszorzędne zdrojowisko pod względem balneotechn. urządzeń i komfortu, znakomite szczawy żelazisto słone, 10—20⁰ C. L. Dr. Chłapowski.

Kołobrzeg zobacz **Colberg**.

Königswart Czechy, 1 godz. od Maryenbadu, 632 mtr. n. p. m. szczawy alkalicz. żelaziste w kw. węglowy zamożne.

Kösen Prusy (prow. saska), 110 mtr. n. p. m. solanka 5⁰/₀, zamożna w siarkany alkaliczne i wapniowe, uznana za północno niemiecki ogródek dziecięcy.

Köstritz Saksonija, 170 mtr. n. p. m. 22⁰/₀ solankowe kąpiele, tudzież gorące piaskowe, tak urządzone, iż chory leżąc, na świeżem powietrzu może przebywać.

Korytnica Węgry, komitat lipkowski, w Karpatach, 796 mtr. n. p. m. zdroje ziemno żelaziste, klimat istic karpacki.

Krankenheil przy Tölz (górna Bawaryja), 666 mtr. n. p. m. jodosodowo siarczane źródło, z których przyrządzane kąpiele wzmacniają solą zdrojową i takimże mydłem, bywają zazwyczaj zastósowane zbyt gorąco i długo.

Krapina-Töplitz Kroacyja, 160 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 41—43° C.

Krasnobród w. Król. polskie, gub. lubelska, pow. zamojski, St. k. ż. nadwiślańskiej Rejowiec. od r. 1888 Zkł. kumysowy i uzdrowisko klimatyczne z pensjonatem dla chorych piersiowych, utrzymanie miesięczne z kumysowem leczeniem od 75 do 100 r. s. L. L. Zkł. Dr. Dr. A. Rose i Skłodowski.

Kranz zobacz **Cranz**.

Kreuth Bawaryja, 812 mtr. n. p. m. pierwszorzędny zakład galaktoterapeutyczny niemiecki, idyliczne położenie, pyszne lasy, najstaranniejsze promenady wolne od kurzu, klimat ostry, wachania dziennej ciepłoty gwałtowne, wyborna zętyca.

Kreuznach Bawaryja, 106 mtr. n. p. m. słaba solanka, odrobinę jodku i bromku sodu zawierająca, o cieplocie 8—30° C. zasilana 6 źródłami stonemi, pochodzącymi z miejscowości Münster am Stein, o 25 minut od Kreuznach odległej, ogromny export wyrabianego lugu i soli zdrojowej.

Krondorf Czechy, 1 mila od Karlsbadu, prosta szczawa alkaliczna, corocznie około 1 miliona flaszek do dyetetycznego użycia rozsyłana.

Krynica Galicyja, St. k. ż. Muszyna-Krynica, 589 mtr. n. p. m. z filialnym źródłem w Slotwinach, nadto zakład hydropatyczny pod kierunkiem Dra Ebersa, z pensjonatem od osoby dziennie 5—7 Złr. tudzież zakład dyetetyczny własność Dra Skórczewskiego, za opłatą tygodniową od osoby 24—42 Złr., 18 źródeł szczawy alkaliczno ziemno żelazistej, bardzo zamożnej w kw. węglowy, wzorowe urządzenia balneotechniczne kąpiele: mineralnych, borowinowych i suchych gazowych, L. Zkł. Dr. Kopff, nadto Dr. Dr. Askenazy, Blatteis, Lorentski i Mars, 1200 pokoi gościnnych, 2 gmachy lazienne o 100 wannach, klimat podalpejski, na miejscu wyrób pastylek krynickich i wyciągu z igliwia świerkowego na kąpiele balsamiczne. Zakład kąpielny od r. 1793 istniejący.

Krzeszowice w ks. Krakowskiem, St. k. ż. 24 kiln. od Krakowa, zakład kąpielny wód siarczanych, L. Zkł. Dr. Dura.

Kudowa zobacz **Cudowa**.

Kulaszne Galicyja, 3 mile od m. Sanoka, Zkł. zętyczny mało uczęszczany, wysokość n. p. m.?

Landeck Śląsk pruski, 452 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 22—29° C. nieco siarkowodu i siarczku sodu zawierające, L. Zkł. Dr. Ostrowicz.

Langenbrücken W. ks. Badeńskie, 138 mtr. n. p. m. zimne wody siarczane.

Levico Tyrol południowy, 533 mtr. n. p. m. źródło z siarkanem żelaza, zawierające niedokwas miedzi i arsen, używane przeważnie do rozsyłki.

Libawa kąpielisko morskie w Bałtyku.

Lipik Sławonija, 158 mtr. n. p. m. alkal. muriat. jodowa cieplica, 46—63° C.

Lippsringe Prusy (Westwalija), 126 mtr. n. p. m. wody ziemno żelaziste, tutejsze gazy źródlane: z tlenu, azotu i kw. węglowego złożone, używane są do wzięwań.

Lubień Galicyja, 3 mile od Lwowa, 275 mtr. n. p. m. bardzo obfite zimne źródła siarczane. Zakład kąpielny od r. 1794 istniejący.

Lubownia nowa Węgry (Spiż), 556 mtr. n. p. m. w pięknym i rozległym parku. szczywy alkalicz. ziemno żelaziste. Tutejszy zamek pamiętny przytulkiem Jana Kazimierza i wytechnieniem J. Sobieskiego w powrocie z pod Wiednia

Madeira północ. Afryka z m. Funchal, słynna St. klim. południowa wilgotno gorąca, pobyt tu zwykle wymagany do 2 lat, pensjonat najtańszy tygodniowo 12—15 funt. szterl. od osoby.

Maryenbad Czechy, 640 mtr. n. p. m. położenie zakładu idylliczne, klimat wilgotny, ranki i wieczory chłodne, alkaliczno glauberskie zimne źródła w g. węglowy zamożne, wzorowe urządzenia balneotechniczne, L. Zkl. Prof. Kisch, znany balneolog, L. L. polacy: Dobieszewski, Jaroszyński i Kaufmann.

Mehadia = Herkulasbad przy **Mehadyi** Węgry (Banat), 174 mtr. n. p. m. Słynne cieplice siarczane 39—44° C.

Meinberg w ks. Lippe-Detmold, 210 mtr. n. p. m. ziemno i słono siarczane źródła, kąpiele: siarczano mulowe i gazowe.

Mentona = Mentone połud. Francyja, 1 godz. k. ż. od Nizy, w zatoce genueńskiej, St. klim. nader korzystnie położona, umiarkowano wilgotna a bardzo ciepła, pensjonat dziennie od osoby 10 franków.

Meran wraz ze sąsiednimi gminami: Ober- i Untermais tudzież Gratsch, połud. Tyrol, 319 mtr. n. p. m. Uznana i znakomita St. klim. zimowa, w pensyonatach wyborna kuchnia, 4—5 Zlr. dziennie od osoby, wiosną leczenia galaktoterapeutyczne, jesienią wlnogrodowe. Lekarz polak Dr Brühl.

Mergentheim król. Wirtembergskie 191 mtr. n. p. m. Zakład od miasta 1000 kroków odległy, od swego źródła Carlsquelle, nazwany Carlsbadem, ma wodę słono gorzką, którą w podparowanym stanie na handel rozsyłają.

Misdroy Pomeranija, dobre i ulubione kąpielisko morskie, lecznica prywatna dla zolzowych dzieci.

Mondorf W. ks. Luxemburskie, 198 mtr. n. p. m. 1—5‰, cieplica bromowo solankowa, 24° C. przeważnie na kąpiele używana.

Monsnmano Włochy (prowincyja Lucca), oprócz cieplice siarczanych 40—50° C., posiada grootę z naturalną parą, służącą na kąpiele gazowo parowe.

Mont-Dore Francyja (depart. Puyde Dome), 1046 mtr. n. p. m. klimat zmienny i ostry, cieplice solankowe 42—45° C. ze śladem arsenu.

Montreux Szwajcaryja (nad jeziorem Genewskim kant. Waadt), wspólna miejscowość z 20 sąsiednich gmin złożona, 979 mtr. n. p. m. St. klim. zimowa, o wiele chłodniejsza jak Meran. Zetyczne tudzież winogrodowe leczenia.

Morszyn Galicyja (obwód Stryjski), 316 mtr. n. p. m. oprócz słonych źródeł, znakomite słono gorzkie źródło, wyrób

odnośnej soli zdrojowej do picia i na kąpiele, zakład zdrojowy jest własnością „Towarzystwa lekarzy galicyjskich” stanowiąc fundusz wdów i sierót pozostałych po lekarzach. L. Zł. Dr. Medwey.

Naleczów Król. polskie, o 10 kilm. od Lublina, zdroje ziemno żelaziste, skąpe w kwas węglowy, zakłady: kąpielny, hydropatyczny (przeważnie) i kumysowy. pensjonat dziennie 3½ do 5 r. s. od osoby, Dr. Chmielewski Dyrektor Zł. tudzież Dr. Dr. Chelchowski, Doliński i Nussbaum jako specjaliści.

Nauheim X. Hessen-Darmstadt, 140 mtr. n. p. m. najsilniejsza niemiecka cieplica solankowa, nader zamożna w kw. węglowy, 35° C położenie rozkoszne, urządzenia balneotechniczne wyborne.

Neundorf Prusy (prowincja Hessen-Nassau), 71 mtr. n. p. m. zimne wody siarczane, z niemieckich najsilniejsze, tudzież solanka 6‰ wzorowe urządzenia balneotechniczne.

Nervi Włochy przy Genui, St. klim. południowa, pensjonat 10—12 frank. dziennie od osoby.

Neuenahr Prusy nadreńskie, 87 mtr. n. p. m. cieplice alkaliczne 20—40° C. analogiczne z Ems i Vichy, klimat łagodny.

Nieklán Król. polskie, St. k. ż. iwanogrodzko-dąbrowskiej tegoż nazwiska, świeżo otwarty Zł. hydropatyczny w wilkach hr. Platerra, okolica leśna. kierownik Dr. Misiewicz.

Niemirów Galicyja (obwód żółkiewski), zimne siarczane źródło, zakład kąpielny opuszczony.

Niederlangenau Szląsk pruski, 359 mtr. n. p. m. szczawa alkaliczno żelazista.

Niederselters zobacz **Selters**.

Nizza = Nice Francyja (depart. Alp morskich), tuż przy morzu Śródziemnym, ulubiona St. klimat. południowa, umiarkowano wilgotno ciepła, pensjonat od 10 do 20 frank. dziennie, L. polak Dr. Tymowski.

Norderney Prusy (Hanowers.), wyspa m. północnego, najznakomitsze niemieckie kąpielisko morskie, lecznica dla żółzowych chorych, pensjonat w hotelach 50 marek tygodniowo od osoby.

Nowe Miasto nad Pilicą Król. pols. gubernija Piotrowska, Zakład wodolecznicy Dra Bilińskiego, pensjonat od 2 r. 20 k. do 3 r. s. dziennie od osoby, L. L. Dr. Dr. Niedzielski i Pawiński.

Obersalzbrunn Szląsk pruski, 380 mtr. n. p. m. szczawy słono-alkaliczne, galaktoterapija, klimat przystry i wilgotny, pobyt tani.

Oynhausen = Rehme-Oynhausen Prusy (Westfalija), 134 mtr. n. p. m. cieplice słone w kw. węglowy zamożne, 26—31° C. 3‰ do 9‰ soli kuchennej zawierające.

Ostenda = Ostende Belgija, najwięcej uczęszczane kąpielisko morskie, wspaniałe i zbyt kosztowne urządzenia, pobyt drogi, Zakład zbyt ruchliwy i bez spokoju.

Palermo stolica Sycylii, krajobraz pyszny, bogatą roślinnością umajony, klimat ogółem wilgotno ciepły, St. klimat. południowa, pensjonat w hotelu 15 lir. dziennie.

Pau Francya (depart. niższych Pyrenejów), 207 mtr. n. p. m. St. klimatycz. zimowa, cieplejsza o 2° C. od Meranu, pensjonat 10 frank. od osoby dziennie.

Petersthal W. ks. Badeńskie, 421 mtr. n. p. m. jedna z t. z. Kniebisbäder, najznakomitsze szczawy alkalicz. ziemno żelaziste.

Pfäfers zobacz **Ragatz-Pfäfers**.

Plombières Francya (Wogezy), 421 mtr. n. p. m. liczne źródła ciepłe obojętne od 19 do 69° C. kąpiele wybornie urządzone.

Pontresina Szwajcaryja (kant. Graubinden), 1828 mtr. n. p. m. Schronisko letnie, mimo wielkiego wyniesienia, klimat łagodny, liczne hotele i pensjonaty. od 6 do 10 frank. dziennie od osoby.

Pustomyty Galicyja, 1 mila ode Lwowa, wody siarczane zimne, od r. 1879 skromny zakładzik zdrojowo kąpielny.

Pyrmont ks. Waldeck, 130 mtr. n. p. m. liczne źródła trzech rodzajów: proste szczawy, wody słone 4‰, a najważniejsze silne żelaziste zdroje, bardzo zamożne w kwas węglowy, pobyt drogi.

Piszczany = Pystjan Węgry (komitat Neutra), 135 mtr. n. p. m. Cieplice siarczane 57—73° C. Tutejszy muł zdrojowy terapeutycznie ważny i bardzo używany na kąpiele.

Rabka Galicyja, St. k. z transwersalnej, 500 mtr. n. p. m. najsilniejsze z europejskich zdroje słono jodobromowe, w tutejszym zakładzie jest od r. 1887 filia Szpitala św. Ludwika dla chorych dzieci, na miejscu wyrób soli zdrojowej i lugu, klimat podgórski, powietrze czyste, L. Zkł. Dr. Głuchowski, Dr. Dr. Piątkiewicz i Porembowicz.

Ragatz-Pfäfers Szwajcaryja (kant. St. Gallen), dwa zdrojowiska: Pfäfers 685 mtr. a Ragatz 521 mtr. n. p. m. których cieplice obojętne 38° C. służą wspólnie do użycia, pensjonat od 7 do 10 frank. dziennie. Ragatz zajmują osoby zamożne; zaś Pfäfers stanu średniego, spokoju szukające.

Rehme zobacz **Oeynhausien**.

Reichenhall Bawaryja, 457 mtr. n. p. m. podalpejskie zdrojowisko, stosunki klimatyczne pomyślne, dobra solanka 24‰ do kąpiel, tndzież zdroj pitny solankowy (Trinksoole) i woda gorzka przyrządzana z zoly reichenhalskiej, g. kw. węglowym wysyconej, nadto wyborna żetyca i soki ze świeżych ziół wyciśnione, jakoteż znakomity zakład aeropneumatyczny i inhalacyjny do wzięwań solankowych i balsamicznych (własność Macka) pod kierunkiem znakomitego pneumoterapeuty Dr. G. Liebiega będący, a drugi zakład inhalacyjny (własność Lehmann) urządzony według systemu Jahra, służą za środki kuracyjne. Ogółem urządzenia balneotechniczne wzorowe, między lekarzami zdrojowemi polak Dr. Zyg. Goldschmidt.

Reinerz Szląsk pruski, 558 mtr. n. p. m. zdroje ziemno alkal. żelaziste, wyborna żetyca, klimat górski, kąpiele: mineralne, wodne i borowinowe znakomicie urządzone.

Roncegno połud. Tyrol, 535 mtr. n. p. m. zdroj arsenowo żelazisty, do picia i do kąpiel na miejscu używany.

Römerbad połud. Styryja, 237 mtr. n. z. m. obojętne cieplice 36–38° C. klimat łagodny.

Royat Francyja (depart. Puy de Dome), 450 mtr. n. p. m. cieplice alkaliczno muryatyczne, 20–35° C. klimat dosyć ostry, częste deszcze i burze, pobyt bardzo drogi, zdrojowisko od arystokracji wielce uczęszczane, urządzenia balneotechniczne znakomite.

Rožnów = Rožnau Morawija, 400 mtr. n. p. m. zakład żętyczny, dosyć uczęszczany, liche urządzenia.

Rymanów Galicyja, (obwód sanocki), St. k. ż. transwersalnej, 3 zdroje szczawy alkaliczno słono jodobromowej, od r. 1881 zakład kąpielny, wyrób soli zdrojowej, podczas lata kolonija wakacyjna dla ubogich dzieci z Łwowa, L. Zkł. Dr. Dukiet, nadto Dr. Krzyżkowski.

Saidschütz Czechy, zdroj wody gorzkiej mnogo rozsyłanej.

St. Honore Francyja, 272 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 26–31° C. Wspaniale balneotechniczne urządzenia.

St. Sauver Francyja, 770 mtr. n. p. m. cieplice siarczane, 20–34° C. Najliczniej uczęszczane francuskie zdrojowisko.

St. Moritz Szwajcaryja (kant. Graubünden), 1856 mtr. n. p. m. St. klim. alpejska i zakład silnych zdrojów żelazistych, bardzo zamożnych w kw. węglowy.

Salzbrunn = Obersalzbrunn Szląsk pruski, 380 mtr. n. p. m. szczawy słono alkalicz. i żelaziste, nadto środki galakto-terapeutyczne, znaczna rozsyłka tutejszych wód, urządzenia znakomite, tani pobyt.

Salzschlirf Prusy (prow. Hessen-Nassau), 240 mtr. n. p. m. jodobromowa solanka 1%, w kw. węglowy zamożna, tudzież zdroj gorzki sodowo siarczany.

Salzungen ks. Sasko-Meiningen, 250 mtr. n. p. m. silne solanki 26%, korzystne klimatyczne położenie uczyniło to zdrojowisko niezmiernie ulubionem letniem schroniskiem dla osób zolzowych i nieżytom podlegających.

San-Remo Włochy (Riviera di Ponente) w zatoce genueńskiej, St. klim. południowa, która co do ochrony od wiatrów i jednostajności ciepłoty powietrznej przewyższa: Nizze, Cannes i Hyeres. Uzdrowisko klim. zbyt świeże, stąd wiele do życzenia pozostawia, pensjonat w hotelach 10–12 frk. dziennie od osoby.

Saxon = Saxon les Bains Szwajcaryja (kant. Wallis), 620 mtr. n. p. m. klimat niezdrowy, cieplice jodowe 25° C. pensjonat od 5 do 12 fr. dziennie od osoby.

Schinznach Szwajcaryja (kant. Aargau), 343 mtr. n. p. m. klimat łagodny, cieplice ziemno siarczane 28–34° C. nadto zdroj jodowy z Wildegg, ulubiony zakład od zamożnych, wyborne urządzenia balneotechniczne, L. Zkł. Dr. Tymowski.

Schlangenbad Prusy (prow. Hessen-Nassau), 313 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 32° C.

Schwalbach = Langenschwalbach, 282 mtr. n. p. m. silne szczawy alkal. żelaziste, wyborne urządzenia balneotechniczne, mnoga rozsyłka wód tutejszych.

Szmeks = Schmecks i Neu Schmecks po węgiers. Tatra-Füred, Węgry, 1011 mtr. n. p. m. ulubiona węgierska St.

klim. -gòrska, Zkł. hydropatyczny, lecznica dla chorych piersiowych na wzór w Davos niedawno tu zaprowadzona, pobyt drogi.

Selters = Niederselters Prusy (prow. Hessen-Nassau), wieś, szczawa alkaliczna, export roczny około 4 miliony flaszek, Zkł. zdrojowego tutaj niema.

Sławinek Król. polsk. pod Lublinem, wody alkaliczno ziemno żelaziste słabe, pozbawione gazu kwasu węglowego, skromny zakładzik zdrojowo kąpielowy, L. Zkł. Dr. Olechowicz.

Sławuta Wołyń, St. k. z. brzesko-kijowskiej, St. klimat. leśna i zakł. kumysowy, lecznica dla chorób piersiowych pod światłym kierunkiem Dra Dobrzyckiego, Dr. Przesmycki konsultant, pensjonat 6-cio tygodniowy 130 r. s. od osoby.

Stotwiny zobacz **Krynica**.

Soden Prusy (prow. Hessen-Nassau), 142 mtr. n. p. m. klimat łagodny, liczne źródła wód słonych w kw. węglowy zamożnych, 15–30° C. wyborne balneotechniczne urządzenia, pensjonat 36–45 mrek. tygodniowo od osoby.

Solec Król. polskie (powiat Stopnicki), wieś, zródź zimny alkal słono siarczany, z krajowych najsilniejszy co do siarkowodu i połączeń siarki, niesłusznie opuszczony, L. L. Dr. Dr. Daniewski i Siarczyński.

Spaa = Spa Belgija, 250 mtr. n. p. m. wytw. rny zakład kąpielny silnych wód alkalicz. żelazistych, w kwas węglowy zamożnych, dawniej od arystokracji licznie odwiedzany, obecnie po zniesieniu banku gry mało uczęszczany, opłata czyli taxa zdrojowa na sezon od 50 do 100 frk. w miarę ilości osób.

Steben = Untersteben Bawaryja (okrąg rządowy Oberfranken), 750 mtr. n. p. m. najwyżej położone niemieckie zdrojowisko wód żelazistych, w kw. węglowy zamożnych, pobyt tani.

Swozowice Galicyja, 10 kilom. od Krakowa, St. k. ż. transversalnej, dawniej słynne kopalnie siarki, zimne wapniowo siarczane zdroje ze zakładem kąpielnym, od niedawna restytuowanym, L. Zkł. Dr. Skrzyński.

Szczawnica Galicyja (obwód Nowo-Sandecki), 332 mtr. n. p. m. wieś, 42 kilom. od St. k. ż. transversalnej Stary Sącz, składa się ze Szczawnicy niższej i wyższej tudzież ze środkowej adtynencyi zwanej Miodzius, klimat podgórski, zdrojowisko jest obecnie własnością Akademii Umiejętności, szczawy słono alkaliczne, bogate w kwas węglowy a z europejskich najzamożniejsze w dwuwęglan sodowy, ma: filialny zakład zdrojowo kąpielny na Miodziusiu, Zkł. hydropatyczny własności Dra Kołaczkowskiego i Zkł. inhalacyjny spadkobierców Dra Janochy, coroczny export wód około stotysięcy flaszek, L. Zkł. Dr. Ściborowski, nadto Dr. Dr. Doskowski, Gluziński, Hammerschlag, Kołaczkowski, Kruzyński, Nieszkowski i Zaremba.

Szkleno Węgry, 1 godz. od Schemnitz, ziemne cieplice 30–56° C.

Szliaes Węgry (komitat Sohl), 300 mtr. n. p. m. proste ciepłe wody żelaziste 11–31° C. w kw. węglowy zamożne.

Szkló Galicyja, 35 kilom. ode Lwowa, zimne wody siarczane, wysokość n. p. m. ? ma 2 Zkł. kąpielne: wojskowy i cywilny,

urządzenia nędzne. Najpierwsza jego monografia Dra Erazma Syxta: „O cieplicach we Szkle wydana w r. 1527.“

Tarasp-Schuls Szwajcaryja (kanton Graubünden), 1300 mtr. n. p. m. klimat alpejski, bogaty zasób źródeł mineralnych: glauberskich i szczaw żelazistych, zamożnych w kw. węglowy, dojazd utrudniony, pensjonat 6—10 frk. dziennie od osoby.

Töplitz-Schönau zobacz **Cieplice czeskie**.

Trenczyn zobacz **Cieplice trenczyńskie**

Truskawiec Galicyja, wieś 8 kilom. od m. Drohobycza, St. k. ż. transversalnej, 400 mtr. n. p. m. Zkł. własność Spółki obywatelskiej jest obecnie w toku rzetelnych ulepszeń balneotechnicznych, rozmaite źródła mineralne: solanka 25⁰/₀, 3 źródła słonoglauberskie i szczawa magnowo alkaliczna, borowina o cennych własnościach, L. Zkł. Dr. Plech nadto Dr. Dekański.

Tüffer Styryja, 215 mtr. n. p. m. cieplice obojętne 35—39⁰ C.

Vals Francuja (depart. Ardèche), 10 zdrojów alkalicznych, do wód Vichy składem chemicznym bardzo zbliżonych, lubo zimniejszych, 13—16⁰ C. mających, export tych wód wielki, pobyt tańszy jak w Vichy.

Vevey Szwajcaryja nad jeziorem genewskim, 380 mtr. n. p. m. St. klim. podalpejska, dobra na wiosnę i jesień, nieodpowiednia na zimę dla chorych piersiowych, leczenia winogrodowe, pensjonat 7—15 frank. dziennie od osoby.

Vichy Francuja (depart. Allier), 230 mtr. n. p. m. najznakomitsze zdrojowisko francuskie, cieplice alkaliczne, 12—44⁰ C. wspaniale balneotechniczne urządzenia, ogromny wyrób soli zdrojowej i pastylek, pobyt drogi, rozsyłka wód corocznie do 3 milionów flaszek.

Vöslau pod Wiedniem. cieplice obojętne, 24⁰ C. wielce uczęszczane przez zamożnych, przedewszystkiem pleć żeńską, tudzież leczenia winogrodowe.

Warmbrunn Szląsk pruski, 325 mtr. n. p. m. cieplice obojętne, 35—38⁰ C. Urządzenia balneotechniczne dobre.

Warazdyn zobacz **Cieplice warazdynskie**.

Wenecyja morskie miasto nad Adryatykiem, za ledwo bardzo mało ponad poziomem morza na wyspach i piaszczystych ławicach zbudowane, St. klim. zimowa, średnio ciepła, wilgotna, wolna od kurzu i wichrów, słoneczna. Średnia zimowa ciepłota o 1¹/₂ do 2⁰ C. wyższa jak w Meranie lub w Montreux. Styczeń i Luty są na pobyt najodpowiedniejsze. Ujemną stronę stanowi niedobre woda do picia, jesienią są tu dobre morskie kąpiele na Lido, pensjonat 7 frk. dziennie od osoby.

Weilbach Prusy (prow. Hessen-Nassau), 137 mtr. n. p. m. zimne wody alkaliczno siarczane, tudzież zdroj sodowolitowy.

Wiesbaden Prusy, stolica ks. Nassauskiego, 117 mtr. n. p. m. cieplice solankowe, 50—68⁰ C. nietylko na kąpiele ale i do picia zastosowane, 900 gabinetów łaźiebnych, zdrojowisko używane za stację klim. wiosną, jesienią nawet i przez zimę, najliczniej uczęszczane niemieckie zdrojowisko, urządzenia kąpielne i na zimę, pensjonat od osoby miesięcznie od 100 mrk. i wyżej, są tu i leczenia winogrodowe.

Wildbad król. Wirtembergskie, 400 mtr. n. p. m. obojętne cieplice, 33—37° C. używane na kąpiele i do picia, urządzenia balneotechniczne wyborne, pensjonat 5 do 8 marek dziennie od osoby.

Wysowa Galicyja (obwód jasielski), od r. 1882 zakład zdrojowo kąpielny, szczawy słono alkalicz. żelaziste, urządzenia zbyt skromne, L. Zkl. Dr. Natter.

Zakopane Galicyja, wieś w Tatrach, 942 mtr. n. p. m. od st. k. ż. transversalnej Chabówka o 43 kilom. odległe, z inicjatywy i staraniem nieodżałowanej pamięci Dra Chałubińskiego St. leczniczo klimatyczna, klimat górski, korzystne na pobyt dla dotkniętych malaryą lub usposobionych do suchot płucnych, ale do przezimowania chorych są tu zbyt prymitywne urządzenia, 2 Zkl. hydropatyczne: Dra Chramca i Dra Piaseckiego L. Stacyi Dr. Chwistek. Najwłaściwsze ocenienie Zakopanego jest w broszurze Dra Ponikły „Zakopane, Kraków 1890.“

Zaizon Siedmiogród, 2 mile od Kronstadtu, 548 mtr. n. p. m. zdroje alkal. muryatyczno jodowe.

Zoppot = Sobótka Prusy. 12 kilom. od Gdańska, kąpielisko morskie od polaków licznie uczęszczane.

Zęgiestów Galicyja (obwód sandecki), St. k. ż. transversalnej, wysokość n. p. m. ? Szczawy alkal. ziemno żelaziste, tudzież rzeczne kąpiele w Popradzie, L. Zkl. Dr. Zgórski, nadto Dr. Szczepański.

Dr. Zieleniewski.

Kąpiele z dodatkiem środków lekarskich.

Na kąpiel pełną (po szyję) dla osoby dorosłej, liczy się 200—300 litrów płynu. 50—200 litrów na kąpiel dla dzieci. Na kąpiel sięgającą tylko do dołka podsercowego 100—150 litrów; kąpiel nasiadową 20—30 litrów, na kąpiel na nogi 10 litrów.

Za zimną uważa się kąpiel do + 15° R.

„ chłodną „	„	+ 15 do 22° R.
„ letnią „	„	+ 22 „ 27° R.
„ ciepłą „	„	+ 27 „ 32° R.
„ gorącą „	„	+ 32° R.

Kąpiele gorczyczne. Na kąpiel pełną daje się 100—250·0 grubo połtuczonyj gorzycy. Do kąpeli miejscowej np. na nogi 50—120·00.

K. igliwowe. Ponieważ przez wygotowanie igliwia niemożna otrzymać eterycznych a właśnie głównie działających pierwiastków, stósowniej przeto dawać ekstraktu. (Extr. turionum pini sylv. ad balnea, Nitribitta w Krynicy) 150—500 gram.

K. jodowe. (Wanna drewniana) Kali jodati 50—100·0 na kąpiel pełną; 5·0—10·0 na litr wody. — Jodi 10·0 kali jodati 20·0 rozpuścić w kilogr. wody i dodać do kąpeli, przyczem należy tak osłonić wannę, aby pacyent nie wdychał parującego jodu.

K. klejowe. 1—2 funtów Colla animalis rozpuszczonego we wrzacej wodzie.

K. z kory dębowej lub z kory wierzby, kasztana itp. odwar z 1 funta w 2 litrach wody, lub też (ponieważ tutaj chodzi o środek ściągający), można użyć Taniny (acid. tannicum) 20—100 grm. rozpuszczonej w szklance wody.

K. z liści orzecha włoskiego. (Fol. Juglandis) Dekokt z 1—2 fnt.

K. ługowe. Dwa do ośmiu funtów popiołu bukowego lub debowego gotuje się z kilkoma litrami wody, lub też potażu ($\frac{1}{4}$ —1 funta, na kąpiel pełną, dla dzieci połowę tej ilości).

K. mrówczane. Napar (Infusum) z 300·0—700·0 formica rufa.

K. mydlane. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ funta pokrajanego mydła na pełną kąpiel (Sapo domesticus, Sapo aromatic. lub Sapo kalinus).

K. z otrąb. 1—3 funtów otrąb pszenicznych odgotowanych w woreczku w 4—6 litrach wody.

K. siarczane. 50·0—200·0 Kalium sulphuratum ad balneum, w celu wzmocnienia działania dodaje się 15—20·0 Acidum sulphur. crud.; aby jednak złagodzić, dodać można Colla animalis $\frac{1}{2}$ funta.

Bogatszym można zapisać:

Rp. Calcii sulphurati crudi 26·00,

Natri chlorati 7·50,

Extr. Saponar. 5·00,

F. c. Aq. font. q. s. Globulus. Dtur. tal. dos. 5.

S. Jedną kulę do kąpieli.

(Wanna drewniana, nie metalowa).

K. słodowe. Słodu jęczmiennego 4—6 funtów gotuje się z kilkoma litrami wody przez $\frac{1}{2}$ godziny, odciedza i wlewa do kąpieli.

K. słone. 3—5—15 funtów soli kuchennej lub morskiej.

K. sodowe. Natri carbon. crudi 200—500·0 na kąpiel pełną, 100—200·0 na kąpiel miejscową.

K. sublimatowe. (Tylko w wannie drewnianej) 2·50—10·0 Hydrarg. bichlor. corros. rozpuszczonego w 50—200·0 Aq. Na kąpiel miejscową tj. ręce lub nogi 0·05—0·25.

K. ziółowo-aromatyczne. Napar rumianku lub mięty, korzenia tataraku, lub spec. aromatic z 200—500·0 na 2000·0 wody, wlewa się do kąpieli, albo też dodać można: Aq. coloniens., Spir. Calami., Spir. Angelicae, Spir. Serpyll. (60·0—100·0 na dawkę). Dla dzieci połowę tych ilości.

K. żelaziste. Ferrum sulphur. siccum (50·0—200·0), Liquor ferri sesquichlorati (15·0—60·0), Tart ferratus s. globuli martiales pulv. (50—200·0), lub też do przyrządzenia kąpieli żelazistej z kwasem węglowym; 1 część Ferr. sulph. sicc. (30·0), 2 części Natr. chloratum (60·0), i 3 części (90·0) Natr. bicarbon. nasypuje się warstwami do szklanki i razem wrzUCA do wody (pro balneo 150·0—200·0 tej mieszaniny).

Rp. Ferri sulphur. sicci

Argillae āā. 100·00,

Mf. pulv. d. tal. dos. 10.

S. Jeden proszek do kąpieli.

Dla dzieci wszystkich przetworów po $\frac{1}{4}$ części.

Najwyższe dawki środków leczniczych, których lekarz przekraczać nie powinien, nie oznaczywszy wykrzyknikiem (!)

	pro dosi	pro die
Acidum arsenicosum	0·005	0·02
„ carbolicum	0·10	0·50
Apomorphinum hydrochloricum	0·01	0·05
Aqua Amygdalarum amarum concentrata	1·50	5·00
„ Laurocerasi	1·50	5·00
Argentum nitricum	0·03	0·20
Atropinum sulfuricum	0·001	0·003
Cantharides	0·05	0·20
Chloralum hydratum	3·00	6·00
Cocainum hydrochloricum	0·10	0·30
Coffeinum	0·20	0·60
Cuprum sulfuricum qua emeticum	0·40	—
Extractum Aconiti radiceis	0·03	0·12
„ Belladonnae foliorum	0·05	0·20
„ Cannabis Indicae	0·10	0·30
„ Colocyntidis	0·05	0·20
„ Conii herbae	0·20	0·60
„ Hyoscyami foliorum	0·10	0·50
„ Opii	0·10	0·40
„ Scillae	0·20	1·00
„ Secalis cornuti	0·50	1·50
„ Strychni	0·05	0·15
Folia Belladonnae	0·20	0·60
„ Digitalis	0·20	0·60
„ Hyoscyami	0·30	1·00
„ Stramonii	0·30	1·00
Fructus Colocyntidis	0·30	1·00
Herba Conii	0·30	2·00
Hydrargyrum bichloratum corrosivum	0·03	0·10
„ bijodatum rubrum	0·03	0·10
„ jodatum flavum	0·05	0·20
„ oxydatum flavum	0·03	0·10
Jodoformium	0·20	1·00
Jodum	0·03	0·10
Kreosotum	0·10	0·50
Lactucarium	0·30	1·00
Morphinum hydrochloricum	0·03	0·12
Oleum Crotonis	0·05	0·10

	pro dosi	pro die
Opium	0·15	0·50
Physostigminum salicylicum	0·001	0·003
Pilocarpinum hydrochloricum	0·03	0·06
Plumbum aceticum	0·10	0·50
Radix Aconiti	0·10	0·50
„ Belladonnae	0·07	0·30
Santoninum	0·10	0·30
Secale cornutum	1·00	5·00
Semen Strychni	0·12	0·50
Solutio arsenicalis Fovleri	0·5	2·00
Stibium Kalio-tartaricum	0·2	0·50
Strychninum nitricum	0·007	0·02
Tinctura Aconiti radiceis	0·50	1·50
„ Belladonnae foliorum	1·00	4·00
„ Cantharidum	0·50	1·00
„ Colchici seminis	1·50	5·00
„ Digitalis	1·50	5·00
„ Jodi	0·30	1·00
„ Lobeliae	1·00	5·00
„ Opii crocata }	1·50	5·00
„ „ simplex }		
„ Strophanthi	1·00	3·00
„ Strychni	1·00	3·00
Veratrinum	0·005	0·02
Vinum Colchici seminis	1·50	5·00
Zincum sulfuricum qua emeticum	0·80	—

Waga różnych dawek.

Łyżeczka cieczy waży mniej więcej 3—5 grm. Łyżeczka cukru, soli, siarki 2·5—5 gram., proszków różnych 2·50. Łyżka wody 15 grm. Łyżka syropu 20·0. Garść nasion 70—80 grm. Garść liści 20—30 grm. Szczypta kwiatu 2 grm. Litr wody dest. 1000·0; litr spirytusu 850; litr chloroformu 1480; litr oliwy 920·0; szklanka 200—250·0; kieliszek 70—80 grm.

Porównanie wag aptekarskich.

28·5 unc. = 1 kilogr.	1 gran = 0·07
1 unc. = 35 grm.	2 „ = 0·15
6 „ = 210 „	3 „ = 0·22
1 drachma = 4·3 grm.	1/2 „ = 0·04
1/2 „ = 2·15 „	1/4 „ = 0·02
1 skrupuł = 1·5	1/8 „ = 0·008

Dawki przeciętne dla dzieci (pro dosi).

L e k i	Do 1 roku	od 1—5 lat	od 5—10 lat
Acetanilidum	0·02	0·05	0·1
Acetum Digitalis	—	5 gtt.	10 gtt.
Acetum Scillae	—	5 gtt.	15 gtt.
Acidum benzoicum	—	0·03	0·05
Acidum hydrobromicum	—	—	30 gtt.
Acidum tannicum	—	0·005	0·01
Aether	—	3 gtt.	5 gtt.
Aether aceticus	2 gtt.	5 gtt.	10 gtt.
Alumen	0·01	0·05	0·1
Ammonium bromatum	0·15	0·25	0·3
Ammonium chloratum ferratum	—	0·03	0·05
Antipyrinum	0·2	0·3	0·5
Apomorphinum hydrochlor. <small>emet.</small>	0·0007	0·0025	0·0045
<small>expect.</small>	0·0004	0·0015	0·0025
Aqua Amygdalarum amararum	—	1—5 gtt.	5—10 gtt.
Argentum nitricum	0·001	0·003	0·005
Atropinum sulfuricum	—	0·0001	0·0002
Bismutum subnitricum	0·05	0·1	0·3
Bromoformium	2·3 gtt.	3·4 gtt.	4·6 gtt.
Camphora trita	0·0075	0·01	0·02
Chininum ferro-citricum	—	0·05	0·1
Chininum hydrochlor. <small>antipir.</small>	0·1	0·3	0·5
<small>antispasm.</small>	0·05	0·15	0·2
Chloralum hydratum	0·1	0·25	0·45
Codeinum phosphoricum	0·0002	0·002	0·005
Coffeinum	—	0·02	0·04
Conium hydrobromicum	0·0005	—	—
Cuprum sulfuricum	—	0·1	0·15
Curare	0·0001	—	—
Extractum Belladonnae	—	0·001	0·003
Extractum Filicis	1·0	2·0	5·0
Extractum Opii	—	0·005	0·02
Extractum Secalis cornuti	—	0·03	0·05
Extractum Strychni	—	0·002	0·005
Ferrum reductum	—	0·005	0·01
Flores Koso	—	2·0	5·0
Folia Digitalis	—	0·02	0·03
Hydrargyrum bichloratum	0·0001	0·0002	0·0003
Hydrargyr. chloratum <small>antisyf.</small>	0·002	0·005	0·01
<small>laxans.</small>	0·01	0·02	0·03

L e k i	Do 1 roku	od 1—5 lat	od 5—10 lat
Hydrargyrum tannicum oxydulat.	0·005	0·02	0·03
Hydrochinon	0·05	0·2	0·3
Kalium bromatum	0·1	0·3	0·5
Kalium chloricum } pro die . .	1·0	2·0	3·0
Kalium jodatam }	0·1	0·5	1·0
Kreosotum	0·005	0·01	0·02
Liquor Ferri sesquichlorati pro die	0·3	0·5	0·5
Liquor Kalii arsenicosi	—	0·05	0·1
Morphinum hydrochloricum	—	0·001	0·003
Naphthalinum	0·05	0·2	0·2
Natrium paraeresotinicum	—	0·25	0·5
Natrium salicylicum pro die	1·0	2·0	3·0
Phenacetinum antipyr.	—	0·1	0·3
Phenacetinum antispasm.	0·001	0·05	0·1
Pilocarpinum hydrochloricum (inj.)	0·001	0·002	0·004
Plumbum aceticum	0·003	0·005	0·01
Phosphorus	—	0·0001	0·0002
Podophyllum	—	0·005	0·015
Pulvis Ipecacuanhae opiatas	—	0·005	0·02
Radix Ipecacuanhae emetic.	0·05	0·1	0·2
Resorcinum	0·2	0·4	0·5
Santoninum	—	0·01	0·02
Sirupus Ferri jodati	1 gtt.	5 gtt.	10 gtt.
Strychninum nitricum (inj.)	—	0·0005	0·001
Tartarus stibiatus	—	0·0075	0·01
Thallinum sulfuricum	0·01	0·02	0·03
Tinctura Opii simplex	0·025	0·05	0·2
Tinctura Strophanthi	—	—	3 gtt.
Urethanum	0·05	0·1	0·2

Porównanie dawki leków

według rozmaitego wieku chorych.

Dawki zmieniają się mniej więcej, jak następuje:

aż do ukończonego	1	roku	$\frac{1}{10}$
od 2	do 4	"	$\frac{1}{8}$
"	5	" 7	" $\frac{1}{5}$
"	8	" 10	" $\frac{1}{4}$
"	11	" 14	" $\frac{1}{2}$

Począwszy od roku 50 należy dawki znowu zmniejszać tak, iż u starców między rokiem 60 a 70 należy znów dawać tylko $\frac{1}{3}$ dawki dla osób dorosłych.

Kobietom zadają się wogóle mniejsze dawki, mniej więcej $\frac{2}{3}$ tej, jaką się przepisuje mężczyznom odpowiedniego wieku.

Ile kropli leków płynnych liczy się na gramm.

Acet. concentrat	16	carvi, chamomil. aeth.,	
Acid. acetic.	16	citri, crotonis, foeniculi, juniperi, lavandulae, menthae, origani, rosmarini, rosae, sabiniae, tanaceti, terebinthinae, eucalypti .	25
„ hydrochlor.	13	Ol. caryophyl., cinnam.	20
„ „ dilut.	16	„ pinguae	20
„ hydrocyanic. Aqu.	16	Petrol. rectificat	25
„ „ spirit.	32	Plumb. acet. solut. . . .	20
„ nitricum	12	„ basic. solut.	16
„ phosphor.	16	Solutio arsen. Fowleri.	16
„ sulphur. conc.	12	„ extr. narcot. (1:2)	37
„ „ dilut.	16	Spir. aethereus	25
Aether acetic.	25	„ alcoholis 90 ¹ / ₂ %	40
„ sulphur.	50	„ ferr. chlor. aeth. . . .	25
Aq. amygdal. amar.	24	„ muriat. aeth.	30
„ destilat. var.	16	„ nitric. aeth.	30
„ spirit. var.	25	„ varii c. spir. vini dil. parat.	25
Bals. copaivae	25	„ Vini concentr.	30
„ poruv. nigr.	16	„ „ dilut.	25
Carbon sulphur.	25	Stibium chlor. solut. . . .	12
Chloroformium	25	Syrupi var.	12
Ferrum sesq. sol.	12	Tinct. spirituos.	25
Kali carbon. sol.	16	Vinum stibiat. et alia vina medicam.	20
Kreosotum	25		
Liq. acidi Halleri	25		
„ hydrar. nitric.	12		
Mucilago gummi ar.	12		
Oleum amygd. aether.	20		
„ anisi, auranti flor. bergamottae, cajeputi			

Leczenie zapomocą wziewań.

Wdychanie rozpylonych cieczy używa się w cierpieniach błony śluzowej ust i połyku (pharyngitis catarrhalis, granulosa, ulcerosa, crouposa, syphilitica), a także w cierpieniach dróg oddechowych: bronchitis putrida, bronchiectasia, bronchorrhoea, po zapaleniu miąższu płucnego przyrody zapalnej czy gruźliczej. Używanie rozpylacza jest daleko przyjemniejsze, jak tuszowanie lub wdmuchiwanie suchych pyłów.

Oddychać należy głęboko, spokojnie, przycisnąwszy język ku dołowi, w ciągu $\frac{1}{2}$ —1 minuty, a następnie przerywać na parę minut, aby odpocząć. Jedno posiedzenie trwa 5—30 minut, 2—4 razy dziennie. Wziewania mleczanek ze środkami odurzającymi lub bez tychże usuwają w ostrych nieżytach tchawicy i oskrzeli przykre uczucie palenia i suchości; wziewanie płynów rozpuszczających błony chorobowe może znacznie zmniej-

szyc nasilenie choroby; nareszcie wziewanie środków lotnych, balsamicznych i przeciwgnilnych może wpłynąć na ograniczenie ilości chorobowej wydzieliny i na zniszczenie smrodliwych jej własności w chorobach dróg oddechowych. Do środków wysuszających zawartość jam zapalnego czy też gruźliczego pochodzenia należą: oczyszczona smoła drzewna, ol. terpentynowy, olejki żywiczne (ol. pini), kreosot, tymol. Używają się te środki zwykle wtedy, gdy gorączka jest słaba (do 38° C.), a płwocina obfita. Do środków ubieżwianiających i niszczących obrzydliwy zapach należy przede wszystkim kwas fenilowy; środka tego używa się tam, gdzie podniesienie ciepłoty jest wysokie (39—40° C.), w okresie jam, po zapaleniu przyrody gruźliczej.

Dawki środków używanych do wziewań.

- Acid. benzoicum 0·5—1·0 na 10 spir, vini.
 Acid. carbolicum 0·5—1·0 na 100 wody.
 Acid. lacticum 1—2:100.
 Acid. tannicum 1—2:100.
 Alumen crud. 2—3:100.
 Ammonium chloratum 1—2:100.
 Amylnitrit 2—5 kropli nalać na chustkę i wdychać.
 Aq. calcis szczera lub na połowę z wodą.
 Aq. chlorata na pół z wodą.
 Aq. hydrosulphurata na pół z wodą.
 Aq. laurocerasi 3—5:100.
 Aq. picis szczera lub na pół z wodą: chorzy ją znoszą chętnie, bo nie drażni.
 Argent. nitr. 0·1—0·2:100.
 Borax venet. 3—5:109.
 Bromum, Kali brom. aa. 0·2:100 na gąbec, oddycha się przez rurkę.
 Emuls. oleosa 5:100.
 Extr. conii maculat. 0·05—0·15:100, albo Extr. stramonii 0·5—1·50:100.
 Extr. hyocyami 0·05—0·20:100.
 Extr. opii aq. 0·1—0·2:100.
 Ferri sesquichl. solut. 0·5—1:100.
 Flores sambuci, flores tiliae, rad. Altheae 5—25 na 500·0.
 Glycerini puri 10:100.
 Hydr. bichlor. corros. 0·05—0·10:100.
 Kali bromati 3:100.
 Kali chlor. 3—5:100.
 Kali hypermang. 0·1—0·2:100.
 Kali jodati 1—2:100, albo z dodatkiem 0·02 jodu czystego.
 Kreosot. gtt. 2:100.
 Liq. kali caustici 2:100.
 Lithium carbon. 0·2—2:100.
 Morph. muriat. 0·1:100.
 Natrium chlorat. 1—2:100.
 Natr. benzoicum 1—2:100.
 Natr. bicarbon. 8—5:100.
 Natr. hydrochlor. 0·2—2·0:100.

Ol. pini 1—2:100, albo Ol. terebinthiae rect. 1—2:100.

Plumb. acet. bas. sol. 3—5:100. Pyridin 4—5:0;100.

Tannini puri 1—2:100.

Tinet. cannabis indicae 0·5—1:100.

Tinet. jodi 0·10 z Spir. vini 10:100.

Tinc. opii simpl. 0·2—0·5:100.

Zincum sulphur. 1:100.

Leki w ciepłe ulatniające się, jak Ol. pini, Ol. terebinth. można wzięwać bez przyrzędu, nalawszy do szklanki 10 do 20 kropli i wstawiwszy ją do gorącej wody.

Mineralne wody z Ems, Salzbrunn, Szczawnickie do wzięwań używają się szczerze lub wodą rozcieńczone.

Z kalend. Dr. J. St. Saw.

Leczenie zapomocą wstrzykiwań podskórnych.

Używane zwykle strzykawki zawierają 1 grm. płynu i są zaopatrzone w przedziałkę dziesiętną. Przepisywać więc należy lekarstwo rozpuszczone w 10 grm. płynu, a wtedy każdy decigram (0·1) cieczy zawierać będzie setną część przepisanego leku.

Acidum carbolicum crystallisatum 0·10 na Aq. dest. 10·0; z tego $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki t. j. 0·005—0·01 kwasu karbolowego na raz. Działa przeciwnie, miejscowo znieczula. Używa się w róży, reumatyzmie stawów, itd.

Acidum osmicum 1:100, 0·5—1·0 pro dosi (=0·005—0·01) jako antineuralgicum in loco; S. ad vitrum fuscum.

Acid. sclerotinicum 5:100 aq. dest. p. dosi 0·5—1·0 (0·025—0·05).

Aether 0·5—0·1 naraz.

Apomorphinum hydrochl. 0·10 na 10·0 aq. dest., z tego 3—7 podziałek, (0·003—0·007 apomorphinu) dorosłym, a 1—1 $\frac{1}{2}$ dzieciom. S. Środek wymiotny.

Aspidosperminum alcaloid Quebracho 2:100 wody; pro dosi 1·0 (=0·02) i więcej.

Atropinum sulph. 0·01:10·0 wody; z tego 5—10 podziałek (0·001—0·002 Atropinu). W tężcu, nerwobólach, padaczkach, drgawkach, wściekliwości i otruciu morfiną. Zaleca się wielką ostrożność!

Camphorae 0·50 Ol. amygd. dulc. 10·0; $\frac{1}{2}$ —1 strzykawki (0·005—0·01 kamfory), środek pobudzający.

Chininum bisulphuricum (lepsze, niż chininum sulphur.). 1·0 rozpuszcza się wśród ogrzanej w 5·0 gliceryny czystej i 5·0 wody; z tego używa się 8—10 podziałek (0·03 do 0·10 chininy). W zimnicy, nerwobólu, gościu stawowym.

Chloralum hydratum cryst. 4·0 na 10 wody; 1—4 strzykawk wstrzyknąć w różne części ciała (Łatwo sprawia ropnie). Środek nasenny i kojący ból.

Chloroformium purum 1·0 i więcej.

Cocaini murat. 0·5 na 10 wody $\frac{1}{2}$ strz. =0·01 kokainy w zapaleniu tężówko-rzęskowem dla uśmierzenia bólów.

Coffeinum purum citricum, hydrobromicum 0·5 Aq. dest. Spir. vini dil. aa. 5·0; $\frac{1}{2}$ do całej strzykawki na raz (0·01—0·05 kofeiny); migrena, otrucie morfiną.

Curarinum sulph. 0·2 Aq. dest. 10·0 z tego wstrzykuje się ostrożnie 1—4 podziałek (0·002—0·01). Poraża końce nerwów. Używa się w tężcu i kurezach.

Daturinum jak *atropinum sulphuricum*.

Digitalinum 0·05 Aq. dest. Spir. vini dil. aa. 5·0; z tego 1—5 podziałek (0·005—0·01 *Digitalinu*). Obniża czynność serca.

Duboisinum sulphuricum 1:500 aq. dest.; p. dosi 0·1—0·2 = (0·0002—0·000·4).

Eserinum 0·1—0·5 Aq. destil. 10·0; $\frac{1}{5}$ —1 strz. (0·01—0·05).

Extr. secalis cornut. aq. 1·0 Aq. dest. Glycerini puri aa. 5·0; $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ —1 strzyk. (0·025—0·05—0·10 *Sec. corn.*). W krwotokach, w długotrwałem zapaleniu macicy, włókniakach macicy, wypadaniu kiszki stolcowej. Najlepiej używać *extract bis purificat.*

Ferrum phyrophosphoricum c. natro citrico 2 na 10 wody, z tego 1·0 in *Anaemia pernicioso* i w wypadkach, gdy wewnętrzne użycie żelaza jest niemożliwe z powodu niezłytu żołądka i kiszki, wrzodu żołądka itp.

Gelsemininum hydrochl. 1:200 wody; 0·1—0·2 pro dosi (0·0005—0·001) przeciw nerwobólom.

Hydrargyrum bichloratum corrosivum 0·1 w 10 wody; z tego $\frac{1}{2}$ —1 strzykawkki (0·005—0·01 sublimatu). *Hydrarg. cyanat.* 0·5 na 10 wody 1 strzykawkę na raz.

Hydrarg. formamydatum solutum 1:100; 0·5—1·0 p. dosi.

Kalium jodatum 3·0 na 10 wody, $\frac{1}{2}$ —1 strzyk. (0·15—0·3 *Jodu*).

Liq. Hydrargyri albuminati 1:100; 0·5—1·0 pro dosi.

Morphium acet. (hydrochlor., sulph.), 0·20 na 5 gliceryny i 5 wody, 3, 5, 7 podziałek do całej (0·003, 0·005, 0·007—0·01 *Morph.*); do 0·02 pro dosi.

Narceini hydrochlor. 0·20 na 10 wody, 3, 5, 7 podziałek do całej strzykawkki, t. j. do 0·006—0·02 *Narceiny*.

Physostigminum salicylicum lub *muriaticum* 1:500 aq. dest.; pro dosi 0·2—0·5 (0·0004—0·001) zamiast *Eserinum muriat.*

Pilocarpinum mur. 0·20 aq. dest. 10·0; $\frac{1}{2}$ strz. = 0·01.

Solut. arsen. Fowler 1·0:5·0 aq. dest. z tego 0·3—0·6 pro dosi w drżeniu, psoriasis, chorea.

Strichninum nitr. i sulph. 0·10 na 10·0 wody; z tego 3—6 podziałek, t. j. 0·003—0·006 strychniny na raz. Wywołuje kurcze. Zadaje się w porażeniach po otruciu ołowiem, w porażeniu pęcherza, w porażeniach obwodowych od nóg i mięśni kiszki stolcowej, w porażeniu poprzecznem (*paraplegia*), *Ataxia med. spin.*, *Atrophia musc. progres.* i *paralysis infantum essent.*

Tinct. opii 5—15 kropli na jedno wstrzyknięcie.

Aconitinum, *Coniinum*, *Emetinum*, *Hyoseyaminum* nie zalecają się, bo działają niepewnie.

Strzykawkka, której igła ma otwór zapehany, oczyszcza się przeciągnięciem jej na chwilę przez płomień. Jeżeli otwór zardzewiał, to należy wrzód oliwy do igły weignać, następnie ogrzać, a po tem jeszcze wysokiem przepłukać. Taksamo postąpić, jeżeli drut w igle zardzewiał.

Tablica brzemienności.

Ostatnia regularność		Dzień porodu		Ostatnia regularność		Dzień porodu	
Styczeń	1	Październ.	8	Lipiec	5	Kwiecień	12
"	5	"	12	"	10	"	16
"	10	"	17	"	15	"	21
"	15	"	22	"	20	"	26
"	20	"	27	"	25	Maj	1
"	25	Listopad	1	"	28	"	4
Luty	1	"	4	Sierpień	1	"	8
"	5	"	8	"	5	"	12
"	10	"	12	"	10	"	17
"	15	"	22	"	15	"	22
"	20	"	27	"	20	"	27
"	25	Grudzień	1	"	25	Czerwiec	1
Marzec	1	"	6	"	28	"	4
"	5	"	10	Wrzesień	1	"	8
"	10	"	15	"	5	"	12
"	15	"	20	"	10	"	17
"	20	"	25	"	15	"	22
"	25	"	30	"	20	"	27
"	28	Styczeń	2	"	25	Lipiec	2
Kwiecień	1	"	6	"	28	"	5
"	5	"	10	Październ.	1	"	8
"	10	"	15	"	5	"	12
"	15	"	20	"	10	"	17
"	20	"	25	"	15	"	22
"	25	"	30	"	20	"	27
"	28	Luty	2	"	25	Sierpień	1
Maj	1	"	5	"	28	"	4
"	5	"	9	Listopad	1	"	8
"	10	"	14	"	5	"	12
"	15	"	19	"	10	"	17
"	20	"	24	"	15	"	22
"	25	Marzec	1	"	20	"	27
"	28	"	4	"	25	Wrzesień	1
Czerwiec	1	"	8	"	28	"	4
"	5	"	12	Grudzień	1	"	7
"	10	"	17	"	5	"	11
"	15	"	22	"	10	"	16
"	20	"	27	"	15	"	21
"	25	Kwiecień	1	"	20	"	26
"	28	"	4	"	25	Październ.	1
Lipiec	1	"	8	"	28	"	4

Otrucia ostre i sposób ratowania w tychże.

Trucizna	Objawy	Odrutki
Aconitinum. Tojad mor- downik fo- lia, flores, radix, Tinct.	Pieczenie języka, ból przy połykaniu, ślinotok, wy- mioty, tętno słabe, obniże- nie ciepł. c., zimne poty, niepokój, rozszewienie źre- nie. Trująca dawka 0·06.	Leki wymiotne, pompa żołądkowa, kawa, her- bata, wino, kamfora Acid. tannic. 4·0. Aq- d. 200·0. Syr. 20·0. S. Co. 5 min. łyżkę.
Acidum car- bolicum.	Wymioty, ból w epigas- trium, zapad, śpiączka. Trująca dawka od 15·00.	Emetica, pompa żołąd. Calcaria saccharata, mleko, kleiki, lód. Rp. Magnes. ust. in Aqua 200·0. S. Połowę na raz później co $\frac{1}{4}$ g. łyżkę.
Acidum ci- tric. „ hydrochl. „ nitricum. „ sulphur.	Obrzmienie bł. śl. ust, pa- lenie i pieczenie przew. od ust do żołądka, boleści, wymioty kwaśne fusowate, upadek sił.	Lód, magnezya, kreda, soda we wodzie, dużo płynów, woda mydla- na, kleiki.
Acidum hy- drocyanic. kwas sino- wodowy kw. pruski Aq. lauroc.	Wdech krótki, wydech zna- cznie dłuższy, drgawki, porażenie serca, czuć woń kwasu pruskiego. Mdłości, nieprzytomność.	Środki wymiotne, sztu- czne oddychanie, oble- wania zimną wodą, środki drażniące skó- rę, Atropin.
Aether	Śpiączka, znieczulenie us- tanie tętna i oddechu. Przy wydechu czuć eter.	Sztuczne oddychanie, (faradyzacya n. phre- nic.), zbryzganie wo- dą, inject. Strychniny (0·001), gorczycznik na okolicę serca.
Alkalia Ług potas. i sodowy, amoniak żrący, sal- mijk.	Nadżarcia ust, ból silny pa- lący w przełyku, wymio- ciny składają się z rozło- żonej krwi i oddział. alka- licznie, kolka, krwawe stolce.	Mleko, rozcieńczony kwas cytrynowy, pi- gułki lodowe, gdy stol- ce krwawe, lewatywy z wody, z lodu.
Alkohol	Odurzenie, utrata przytom- ności, wymioty, zwężenie źrenic, zapad, lepka zimna skóra, piana z ust, woń wysokoku z ust, tętno małe, powolne.	Zlewania zimną wodą, lód na głowę, ręce i nogi zanurzyć w go- rącej wodzie, synapism na kark, lewatywy z zimnej wody.

Trucizna	Objawy	Odrutki
Antimonium Tart. emetic.	Gwałtowne wymioty, ból pałacy w żołądku i kiszka- kach, zimny pot, pragnie- nie, drgawki.	Pompa żołąd., pigułki lodowe, mleko, Tanina, Opium.
Anilinum	Nudności, ból głowy, trud- ne oddychanie, senność, utrata przytomności, znie- czulenie skóry. Sina barwa bł. śluz. i skóry, ciepota nizka, tętno wolne.	Pompa żołąd., środki wy- miotne, białko, sztucz- ne oddychanie, leki podniecające, magnez.
Argentum ni- tricum	Wymioty białawe, czernie- ją na powietrzu, przypadki mózgowe, oznaki zapalenia żołąd. i jelit.	Sól kuchenna, białko, mleko.
Arszenik i jego przetwory	Ból w okolicy żołądka, nu- dności, wymioty, biegunka, skóra zimna, przy uczuciu pałania, pragnienie. Tętno małe, szybkie, oddech przy- spieszony mozolny. Czasa- mi drgawki. Po arseno wo- dorze mocz krwawy. Dawka trująca 0·015 zabójcza 0·12	Środki wymiot., (zinc. sulph.) ferr. hydric. in Aqua. Magnezya, An- tidot. arsenici. Unikać alkalii.
Atropinum Radix, fo- lia, baccae bellad. Szalej	Suchość i drapanie w gar- dle, chrypka, nudności, trudność mówienia i poly- kania, pragnienie, ból i za- wrot głowy, złudzenia i omamy, rozszeż. źrenic, parcie na mocz, osłabienie serca, szłał, drgawki, tężec, podwójne widz., ślepoća.	Pompa żołąd., środki wym., tanina, kali jo- dat., morfina, opium, węgiel zwierzęcy, wy- skok. Rp. Pilocarp. mur. 0·05, Aqu. dest. 5·00 do inj. Zimne o- kłady na głowę,
Baryum zob. Plumbum Bromum zob. Jodum		
Camphora	Popęd do ruchów, gonitwa myśli, drżenie, drgawki.	Środki wym., oblewa- nie zimna wodą.
Cantharides	Ból w ustach, przelyku, żołądka, pęcherze w jamie ust, pragnienie, nudności, mocz krwawy, podrażnie- nie części płciowych, ból głowy, odurzenie, drgawki. Porażenie serca.	Pompa żołąd., klejki na- poje z lodem, kamfo- ra, Opium. Unikać tłuszczów!
Chloral hy- dratum		Środki drażniące skórę inj. Strychn., Cocainy.

Trucizna	O b j a w y	O d t r u t k i
Chloroform	Porażenie serca, ustanie oddechu.	Sztuczne oddychanie, inj. Strychniny, zlewanie zimną wodą, środki drażniące skórę.
Chlorum	Skurez głośni, krwioplucie.	Świeże powietrze, wdychanie amoniaku i ciepłej pary.
Cocainum	Chłodnięcie ciała, tętno zmienne, powolne to szybkie, duszność, odurzenie, drgawki.	Wdychanie amylnitritu, excitantia, ciepłe kąpiele.
Codeinum z. Morfine		
Coffeinum	Niepokój, odurzenie, zawrót głowy, drżączka, kołatanie serca.	Pompa żołąd., środki wymiotne, kali jodat., sztuczne oddychanie, Morphium.
Colchicin Semen. Colch. Zi- mowit	Silne bóle brzucha, wymioty, biegunka, pragnienie, tętno zwolnione, mąjanie, drgawki.	Środki wym., Tanina, Opium, eter, kamfora, wino,
Cuprum grynszpan	Wymioty zieloną treścią, kolka, stolce krwawe, drgawki, oddech utrudniony, nieregularne tętno.	Węgiel drzewny, Limatura ferri, białko z wodą, mleko, lewatywy ze skrobi, purgantia. Unikać tłuszczów!
Digitalis	Wymioty, biegunka, tętno nieregularne, rozszerzenie źrenic, osłabienie, zapad, drgawki.	Środki wymiotne, wino, kamfora, Liquor ammon. anis, synapism.
Ergotinum secal. corn. sporysz	Ślinotok, nudności, wymioty, biegunka, ból głowy, spiączka, zatrzymanie moczu, zapad.	Emetica, opium, amylnitrit, chloralhydrat, eter, wino, kawa.
Hydrargyr. Sublimat	Smak metaliczny, ból w ustach, przełyku i żołądka, wymioty, biegunka, czasem krwawa, zatrzymanie moczu, zapad.	Pompa żołąd., mleko, białko, przetwory żelaza, (ferrum sulphurat hydrat.).
Hyoscyamus z. Atropin Jodum	Ból w gardle, przełyku i brzuchu, wymioty, zatrzymanie moczu, osłabienie, ruchy serca wzmocnione, a tętno słabnie.	kleiki z mąki pszennej, białko, magnezja, lód, środki drażniące skórę.

Trucizna	O b j a w y	O d t r u t k i
Kalium chloricum	Objawy ze strony żołądka i jelit, upadek sił, zatrzymanie moczu, sinica, żółtaczka.	Pompa żołąd., środki wym., środki podniecające, moczopędne, pilocarpin, transfuzja krwi lub wlewanie śródżylne soli kuchen.
Kreosotum	Zob. kw. karbol.	Pompa żołąd., białko.
Morphium Opium	Zapad, upośledzenie czucia, <i>silne zwężenie źrenic</i> , skóra blada, głowa gorąca, u dzieci czasami teżec.	Pompa żołąd., środki wym., sztuczne oddychanie, tanina, lód na głowę, ręce i nogi do gorącej wody, synapismy, lewatywy z octem, mocna kawa, Coffeina, Atropina (0'01:5'0 Aq., do inj.).
Nicotinum	Uczucie drapania i palenia w ustach i przelyku, biegunka, wymioty, bladeść skóry, tętno wolnieje, kurez mięśni oddechow., z początku zwężenie, później rozszerzenie źrenic, teżec, zapad.	Pompa żołąd., kali jodat., Tanina, lewatywy z octu, sztucz. oddych.
Opium vide Morphium		
Petroleum	Zaburzenia żołądkowo kiszkowe, zadrażnienie nerek, ból głowy, senność, zapad.	Pompa żołąd., Emetica, sztuczne oddychanie. Excitantia.
Phosphorus	Ból w dołku podsercowym i wymioty miazgą, świecąca w ciemności, mająca woń fosforu. Gastroenteritis, żółtaczka, bolesność w okolicy wątroby i powiększ. tejże. Lekka gorączka, później wymioty krwawe, osłabienie serca, krwotoki z nosa, jelit, macicy, śpiączka, drgawki, mocz krwawy.	Pompa żołąd., purgantia, środki wymiotne: Cupr. sulphur. 1'0:40'0 Aq. dest. S. na raz połowę, po 5 minut. jeżeli trzeba, resztę. Ol. terebinth. co 1/2 godz. po 10 kropli w kleiku. Unikać tłuszczów!
Plumbum octan oł. żele pobie-	Palenie w gardle i żołądku, wymioty, morzysko, zaparcie stolca, zawrót gło-	Emetica, Purgantia, kwas siarkowy rozcieńczony, siarkan po-

Trucizna	Objawy	Odrutki
lane naczy- nia, farby ołowiowe	wy, mdłości, porażenia, spączka.	tasowy. W braku od- trutek: mleko, biało. Po odrutkach znowu emetica i purgant. póź- niej opium i ciepłe kąpiele.
Santoninum	Wymioty, odurzen., drgaw- ki, brak oddechu, żółto- widzenie.	Pompa żoład., emetica, Purgantia, sztuczne od- dychanie, przy drgaw- kach Chloral.
Strychninum wronie oko	Kurcze tężcowe, tężec, szczękościsk, opisthōnus. Rozszeżenie źrenic, sinica, oddech przerywany, tętno małe. Przytomność zachō- wana. Dawka trująca 0·015 —0·03.	Pompa żoład., Emeti- ca, Tanina, kali jodat. kali brom., Chloral, wziewanie chloroform., morfina (inj.), czarna kawa.
Sublimat v. hydrgr.	W kilkanaście godzin po spożyciu mdłości, ból w o- kolicy żoładka, morzysko, Gastroenteritis, upośle- dzenie wzroku, podwójne widzenie. Później suchość w ustach, trudność w po- łykaniu, tętno zwolnione.	Emetica, Purgantia, Calomel, lewatywy, póź- niej Rp. Aether de- pur. 2·0 Aq. dest. 150·0, Trae laud. gtt. 10. Syr. 20·0. S. Co 1/2 g. łyżkę.
Trucizna kiszkowa zepsute kiszki kieł- basy, wę- dliny	W kilkanaście godzin po spożyciu mdłości, ból w o- kolicy żoładka, morzysko, Gastroenteritis, upośle- dzenie wzroku, podwójne widzenie. Później suchość w ustach, trudność w po- łykaniu, tętno zwolnione.	Emetica, Purgantia, Calomel, lewatywy, póź- niej Rp. Aether de- pur. 2·0 Aq. dest. 150·0, Trae laud. gtt. 10. Syr. 20·0. S. Co 1/2 g. łyżkę.
Ukąszenie jadowitych wężów	Rozwijające się obrzmie- nie w okolicy rany, skóra sina, ziębnienie i ocięża- łość, osłabienie, drżenie, mdłości, tętno ledwie wy- czuwalne, spączka, drgaw- ki, krwotoki z nosa, ust, żoładka.	Wypalenie rany rozp. żelazem, c. kali cau- stic., wyssanie rany. Przewiązanie powyżej rany wymycie octem, amoniakiem. Na we- wnątrz excitantia: Li- quor ammon. anis; kamfora, wino, cognac.
Gaz świetlny		Usunięcie chorego z at- mosfery zatrutej. Sztu- czne oddychanie, upust krwi. Transfusia.

Ratowanie pozornie zmarłych.

Pierwszem zadaniem lekarza wezwanego do pozornie zmarłego powinno być poznanie powodu pozornej śmierci. Rozpytać więc należy obecnych, następnie zbadać ciało, czy nie ma gdzie obrażeń, czy nie nastąpiło udławienie się, czy nie ma plam lub woni, charakteryzujących truciznę, ale jednocześnie, nie tracąc czasu, należy przystąpić do ratowania, a mianowicie:

1. Rozpiąć odzież, obnażyć piersi i szyję, rozpuścić pas lub gorset i obrócić twarz ku drzwiom lub oknu, które należy otworzyć chociażby w czasie mrozu.

Najważniejszą rzeczą jest przywrócenie oddechu, które można uskutecznić w rozmaity sposób: 1. nadając choremu położenie boczne; podtrzymując głowę, drażniąc błonę śluzową nosa piórkami, słomką lub tabaką, skrapiając mocno twarz i piersi zimną wodą raz po raz, i obcierając po każdym skrapianiu; 2. albo kładąc pozornie zmarłego twarzą ku dołowi, podkładając pod pierś zwiniętą odzież jego, następnie obracając go na bok, a nawet prawie na plecy, żeby nastąpił wdech, a potem szybkim poruszeniem obracając go napowrót twarzą na dół, żeby nastąpił wydech. Powtarza się to 15 razy na minutę i za każdym razem, gdy twarz jest ku dołowi obróconą, należy naciskać plecy żeby pomódz wyciśnieniu z piersi powietrza; albo 3. wyciągnawszy język chorego, położyć pacyenta plecami na pochylą płaszczyznę na wznak, potem stanawszy przy głowie chorego, uchwycić za ręce wyżej łokci i podnieść je do skroni, a następnie napowrót do klatki piersiowej, przyciskając do niej łokcie mocno, żeby wycisnąć powietrze, znajdujące się w płucach. Powtarza się to około 15 razy na minutę. Jednocześnie można ułatwić wydech pociskaniem brzucha i przyciskaniem doń zgiętych kolan, wdech zaś wyciąganiem nóg, aby napiąć mięśnie brzuszne.

3. Jak tylko oddech naturalny nastąpi, starać się wzbudzić krążenie krwi, pocierając rękami całe ciało, dając środki pobudzające: krople Hofmana, Aether acetic., Liq. amon. anisat. itp.

4. Ratunek winien być dzielny i czynny, ale bez pośpiechu i w należytych porządku wykonany, przy czem nigdy nie tracić nadziei przywrócenia do życia, chociażby po godzinie bezwzględnej pracy, gdyż są przykłady wskrzeszenia po usiłowaniach trwających sześć godzin i więcej.

Omdlenie. Poziome położenie, usunięcie z pokoju osób zbyt uczynnych; świeże powietrze, rozpiąć odzież i skrapiać twarz zimną wodą; skronie nacierać eterem lub octem z wodą; dać wachać mocny ocet, salmiak, krople Hofmana (Liq. anodynus Hofmani); ostatnie i do wewnątrz (20—30 kropli). Po przejściu omdlenia Amilnitrit, najwięcej 3 kr. na chustec do wachania.

Apopleksya. Ułożyć głowę wysoko i zastosować zimne okłady często zmieniane, lub pecherz z lodem; na wewnątrz — leki przeczyszczające, szczególnie, jeżeli kał albo gazy są nagromadzone; na zimne kończyny dolne, kamionkę ogrzaną. Jeżeli twarz mocno czerwona, a żyły szyjne obrzmiałe — upust krwi.

Wstrząśnienie mózgu. Jak przy omdleniu, a zresztą stosownie do przypadków.

Padaczka. Ułożyć chorego tak, żeby nie mógł sobie zrobić nic złego; rozpiąć odzież, między zęby włożyć łyżkę drewnianą owiniętą w płótno, aby uchronić język od obrażenia. Jeżeli twarz jest mocno zaczerwieniona i żyły szyjne nabrzmiałe — zimne okłady, albo niewielki upust krwi.

Rażenie piorunem. Położyć poziomo, oblewać zimną wodą, obwiązać zmoczonymi prześcieradłami, środki trzeźwiące. Prosty lud, okłada ciało świeżą ziemią. Przedewszystkiem zaś wzbudzić oddychanie. Rany spieczone okłada się zimną wodą.

Uduszenie gazami. Położyć chorego na czystem powietrzu poziomo z nieco podniesioną głową i cucić, jak przy omdleniu; lać wodę w twarz, a jeżeli zbiera się na wymioty — ułatwić to, lechząc gardło chorągiewką pióra.

Powieszenie. Zdjąć ostrożnie, potem przeciąć pętlę, ułożyć z nieco podniesioną głową na świeżem powietrzu i zastosować oddech sztuczny, skrapianie, nacieranie podeszew i dłoni; jeżeli przyływ krwi do głowy jest zbyt wielki, to wenesekcja. Drażniące enemy z solą i z mydłem.

Zaduszenie ciałem obcym. Wydalić obce ciało przedewszystkiem, albo za pomocą narzędzi odpowiednich, albo wciskając do żołądka, jeżeli to są pokarmy, albo uciec do przecięcia polyku. Jeżeli obce ciało jest połknięte, to dać do zjedzenia znaczną ilość chleba razowego, aby z nim ciało obce się wydaliło.

Utopienie. Wydalić piasek lub błoto z nosa i ust palcem, nacylić nieco na bok, aby woda znajdująca się w ustach i w tchawicy mogła się wylać, zdjąć odzież i zastosować oddech sztuczny, nacierając i ogrzewając ciało; ciepłe okłady na brzuch, na nogi i pod pachami; excitantia.

Utrata krwi. Przedewszystkiem należy zatamować krwotok czy to przez podwiązanie naczynia krwawiącego, czy to za pomocą ucisku, użycia gąbki, waty namoczonej w półtora-chlorku żelaza, lodu itd. Przy krwotokach po przystawieniu pijawek — kamień piekielny, półtora-chlorek żelaza na wacie; jeżeli połknięto pijawkę, to roztwór łyżki stołowej soli w wodzie do wewnątrz. W krwotoku po wyjęciu zęba — zatkać zębodół watą namoczoną w półtora-chlorku żelaza. Jednocześnie jeżeli jest omdlenie, to środki trzeźwiące.

Zamarznięcie. Najważniejszą rzeczą jest aby ogrzewanie nie było raptownem, a odbywało się stopniowo, przyczem należy być bardzo ostrożnym, aby nie złamać zeszywniałych członków. Najlepiej zdjawszy suknie pozornie zmarłemu, ułożyć na śniegu w jakiej stodołę lub innym nieogranzonym miejscu i całe ciało obłożyć warstwą śniegu, na parę pędzi grubo, zostawiając tylko usta i nos wolny. Tak pozornie umarły zostaje dopóty, aż zupełnie odtaje i gibkość członków wróci. Jeżeli śniegu niema, włożyć do wanny wody z lodem. Gdy zamarznięty odtaje, należy go obetrzeć suchem, nieogranzonym prześcieradłem, ułożyć do łóżka, nakryć chłodną kołdrą, zacząć nacieranie i zastosowywanie sztucznego oddechu. Po ukazaniu się pierwszych znaków życia przenieść pacyenta do umiarkowanie ciepłego po-

koju, rozcierać ciało, okryć ciepłej, dać choremu nieco herbaty z winem, lewatywę z ciepłą wodą z solą i trochę rosołu. Jeżeli który z odtajających członków boli, to natrzeć go śniegiem lub wodą z lodem.

Insolatio. Zimne okłady na głowę, gorczyczniki na łydki, zimne lewatywy; jeżeli środków tych użyć nie można, naprzykład w marszu — wenesekcja.

Asphyxiā neonatorum. Oczyścić usta ze śluzu, rozetrzeć skórę flanelą, skrapiać zimną wodą pierś, twarz i brzuch, drażnić piórkiem nos, gardziel i krtani, dla wywołania odruchów, gorąca wanna, wdmuchiwanie powietrza.

Z kalend. Dr. J. St. Saw.

Warunki przyjmowania chorych obłąkanych do zakładów publicznych lub prywatnych.

Według §. 273 ust. cyw. za obłąkanego lub głupkowatego ten tylko uznany być może, który za takiego sądownie, po dokładnem zbadaniu zachowania się jego przez wyznaczonych do tego przez sąd lekarzy, uznanym zostanie. W przypadku takim postanowienie sądu do publicznej wiadomości podane być powinno. Sąd w tym razie ustanawia kuratora (§. 269).

Zakłady dla obłąkanych są prywatne albo publiczne. Do prywatnych, zakładanych jedynie za pozwoleniem politycznej władzy krajowej, przyjmowani być mogą chorzy, tylko na podstawie świadectwa lekarskiego, potwierdzającego istniejącą chorobę umysłową. Świadectwo to musi być wystawione przez lekarza powiatowego lub gminnego miejsca pobytu chorego, lub gdyby przez innego lekarza było wystawione, musi być potwierdzone przez lekarza powiatowego lub gminnego i wygotowane najpóźniej w 14 dniu przed wniesieniem prośby o przyjęcie. Jeżeli chory był poprzednio w kuracji lekarskiej, dodaną być musi historia choroby, skreślona przez lekarza ordynującego. Chorzy, których władza bezpieczeństwa z powodu zagrażającego ogółowi niebezpieczeństwa do zakładu prywatnego oddać jest zniewoloną, mają być przyjęci na podstawie świadectwa wystawionego przez lekarza, którym ta władza rozporządza. Lekarz kierujący zakładem ma o przyjęciu chorego w przeciągu 24 godzin donieść trybunałowi pierwszej instancyi, w którego okręgu zakład się znajduje, z prośbą o potwierdzenie odbioru doniesienia. Doniesienie to wtedy tylko ma być zaniechane, jeżeli niema wątpliwości, że chory jeszcze pozostaje pod władzą ojcowską. Jeżeli taki chory podczas pobytu swego w zakładzie dojdzie do 24 roku życia, należy o tem, wyszczególniając stosunki jego osobiste, donieść trybunałowi pierwszej instancyi. To samo ma nastąpić, jeżeli zajdą okoliczności, które pociągają za sobą zmianę osoby prawnego zastępcy, a sąd opiekuńczy lub kuratelarny zkadinał o tych okolicznościach nie wie. Osoby umieszczone w prywatnych zakładach dla obłąkanych, które uważać należy za wyleczone, mają być z zakładu wypuszczone, po porozumieniu z temi osobami, które prosiły

o przyjęcie chorego do zakładu, albo w miejsce tychże pieczę o chorym przyjęły. Także chorzy nieuleczalni nie mogą być w zakładzie dłużej zatrzymywani, jeżeli ich wypuszczenia żądają krewni, lub ich prawni zastępcy. Chorzy niewyleczalni mogą być oddani tylko swym prawnym zastępcom, lub osobom przez tychże wskazanym. Jeżeli z zakładu będą wypuszczone osoby, które władza bezpieczeństwa oddała z powodu grożącego ogółowi niebezpieczeństwa, poprzednio o wypuszczeniu tę władzę należy zawiadomić. Tak samo należy postąpić w razie uwolnienia osób takich na próbę. O wypuszczeniu chorych wyleczonych zostających pod kuratelą należy odnośny sąd zawiadomić.

Zakłady publiczne dla obłąkanych rządzą się własnymi statutami, które muszą być potwierdzone przez ministra spraw wewnętrznych. Zakłady publiczne dla obłąkanych mają czynić doniesienia wyżej wymienione do tychże władz sądowych. Gminy a w szczególności ich organa lekarskie są obowiązane utrzymywać w naoczności tych obłąkanych, którzy nie są umieszczeni w domach obłąkanych i czuwać nad pielęgowaniem tychże. Chorych na umyśle, którzy nie pozostają pod władzą ojcowską lub opiekuńczą, mają gminy w celu dalszego zarządzenia wskazać temu trybunałowi, do którego okręgu są wcielone. Władze sądowe są obowiązane o ustanowieniu opiekuna i kuratorów dla umysłowo chorych, znajdujących się w zakładach dla obłąkanych zawiadomić te zakłady. (Dz. p. p. z r. 1874. L. 71).

Przyjmowanie do Kulparkowa i wydalanie. (Toż samo stosuje się i do Szpitala św. Łazarza w Krakowie). Chorych przyjmuje do zakładu dyrektor na żądanie stron lub władzy bezpieczeństwa. Aby chory mógł być przyjęty, należy dyrektorowi przedłożyć: Świadectwo władzy miejscowej z wymienieniem stosunków rodzinnych i majątkowych chorego, a także historią choroby, sporządzoną przez lekarza i poświadczoną przez fizyka powiatowego. Jeżeli oddaje władza bezpieczeństwa, to winna wymienić fakty. Jeżeli chory ma leczyć się własnym kosztem, to należy jeszcze dołączyć pisemne zobowiązanie się tej osoby, która ma spłatę uiszczać. Chorzy winni być oddani do zakładu należycie odziani.

Dyrektor zakładu do 24 godzin powinien donieść o przyjęciu chorego trybunałowi pierwszej instancji.

O zamierzonym wydaleniu chorych wyleczonych, lub nieuleczalnych nie zagrażających publicznemu bezpieczeństwu lub obyczajności i o terminie wydalenia, powinien dyrektor zakładu zawiadomić rodzinę lub prawnego zastępcę, urząd gminy do której chory jest przynależny, władzę opiekuńczą, jeżeli pod tą władzą zostaje i władzę bezpieczeństwa, jeżeli ona oddała chorego do zakładu ze względów policyjnych.

Przy odbieraniu chorego niewyleczonego, odbierający powinien złożyć dyrektorowi: przyzwolenie władzy opiekuńczej, przyzwolenie gminy w której chory ma mieszkać i pisemne zobowiązanie się do dalszego pielęgnowania chorego. D. u. k. 1876. 15 Lutego. Nr. 6.

Z Kalend. Dr. J. St. Sawickiego.

ROZBIÓR CHEMICZNY MOCZU.

A. Badanie fizycznych własności.

Własność	Zmiany jakim ulega	Przyczyna
Barwa	winowo-żółta; zmienia się na: { jasno-słomkowa cisawo-win.-żółta krwawo-czerwona pomarańcz.-żółta cisawo-czerwona brunatna }	nadmierna ilość wody Urobilina barwik krwi barwiki żółci kwas chryzofanowy kwas karbolowy
Oddziaływanie	kwaśne; może być alkaliczne (obojętne): przy odparowaniu staje się: { kwaśne silniej alkaliczne }	węgiel amonowy węgiel sodowy
Ciężar gątkowy	od 1,015—1,023; zwiększa się skutkiem	większ. ilości: mocznika cukru
Osad	skapy obłóczkowaty złożony z: { przybłonków śluzu w małej ilości }	(patrz C.)

B. Badanie chemicznych własności.

Składniki	S p o s ó b b a d a n i a	Oddziaływanie
Urochrom.	Do $\frac{1}{4}$ kieliszka kwasu siarkowego zgęszczonego nalewa się moczu odrazu	zabarwienie: różowo-brunatne brunatne brunatno-czarne
Indoxyl (Uroxantyna, Indykan	Do $\frac{1}{2}$ kieliszka kwasu chlorowodowego zgęszczonego nalewa się moczu kroplami	zabarwienie: żółtawo-różowe niebiesko-fioletowe ciemno-niebieskie
Mocznik	Oznaczenie ilościowe: w moczu zagęszcz. po dolaniu kw. azotow. zgęszczon.	osad krystaliczny: azotanu mocznika
Kwas moczowy	Oznaczenie ilościowe: w moczu zawierającym więcej kw. moczowego, kw. azotowy zgęszczony	daje smugę: białą, rozlaną i wysoko umieszczoną
Chlorki	Zakwasza się kw. azotowym i dodaje kroplę Azotanu srebrowego (1:8)	osad: biały serowaty kaskowaty obłoczkiowaty
Fosforany ziem.	Do $\frac{1}{2}$ kieliszka moczu dodaje się kilka kropli Amoniak z gęszczonego	osad: krystaliczny + obfity
Fosforany potasowców	Siarkanu magnowo-amonowego Do $\frac{1}{2}$ kieliszka moczu dodaje się:	osad: żółtawy + obfity
Siarkany	Chlorku baru z kw. chlorowodowym Do $\frac{1}{2}$ kieliszka moczu dodaje się:	osad: biały ciężki + obfity

Składniki	S p o s ó b b a d a n i a	Oddziaływanie
Białko	1) Do $\frac{2}{3}$ kieliszka moczu nalewa się po ścianie kwasu azotowego zgęszczonego 2) Po zagotowaniu i dodaniu kw. octow. rozcieńcz.	1) smuga biała \perp gruba na granicy warstw. 2) osad w kw. octowym nierozpuszczalny
Cukier	1) Po zagotowaniu z równą objętością zgęszcz. lugu potasow. 2) „ „ z ługiem potas. i siarkan. miedzi	1) zabarwienie: żółto-brunatne brunatne brunatno-czarne 2) osad czerwony
Barwiki żółci	Do $\frac{1}{2}$ kieliszka kwasu chlorowod. zgęszcz. nalewa się moczu a następnie kw. azotowego kilka kropli na dno	płócenie barwne zwłaszcza zielony
Urobilina	Po dodaniu Amoniak i Chlorku cynku (uwzględnić się zabarw. moczu a niekiedy ubarwienie moczanów)	zabarwienie: żółte z zieloną fluorescencją
Barwik krwi (Haemoxo-Methaemo globino	Po zagotowaniu z ług potasowym (oddziaływ dla białka, badan. mikroskop. próba spektral.)	osad fosforanów czewono zabarwiony
Fosforan. wapn. zasad.	Po zagotowaniu	osad w kw. węglowym rozpuszczalny, po powrotn. zagotowaniu się wydzielający
Węglan amoniou	Przy zagotowaniu uchodzi Amoniak i	barwi zwilżony papier lakm. czerwony na niebiesko

Składniki	S p o s ó b b a d a n i a	Oddziaływanie
Kw. chryzofanowy (Senna, Rheum)	Po dodaniu Amoniak	zabarwienie: ogniście-czerwone
Kwas karbolowy	Obok braku lub zmniejszonej ilości siarkanów Obok barwy moczu ciemno-brunatnej	badanie przekroju za- pomocą: chlorku żelaz- zow. odczynnika Mii- lona
Naftalina	Do paru kropli moczu dodaje się kilka kropli kwasu siarkowego zgęszczonego	zabarwienie: zielone
Balsam ko- paiwowy	1) Po zagotowaniu z kwasem chlorowodowym 2) Po dodaniu kw. azotowego (jak przy białku)	1) zabarw. czerwone 2) smuga różowa wie- co wyżej umieszczona
Jodek potasu	1) Po dodaniu kwasu azotowego 2) Z kleikiem skrobi i kwasem azotowym	1) zabarwienie brunatne i woń jodu 2) zabarw. niebieskie

C. Badanie osadu drobnowidowe i chemiczne.

Składniki	K s z t a ł t	Własności chemiczne
Ciałka ropy	o charakterystycznych konturach	z ług. potas. lub Amoniakiem zmieniają się w masę galaretowatą
Ciałka krwi	o charakterystycznych konturach	z kw. octow. lodowatym i chlor. sodu dają: Haemine (kryształki Teichmanna)
Ciałka śluzu	małe ziarniste komórki o wyraźnych konturach	
Przybłonki	okrągłe i owalne drobne (kanaliki nerek) kształtu gruszkowatego (miedniczki nerk) komórki przybl.: okrągłe wieloboczne, podłużne (pęcherz i moczowody) kuliste, ziarniste (cewka mocz. i dno pęch.)	
Walczki	ziarniste przezroczyste krwawe przybłonkowe woskowe z kanalików nerek kształtu walcowatego	

Składniki	K s z t a ł t	Własności chemiczne
Kwas moczowy	kryształy poznaczane lub oddzielne \pm żółtawo zabarwione kształtu oselek, rombów lub maczugowate	w ługu potasowym lub Amoniaku rozpuszczalne
Moczan sodow.-potas.	masa ziarnista bezpostaciowa	
Moczan amonowy	kryształy kuliste opatrzone czasem kolcami	w kw. octowym nierozpuszczalne
Szczaławian wapniowy	kryształy drobne kształtu kopert listowych	
Fosforan magn.-amonowy	kryształy duże kształtu trumienkowego	w kwasie octowym rozpuszczalne;
Fosforan wapniowy zasadowy	masa drobno-ziarnista	w ługu potas. lub amoniaku nie zmieniają się
Kulki tłuszczu	ciałka okrągłe silnie światło łamiące	w eterze rozpuszczalne
Mikroorganizmy	laseczniki, kokki, drożdże, sarcina	
Plemniki	nitki dość proste na jednym końcu zagięte, na drugim opatrzone główką	

Kilka uwag o świadectwach lekarskich.

Niema zapewne dokumentu, któregooby tak nadużywano jak świadectw lekarskich. Nadużyciom ze strony publiczności stara się zapobiedz okólnik c. k. Namiestnictwa we Lwowie z dnia 14-go Marca 1877 r. L. 8431, w myśl którego mają lekarze na każdym świadectwie podawać wyraźnie cel, w jakim takowe wydają. Przykro wyznać, że i ze strony lekarzy musiały się zdarzać nadużycia z wydawaniem świadectw, skoro c. k. Namiestnictwo we Lwowie (w okólniku z dnia 31go Sierpnia 1889 L. 57489) uznało za stosowne wezwać wszystkich lekarzy i chirurgów „aby przy wydawaniu świadectw w ogóle a dla celów wojskowości w szczególności postępowali nader ostrożnie i aby w tych świadectwach jedynie to poświadczali, co jest zgodne z prawdą.“ Jak wynika z omowy tego okólnika dał jeden zwłaszcza przypadek powód do wydania rozporządzenia tej treści, która musi tak przykro dotyczyć wszystkich lekarzy, zwracając im uwagę na sumienne pełnienie obowiązków. Lepiej nieraz uchylić się od wydania świadectwa, pamiętając że „*scripta manent*“ aniżeli czynić zadość żądaniom publiczności, zwłaszcza że jej wymagania są niejednokrotnie tego rodzaju, iż im lekarz nie może zadość uczynić bez widocznego wykroczenia poza obręb ścisłej nauki lekarskiej.

Świadectwa lekarskie wydawane osobom prywatnym (t. j. nie na żądanie władz) należy zaopatrywać w markę stemplową (50 centów). Wyjątki pod tym względem stanowią świadectwa szczepienia (względnie przebytej ospy) i świadectwa wydawane uczniom dla udowodnienia przeszłości w uczeszczeniu do szkoły lub kościoła tudzież w złożeniu egzaminów w należytych czasie (rozp. gubern. z dnia 29 Czerwca 1834 L. gub. 39736 i obwieszczenie gubern. z dnia 4 Grudnia 1844 L. gub. 75852).

Świadectwa stwierdzające istnienie choroby umysłowej i potrzebę umieszczenia w jednym z krajowych zakładów dla umysłowo chorych, mogą wydawać jedynie c. k. lekarze powiatowi i fizycy miast Lwowa i Krakowa. (§ 14 statutu co do przyjmowania chorych do zakładów dla umysłowo chorych).

Co do świadectw sądowolekarskich (t. z. *visa et reperta*) istnieją wprawdzie przepisy objęte wiadomością gubernijalnym z dnia 27 marca 1827 L. gub. 14611; te jednak uchyla po największej części ustawa o postępowaniu karnem obecnie obowiązująca. — Ustawodawstwo austriackie późniejsze nie zawiera szczegółowych przepisów co do formy tych świadectw, lecz mając na oku ich cel, uwzględniając zwyczaj pod tym względem istniejący a zwłaszcza czyniąc zadość wymaganiom tak ustawy karnej jakoteż ustawy o postępowaniu w sprawach karnych, spisuje się je powszechnie podobnie jak protokoły oględzin sądowolekarskich. — Według tego składa się świadectwo sądowolekarskie z trzech części. Pierwsza obejmuje imię i nazwisko, wiek, stan i miejsce zamieszkania osoby badanej;

wzmianka o miejscu gdzie się badanie odbywa jest również nieraz pożądaną. W części téj zestawia się w miarę potrzeby w streszczeniu lub wyczerpująco podania samej osoby badanej, względnie osób otaczających (które wymienić należy), co miewa miejsce przy badaniach osób nieletnich, nieprzytomnych lub dotkniętych chorobą umysłową. W ostatnim razie ta część świadectwa może mieć największe znaczenie zwłaszcza, że niejednokrotnie pisze się świadectwo na podstawie jednorazowej obserwacji, tak że dopiero podania osób otaczających dają podstawę do orzeczenia. W tej części wyszczególnić należy objawy podmiotowe.

Drugą część świadectwa, którą rozpoczyna się zazwyczaj wyrazami: „Badanie dokonane w dniu dzisiejszym wykazuje”: dzieli się w miarę potrzeby na ustępy, oznaczone liczbami porządkowymi lub literami tak, aby się na nie w orzeczeniu powołać można.

W tej części świadectwa mieści się o ile możliwości wyczerpujący a zwięzły wynik badania przedmiotowego, w którym w przypadkach uszkodzeń ciała nie należy się ograniczać do dokładnego opisu śladów obrażeń z osobna, lecz odpowiedniem jest uczynić uwagę co do budowy ciała, stanu odżywienia, wrodzonych lub nabytych nieprawidłowości tudzież przemijających stanów fizyologicznych, zwłaszcza ciąży i jej okresu. Odpowiedniem jest również zaznaczyć w tem miejscu i wynik badania ujemnego pewnych narządów, zwłaszcza gdy podania osoby badanej wskazują na istnienie objawów podmiotowych; w końcu należy uczynić uwagę co do stanu ogólnego osoby badanej. Jeżeli świadectwo jest wynikiem kilkakrotnej obserwacji, jest odpowiedniem zestawić wynik poszczególnych badań z osobna aby czytającemu dać o ile możliwości dokładny obraz przebiegu, unikając przytem wyrażen, które stanowią rozpoznanie.

Trzecią część świadectwa stanowi orzeczenie, którego treść zależy od celu, w jakim się świadectwo wydaje. Tutaj mieści się przedewszystkiem rozpoznanie a nado w przypadkach uszkodzeń ciała ocenienie sądowolekarskie jak tego wymaga § 129 p. k. „... lekarze orzec mają w szczególności, które ze znalezionych obrażeń ciała lub nadwyrężeń zdrowia same przez się lub w połączeniu z innemi, bezwzględnie lub ze względu na szczególne okoliczności przypadku, uważać należy za lekkie, ciężkie lub dla życia niebezpieczne; jakie skutki uszkodzenia takie zwykle za sobą pociągają i jakie w danym przypadku ztąd nastąpiły, tudzież jakimi środkami albo narzędziami i w jaki sposób zadane były“. Zbyteczna nadmienić, że do odpowiedniego ocenienia uszkodzeń ciała trzeba gruntownej znajomości §§ ustawy karnéj, odnoszących się do obrażeń ciała, orzeczenia te bowiem nie są tylko lekarskimi lecz sądowolekarskimi: mają uwzględniać pojęcia prawnicze dla nauki lekarskiej obec i tylko w takim razie mogą zadowolnić sędziego.

Dr. Schaitter.

Świadczenie sędowo-lekarskie. +) ++)

Stempel
50 ct.

Kazimierz Mazur lat 38 liczący rolnik z Łobzowa żonaty podaje, że dnia 14go Września r. b. doznał w Łobzowie pobicia przez Piotra Mosala i Jana Prusaka obu z Czarnej Wsi, z których pierwszy ugodził go grubym kijem w głowę, drugi obuchem kopaczki w przedramię lewe, poczem obaj obaliwszy go na ziemię, kopali nogami obutymi po bokach klatki piersiowej tak, że wskutek odniesionych obrażeń jest niezdolnym do pracy.

Badanie dokonane w dniu dzisiejszym wykazuje:

1. U mężczyzny dobrze zbudowanego i miernie odżywionego (z wyraźną liniową bladą blizną na licu prawem), na czole po stronie lewej od guza czołowego ku granicy porostu włosów w pionie guza czołowego ranę długości 3 cm. rozwartą na 6 mm., prostopadle przebiegającą. Brzegi rany równe, dno strzępiaste, badanie zgłębnikiem okazuje, że rana przenika skórę lecz nie obnaża kości, okolica rany miernie obrzmała. (Ranę oczyszczono i opatrzone).

2. Powieka górna oka lewego okazuje mierny obrzęk i zasinienie, dolna nieznacznie zasiniała.

3) Na klatce piersiowej po stronie prawej w linii pachowej przedniej widać wysokości 6go i 9go żebra po jednym sińcu rozmiarów talara; badanie nie wykazuje w tych miejscach nieprawidłowej ruchomości żeber ani chrupotania, wypuk i przysłuch prawidłowy.

4. Mniejszy sinięć widać na klatce piersiowej po stronie lewej w wysokości 8go żebra i tutaj nie wykazuje badanie nieprawidłowej ruchomości żebra, ani zboczeń w wypuku lub przysłuchu.

5. W dolnej trzeciej części przedramienia lewego, które badany prawą ręką podtrzymuje, widać po stronie zewnętrznej zasinienie rozmiarów 4 centów, okolica tegóż miernie obrzmała. Badanie wykazuje w tem miejscu nieprawidłową ruchomość w przebiegu kości łokciowej i wyraźne chrupotanie odłamków, przyczem badany doznaje znacznego bólu. Tak przy ruchach biernych jak zwłaszcza czynnych, uskarża się na ból.

6. Zresztą badanie nie wykazuje innych śladów obrażeń, ciepota ciała prawidłowa (37.3⁰ C.), tętno 78.

*) Powyższy napis czyni już zbytecznym wymienianie celu świadczenia jak tego żąda okólnik c. k. Namiestnictwa.

**) W przypadkach zbrodni (ciężkich uszkodzeń, zgwałceń i t. p.) jest lekarz obowiązany uczynić doniesienie w myśl § 359 u. k. Doniesienia takie (bez stempla) pisane przez lekarzy mogą być poparte świadectwem lekarskiem w takim razie również bez stempla. (Orzeczenie c. k. krajowej Dyrekcji Skarbu z dnia 9go Lipca 1887, L. 40492).

ORZECZENIE.

Rana opisana pod 1) tak samo jak i zmiana pod 2) mogą pochodzić od uderzenia kijem w głowę, sińce na klatce piersiowej od kopnięć, obrażenie zaś przedramienia lewego a mianowicie złamanie kości łokciowej lewej od silnego uderzenia obuchem kopaczki tak, jak to badany twierdzi. Obrażenia pod 1 i 2 jakoteż pod 3 i 4 opisane stanowią tak z osobna, jakoteż razem lekkie uszkodzenia ciała i sprowadzają upośledzenie zdrowia przez dni 6 do 8 niezdolność do pracy zawodowej o kilka dni krócej trwającą. Obrażenie pod 5 opisane t. j. złamanie kości łokciowej lewej, stanowi samo przez się obrażenie ciała ciężkie, sprowadza bowiem upośledzenie zdrowia i niezdolność do pracy zawodowej przez więcej niż 20 dni. Czy niezdolność do pracy zawodowej i upośledzenie zdrowia wskutek odniesionego złamania kości nie potrwiają w tym przypadku przez więcej niż 30 dni. ocenić będzie można dopiero po zdjęciu opatrunku ustalającego, który badanemu właśnie założono, t. j. po upływie trzech tygodni.

Co niniejszem jako zgodne z zasadami nauki lekarskiej

Kraków, dnia 16go Września 189...

Dr N. N.

O sądowych oględzinach i sekcyach zwłok

mieszczą się wszystkie przepisy w rozporządzeniu Ministerstwa spraw wewnętrznych i sprawiedliwości z dnia 28go Stycznia 1885. Dz. u. p. Nr. 26; większe lub mniejsze wyjątki z tego rozporządzenia znajdują się w zwykle używanych podręcznikach o postępowaniu w sprawach karnych. Ponieważ rozporządzenie to jest tak obszernem, że go tutaj w całej rozciągłości podawać nie możemy przeto odsyłamy ciekawych do Zbioru ustaw i rozporządzeń zdrowotnych dra Olpińskiego (Tom I str. 284 do 351) tutaj zaś nadmieniamy tylko, że rozporządzenie to wyczerpuje wszystko, co tylko lekarzy obchodzić może tak co do formy, jakoteż co do poszczególnych czynności i porządku sekcyj. Poznanie treści tego rozporządzenia jest bardzo pożytecznem, zwłaszcza że często zdarzają się przy sekcyach niedokładności, które udaremniają wyniki dochodzeń.*)

Szemat protokołu sekcyjnego osoby dorosłej przedstawia się mniej więcej jak następuje: (opisanie odzieży następuje przed oględzinami zwłok § 31 rozp. ministryalne).

*) Pomimo wyraźnego przepisu ustawy co do sposobu zapatrywania wnętrzości, które się przesyła do rozbioru chemicznego, otrzymują chemicy takowe prawie zawsze w słojach zawiązanych pęcherzami. Rzecz naturalna, że gdy pęcherz zgnije, a dzieje się to nader rychło, wylewa się wszystko ze słoja do opakowania n. p. trocin, siana, tak, że badanie jest przeto utrudnionem a wynik jego może być nawet wątpliwym.

A. *Ogłędziny zewnętrzne.* 1. Zwłoki mężczyzny lat zbudowanego odżywnionego 2. Długość zwłok zabarwienie skóry 3. Steżenie trupie; plamy trupie znajdują się na barwy przez nacięcie stwierdzone. 4. Włosy na głowie na brodzie. 5. Twarz zwłok oczy gałki oczne źrenice tęczówki; otwory i małżowiny uszne z ust i nosa wydobywa się; jama ust zawiera zęby język 6. Szyja; klatka piersiowa; brzuch; odnogi palce grzbiet części płciowe (tu należy opisać dokładnie ślady obrażeń znalezione na poszczególnych częściach, z których każdy można oznaczać literami alfabetu).

7. Zresztą po dokładnem obejrzeniu zwłok nie zauważono innych śladów.

B. *Ogłędziny wewnętrzne.* (Sekcje wykonywa się w porządku anatomicznym, jedynie regulamin pruski (z d. ¹³/₂ 1875) zaleca w przypadkach podejrzenia o otrucie badać najprzód trzewa brzuszne). 8. Powłoki czaszkowe miękkie 9. Sklepienie czaszki grubość kości 10. Opona twarda zatoka podłużna 11. Opony miękkie zwoje mózgowe 12. Zbitość mózgu istota korowa biała na rozkroju komórki mózgowe zwoje wielkie sploty żylne mózdzek rdzeń przedłużony komórka 4 ta naczyńnia na podstawie mózgu 13. Opona na podstawie zatoki podstawowe podstawa czaszki po odjęciu opony twardej 14. Jamy bębenkowe 15. Krtani i tchawica (otwarte in situ) mięśnie szyji język nagłośnia przełyk gardziel 16. Powłoki klatki piersiowej brzucha mięśnie 17. Przepona sięga po stronie prawej lewej (W przypadkach sekcji noworodków). 18. Śródpiersie przodkowe ułożenie trzew 19. Osierdzie serce komórki przedsoni zastawki żylne naczyńnia wieńcowe mięsień sercowy 20. Krew barwy 21. Tętnice główne naczyńnia na szyji 22. Płuca opłucne pod opłucniami miąższ płuc na rozkroju płuco lewe oskrzela płuco prawe jamy opłucnowe zawierają opłucna ścienna 23. Dolna część gardziela tętnica główna część (zstępująca i piersiowa) 24. Tkanka śródpiersia tylnego 25. Jama brzuszna zawiera otrzewna trzewiowa ścienna krezka gruczoły krezkowe 26. Żołądek (w przypadkach podejrzenia o otrucie należy podwiązać u wpustu i odźwiernika) powierzchnia zewnętrzna żołądka po otwarciu treść w ilości barwy zawiera wydaje woń błona śluzowa 27. Wątroba rozmiarów torebka na rozkroju miąższ 28. Pęcherzyk żółciowy żółć 29. Śledziona rozmiarów torebka miąższ 30. Trzustka 31. Dwunastnica zawiera błona śluzowa 32. Jelita cienkie powierzchnia otrzewnowa treść błona śluzowa 33. Jelito grube 34. Tkanka zaotrzewnowa 35. Nerki rozmiarów torebki istota korowa piramidy miedniczki moczowody 36. Pęcherz moczowy zawiera mocz barwy (w przypadkach otruę bywa wskazanem odprowadzić mocz czystym cewnikiem do osobnego naczyńnia); błona śluzowa 37. Gruczoł krokowy pęcherzyki

nasienne 38. Odbytnica 39. Po wyjęciu wszystkich trzew okazują żebra uszkodzone ... kręgosłup kości miednicy 40. Kości odnóg 41. Nacięcia tkanek na nogach wykazują 42. (Tylko w razie potrzeby) Po otwarciu przewodu rdzeniowego okazuje opona twarda rdzenia w wysokości kręgu opony miękkie rdzeń

W przypadkach sekcij zwłok noworodków należy nadto uwzględniać, cechy donoszenia: długość zwłok (wyrażona w centymetrach podzielona przez 5 wskazuje miesiąc życia płodowego w drugiej połowie ciąży. Płody donoszone męskie 49—53 cm. żeńskie 47—51 cm.) wymiary główki, barków, stan i rozmiary ciemion, chrząstki nosa i uszu, stan paznogi, włosy na głowie, stan jąder (u płodów męskich donoszonych oba jądra w mosznach); rozmiary jąder kostnych w dolnych nasadach kości udowych, lub rozmiary ich w kościach skokowych, wreszcie stan pępownicy. W tych przypadkach nadto wykonywa się t. z. próby życiowe (płucową, żołądkową, jelitową, uszną itd.)

Orzeczenie wydaje się najczęściej bezpośrednio po sekcji, wolno jednak a nieraz nawet okazuje się koniecznem wstrzymać się z orzeczeniem aż do przesłuchania świadków. Co do orzeczeń sadowolekarskich w przypadkach śmierci obowiązuje § 129.: u. k. „Zdanie wypowiedać powinno, co było w danym przypadku najbliższą przyczyną śmierci i co tę przyczynę wywołało. Jeżeli spostrzega się obrażenia orzec należy w szczególności: 1. czy takowe zadane były zmarłemu czynem osoby drugiej, a w razie potwierdzenia tego pytania, 2. czy czyn ten spowodził śmierć *a)* już ze swój natury w ogólności; *b)* lub z powodu właściwego ustroju osobistego albo z powodu szczególnego stanu obrażonego; *c)* z powodu okoliczności przypadkowych, wśród których został spełniony; albo *d)* z powodu przyczyn pośrednich, które przypadkiem nastąpiły lecz czynem samym były wywołane lub z niego wynikły i czy wreszcie *e)* śmierci mogła była zapobiedz wczesna i odpowiednia pomoc lekarska “

W przypadkach dochodzeń z powodu podejrzenia o dzieciobójstwo mają lekarze orzec nadto, czy dziecko urodziło się żywe (§ ustawy o post. karn.). Pytanie co do zdolności do życia noworodka, które mieściło się w dawnej ustawie o p. k. wykreślono słusznie w ustawie obecnie obowiązującej, pomimo tego pojawia się ono dosyć często w ustach sędziów śledczych, lekarze jednak mogą się uchylić od dania odpowiedzi w tym kierunku.

ŚLUŻBA ZDROWIA W GALICYI.

Kraków.

Dr Adamkiewicz Albert.

Beck Adolf, Dietla 68 (2—4).

Blatteis Jakób, Krupnicza Nr 16; w lecie w Krynicy.

Blatteis Stefan, Zwierzyniecka, Nr. 24.

Blumenstok Leon, ul. Podwale Nr 10 (3—4).

Bobkiewicz Henryk, Mały Rynek Nr 3 (3—4).

Borelowski Walenty, Plac Matlejki Nr 6.

Bossowski Aleksander, Floryańska Nr 35 (3—4).

Braun Stanisław, ul. Długa 5.
Braunstein Fryderyk, ul. Krakowska Nr 25.

Browicz Tadeusz, Podwale Nr 10 (3—4).

Buszek Jan, Fizyk miasta Krakowa, Rynek główny linia A—B Nr 39 (2—4).

Buzdygan Mikołaj, Klinika.

Cercha Maksymilian, ul. Jagiellońska Nr 11.

Cholewicz Franciszek, ul. św. Jana Nr 4 (3—4).

Choróbski Stanisław, Szpital św. Łazarza (3—4).

Czapliński Stanisław, Szpital św. Łazarza.

Cybulski Napoleon, ul. Szczepańska Nr 11.

Domański Stanisław, ul. Szczeпаńska Nr 9 (3—4).

Doskowski Józef, ul. Bracka Nr 4 (9—10); w lecie w Szczawnicy.

Dr Drobner Jakób, Stradom Nr 25 (1—3).

Drożdż Bolesław, ul. św. Jana Nr 11 (3—4).

Eichhorn Ferdynand, ul. Krakowska Nr 35.

Filipkiewicz Stefan, ul. Grodzka Nr 7.

Filimowski Antoni, ul. Grodzka Nr 42 (2—4).

Fraenkel Henryk, ul. Grodzka Nr 32 (3—5).

Gabryszewski Antoni, Klinika chirurgiczna.

Gawlikowski Stanisław, ulica Mikołajska Nr 24.

Gluziński Władysław Antoni, ul. Floryańska Nr 53.

Gold Józef, Zielona Nr 1 (3—4).

Grabowski Kazim., ul. Bracka Nr 11.

Gwiazdomorski Jan, ul. Łobzowska Nr 32 (Dom zdrowia).

Harajewicz Jan, Szpital św. Łazarza.

Harajewicz Władysław, Podwale Nr 14 (2—4).

Hirsch Herman, ul. Jasna 4.

Hyżycki Stanisł., ul. Szewska.

Idziński Wiktor, ul. Lubicz.

Jakubowski Maciej Leon, Podwale Nr 10 (3—4).

Jaworski Walery, ul. Sławkowska Nr 12 (4—6).

Jordan Henryk, ul. Wiślna Nr 5 (3—4).

Junger Jakób, ul. Krakowska Nr 7 (2—4).

Jurowicz Izydor, Stradom N. 17.

Dr Kaden Kazimierz, ul. Kolejowa Nr 1 (3—4).
 Kaufmann Michał, ul. Grodzka Nr 32.
 Kirschner Aron, Mostowa 10.
 Kohn Maksymilian, ul. Floryańska Nr 19 (3—4).
 Komorowski, Szp. św. Ludw.
 Kopff Leon, Szczepańska Nr 1 (3—4); w lecie w Krynicy.
 Korczyński Edward, ul. św. Krzyża Nr 5 (3—5).
 Korczyński Ludomił, Klinika.
 Koźmiński Franciszek, Szpital św. Łazarza (3—4).
 Koy Stanisław, ul. Floryańska Nr 3 (3—4).
 Kozierowski Eugeniusz, ul. św. Tomasza 28.
 Kozłowski Sykstus.
 Kramarzyński Karol, Mały Rynek Nr 6 (3—4).
 Króó Józef, Starowiślna Nr 23.
 Krongold Wilhelm, ul. Krakowska Nr 17.
 Kryński Leon, Klinika chir.
 Kulczycki Maryan, Krowderska 130.
 Kwaśnicki August, ul. Basztowa Nr 4 (3—4).
 Lachowicz Eugen., ul. Szewska Nr 4 (3—4).
 Langie Adam, ul. Garbarska Nr 5 (3—4).
 Lustgarten Ludwik, ul. Grodzka Nr 62.
 Lustig Samuel, Krakowska 17.
 Łazarski Józef, Grodzka 62.
 Łepkowski Wincenty.
 Łowczowski Wiktor, ul. Kanonicza Nr 10, I p. (2—4).
 Madurowicz Maurycy, ul. Bracka Nr 6 (3—4).
 Majer Józef, ul. Wiślna Nr. 8.
 Malinowski Gustaw, Starowiślna Nr 15.
 Marcisiewicz Feliks, ul. Wiślna Nr 10.
 Mars Antoni, ul. Szpitalna 19 (2—4); w lecie w Krynicy.
 Maczka Tomasz, ul. Floryańska Nr 24 (2—4).

Dr Mayzel Tadeusz, ul. św. Gertrudy Nr 8 (3—4).
 Mendelsburg H., Grodzka 27.
 Momidłowski Stanisław. Szpital św. Ludwika (2—4).
 Momidłowski Waleryan, ul. Szpitalna Nr. 17.
 Murdzieński Franciszek, ul. Floryańska Nr 51 (3—4).
 Nycz H., Szp. Braci Miłos.
 Obaliński Alfred, ul. Kolejowa Nr 7 (3—4).
 Oettinger Józef, Rynek główny Nr 10 (3—5).
 Olszewski Bronisław, ul. Szpitalna Nr 20 (3—4).
 Opieński Jan, ul. Straszewskiego Nr 22 (2—4).
 Orski Jan, ulica Kolejowa 5.
 Orzechowski L., Mikołajska 7.
 Ożarowski Stanisław, ul. Batorego Nr. 1.
 Paleczny Bronisław, ul. Szewska Nr 7 (3—4).
 Pareński Stanisław, ul. św. Jana Nr 1 (3—4).
 Paszkowski Stanisław, ul. św. Anny Nr 7 (3—4).
 Pełczar Zenon, Mikołajs. 11.
 Piasecki Wenanty, ul. Sławkowska.
 Piątkowski M. ul. Zwierzyn. 29.
 Pięniżek Przemysław, ul. Bracka Nr 10 (3—5).
 Pohorecki Władysław, Szpital św. Łazarza.
 Ponikło Stanisław, ul. Bracka Nr 5 (3—4).
 Porębowicz Ignacy, ul. Grodzka Nr 2 (2—4).
 Puchacki Edmund, Sławkowska 27.
 Raczyński Jan, ul. Floryańska Nr 30.
 Radecki Paweł, ulica św. Jana Nr 12 (2—4).
 Regiec Jan, Długa 58.
 Rościszewski Erazm, ul. Kolejowa Nr. 47.
 Rosenzweig Józef, Klinika.
 Rosenberg Antoni, ul. Kanonicza (2—3).

- Dr Rosenblatt Emanuel, ulica Grodzka Nr 11 (3—4).
 Rosner Aleksander, Rynek gł. Nr 21.
 Rosner Antoni, Rynek gł. Nr 21 (3—5).
 Rozłucki Michał, ul. Straszewskiego Nr 22.
 Rydel Lucyan, ul. Sławkowska Nr. 22 (11—12).
 Rydygier Ludwik, ul. Karmelicka Nr 31 (3—5).
 Schaitter Ignacy, ul. Grodzka Nr 62.
 Schuman Franciszek, Klinika chirurgiczna.
 Schneider Ludwik, Rynek Kleparski Nr 9 (2—4).
 Schwarz Albin, ul. Sławkowska Nr 8 (3—5).
 Ściborowski Władysław, ul. Franciszkańska (pałac biskupi) Nr 3 (3—4); w lecie w Szczawnicy.
 Siedlecki Jan, Karmelicka 54.
 Skobel Stanisław, Rynek gł. Nr 23 (3—5).
 Skórczewski Bol., ul. Batorego Nr 24; w lecie w Krynicy.
 Skrzyński Stef., Pijarska 2.
 Śliwiński Michał, Mały Rynek Nr 4 (3—4).
 Smorągiewicz Kazim., Szpital św. Łazarza.
 Sokołowski Henryk, ul. Floryańska Nr 5 (3—4).
 Spira Rafał, Dietla 62.
 Sroczyński Klinika okulist.
 Stopczański Aleksander, ul. Kopernika, zakład chemiczn.
 Surzycki Józef, ul. Floryańska Nr 13 (3—4).
 Switalski Ludwik, ul. Mikołajska Nr 7 (3—4).
 Szewczyk Józef, ul. Bracka Nr 17.
 Szymkiewicz Kazim., Rynek gł. Nr 26.
 Teichman Ludwik, ul. Floryańska Nr 53.
 Torczyński Teofil, ul. Batorego Nr 22.
- Dr Trzebicki Rudolf, ul. św. Anny Nr 4.
 Tuszyński Ferdynand, plac Szczepański Nr 9 (9—10, 3—4).
 Wachholz Leon, ul. Kolejowa Nr 15 (3—4).
 Wilkosz Aleksander, Mały Rynek Nr 4.
 Windakiewicz Władysł., Szpital św. Łazarza (3—4).
 Wiszniewski Ludw., ul. Krupnicza Nr 5 (3—4).
 Wojtaszek Jan, ul. Wiślna Nr 9.
 Zarewicz Aleksander, ul. Floryańska Nr 40 (2—4).
 Zaremba Tomasz, ul. Szewska Nr 7 (2—4); w lecie w Szczawnicy.
 Zieleniewski Michał, ul. Szpitalna Nr 32.
 Żuławski Karol, ul. Długa N. 82.
 Docent dr Walentowicz Andrzej, weterynarz, Plac Dominikański Nr 1.
 Dr Bandrowski Juliusz, lekarz-dentysta, Rynek główny Nr 7 (10—1, 3—6).
 Jan Dłużynski, dentysta, ulica Floryańska Nr 12 (9—1, 3—5).
 Drd Hrebenda Władysł., lekarz-dentysta, ul. Szpitalna Nr 17 (9—1, 2—5).
 Drd Łukasiewicz Karol, ul. Sławkowska Nr 16, (9—1, 3—5).
 H. Matuszewski, dentysta-technik, plac Dominikański Nr 3.
 Dr Szymkiewicz Kazimierz, Rynek gł. Nr 26, (9—1, 3—5).
 Dr Starachowicz Jan, plac WW. Św. Nr 10, lekarz-dentysta.

Lwów.

- Dr Aschkenazy Zygm., Kaźmierzowska 41.
 Auerbach Emanuel, Skarbk. 2.
 Barański Antoni, prof. szk. weter. Chorążcz. 24.
 Barącz Roman, ul. Teatral. 11.
 Berézowski Kazimierz, sek. w zakł. w. ul. Kaźm. 37.

- Dr Berthlef Karol, plac świętego
Ducha 3.
- Bett Maks, Kaźmier. 26.
- Błotnicki Teod., pl. Smolki 3.
- Bohin Salam., ul. Boimów 19.
- Bogdański Wład., Blachars. 1.
- Bylicki Wł., Kościuszki 7.
- Chomin Antoni, ul. Zimoro-
wicza 3.
- Chadzyński Jan, pr. sz. p.
Chorażcz. 11.
- Czerkawski Juljan, Franci-
szkańska 9.
- Czerkawski Stanisł., Piekar. 8.
- Czyżewicz Ad., pr. sz. r. z.
Cłowa 2.
- Dębicki Kl., plac Bernard. 13.
- Dekański Stanisław.
- Dobiński Włodz., Puławs. 1.
- Dubanowicz Paweł, Ormiań-
ska 33.
- Durst Adolf, Kaźmierz. 23.
- Ebers Henryk, w lecie w Kry-
nicy, Mickiewicza 3.
- Ehrlich David, Krakowska 36.
- Elektorowicz Emil, Lwów 1.
m., Łyczakowska 6.
- Feigel Longin, pros. sz. p.
pl. Bernardyński 11.
- Festenburg Edward, Domini-
kańska 11.
- Fiałkowski Lud., Syxtuska 13.
- Fuchs Franc., dentysta plac
Marjacki 9.
- Gesang Bernard, ul. 3 maja 7.
- Gluziński Lesław, Wałowa 14.
- Głowacki Bol., dyr. sz. p. Ba-
torego 24.
- Godlewski Kazimierz, Karola
Ludw. 5.
- Gońka Andrzej, dentysta ul.
Kopernika 4.
- Gostyński Józef, lek. sądowy
ul. Kościuszki 2.
- Gussmann Izaak, em. lekarz
wojsk. Żółkiewska 38.
- Gross Karol, lek. szpitala We-
kslarska 9.
- Hellmann, ul. Jagiellońska 6.
- Hoszard Franc., czł. W. kraj.
Ossolińskich 4.
- Jana Stan., Łyczak. 5.
- Dr Janda Franc., Pańska 21.
- Jaroszyński Witold, Rynek 41.
- Jasiński Wł., c. k. radca rz.
l. z. kar. Rynek 9.
- Jendl Teodor, sekr. szp. Try-
bunalska 1.
- Kadyj Henryk, prof. sz. w. ul.
Zielona 15.
- Kicki Tytus, Kopernika 1.
- Kilarski Józef, pry. szp. Ry-
nek 35.
- Kniaziolucki, Kopern. 15.
- Kosiński Franc., em. fiz. m.
ul. Skarbkowska 37.
- Kossak Leon, Wałowa 29.
- Krobicki Tadeusz, l. m. Skarb-
kowska 2.
- Krokiewicz Ant., Kopernika 8.
- Krówezyński Ign., rad. zdr.
Lindego 7.
- Krygowski Tadeusz, ulica 3ci
maja 10.
- Krzyżanowski Franciszek, ul.
Kaźmierzowska 39.
- Kucharski Piotr, sek. szpitala
dziec. Pańska 2.
- Kuhn Adolf, Sobieskiego 9.
- Lachowicz Zdzisław, pl. Ha-
licki 14.
- Landau Salamon, Karola Lu-
dwika 29.
- Lateiner Em., sek. szp. plac
Marjacki 10.
- Lickendorf Ignacy, ulica Ba-
torego 6.
- Lukas Ad., l. sąd. Blachar. 8.
- Łopacki Ludw., l. m. Choraż-
czynna 18.
- Machek Em., Wałowa 7.
- Mahl Jakób, Jagiell. 24.
- Majewski Ad., l. z. hydr. Ka-
pielna 4.
- Mehrer Henr., Jagiell. 13.
- Meller Dawid, Jagiell. 6.
- Merczyński Em., pr. s. d. Os-
solińskich 10.
- Merunowicz Józef, c. k. Pro-
tomedyk, ul. Wałowa 31.
- Mosing Kaz., Wałowa 13.
- Mukowicz Edward, Szpital.
- Nowiński Seweryn, Sykstus-
ka 48.

- Dr Opolski Wiktor, pr. sz. p. rad. zdr. Wałowa 13.
 Pawlikowski Ant., fiz. m. Chorążczyzna 2.
 Piotrowski Gustaw, Akademińska 5.
 Pisek Wilh., Jagiell. 12.
 Prus Jan, Kościuszki 7.
 Rapaport Józef, Karola Ludwika 31.
 Reitzes D., Skarbkowska 27.
 Rieger Zygmunt, rad. zdr. pl. Halicki 10.
 Roicki Ant., Karola L. 7.
 Rosenbusch L., Kopernika 32.
 Rosenzweig Leo, Sykst. 6.
 Rosner Jan, Wałowa 11.
 Rosner Ig., l. m. Sykstuska 24.
 Rożański Józef, prym. sz. Sykstuska 36.
 Sawicki Edward, prym. szp. Batorego 9.
 Schaff Sische, Krakowska 20.
 Schmidt Edm., l. m. Akademińska 11.
 Schmidt Filip, Lyczakowsk. 3.
 Schram Hilary, Halicka 20.
 Seifmann Piotr, dyr. sz. w. Sielski Szcześny, Akademicka 8.
 Sieradzki Antoni, Akademicka 15.
 Singer Menele, Krasieckich 20.
 Skałkowski Władysł., Teatralna 16.
 Smitowski Miecz., Sobieskiego 7.
 Smutny K., Chorążczyzna 14.
 Sobolewski Kaźm., s. sz.
 Sochański J., Hetmańska 10.
 Stachiewicz Teofil, Plac Maryacki 8.
 Stahlberger Teodor, Szpital.
 Stark J., Karola Ludw. 37.
 Steinhaus Józef, em. lek. pow. Kamińskiego 6.
 Stella-Sawicki Jan, ins. szp. Długosza 15.
 Strojnowski Edw., Plac Maryacki 67.
 Szuszkiewicz Piotr, Ossolińskich 12. lek. polic.
- Dr Świątkiewicz Mich., Ormiańska 29.
 Szpilman Józef, doc. szk. wet. Sztembarth Celestyn, sek. szp. Batorego 26.
 Taschmann Albert, Sykstuska 24.
 Tataarczuch Władysław. l. m. Kołataja 3.
 Tomańek Józef, Teatralna 21.
 Urech Marek, Żółkiewska 1.
 Urech Teofil, Jagiell. 2.
 Uhma Czesław, Wałowa.
 Wachtel Ant., Wałowa 11.
 Wagner Arnold, l. k. Kopernika 10.
 Wechsler Emil, Bernardyński plac 11.
 Wehr Wiktor, Sykstuska 9.
 Weigel Józef, Akademińska 20.
 Wiernicki Józef, Mickiew. 3.
 Wiczkowski Józef, chem. szp. p. Skarbkowska 4.
 Widman Oskar, pr. szp. Grodzickich 2.
 Wiktor Jan, l. m. Żółkiewska 8.
 Willer Abr., Janowska 12.
 Zakreys Franc., Grodecka 50.
 Ziembicki Grzeg, ojciec, Wałowa 15.
 Ziembicki Grzeg. syn, pr. szp. 3 Maj. 5.
- C. Aderschlagel Adolf, Kościelna 1.
 Beschloss Manisch v. Maksym, Żółkiewska 29.
 Caliga Karol, dentysta, Skarbkowska 9.
 Chifl Sam., Wekslarska 12.
 Gabel Hil., Sobieskiego 26.
 Gallasch Józef, Janowska 32.
 Gąsiorowski Juljusz, l. k. Dworzec.
 Gotlieb Leo, Rejtana 2.
 Grabscheid Max, pl. Krakowski 19.
 Haynrich Józef, Czackiego 6.
 Knopf Salom., d. inwalid,
 Krainer Emanuel, Krakowska 7.
 Lateiner Jak., Grodecka 57.

- C. Lateiner Nathan, plac Maryjacki 10.
 Letz Samuel, pl. Gołuchowskich 15.
 Lisowski Maryan, dent. plac Halicki.
 Madeyski Edw., ortoped. Piekarska 21.
 Mark Sal., Halicka 1.
 Szymonowicz Jan, Teatr. 23.
 Weis Ign., Jagiellońska 6.
 Zawirski Konst., Bator, 34.
 Zrogowski Jan, Halicka 26
 W. Kubicki Leon, w. m. Bat. 7.
 Borkowski Jan.
 Kretowicz Paweł, n. szk. w.
 Markowski Tomasz.
 Serwacki Mich., as. szk. w.
 Sikorski Narcyz, wet. p. w
 biurze san. Namiestn.
 Thur Dawid.

1. Pow. Bialski.

- D. Bogdanik Józef, Biała.
 Długołęcki Kar., Kęty l. m.
 Dworzański Karol „
 Kaczorowski Bronisław, Biała.
 Kapelusz Eisig, Biała.
 Lwieciński Maciej, Biała.
 Lucki Sas Julian, Oświęcim.
 Plessner Jakób, Oświęcim.
 Schlank Maur. „ l. k.
 Slosarczyk Antoni „
 Nycz Wincenty, Biała l. p.
 C. Kupka Józef, Biała l. m.
 Spelda Aleks. „
 Kunz J., Wilamowice l. g.
 W. Smoluchowski Jan, Biała w.
 pow.
 Lucki Teofil, Oświęcim.
 Lubliner Leon, Biała w. m.
 Sochaniewicz Teofil, Kobier-
 niec wet. szk. roln.

2. Pow. Bobrecki.

- D. Hirschler Miecz., Bóbrka as.
 san.
 Żukotyński Fr., Bóbrka.
 C. Sochacki Fel., Chodórow.
 Handt Izydor „ l. m.
 Roth Wolf, Bóbrka.
 Sternberg Bern., Strzeliska.

- Urieh Salamon, Bóbrka.
 W. Herasymowicz Stanisław,
 Bóbrka w. p.

3. Pow. Bocheński.

- D. Roth Al., Bochnia l. p.
 Bartmański Ferd., Niepołomice l. m.
 Górski Czesław, Bochnia.
 Oświęcimski Sz., Bochnia sek.
 szp.
 Nodzyński Bolesław, Bochnia.
 Piórko Ad., Niepołomice.
 Słapa Teofil, Bochnia em. l. sal.
 Dobruchowski Adam, Wiśnicz
 l. domu kar.
 C. Wieselmann Mor., Wiśnicz l. m.
 W. Fertig Zygm., Bochnia w. p.

4. Pow. Bohorodczański.

- D. Coghen Antoni, Bohorodczany
 as. san.
 Feuerstein N., Sołotwina.
 Głowiński Winc., Sołotwina
 l. sk.
 C. Tumin Ad., Bohor. l. m.
 W. Schwetter Feliks, Bohor.

5. Pow. Borszczowski.

- D. Dorożyński Jak., Borsz. l. p.
 Dawidowicz Emil, Mielnica.
 Jodłowski Jan, w Bilezu.
 Kalinowicz Mikołaj, Korolówka
 l. m.
 Mosler Maks., Borszczów.
 C. Czauderna Kar., Skala l. sk.
 Minczeles Lazar, Uście b.
 Paślawski Wiktor, Skala.
 Poeller Herm., Skala l. m.
 W. Fedorowicz Włodz., Borszczów
 w. p.

6. Pow. Brodzki.

- D. Borysiewicz Wiktor, Załozec.
 Bujalski Maryan, Załozce.
 Goldhaber Paweł, Brody l. m.
 Jendl Ignacy, Brody.
 Kalach Feliks, Brody.
 Leiblinger Fel., Brody.
 Madejski Wł., Pieniaki l. p.
 Schorstein Lud., Brody.
 Silbermann Edw. „

- Sołtysik St., Brody pr. sz.
 Strumiński Adam, Brody.
 Zaorski Bronisł., Podkamień.
 C. Bardasch D., Założce l. m.
 Grünfeld Iz., Brody l. m.
 Nussbaum Melchior, Podkamień l. m.
 Rager Izydor, Założce.
 Rosenbaum Leon, Łopatyn l. m.
 Weiss Pink., Brody s. sz.
 W. Harasymowicz Dyonizy,
 Brody w. p.
 Szczerba Jan, Brody weter.
 pogr.

7. Pow. Brzeski.

- D. Kisielewski Franc., Zakliczyn
 l. m.
 Bernadzikowski Sz., Brzesko.
 Bernacki Franc., Brzesko.
 Michalik Józef, Szczeruowa.
 Pałka Konrad, Radłów.
 Pietrzycki Antoni, Brzesko.
 C. Czernek Hen., Wojn. l. m.
 W. Grodecki Miecz., Brzesko.

8. Pow. Brzeżański.

- D. Milerowicz Józ., Kozłów l. m.
 Skibiński Adam, lek. pow.
 Teitelbaum Melech, Brzeżany.
 Uranowicz Tadeusz, l. m.
 Zauderer Albert, pr. szp.
 C. Schenker E., Brzeż. sek. szp.
 Stern Rachmiel, Kozowa.

9. Pow. Brzozowski.

- D. Lic Henr., Brzozów l. p.
 Słaczka Ant. " l. m.
 Gaska Jan, Dynów.
 Baraniecki Artur, Dynów.

10. Pow. Buczacki.

- D. Bobek Jan, Potok Złoty.
 Koerner Ed., Monast. l. m.
 Krzyżanowski Edw., Buczacz
 l. m.
 Nacht Fabiusz, Buczacz.
 Obtulowicz Ferd. " l. p.
 Stokłosiński Franc., Jazłowiec.
 Witoszyński Teofil, Uście ziele-
 lone.
 C. Mosler Mojżesz, Buczacz.

Adler Szymon, Monasterzyska
 l. m.

- Feder Jak., Jazłowiec l. m.
 W. Majkowski Bazyli, Buczacz
 wet. pow.

11. Pow. Chrzanowski.

- D. Dura Józ., Krzeszowice l. s.
 Damski, Jaworzno l. górń.
 Klein Leon, Chrzan. l. m.
 Pawlas Teod. " l. p.
 Schneck Karol, Szczakowa.
 Steinkeller Hen., Trzebinia.
 C. Kowarzik An., Siersza l. g.
 W. Ochnicz Michał, Szczakowa
 w. pogr.

12. Pow. Cieszanowski.

- D. Jabłoński Jac., Cieszanów
 as. san.
 Mildner Józef, Lubaczów l. m.
 Szymański Ludw. " "
 C. Rotter As., Cieszanów l. m.

13. Pow. Czortkowski.

- D. Bubeniczek Franc., em. lek.
 pułk. Czortków.
 Wągrowski Karol, Czortków
 l. p.
 Stoekl Adolf, Czortków.
 Lutyński Lud., Jagielnica l.
 fabr.
 C. Oestersetzer Ad., Czortków
 l. m.
 W. Marko Dymitr, Czortków.

14. Pow. Dąbrowski.

- D. Cymbler Walery, l. m. Żabno.
 Kramarzyński Mieczysł., Dą-
 browa.
 Ozimek Stan., Dąbrowa.
 Zaremba Ant., l. m. sąd.
 Rudnicki Karol, Szczućin l. m.
 C. Kluczycki Wit., Mendrzechów.

15. Pow. Dobromilski.

- D. Bieńczowski Aleks., Dobro-
 mil l. p.
 Cwiklicer Lud., Dobr. l. sal.
 Nycz Henryk, Bircza.
 C. Brauner Leon, Dobr. l. m.
 W. Bardach Zach.

16. Pow. Doliniański.

- D. Krzyształowicz Ad., Dolina l. p.
 Kotłowski Stanisław, Dolina l. m.
 Podluski Mikołaj, Bolechów l. m. i kol.
 C. Kujłowski Leon, Wołoska wieś l. sal.
 Baumöhl Naf., Roźniatów.
 W. Piskorski Jan "

17. Pow. Drohobycki.

- D. Janowski Ig., Droh. l. p.
 Lechowski Wik. " pr. sz.
 Jurkiewicz Kaźm., Drohobycz l. sal.
 Bermann Dawid, Borysł.
 Antoniewicz Włodzimierz, Drohobycz.
 Lów Bernh., Borysław l. kop.
 Rudorfer Jonas, Borysław.
 C. Reich Baruch, Droh. l. m.
 Rosenöhl Joach. " l. kol.
 Kelhofer Sam., Borysł. l. m.
 W. Fischer Joach., Drohob.

18. Pow. Gorlicki.

- D. Wroński Bartł., Gorlice l. p.
 Januszkiewicz Ign., Biecz.
 Kukulski Antoni "
 Neumann Eugen., Gorlice.
 Przesmycki Jan "
 Grzybczyk Stan. "
 C. Koller Józ., Gorlice l. m.
 W. Lipiński Ludwik, Gorlice.

19. Pow. Grodecki.

- D. Danielski Jan, Gródek as. san. l. pow.
 Freudenthal Izaak, Gródek.
 Gawroński Aleks., Gródek l. m. i kol.
 C. Landau Ad., Gródek.
 Schöps Ignacy, Janów.
 W. Langhaus Józef, Gródek wet. pow.

20. Pow. Grybowski.

- D. Jakubowski Adam, Grybów l. m.

Kronenberg Karol, Grybów l. p.
 Mikołajski Stefan, Ciężkowice l. m. i kol.

21. Pow. Horodeński.

- D. Przetocki Kaźm., Horod. as. sanit.
 Jastrzębski Julian, Horodenka.
 Roszko Antoni, Horod.
 C. Burnatowicz Rom., Obertyn l. m.
 Kurzer Gustaw, Horod. l. m.
 Landes Leon " "
 Piotrowicz Mar. " l. m.
 W. Gnatewicz Piotr, Horod.

22. Pow. Husiatyński.

- D. Frydmann Zeno, Husiatyn l. p.
 Auerhahn Wilch., Chorostków.
 Wilson Rysz., Kopeczyńce.
 C. Hladij Sz., Chorostk. l. m.
 Margules Elias, Husiatyn.
 Pomeranz Filip " "
 Rares Izydor, Husiat. l. m.
 Siebner Nath., Kopyczyńce l. m.
 Sobelsohn Dawid, Probuźna l. m.
 W. Dorożyński Teofil, Husiatyn w. p.
 Sigal Herm., Husiatyn ogl.

23. Pow. Jarosławski.

- D. Plech Aur., Jarosł. em. l. p.
 Dietzius Adolf, Jarosław lek. m. i kol.
 Friedwald Abr., Jarosław.
 Jastrzębski Walery, Sieniawa.
 Meissels Zym., Jarosław.
 Marynowski Miecz., Jarosław l. pow.
 Richter Fryder., Jarosław.
 Trzaskowski Bron., Jarosław.
 Turzański Grzeg., Jarosław.
 Warzycki Bron., Radymno.
 C. Thalheim Joachim, Pruchnik l. m.
 Morecki Pink., Sieniawa l. m.
 Reiss Abr., Radymno l. m.
 W. Waśniewski Fr., Jarosław w. p.

24. Pow. Jasielski.

- D. Biesiadecki Jan, Jasło l. p.
 Cieglewicz Stan. " "
 Hicner Aleks. " l. m.
 Kadyj Józef " s. sz.
 Macudziński Wal. " pr. sz.
 Natter Wiktor, Frysztak.
 Pawlicki Teod., Żmigród.
 C. Spiegel Em., Frysztak l. m.
 W. Urich Leopold, Jasło w. m.

25. Pow. Jaworowski.

- D. Hordyński Andrzej, Jaworów l. pow.
 Gracka Józef, Krakowiec,
 C. Bendel Zym., Jaworów.
 Gabel Rubin " l. m.
 Piotrowski Ign., Wielkie Oczy.

26. Pow. Kałuski.

- D. Wurst Adolf, Kałusz l. p.
 Kurowiec Jan " "
 C. Kiczales Herm., " l. kol.
 Finkelstein Moritz, Kałusz l. m.
 Hand Leop., Wojniłów.
 W. Atlass Hermann, Kałusz.

27. Pow. Kolbuszowski.

- D. Filewicz Jan, l. p.
 Drzewiecki Stefan, Sokolów l. m.

28. Pow. Kamionecki.

- D. Kołychanowski Józef, Kamionka l. p.
 Ciuk Aleks., Radziechów.
 Prochaska Teofil, Busk.
 Stupnicki Wł., Kamionka.
 C. Brand Jul., Radziech. l. m.
 Raps Maks., Kamionka.
 Siegelbaum Jakób, Busk.
 W. Kwieciński Stanisław, Kamionka wet. pow.

29. Pow. Kołomyjski.

- D. Głaczyński Wł., Kołomyja pr. sz.
 Jakubowski Mich. " l. m.
 Mayzel Władysław " "
 Piaskiewicz Wł. " "
 Romaszkan Józef " "

- Rosner Maksym., Kołom. l. p.
 Sysak Gabryel " "
 Kirschen Osyas " "
 Schmidt Józef " e. l. p.
 Wojda Marc., Peczen. l. m.
 Lic Feliks, Gwoździec.
 C. Mazacz Jan, Peczen l. m.
 Pistol Don., Gwoździec l. m.
 Reder Eman., Kołomyja.
 Stauber Adolf " "
 Ternier Hersch " "
 Zaleski Antoni " "
 W. Janowicz Stefan " "

- Timoftiewicz Ludwik, Kołomyja wet. pow.

30. Pow. Kosowski.

- D. Tarnawski Apol., Kosów as. sanit.
 Bażant Wacl., Kosów l. sal.
 Skomorowski Jan, Kutry l. m.
 C. Rudich Leon, Kosów.
 W. Wolf Geller, Kosów.

31. Pow. Krakowski.

32. Prow. Krośnieński.

- D. Najedło Feliks, l. p.
 Wain Jan, Krosno.
 Humiecki Mod., Krosno.
 Mazurkiewicz Dyon., Krosno l. m.
 Reiss Karol, Dukla l. m.
 Kocay Aleks., Krosno.
 Przysłowski Jakób, Korezyn l. gm.
 C. Horak Karol, Dukla.
 W. Pawlikiewicz Piotr, Krosno wet. pow.

33. Pow. Łańcucki.

- D. Bielański G., Łańcut l. p.
 Fleszar Jan, Łańcut l. m.
 Howiecki Mateusz, Przeworsk.
 Koncewicz Jan " l. m.
 Mach Seb., Kańczuga.
 Nidecki Apolin., Leżajsk.
 C. Arzt Ignacy, Łańcut l. sk.
 Peszkowski Ad., Leżajsk.
 Dobiasz Teod., Przew. l. m.
 Malina Filip " l. k.
 W. Sołtykiewicz Jan, Przew.

34. Pow. Limanowski.

- D. Ściborowski Kazim., l. p.
Kruk Kazim., Limanowa.
Odrobina Jerzy, Mszana l. k.

35. Pow. Liski.

- D. Dembowski M., Lisko l. p.
Zadurowicz Emil, Ustrzyki.
Zduń Józef, Procisne.
C. Freysinger Józ., Lisko l. m.
Propst Jakób, Lutowisko l. m.

36. Pow. Lwowski.

- D. Kolberger, Kulpark. s. sz.
Maliszewski H. " " "
Wislocki " " "
Neusser Gust. " dyr.
Pluciński Mich., " p. sz.
Bernolak Jan, Winniki l. f.
C. Markel Ig., Szczerzec l. m.
Raps Maur., Jaryczów "

37. Pow. Mielecki.

- D. Kijas Błażej, Mielec l. p.
Lorentski And., Radomyśl.
Schaffer Wład., Mielec.
Iwański Kar., Radom. l. m.
C. Schabus Em., Mielec l. m.
W. Nestajko Euzeb., w. p.

38. Pow. Mościski.

- D. Lebedowicz Em., Mościs. l. p.
Pordes Major, Sądowa W.
C. Raab Hen., Sąd. W. l. m.
Korner Wilh., Mośc. l. m.
W. Kruczkowski Sylw., Mośc.

39. Pow. Myślenicki.

- D. Dereniowski Bol., Jordanów
l. m.
Kuihyniecki Klem., Myślenice
l. p.
Łodziński Wikt., Myśl. l. m.
Uchacz Bł., Maków l. sk.
Spitzel Jakób, Rabka.

40. Pow. Nadworniański.

- D. Głowiński Wine., Nadwórna
l. p.
Bogdański Bron., Delatyn l.
m. i sal.

- Bibring Szym., Nadwórna.
C. Feuerstein Maur., Nadwórna
l. m.

41. Pow. Niski.

- D. Loewy Alojz., Nisko l. p.
Ciechanowicz Antoni, Nisko.
Hernich Franc., Rudnik.
C. Hand Saul, Ulanów l. m.
W. Zoerner Ferd., Nisko w. p.

42. Pow. Nowosądecki.

- D. Przybylski Wacł., N. Sącz
l. p.
Dziembowski Józef, Muszyna
l. m.
Fiorich Tytus, N. Sącz.
Gawałkiewicz Leop., S. Sącz.
Głuchowski Miecz., N. Sącz.
Kijas Tadeusz " "
Kosterkiewicz Franc. " "
Kołączkowski Józ. " "
Mohr Dawid " "
Richter Józef, N. Sącz l. m.
Sławik Karol " "
Trembecki On. " "
Zengteller Luc. " pr. sz.
Kozubski Ludwik, N. Sącz.
Chilewski Aleks., S. Sącz l. m.
C. Zauderer Maur., N. Sącz.
W. Stuber Krystyn "

43. Pow. Nowotarski.

- D. Goldhaber Adolf, Nowy Targ
as. san.
Schein Her., N. Targ l. m.
Chramiec And., Zakopane.
Chwistek Bronisł. " "
l. st. klimat.
Nieszkowski Zdz., Szczawnica
(tylko w lecie).
Hammerschlag Rudolf, Kroś-
cienko.
W. Sochacki Ed, Nowy Targ
w. p.

44. Pow. Pilzneński.

- D. Januskiewicz Ig., Pilzno
l. p.
Gumowski Franc, Brzostek
l. m.
Mydlarski Wład., Pilzno.

45. Pow. Podhajecki.

- D. Dzikowski Zyg., Podhajece
as. san.
Feuerstein Leon, Podhajece.
Galusiński Antoni, Podhajece
pr. szp.
Lidechower Maur., Podhajece.
C. Sternschuss Henryk, Podhajece
sek. szp.
Bardach Teod., Wiśniowczyk
l. m.

46. Pow. Przemyski.

- D. Cassina Ferd., Przemysł l.
p. rad. zdr.
Szyszkowski Mich., Przemysł.
Kiebuziński Baz. "
Keller Maurycy "
Smolański Zygm. "
Lityński Luc., Przem. l. k.
Trybulec Franc. "
Ziemiański Leon "
Rosenbluth Efr. "
Ruczka Stan., Niżankowice.
Salay, Przem. em. l. szp.
Gasiorek Fran., Lubiecko.
C. Čilf Joachim, Przemysł.
Biber Maur., Przem. sek. szp.
i więz.
Salweŕ Joach., Przemysł.
W. Horodyski Stefan, Przemysł
wet. pow.
Łukaszewski Andr., Przemysł
wet. m.

47. Pow. Przemysłański.

- D. Waligórski Alb., Przemysłański
l. p.
Dolnicki Cyryl, Przemysłański.
C. Eliasiewicz Mar., Gliniany
l. m.
Kostmann Ig., Przemysłański
l. m.
Sternberg Józef, Przemysłański.

48. Pow. Rawski.

- D. Lisiński Lud., Rawa l. p.
Dadlez Julian, Rawa.
Szajnowski Wład., Uhnów.
C. Elner Mark., Niemir. l. m.
Herold Izidor, Rawa.

Hirsch Henryk, Lubycza.
Kibitz Bernard, Uhnów.
Kibitz Natan, Rawa.

W. Rożankowski Jan, Rawa w. p.

49. Pow. Rohatyński.

- D. Wasylewski Tyt., Rohatyn
as. san.
Węgrzynowski, Rohat, l. m.
Płochocki Tadeusz, Bursztyn.
C. Friedmann Maur., Rohatyn.
Chamaides Bern., Boleszów.
Goldscheider Jak., Bukaczowce
l. k.
W. Fried Fryd., Rohat. w. p.

50. Pow. Ropczycki.

- D. Wyszatycki Fr., Ropczyce
l. p.
Bentkowski Zygm., Dębica.
Sędzielowski Fr., Sędzisz.
Röller Fryd., Ropcz. l. m.
C. Sztolzenberg Kar., Sędzisz.
Benda Ant., Dębica l. m. i k.
Reiss Elias, Dębica.
W. Dr. Rasp. Kar., Ropczyce
wet. pow.

51. Pow. Rudecki.

- D. Żelazowski Wiktor, l. p.
Maciulski Józef, Kołbajów.
Jakliński Leon, Komarno l. sk.
C. Bardasch M., Komarno l. m.
Gizelt Józef, Rudki l. m.

52. Pow. Rzeszowski.

- D. Barzycki Józ., Rzeszów l. p.
Drobner Edw. " s. sz.
Jabłoński Stan. " pr. sz.
Kohn Ignacy "
Niesiołowski Wł. "
Segel Edward "
Szczepański Tyt., Strzyż.
Kolasiński Alf., Błazowa.
Szczepański Włodz., Rzeszów.
Zagórski Ad., Rzeszów l. m.
Patryn Józ., Strzyżów l. m.
Fiałkowski Wojc., Rzeszów.
Kraus Herman, Rzeszów.
Bujniewicz Jakób "
C. Kopeczny Jan, Błazów.
Bernfeld Leon, Tycz. l. m.

Herzum Józ., Głogów l. m.
 Rotter Herm., Rzeszów.
 W. Vergesslich Józ. „ wet.

53. Pow. Samborski.

D. Skalski Wł., Sambor l. p.
 Biegelmayr Alf., Sambor
 prym. szp.
 Kopaczyński Wład., Sambor.
 Markiewicz Hen. „
 Pulman Ad. „
 C. Luster Herm., Sambor.
 Reis Leon „
 W. Machalski Wł., Samb. w. p.

54. Pow. Sanocki.

D. Bielecki Ignacy, Rymanów.
 Dukiet Józ., Ryman. l. zdr.
 Galant Józef, Zagórz l. k.
 Zaleski Karol, Sanok.
 Lemer Tytus „
 Krzyszkowski Er., Rymanów.
 Szajna Józ., Ryman. l. m.
 Drewiński M., Sanok l. szp.
 C. Stangenhauz Józef, Sanok
 sek. szp.
 Atlas Sal., Bukowsko l. m.
 W. Olbrycht Piotr, San. w. p.

55. Pow. Skałacki.

D. Meciński Konstanty, Skałat
 l. p.
 Świdzki Miecz., Podwoło-
 czyska l. p.
 Wojtkowski Jan, Grzym.
 C. Bügeleisen Wilh., Touste.
 Kümmermann Sal., Skałat.
 Starwer Maurycy „
 Metal Izaak, Podwołoczyska
 l. m.
 W. Tychowski Wikt. „ w. p.
 Rohr Henr., Podw.

56. Pow. Śniatyński.

D. Werner Kar., Śniatyn l. p.
 Lic Feliks, Zabłotów.
 Mehrer Izaak, Śniatyn l. m.
 C. Pomeranz Izaak, Śniatyn.
 Berger Aron, Śniatyn.
 W. Gottlieb Aleks., „ w. p.
 Faulent Karol „
 Prager Sam., Zabłot. w. m.

57. Pow. Sokalski.

D. Broniewski Ant., Sokal l. p.
 Wypiański Gwido „ p. s.
 Musiałowicz Każm., Bełz.
 Jajus Miron, Sokal.
 Łuszczkiewicz J., Sokal.
 Feuerstein El., Krystynop.
 C. Markl Józef, Wareż l. m.
 Pordes Sal., Krystynopol.
 Blum Zygm., Bełz.
 W. Eitelberg Br., Sokal w. p.
 Orzechowski, Bełz.

58. Pow. Stanisławowski.

D. Wolański St. l. p.
 Frankfurter Józ., l. m.
 Sztenczel Bernard „
 Csessnak Julian „
 Gašiorowski Leodgard, l. do-
 mu karnego.
 Żukowski Aleks., Stanisł.
 Machnowski Wacł. „ l. k.
 Ochsenhorn Mojż. „
 Konkolniak Grzeg. „ p. s.
 Ostafiński Maryan „
 Konarzewski J., Halicz l. m.
 Mołczkowski Dyon. „ l. k.
 Lachawiec Apol., Stanisławów.
 C. Kurzer Leon, Stanisławów.
 Grader Maur. „
 Blausztein Elias „
 Klaar Szymon „ l. k.
 Hoffman Jan „ l. sz.
 Szczepkowski Tyt., Stanisła-
 wów l. kar.
 Rosenbaum Max., Stanisł.
 W. Dulęba Maryan „ w. p.
 Frucht Maurycy „ w. m.

59. Pow. Staromiejski.

D. Baliński Stan., l. p.
 Laskiewicz Alfred, Stara Sól.
 Mężyk Jan, Chyrów lek. zakł.
 wych. OO. Jezuitów.
 C. Obuszkiewicz Stanisł., Stare
 miasto l. i wet. m.
 Berko Hersz, Staremiasto.
 Schubert Mikołaj, Chyrów l. k.

60. Pow. Stryjski.

D. Serkowski Bol., Stryj l. p.
 Jakobi Lucyan, Stryj.

- Michalski Wiktor, Skole.
 Papieski Antoni, Stryj l. k.
 Mironowicz Kor., Skole l. s.
 Medwey Aleks., Morszyn.
 Jeż Andrzej, Stryj.
 C. Temple Dym., Stryj l. m. i
 pr. sz.
 Kräterblüth Jak., Skole.
 Rosenberg Nach., Stryj l. k.
 König Iz., Stryj sek. szp.
 W. Mglej Jan, Stryj w. p.
 Horodnicki Mikołaj, Stryj.

61. Pow. Tarnobrzesci.

- D. Machalski Leon, Tarnobrzeg
 l. p.
 Pawlas Walerian, Tarnobrzeg
 l. szp.
 Reifer Ad., Tarnobrzeg l. m.
 Dumaire Wł., Rozwad. "
 Bakowski Teofil, Baranów.
 Szóstkiewicz St., Radom.
 C. Hellmann Tob., Tarnobrzeg.

62. Pow. Tarnopolski.

- D. Gładyszowski Emil, Tarnopol l. p.
 Eckhardt Józ. Tarnop. p. s.
 Karmin Józef "
 Korngrün Joach. "
 Leiblinger Izyd. "
 Moszkowicz "
 Rosenfeld Ad. " p. s. ż.
 Weissberg Zyg. "
 Brudziński Lud., Mikuliń.
 Koller Bolesław, Mikuliń.
 Swistun Atan., Tarnopol.
 Münzer Max. "
 Zgórski Kazim. "
 C. Brauner Izydor " s. sz.
 Planer Jakób "
 Stein Ad., Tarnop. dent.
 W. Weissberg Adolf, Tarnop.

63. Pow. Tarnowski.

- D. Stanko Wojc., Tarnów. l. p.
 Metzger Jan " l. m.
 Białkowski Wład. "
 Kowalski Henr. "
 Skowroński Wł. " p. s.
 Bromberg Leon " l. k.
 Glaser Leopold "

Lerner Wilhelm Tarnów.

- Pilzer Herman "
 Walczyński Józ. "
 Wolfram Adolf "
 Józefczyk Tad. "
 Kaczkowski Wit. "
 Pochron Józef " l. sk.
 Midowicz Kaz. " s. sz.
 Portik Józef "
 Kalisz Al., Tuchów l. m.
 W. Wójcik Wł., Tarnów w. p.
 Bernstein Józ. " w. m.

64. Pow. Tłumacki.

- D. Litwinowicz Orest, Tłumacz
 l. p.
 Ebersohn M., Tysmienice.
 C. Nussbaum Al., Tyśm. l. m.
 Philip Herman, Ottynia l. m.
 i kol.
 W. König Pinkas, Tłumacz.

65. Pow. Trembowelski.

- D. Grünhaut Bern. l. p.
 Olpiński Jul., Trembowla.
 Stoklassa Józ., Budz. l. m.
 Glücksmann Natan, Budzanów.
 Kummer Leon, Strussów.
 C. Neustein Joach., Trembowla
 l. m.
 Fischer Leon, Trembowla.
 Rosenstock Ign., Budzanów.
 Rosenstock Ad., Janów.
 Hrazdilek Ed., Strusów.

66. Pow. Turecki.

- D. Ciepielowski K. Turka l. p.
 Kowalski Karol "
 C. Kelhofer Sal. " l. m.
 W. Kisiel Daniel " w. p.

67. Pow. Wadowicki.

- D. Zawadziński Stanisł., Wadowice l. p.
 Bukowski August, Wadowice.
 Żędzianowski Sta., "
 Opydo Franc., "
 Gedl Władysł. "
 Lewandowski An., Tłucz.
 Geslak Jan., Zebrzydowice
 l. szp.
 Tarchalski Józ., Zator, l. m.

Zborowski J., Andrychów l. m.
 C. Frychleb Jan, Kalwarya.
 Weczerka August, Wadowice.
 W. Hryniewiecki Em. „ w. p.
 Bogdan Grzeg., Wadowice.

68. Pow. Wielicki.

D. Malinowski Kaz., Dobczyce.
 Aronsohn Sam., Podgórze.
 Kownacki Józ., Wieliczka.
 Morawiecki Jan, Gdów.
 Podobiński Ant., Wiel. l. m.
 Scheuring Ed., „ l. s.
 Skakalski Eu., Podg. l. m.
 Świętek Winc., Podg. l. k.
 Nawrat Stanisł., Skawina.
 Panciewicz, Podgórze.
 Steiner Stanisław, Wieliczka.

69. Pow. Zaleszczyki.

D. Sobolewski Franc., l. p.
 Omeis Jerzy, Zaleszczyki.
 Jaworski Bol. „
 Kretz Ber., Tłuste.
 Morawski, „ l. m.
 Sołowski Jan, Zalesz. p. sz.
 Pawlikiewicz J., Uścieczko.
 C. Reischer Izaak, Zaleszczyki.
 sek. sz. i l. m.
 W. Raff Chaskiel., Zaleszczyki.

70. Pow. Zbarański.

D. Berger Michał, Zbaraż. l. m.
 Bieler Max. „
 Celewicz Al., „
 C. Mantel Maur., „ l. sz.
 Reisner Wilh., „ l. m.
 W. Pawlikiewicz Jan „ w. p.

71. Pow. Złoczów.

D. Heyne Bol., Złoczów.
 Wysocki Aleks., Złoczów p. s.
 Stein Elias, „
 Zaleski Eustachy „ l. p.

Skórski Em., Zborów l. m.
 C. Aderschläger Izaak, Biały
 Kamień l. m.
 Bienenwald S., Sasów j. m.
 Deutsch Hen., Złocz. l. m.
 Eskreis Markus, „ s. sz.
 Hassman Ludwik, Nowosiołki
 l. sz.
 Hischhorn F., Jeziern. l. m.
 Nagler Maur., Zborów.
 Raps Mayer, Pomorz. l. m.
 Tischner Dion., Złoczów sek.
 sz. i sąd.
 Tokayer Jak., Pomorzany.
 Fuchs Mojż., Olesko l. m.
 W. Tłomak Henryk, Złoczów.

72. Pow. Żółkiewski.

D. Berggrün Alf., Żółkiew l. p.
 Drzymalik Sylw. „
 Muszkiet Karol „ p. sz.
 Radlmesser Karol „
 C. Bardon Em., Kulików l. m.
 Elner Sal., Żółkiew s. sz.
 Sakler Elias, Mosty w.
 W. Tantos Jan, Żółk. w. p.

73. Pow. Żydaczowski.

D. Lachowicz Zdzisław, Żyda-
 czów a. s.
 Gozdecki Józ., Żurawno l. m.
 Kraetschmar Fel., Drohow.
 Kuraśiewicz Józef, Rozdół.
 C. Petersil Józ., Rozdół l. m.

74. Pow. Żywiecki.

D. Gawlik Jan, Sucha l. hut.
 Janota Rud., Węg. górka.
 Podgorski Czesław.
 Witowski Edw., l. p.
 Seidler Ant., Żywiec l. sk.
 Blumenfeld Joa., Zabłocie.
 C. Klein Ad., Rajeza l. sk.
 W. Nowak Jan, Żywiec w. m.



OGÓLNE PRZEPISY POCZTOWE.

Należytość za listy zwyczajne w całym państwie austr. do wagi 20 gr. ($\frac{0}{10}$ ł. ct.) jest 5 ct., nad 20 do 250 gr. (15 ł. ct.) 10 ct., listy takie mogą być przy oddaniu opłacone lub nie, a wtenczas za listy niefrankowane do 20 gr. 10 ct., od 20 do 250 gr. 15 ct., listy za mało frankowane podlegają tej samej opłacie, z tą różnicą, że wartość przyklepionych marek odlicza się.

Za listy, które w miejscu doręczane bywają, opłaca się: do 20 gr. 3 ct., od 20 do 250 gr. 6 ct. Za nieopłacone opłaca odbiorca 6 ct. do 20 gr.; 9 ct. do 250 gr.

Listy kartkowe po 3 ct. dla doręczenia adresatom w miejscu nadania zamieszkałym, jakoteż listy kartkowe po 5 ct., które do wszystkich krajów monarchii austriackiej, Prus i Niemiec przesyłane być mogą.

Karty korespondencyjne po 2 ct. mogą być przesyłane do wszystkich krajów monarchii austriackiej, Prus i Niemiec — karty te można wysyłać zagranicę z dolepieniem odpowiedniej należytości. Karty korespondencyjne mogą być rekomendowane jak listy za opłatą 10 ct. za rekomendację, lub przyklepieniem marki 10 ct.

Na listy rekomendowane otrzymuje się receptis. Należytość rekomendacyjna do wszystkich krajów europejskich wynosi 10 ct.

Jeżeli nadawca po upływie pewnego czasu nie otrzymał odpowiedzi, natenczas ma prawo przy urzędzie nadawczym zrobić zapytanie (reklamację) za opłatą 10 ct. Jeżeli zaś był dołączony receptis zwrotny, natenczas reklamacya nie podlega żadnej opłacie; jeżeli pokaże się, że list zaginął, wtenczas ma prawo żądać wynagrodzenia 20 złr., gdy list był do miejsca w obrębie monarchii położonego adresowany, zaś 21 złr., gdy był za granicę wysłany.

Za granicę muszą być pieczętowane jedną lub dwiema pieczętkami, w kraju zaś mogą być tylko zalepiane. Listy rekomendowane do Prus i Niemiec mogą być posyłane na koszt adresata.

Druki. Do państwa Austriackiego oraz Niemiec wynosi opłata: do 50 gr. 2 ct., do 250 gr. 5 ct., do 500 gr. 10 ct.; do 1 kilogr. 15 ct. Waga nie może przenosić kilogr. (2 fnt. ct.). Niedostatecznie opłaconych druków nie wysła się, lecz zwrócone są oddawcom.

Listy pilne. Jeżeli oddawca życzy sobie, ażeby list natychmiast po odejściu do miejsca przeznaczenia był doręczonym, winien dopisać na kopercie po lewej stronie u dołu „*doręczyć zaraz przez umyślnego posłańca*“ (expres). Za to dopłaca się 15 ct., jeśli adresat mieszka w miejscu, gdzie się znajduje urząd

pocztowy. Za każde $7\frac{1}{2}$ kilometra (miał) odległości od urzędu pocztowego płaci się posłańcowi 50 cnt., zawsze jednak adresat jest odpowiedzialny za uiszczenie przypadającej kwoty. Na kopercie można i godzinę oznaczyć, o której list musi być koniecznie wręczony. — Należność uiszcza się przylepianiem marek odpowiedniej wartości, zaś przy pieniężnych, gotówką. Za doręczenie awiza razem z przesyłką opłata wynosi 30 ct.

Taryfa opłaty listów.

Do	Należność za opłatę				
	Listy		kor.kart. cnt.	Druki	
	za każde gr.	cnt.		za każde gr.	cnt.
Belgii, Bułgarii, Chin (p. Rosyję)	15	10 5		50	3
Danii i Islandyi	"	10 5		50	3
Egiptu	"	" "		" "	" "
Niemiec z Alzacyą i Lotaryngią, Helgoland i Luxenburg	do 15	5 "	do	50	2
				250	5
	nad 15	10 2	"	500	10
	— 250		"	1000	15
Francyi z Algierem	15	10 5		50	3
Gibraltar przez Niemcy	15	10 5		50	3
Grecyi i wysp Jońskich, Korfu, Cefalonia, Zante	15	10 5		50	3
Wielkiej Brytanii i Irlandyi . . .	15	10 5		50	3
Włoch	15	10 5		50	3
Czarnogóry	15	7 4		50	2
Niederlandów	15	10 5		50	3
Norwegii	15	10 5		50	3
Persyi przez Rosyję	"	" "		" "	" "
Portugalii z Maderą i w. Azorskich	15	10 5		50	3
Rumunii (Mołdawii i Wołoszczyzny)	15	10 5		50	3
Rosyi z Polską	15	10 5		50	3
Stany Zjednocz. Północ. Ameryki.	"	" "		" "	" "
Szwajcaryi	15	10 5		50	3
Serbii (z Węgier)	15	5 4		50	2
(z Austrii)	15	7 3		50	2
Hiszpanii	15	10 5		50	3
Tureyi europ. i azyatyckiej przez Tijest, Belgrad Orsowę	15	10 5		50	3

Listy z pieniędzmi winny być zaopatrzone w kopercie trwałej pięcioma pieczęciami, w urzędowej zaś kopercie dwiema, lub też jeżeli wartość przenosi 500 zlr., a waga 250 gramów, przynieść je można na pocztę, ale nie zapieczętowane, aby urzędnik mógł sprawdzić kwotę znajdującą się w nich, wten-

czas jednak portoryum musi być zaraz uiszczone i wynosi więcej, niż zwyczajne.

Gotówkę brzęczącą posyłając, należy obwinąć w papier i przypieczerować wewnątrz koperty, aby się nie poruszała.

Opakowanie. Przedmioty małej wartości, którym przyciśnięcie nie szkodzi, nie przepuszczające tłuszczu lub wilgoci, nie przenoszące ciężaru 3—3 kilogr., na nie wielką odległość pakować można w papier mocny i obwiązać sznurkiem.

Powziątki pocztowe w kraju (Nachnahme). Wolno wysyłać przesyłki do wszystkich w kraju poczt monarchii austr., jakoteż węgierskiej za pobraniem do wysokości 500 złr.

Przekazy pieniężne (Postanweisungen). Za pośrednictwem urzędów pocztowych można przekazywać wypłaty w kraju do wysokości 500 złr. w. a.

Przesyłający opłaca porto przyklejeniem marki do 5 złr. 5 cent., od 5 do 50 złr. 10 cent., do 150 złr. 20 ct., od 150 do 300 złr. 30 ct., od 300 do 500 złr. 50 ct.

Drogą zaś telegraficzną przyjmują i wypłacają przekazy pieniężne i znaczki pocztowe (Postanweisungen) do wysokości 500 złr. w. a. Przy przesyłkach przekazów drogą telegraficzną opłata pocztowa jest ta sama, co przy przekazach zwykłych, z dodatkiem opłaty depeszy zawisłej od ilości słów.

Przekazy za granicę mogą być przesyłane do całych Niemiec, Szwajcaryi, Bawaryi i Wirtembergu, Bułgarii, Rumunii, Turcji i Egiptu, jako też do Stanów Zjednoczonych Ameryki, jak również ze wszystkich tych krajów do Monarchii austr. i węgierskiej. Blankiety są inne jak w kraju, opatrzone 10 ct. marką. Kwoty mogą być przesyłane do wysokości 200 złr. albo 400 marek czyli 500 franków.

Zlecenia pocztowe. Za pośrednictwem urzędów pocztowych można ściągać od innych osób drobne wierzytelności do wysokości 500 złr. Blankietów nabywa się w urzędach pocztowych po cenie $\frac{1}{2}$ centa; a dołączony dokument (n. p. weksel, rachunek lub kwit itp.), przesyła się w kopercie zapieczerowanej, jako opłacony list polecony pod adresem urzędu pocztowego, gdzie debent mieszka.

W razie uiszczenia kwoty na blankiecie wyrażonej, wydaje poczta adresatowi załączone dokumenta, a pieniądze przesyła wierzycielowi za przekazem, po strąceniu zwykłej należności przekazowej.

Zlecenia pocztowe są i do Niemiec dozwolone; w takim razie wierzytelności obliczają się na austriacką monetę wedle kursu wiedeńskiego.

Pod jedną kopertą można więcej zleceń naraz wysyłać, ale nie trzeba zapomnieć o dołączeniu dokumentu każdego zlecenia, gdyż w takim razie zlecenie musiałoby być zwrócone bez skutku po upływie dni 14.

PORADNIK TELEGRAFICZNY.

W depeszach europejskich 15, w poza europ. 10 liter stanowi jedno słowo, wyraz więcej liter liczący, liczy się za dwa. Pięć cyfer w europ., 3 cyfry w poza europ. depeszach, stanowią słowo.

Bliższe oznaczenie w jaki sposób chce oddawca przesać depeszę, można w sposób skrócony oznaczać, dwie takie zgłoski liczą się za słowo.

Mp. Depesza do rąk własnych adresata.

D. Pilno. Depesza taka ma pierwszeństwo przed innemi; (taksa potrójna).

Rp. Odpowiedź zapłacona. Należytość zależy od ilości żądanej odpowiedzi.

Rpd. Odpowiedź zapłacona pilna. Należytość jak przy depeszy pilnej.

Xp. Posłaniec zapłacony.

Na żądanie nadawcy, można otrzymać recepis za opłatą 5 ct.

Nadawca może zażądać wstrzymania depeszy, lub jeżeli już wysłana, wstrzymać doręczenie tejże, w pierwszym przypadku otrzymuje zwrot opłaty po strąceniu 25 ct., w drugim przypadku musi nadać nową depeszę.

Opłata składa się:

- | | |
|---|--------|
| I. Z ogólnej taksy, wynoszącej w Monarchii Austro-Węgierskiej | 24 ct. |
| II. Do Bośni-Herzegowiny i innych państw | 30 " |
| Od każdego pojedynczego słowa, podług taryfy np. za depeszę złożoną z 10 słów, w obrębie Austrii zapłaci się takse zasadniczą | 24 ct. |
| a 10 słów po 2 ct. czyli 20 ct. = razem | 44 " |

Za pojedyncze słowo płaci się, oprócz taksy zasadniczej:

Algier i Norwegia	16 ct.
Ameryka północna	57 "
" południowa	4 Złr. 45 "
Anglia	20 "
Belgia, Dania i Niderlandy	11 "
Czarnogóra, Niemcy, Szwajcarya i Serbia	4 "
Bułgarya	9 "
Egipt	84 "
Francya	10 "
Greya	21 "
Hiszpania, Rosya i Turcya eur.	14 "
Holandya	13 "
Portugalia	17 "
Rumunia	6 "
Szwecya	12 "
Włochy	8 "

C. K. KOLEJE PAŃSTWOWE.

Wyciąg z rozkładu jazdy, ważny od 1 października 1891 r.

Czas środkowo-europ.

Odjazd z Krakowa (Podgórze):

5:00 rano poc. osob. z Podg.-Płaszowa	}	do Oświęcimsa, do Wiednia.
5:14 " " " z Podg.-Bonarki		
2:05 pop. poc. międz. z Krakowa (k. Póln.)		
2:27 " " osob. z Podg.-Płaszowa		
2:46 " " " z Podg.-Borki		
9:00 rano poc. międz. z Krakowa (k. Póln.)	}	do Biels., Żywca, Zwardon., Wied., Pesztu, N. Sącza, Orłow., Chyrow., Stryja.
9:19 " " osob. z Podg.-Płaszowa		
9:40 " " " z Podg.-Bonarki		
3:59 pop. poc. osob. z Krakowa (k. K. Lud.)	}	do Żywca, Msza- ny dolnej.
4:44 " " " z Podg.-Płaszowa		
4:56 " " " z Podg.-Bonarki		
6:55 wiecz. poc. międz. z Krakowa (k. Póln.)	}	do N. Sącza, Chyrow., Stryja.
7:16 " " osob. z Podg.-Płaszowa		
7:37 " " " z Podg.-Bonarki		

Przyjazd do Krakowa (Podgórze):

5:26 rano poc. osob. do Podg.-Bonarki	}	ze Stryja, Chy- rowa, N. Sącza.
5:41 " " " do Podg.-Płaszowa		
6:02 " " międz. do Krakowa (k. Póln.)		
6:14 " " osob. do Krakowa (k. K. Lud.)		
9:06 przedp. poc. osob. do Podg.-Bonarki	}	z Żywca, Msza- ny dolnej.
9:18 " " " do Podg.-Płaszowa		
10:02 przedp. poc. osob. do Podg.-Bonarki	}	z Wiednia, z Oświęcimsa.
10:18 " " " do Podg.-Płaszowa		
10:37 " " międz. do Krakowa (k. Póln.)		
10:58 " " osob. do Krakowa (k. K. Lud.)		
3:38 pop. poc. osob. do Podg.-Bonarki	}	z Pesztu, Wied., Zward., Żywca, Bielska, Stryja, Chyrow., Orłow., N. Sącza.
3:53 " " " do Podg.-Płaszowa		
4:12 " " międz. do Krakowa (k. Póln.)		
8:12 wiecz. poc. osob. do Podg.-Bonarki	}	z Oświęcimsa.
8:28 " " " do Podg.-Płaszowa		
9:20 " " posp. do Krakowa (k. K. Lud.)		

Odjazd z Tarnowa:

- 4:30 rano pociąg mieszany do Orłowa, Koszyc, Suchy, Żywea.
 9:41 " " osobowy do Chyrowa, Stryja.
 1:27 po poł. pociąg osobowy do Orłowa, Nowego Sącza, Dobry, Chyrowa, Stryja.

Przyjazd do Tarnowa:

- 10:56 przed poł. pociąg osobowy z Orłowa, Dobry, Now. Sącza, Stryja, Chyrowa.
 7:24 wiecz. poc. osob. z Koszyc, Orłowa, Żywea, Stryja, Chyrowa.
 11:59 w nocy pociąg mieszany ze Stryja, Chyrowa.

Czas środkowo-europejski jest wcześniejszy od czasu pragskiego o 2 minuty, zaś późniejszy od czasu krakowskiego o 20 m., od czasu lwowskiego o 36 m., od czasu wiedeńskiego o 6 m., od czasu budapeszteńskiego o 16 m. i od czasu cieszyńskiego o 14 minut.

Pociągi na kolei Karola Ludwika.

Według czasu średnio-europ. (który w porównaniu z lwowskim *spóźnia się* o 36 minut, w porówn. z krakowskim o 20 minut.

Odchodzą z Krakowa:		Przychodzą do Lwowa:	
6:02 rano poc. miesz.		6:39 wieczór.	
7:43 " " posp.		3:27 popoł.	
10:30 " " osob.		8:52 wieczór.	
3:59 pop. " " tylko do Tarnowa		6:28 " "	
10:27 wiecz. " "		8:14 rano.	
Odchodzą ze Lwowa:		Przychodzą do Krakowa:	
1:52 popoł. poc. posp.		9:20 wieczór.	
7:54 wiecz. " osob.		6:14 rano.	
3:39 w nocy " "		2:17 popoł.	
6:44 rano " "		5:44 " "	
8:20 " " " z Tarnowa		10:58 przedpoł.	

Pociągi kolei północnej

w kierunku do Wiednia lub od Wiednia. Czas średnio-europ.

Odchodzą z Krakowa:		Przychodzą do Krakowa:	
3:05 popoł. osob.		† * 5:00 popoł.	
9:37 wiecz. posp.		* 8:42 wiecz.	
† 6:35 " osob.		* 9:42 " "	
† * 6:55 rano posp.		† 7:25 rano	
† * 5:37 " osob.		7:05 " "	
† * 9:25 " "		† 9:46 " "	
† w kierunku do Warszawy lub z Warszawy.			
* " " " Prus " z Prus.			

SKALA STEMPOWA.

SKALA I.

na weksle.

		złr. ct.	
nad	Do	złr.	złr. ct.
	75	150	—05
nad 75	złr.	150	—10
"	"	300	—20
"	"	450	—30
"	"	600	—40
"	"	750	—50
"	"	900	—60
"	"	1050	—70
"	"	1200	—80
"	"	1350	—90
"	"	1500	1—
"	"	3000	2—
"	"	4500	3—
"	"	6000	4—
"	"	7500	5—
"	"	9000	6—
"	"	10500	7—
"	"	12000	8—
"	"	13500	9—

Od każdych zaś następnych 1500 złr. o 1 złr. więcej, przyczem jednak kwoty poniżej 1500 złr. uważane będą za pełne.

SKALA II.

kwity i dokumenta w sprawach prawnych.

		złr. ct.	
nad	Do	złr.	złr. ct.
	20	40	—07
nad 20	złr.	40	—13
"	"	60	—19
"	"	100	—32
"	"	200	—63
"	"	300	—94
"	"	400	1·25
"	"	800	2·50
"	"	1200	3·75
"	"	1600	5—
"	"	2000	6·25
"	"	2400	7·50
"	"	3200	10—
"	"	4000	12·50
"	"	4800	15—
"	"	5600	17·50
"	"	6400	20—
"	"	7200	22·50
"	"	8000	25—

Nad 8000 złr. od każdych 400 złr. opłacaną być ma należność wraz z nadzwyczajnym dodatkiem po złr. 1 ct. 25, przyczem sumy niżej 400 złr. uważają się jako pełne.

SKALA III.

ugody pożyczkowe, kontrakty służbowe, kwity na wygrane loteryjne.

		złr. ct.	
nad	Do	złr.	złr. ct.
	10	20	—07
nad 10	złr.	20	—13
"	"	30	—19
"	"	50	—32
"	"	100	—63
"	"	150	—94
"	"	200	1·25
"	"	400	2·50
"	"	600	3·75
"	"	800	5—
nad 800	złr.	1000	6·25
"	"	1200	7·50
"	"	1600	10—
"	"	2000	12·50
"	"	2400	15—
"	"	2800	17·50
"	"	3200	20—
"	"	3300	22·50
"	"	4000	25—

Nad 4000 złr. od każdych 200 złr. opłacaną być ma należność wraz z nadzwyczajnym dodatkiem po 1 złr. 25 ct., przyczem sumy niżej 200 złr. uważają się jako pełne.





NOTATKI.

STYCZEŃ.

1. Piątek. **Nowy Rok.**

2. Sobota.

STYCZEŃ.

3. Niedziela.

4. Poniedziałek.

STYCZEŃ.

5. Wtorek.

6. Środa. **Trzech Króli.**

STYCZEŃ.

7. Czwartek.

8. Piątek.

STYCZEŃ.

9. Sobota.

10. Niedziela.

STYCZEŃ.

11. Poniedziałek.

12. Wtorek.

STYCZEŃ.

13. Środa.

14. Czwartek.

STYCZEŃ.

15. Piątek.

16. Sobota.

STYCZEŃ.

17. Niedziela.

18. Poniedziałek.

STYCZEŃ.

19. Wtorek.

20. Środa.

STYCZEŃ.

21. Czwartek.

22. Piątek.

STYCZEŃ.

23. Sobota.

24. Niedziela.

STYCZEŃ.

25. Poniedziałek.

26. Wtorek.

STYCZEŃ.

27. Środa.

28. Czwartek.

STYCZEŃ.

29. Piątek.

30. Sobota.

STYCZEŃ.

31. Niedziela.

LUTY.

1. Poniedziałek.

2. Wtorek. **Oczyszcz. N. M. P.**

LUTY.

3. Środa.

4. Czwartek.

LUTY.

5. Piątek.

6. Sobota.

LUTY.

7. Niedziela.

8. Poniedziałek.

LUTY.

9. Wtorek.

10. Środa.

LUTY.

11. Czwartek.

12. Piątek.

LUTY.

13 Sobota.

14. Niedziela.

LUTY.

15. Poniedziałek.

16. Wtorek.

LUTY.

17. Środa.

18. Czwartek.

L U T Y.

19. Piątek.

20. Sobota.

LUTY.

21. Niedziela.

22. Poniedziałek.

23. Wtorek.

24. Środa.

LUTY.

25. Czwartek.

26. Piątek.

LUTY.

27. Sobota.

28. Niedziela.

LUTY.

29. Poniedziałek.

MARZEC.

1. Wtorek.

2. Środa.

MARZEC.

3. Czwartek.

4. Piątek.

MARZEC.

5. Sobota.

6. Niedziela.

MARZEC.

7. Poniedziałek.

8. Wtorek.

MARZEC.

9. Środa.

10. Czwartek.

MARZEC.

11. Piątek.

12. Sobota.

MARZEC.

13. Niedziela.

14. Poniedziałek.

MARZEC.

15. Wtorek.

16. Środa.

MARZEC.

17. Czwartek.

18. Piątek.

MARZEC.

19. Sobota.

20. Niedziela.

MARZEC.

21. Poniedziałek.

22. Wtorek.

MARZEC.

23. Środa.

24. Czwartek.

2

MARZEC.

25. Piątek. **Zwiast. N. M. P.**

26. Sobota.

MARZEC.

27. Niedziela.

28. Poniedziałek.

MARZEC.

29. Wtorek.

30. Środa.

MARZEC.

31. Czwartek.

KWIECIEŃ.

1. Piątek.

2. Sobota.

KWIECIEŃ.

3. Niedziela.

4. Poniedziałek.

KWIECIEŃ.

5. Wtorek.

6. Środa.

KWIECIEŃ.

7. Czwartek.

8. Piątek.

KWIECIEŃ.

9. Sobota.

10. Niedziela.

KWIECIEŃ.

11. Poniedziałek.

12. Wtorek.

KWIECIEŃ.

13. Środa.

14. Czwartek. *Wielk.*

KWIECIEŃ.

15. Piątek. *Wielk.*

16. Sobota. *Wielk.*

KWIECIEŃ.

17. Niedziela. Zmartw. P.

18. Poniedziałek. Wielk.

KWIECIEŃ.

19. Wtorek.

20. Środa.

21.

KWIECIEŃ.

21. Czwartek.

22. Piątek.

KWIECIEŃ.

23. Sobota.

24. Niedziela.

KWIECIEŃ.

25. Poniedziałek.

26. Wtorek.

KWIECIEŃ.

27. Środa.

28. Czwartek.

KWIECIEŃ.

29. Piątek.

30. Sobota.

1. Niedziela.

2. Poniedziałek.

k.

3. Wtorek.

4. Środa.

5. Czwartek.

6. Piątek.

M A J.

7. Sobota.

8. Niedziela.

9. Poniedziałek.

10. Wtorek.

11. Środa.

12. Czwartek.

13. Piątek.

14. Sobota.

15. Niedziela.

16. Poniedziałek.

17. Wtorek.

18. Środa.

19. Czwartek.

20. Piątek.

21. Sobota.

22. Niedziela.

23. Poniedziałek.

24. Wtorek.

25. Środa.

26. Czwartek.

27. Piątek.

28. Sobota.

29. Niedziela.

30. Poniedziałek.

M A J.

ek.

31. Wtorek.

CZERWIEC.

1. Środa.

2. Czwartek.

CZERWIEC.

3. Piątek.

4. Sobota.

CZERWIEC.

5. Niedziela. Zesł. Ducha. ś.

6. Poniedziałek. Świąt

CZERWIEC.

7. Wtorek.

8. Środa.

CZERWIEC.

9. Czwartek.

10. Piątek.

CZERWIEC.

11. Sobota.

12. Niedziela.

CZERWIEC.

13. Poniedziałek.

14. Wtorek.

CZERWIEC.

15. Środa.

16. Czwartek. **Boże Ciało.**

CZERWIEC.

17. Piątek.

18. Sobota.

CZERWIEC.

19. Niedziela.

20. Poniedziałek.

CZERWIEC.

21. Wtorek.

22. Środa.

CZERWIEC.

23. Czwartek.

24. Piątek.

CZERWIEC.

25. Sobota.

26. Niedziela.

CZERWIEC.

27. Poniedziałek.

28. Wtorek.

CZERWIEC.

29. Środa. Piotra i Pawła.

30. Czwartek.

LIPIEC.

1. Piątek.

2. Sobota.

LIPIEC.

3. Niedziela.

4. Poniedziałek.

LIPIEC.

5. Wtorek.

6. Środa.

LIPIEC.

7. Czwartek.

8. Piątek.

LIPIEC.

9. Sobota.

10. Niedziela.

LIPIEC.

11. Poniedziałek.

12. Wtorek.

L I P I E C.

13. Środa.

14. Czwartek.

LIPIEC.

15. Piątek.

16. Sobota.

LIPIEC.

17. Niedziela.

18. Poniedziałek.

LIPIEC.

19. Wtorek.

20. Środa.

LIPIEC.

21. Czwartek.

22. Piątek.

LIPIEC.

23. Sobota.

24. Niedziela.

LIPIEC.

25. Poniedziałek.

26. Wtorek.

LIPIEC.

27. Środa.

28. Czwartek.

LIPIEC.

29. Piątek.

30. Sobota.

LIPIEC.

31. Niedziela.

SIERPIEŃ.

1. Poniedziałek.

2. Wtorek.

SIERPIEŃ.

3. Środa.

4. Czwartek.

SIERPIEŃ.

5. Piątek.

6. Sobota.

SIERPIEŃ.

7. Niedziela.

8. Poniedziałek.

SIERPIEŃ.

k.

9. Wtorek.

10. Środa.

SIERPIEŃ.

11. Czwartek.

12. Piątek.

SIERPIEŃ.

13. Sobota.

14. Niedziela.

SIERPIEŃ.

15. Poniedział. **Wnieb. NP.**

16. Wtorek.

SIERPIEŃ.

17. Środa.

18. Czwartek.

SIERPIEŃ.

19. Piątek.

20. Sobota.

SIERPIEŃ.

21. Niedziela.

22. Poniedziałek.

SIERPIEŃ.

23. Wtorek.

24. Środa.

SIERPIEŃ.

25. Czwartek.

26. Piątek.

SIERPIEŃ.

27. Sobota.

28. Niedziela.

SIERPIEŃ.

29. Poniedziałek.

30. Wtorek.

SIERPIEŃ.

31. Środa.

WRZESIEŃ.

1. Czwartek.

2. Piątek.

WRZESIEŃ.

3. Sobota.

4. Niedziela.

WRZESIEŃ.

5. Poniedziałek.

6. Wtorek.

WRZESIEŃ.

7. Środa.

8. Czwartek. Narodz. NMP

WRZESIEŃ.

9. Piątek.

10. Sobota.

WRZESIEŃ.

11. Niedziela.

12. Poniedziałek.

WRZESIEŃ.

13. Wtorek.

14. Środa.

WRZESIEŃ.

15. Czwartek.

16. Piątek.

WRZESIEŃ.

17. Sobota.

18. Niedziela.

WRZESIEŃ.

19. Poniedziałek.

20. Wtorek.

WRZESIEŃ.

21. Środa.

22. Czwartek.

WRZESIEŃ.

23. Piątek.

24. Sobota.

WRZESIEŃ.

25. Niedziela.

26. Poniedziałek.

WRZESIEŃ.

27. Wtorek.

28. Środa.

WRZESIEŃ.

29. Czwartek.

30. Piątek.

PAŹDZIERNIK.

1. Sobota.

2. Niedziela.

3

PAŹDZIERNIK.

3. Poniedziałek.

4. Wtorek.

PAŹDZIERNIK.

5. Środa.

6. Czwartek.

PAŹDZIERNIK.

7. Piątek.

8. Sobota.

PAŹDZIERNIK.

9. Niedziela.

10. Poniedziałek.

11

PAŹDZIERNIK.

11. Wtorek.

12. Środa.

PAŹDZIERNIK.

13. Czwartek.

14. Piątek.

PAŹDZIERNIK.

15. Sobota.

16. Niedziela.

PAŹDZIERNIK.

17. Poniedziałek.

18. Wtorek.

PAŹDZIERNIK.

19. Środa.

20. Czwartek.

PAŹDZIERNIK.

21. Piątek.

22. Sobota.

PAŹDZIERNIK.

23. Niedziela.

24. Poniedziałek.

PAŹDZIERNIK.

25. Wtorek.

26. Środa.

PAŹDZIERNIK.

27. Czwartek.

28. Piątek.

PAŹDZIERNIK.

29. Sobota.

30. Niedziela.

PAŹDZIERNIK.

31. Poniedziałek.

LISTOPAD.

1. Wtorek. Wszystkich ŚŚ.

2. Środa.

3

LISTOPAD.

3. Czwartek.

4. Piątek.

LISTOPAD.

5. Sobota.

6. Niedziela.

LISTOPAD.

a. 7. Poniedziałek.

8. Wtorek.

LISTOPAD.

9. Środa.

10. Czwartek.

LISTOPAD.

11. Piątek.

12. Sobota.

LISTOPAD.

13. Niedziela.

14. Poniedziałek.

LISTOPAD.

15. Wtorek.

16. Środa.

LISTOPAD.

17. Czwartek.

18. Piątek.

LISTOPAD.

19. Sobota.

20. Niedziela.

LISTOPAD.

21. Poniedziałek.

22. Wtorek.

LISTOPAD.

23. Środa.

24. Czwartek.

LISTOPAD.

25. Piątek.

26. Sobota.

2

LISTOPAD.

27. Niedziela.

28. Poniedziałek.

LISTOPAD.

29. Wtorek.

30. Środa.

GRUDZIEŃ.

1. Czwartek.

2. Piątek.

GRUDZIEN.

3. Sobota.

4. Niedziela.

GRUDZIEŃ.

5. Poniedziałek.

6. Wtorek.

GRUDZIEŃ.

7. Środa.

8. Czwartek. **Niep. Pocz. N**

GRUDZIEŃ.

9. Piątek.

10. Sobota.

GRUDZIEN.

11. Niedziela.

12. Poniedziałek.

13

GRUDZIEŃ.

iałek.

13. Wtorek.

14. Środa.

GRUDZIEŃ.

15. Czwartek.

16. Piątek.

GRUDZIEŃ.

17. Sobota.

18. Niedziela.

GRUDZIEŃ.

19. Poniedziałek.

20. Wtorek.

GRUDZIEŃ.

21. Środa.

22. Czwartek.

GRUDZIEŃ.

23. Piątek.

24. Sobota.

GRUDZIEŃ.

25. Niedziela. Boże Nar.

26. Poniedział. Szczep. m.

GRUDZIEŃ.

27. Wtorek.

28. Środa.

GRUDZIEŃ.

29. Czwartek.

30. Piątek.

GRUDZIEŃ.

31. Sobota.

